

**Національна академія аграрних наук України
Інститут механізації тваринництва**

О. Кисельов, І. Комарова, Д. Мілько, Р. Бакарджиєв

**СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА
І ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(ІЗ ДОСВІДУ НАПИСАННЯ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ)**

Навчальний посібник

Електронний аналог друкованого видання (електронна книга)



**Запоріжжя
СТАТУС
2017**

УДК 651.92:001.817

C78

Рекомендовано та затверджено до друку рішенням ученої ради
Інституту механізації тваринництва НААН від 17.08. 2011 р., протокол № 7.

Рецензенти:

Б. І. Котов, д.т.н, професор кафедри загально–технічних дисциплін та
охорони праці Вінницького національного аграрного університету.

С. А. Вдовенко, д.с.–г.н. професор кафедри садово–паркового господар-
ства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного
університету.

О. В. Кисельов, к.т.н., с.н.с.
Інституту механізації тваринництва
Національної академії аграрних наук України.

І. Б. Комарова, к.с.–г.н., с.н.с.
Інститут олійних культур
Національної академії аграрних наук України.

Д. О. Мілько, д.т.н., доцент;

Р. О. Бакарджієв, к.т.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет.

**C78 Статистична обробка і оформлення результатів експеримен-
тальних досліджень (із досвіду написання дисертаційних робіт) :**
Навчальний посібник / О. В. Кисельов, І. Б. Комарова, Д. О. Мілько,
Р. О. Бакарджієв, за заг. ред. Д. О. Мілька ; Інститут механізації тва-
ринництва НААН. — Електронний аналог друкованого видання
(електронна книга). — Запоріжжя : СТАТУС, 2017. — 1181 с.,
482 табл., 379 іл., додатк. 9 (147 табл., 9 іл.). Бібліогр.: 197 наймен. —
1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

ISBN 978-617-7353-62-0

Розглянуто методи статистичного аналізу даних в агрономічних і
технічних науках. Подані основи обробки і оцінювання результатів
досліджень однофакторних і багатофакторних експериментів. Наве-
дено способи розрахунку та представлення числових і графічних ре-
зультатів із використанням персональних комп'ютерів при застосу-
ванні табличного процесора **Microsoft Excel** у складі **Microsoft**
Office та пакету прикладних програм **Statistica**.

Для аспірантів і студентів сільськогосподарських вузів, які на-
вчаються з агрономічних і технічних спеціальностей.

ISBN 978-617-7353-62-0

© О. В. Кисельов, І. Б. Комарова,
Д. О. Мілько, Р. О. Бакарджієв, 2017

ЗМІСТ

ВСТУП.....	21
1. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ТА ВИБІРКИ. ВАРІАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ.....	23
1.1. Основні характеристики статистичної сукупності.....	23
1.2. Типи групування статистичних даних.....	25
1.2.1. Структурне групування значень варіаційного ряду.....	26
1.2.2. Типологічні угруповання.....	30
1.2.3. Аналітичні угруповання.....	31
1.3. Основні показники характеристики варіаційного ряду.....	32
1.4. Узагальнюючі характеристики статистичних сукупностей.....	38
1.4.1. Ряди розподілу.....	38
1.4.2. Частотні характеристики рядів розподілу.....	39
1.4.3. Графічне представлення рядів розподілу.....	41
1.4.4. Показники центра розподілу варіаційного ряду.....	42
1.4.5. Показники варіювання.....	49
1.4.5.1. Розмах варіації R	49
1.4.5.2. Середній лінійний відхил.....	50
1.4.5.3. Правило додавання дисперсій.....	52
1.4.5.4. Стандартний і середньоквадратичний відхил.....	53
1.4.5.5. Коефіцієнт варіації — його оцінювання і застосування.....	70
1.4.5.5.1. <i>Визначення і оцінювання коефіцієнту варіації</i>	70
1.4.5.5.2. <i>Теоретичні основи обґрунтування оціночних значення коефіцієнта варіації дозаторів і змішувачів</i>	73
1.4.5.6. Дослідження форми розподілу.....	76
1.4.5.6.1. <i>Коефіцієнт асиметрії Пірсона</i>	76
1.4.5.6.2. <i>Визначення асиметрії і ексцесу розподілу</i>	77
1.5. Поради до роботи з функціями пакету аналізу MS EXCEL.....	81
2. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАНИХ.....	85
2.1. Визначення основних статистичних показників.....	85
2.2. Використання ПА MS EXCEL і ППП STATISTICA для аналізу данних.....	99
2.2.1. Установка пакету АНАЛИЗ ДАННЫХ програми MS Excel.....	99
2.2.2. Одержання основних статистичних показників за допомогою інструментів пакета АНАЛИЗ ДАННЫХ MS Excel.....	100
2.2.3. Одержання основних статистичних показників за допомогою ППП Statistica.....	101
2.3. Обчислення показників для інтервального ряду даних.....	126

3. ОСНОВНІ ВИДИ ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗПОДІЛІВ.....	129
3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	129
3.2. БЕЗПЕРЕРВНІ РОЗПОДІЛИ	131
3.2.1. Закон розподілу рівномірної щільності	131
3.2.2. Трикутний розподіл (розподіл Сімпсона)	134
3.2.3. Нормальний закон розподілу	136
3.2.4. Логнормальний розподіл	144
3.2.5. Розподіл Стюдента	151
3.2.6. Розподіл Фішера (F -розподіл).....	155
3.2.7. Хі-квадрат розподіл (χ^2 -розподіл Пірсона).....	159
3.2.8. Закон розподілу Вейбулла-Гніденка	163
3.2.9. Показниковий (експоненціальний) розподіл.....	166
3.2.10. Розподіл Релея	169
3.2.11. Розподіл Коші	175
3.3. ДИСКРЕТНІ РОЗПОДІЛИ	176
3.3.1. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі).....	176
3.3.2. Розподіл Пуассона.....	178
3.4. ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОКРЕМИМИ РОЗПОДІЛАМИ	183
4. ДВОМІРНІ РОЗПОДІЛИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН.....	185
4.1. ПОНЯТТЯ ПРО ДВОМІРНІ ВИПАДКОВУ ВЕЛИЧИНУ. ДВОМІРНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ	185
4.2. ДВОМІРНА ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ.....	185
4.2.1. Властивості двомірної функції розподілу	185
4.2.2. Імовірність влучення випадкової точки у напівсмугу і прямокутник	187
4.2.3. Матриця розподілу двомірної випадкової величини.....	189
4.2.4. Щільність імовірності двомірної випадкової величини.....	190
4.2.4.1. Двомірна щільність розподілу і її властивості	190
4.2.5. Залежні і незалежні випадкові величини.....	193
4.2.6. Умовні закони розподілу.....	195
4.3. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДВОВИМІРНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН.....	199
4.4. ДВОВИМІРНИЙ НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ.....	201
4.4.1. Теоретичні основи розподілу	201
4.4.2. Порядок розрахунку двовимірного нормального розподілу	207
4.4.3. Попадання в площинну область при двовимірному нормальному розподілі.....	209
4.4.3.1. Імовірність влучення в еліпс рівних ймовірностей і круг.....	209
4.4.3.2. Імовірність попадання у нескінченну прямолінійну смугу, довільно розташовану щодо головних осей розсіювання	210
4.5. РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ НА ПЛОЩИНІ	212
4.6. ФУНКЦІЇ ВІД НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН.....	213

5. УРАХУВАННЯ ПОХИБОК ПРИ ВИМІРЮВАННЯХ.....	215
5.1. Основні визначення.....	215
5.2. Визначення числа спостережень (обсягу вибірки)	215
5.3. Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії.....	218
5.4. Довірчі оцінки середньоквадратичної похибки.....	220
5.5. Види похибок вимірювання	223
5.6. Нормальний закон розподілу випадкових похибок.....	228
5.7. Показники точності вимірювання.....	229
5.8. Інструментальні похибки і способи їх визначення.....	229
5.9. Похибки приладів	232
<u>5.9.1. Прилади з адитивною смугою похибок</u>	<u>232</u>
<u>5.9.2. Прилади з мультиплікативною смугою похибок.....</u>	<u>234</u>
<u>5.9.3. Прилади з комбінованою смугою похибок</u>	<u>236</u>
5.9.3.1. Адитивний метод нормування	236
5.9.3.2. Мультиплікативний метод нормування	237
5.10. Способи нормування похибок вимірювальних приладів.....	238
5.11. Похибки при вимірюваннях	241
<u>5.11.1. Похибка одноразового вимірювання при рівномірному</u>	
<u>розподілі випадкових величин</u>	<u>241</u>
<u>5.11.2. Довірчі інтервали випадкової похибки.....</u>	<u>242</u>
<u>5.11.3. Визначення меж невиключної систематичної похибки</u>	
<u>результату вимірювань.....</u>	<u>244</u>
5.12. Виключення результатів з грубими похибками.....	246
<u>5.12.1. Параметричні критерії оцінки аномальності результатів</u>	
<u>вимірювань і виключення помилкових значень</u>	<u>248</u>
5.12.1.1. Метод виключення при відомому σ	248
5.12.1.2. Метод виключення при невідомому s	249
5.12.1.3. Оцінка за t -критерієм Стьюдента	250
5.12.1.4. Оцінка за r -критерієм з використанням стандартного	
відхилу	251
5.12.1.5. Критерій Смирнова–Граббса при відомій генеральній	
дисперсії.....	253
5.12.1.6. Оцінки сумнівних даних за критерієм Смирнова	254
5.12.1.7. Критерій Шарльє	255
5.12.1.8. Критерій Граббса.....	256
<u>5.12.1.8.1. Критерій Граббса для одного викиду</u>	<u>256</u>
<u>5.12.1.8.2. Перевірка за критерієм Граббса на два викиди</u>	<u>258</u>
5.12.1.9. Застосування критерію v	260
5.12.1.10. Критерій $3s$. Критерій Райта ($4s$)	261
5.12.1.11. Рекомендації Г. А. Аганекяна	262
5.12.1.12. Критерій В. І. Романовського.....	262
5.12.1.13. Критерій Ірвіна	264

5.12.2. Критерій Шовене.....	266
5.12.2.1. Загальноприйнятий критерій Шовене	266
5.12.2.2. Спрощений критерій Шовене.....	266
5.12.3. <u>Непараметричні критерії оцінки сумнівних і виключення</u> <u>помилкових значень</u>	267
5.12.3.1. Метод різниць (варіаційний критерій Діксона).....	267
5.12.3.2. Метод різниць за критерієм τ	269
5.12.3.3. Метод різниць (критерій Діксона)	269
5.12.3.4. Застосування розмаху усіченої вибірки	270
5.12.3.5. Застосування вибіркового розмаху.....	271
5.12.3.6. Використання вибіркового розмаху	272
5.13. Оцінка похибок при вимірюваннях	273
5.13.1. Оцінка похибок при прямих багаторазових вимірюваннях	273
5.13.2. Визначення похибки при непрямих вимірюваннях.....	278
5.14. ПРИКЛАДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ.....	281
5.14.1. Обробка прямих одноразових вимірювань	281
5.14.2. Обробка прямих багаторазових вимірювань.....	282
5.14.3. <u>Обробка непрямих вимірювань при відтворюваних умовах</u>	283
5.14.3.1. Похибка функції однієї змінної.....	283
5.14.3.2. Похибка суми двох величин	284
5.14.3.3. Похибка різниці двох величин	285
5.14.3.4. Похибка добутку двох величин.....	286
5.14.3.5. Похибка частки двох величин	287
5.14.3.6. Похибка при складних обчисленнях	288
5.14.3.7. Непряме вимірювання щільності матеріалу деталі складної форми	289
5.14.4. Обробка непрямих вимірювань у невідтворюваних умовах	294
5.14.5. Загальний порядок розрахунків при непрямих вимірюваннях	295
5.15. ОБРОБКА СПІЛЬНИХ ВИМІРІВ. МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ	296
5.16. ПРАВИЛА ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ.....	298
5.16.1. Обмеження числа значущих цифр і округлення похибки	298
5.16.2. Запис результату вимірювань при прямих вимірюваннях.....	302
6. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ОЦІНЮВАНИХ ВИБІРОК	303
6.1. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ	303
6.2. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ ВАРІАЦІЇ, СИМЕТРИЧНІСТЮ, ЧИСЕЛ ВЕСТЕРГАРДА	304
6.3. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВІЗУАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ Й ПОБУДОВОЮ ГІСТОГРАМ. ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ШАПРО-УІЛКА.....	305
6.4. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗА СЕРЕДНІМ АБСОЛЮТНИМ ВІДХИЛЕННЯМ	306

6.5. Використання χ^2 -критерію згоди Пірсона.....	307
6.5.1. Використання χ^2 -критерію для оцінювання дисперсій	307
6.5.2. Оцінка дисперсії нормально розподіленої випадкової величини. Оцінка дисперсії відтворюваності	309
6.5.3. Оцінювання відповідності між експериментальними й теоретичними даними за χ^2 -критерієм Пірсона.....	311
6.5.4. Використання χ^2 -критерію для перевірки нормальності статистичного розподілу (підгонка розподілу)	313
6.5.4.1. Розрахунковий метод перевірки за χ^2 -критерієм	313
6.5.4.2. Перевірка нормальності розподілу χ^2 -критерієм за допомогою ППП Statistica.....	316
6.6. Одновибірковий тест Колмогорова для перевірки виду статистичного розподілу	320
6.7. Перевірка нормальності розподілу за складеним критерієм d	323
6.8. Критерій Омега-квадрат.....	325
6.9. Критерій Андерсона-Дарлінга	327
6.10. Оцінка відповідності вибірки нормальному розподілу за В. І. Романовським	328
6.11. Перевірка нормальності статистичного розподілу за допомогою коефіцієнтів асиметрії й ексцесу	329
6.12. Оцінка виду розподілу графічним способом	331
7. ОЦІНКА СТАТИСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ВИБІРКАМИ	335
7.1. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РІВНІВ ЗНАЧУЩОСТІ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ГІПОТЕЗ	335
7.2. Типи вимірювальних шкал даних.....	350
7.3. Використання ПАРАМЕТРИЧНИХ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ.....	358
7.3.1. Загальні положення.....	358
7.3.2. Принципи розрахунку при оцінці вибірок	359
7.3.3. Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій	359
7.3.3.1. Розрахункове виконання двовибіркового F -тесту за критерієм Фішера-Снедекора	359
7.3.3.2. Визначення гомоскедастичності двовибірковим F -тестом за критерієм Фішера-Снедекора ПА MS Excel	361
7.3.4. Оцінка розбіжності між дисперсіями за t -критерієм Стюдента ...	362
7.3.5. Порівняння середніх при відомих дисперсіях	363
7.3.6. Застосування z -критерію для середніх арифметичних.....	364
7.3.6.1. Розрахунковий метод z -тесту.....	364
7.3.6.2. Двовибірковий z -тест для середніх арифметичних.....	365
7.3.7. Використання t -критерію Стюдента для середніх арифметичних.....	367

7.3.7.1. Вимоги до застосування t -критерію.....	367
7.3.7.2. Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стьюдента).....	368
7.3.7.2.1. <u>Розрахунковий метод оцінки за одновибірковим t-критерієм Стьюдента</u>	368
7.3.7.2.2. <u>Порівняння вибіркової середньої з константою використанням ППП Statistica</u>	370
Порівняння вибіркової середньої з константою використанням одновибіркового t -критерію	370
Застосування тестового інструменту ППП Statistica	372
7.3.7.3. Двовибірковий гомоскедастичний t -тест	373
7.3.7.3.1. <u>Розрахункове виконання двовибіркового t-тесту із статистично рівними дисперсіями</u>	373
7.3.7.3.2. <u>Двовибірковий гомоскедастичний t-тест статистичною функцією ПА MS Excel</u> СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ	376
7.3.7.4. Розрахункове виконання двовибіркового t -тесту із статистично різними дисперсіями (двовибірковий гетероскедастичний t -тест)	376
7.3.7.4.1. <u>Точкова оцінка зі зміною критичного значення t</u>	376
7.3.7.4.2. <u>Точкова оцінка зі зміною ступеня вільності</u>	377
7.3.7.4.3. <u>Точкова оцінка з використанням середньозваженої дисперсії вибірок</u>	379
7.3.7.4.4. <u>Двовибірковий гетероскедастичний t-тест функцією MS Excel</u> СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ	380
7.3.7.4.5. <u>Представлення середньозваженого при виконанні двовибіркового t-тесту із статистично різними дисперсіями</u>	380
7.3.7.5. Застосування критерію В. І. Романовського.....	382
7.3.7.6. Оцінка істотності різниці середніх вибірок однакового обсягу за t -критерієм	383
7.3.7.6.1. <u>Оцінка різниці середніх незв'язаних вибірок</u>	383
7.3.7.6.2. <u>Точкове оцінювання середньої різниці за t-критерієм</u>	384
7.3.7.6.3. <u>Точкове оцінювання середньої різниці за критерієм Бейлі</u>	385
7.3.7.6.4. <u>Точкове оцінювання середньої різниці за F-критерієм Фішера</u>	386
7.3.7.6.5. <u>Оцінювання середньої різниці між вибірками довірчим інтервалом</u>	388
7.3.7.7. Розрахунковий метод оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами за середньою різницею	389
7.3.7.7.1. <u>Загальні положення</u>	389
7.3.7.7.2. <u>Точкове оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами за t-критерієм Стьюдента</u>	390

7.3.7.7.3. <u>Оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами довірчим інтервалом</u>	391
7.3.7.8. Найменша істотна різниця (НІР).....	392
7.3.7.8.1. <u>Загальні положення</u>	392
7.3.7.8.2. <u>Оцінка НІР середньої різниці попарно пов'язаних вибірок</u>	394
7.3.7.8.3. <u>Оцінка НІР незалежних вибірок</u>	395
7.3.7.9. Перевірка гіпотези про рівність середніх без припущень про дисперсіях	395
7.3.7.10. Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами парним двовибірковим t -тестом для середніх	397
7.3.7.11. Виконання t -тесту Стюдента з використанням ППП Statistica	398
7.3.7.11.1. <u>Виконання t-тесту Стюдента порівнянням за змінними</u>	398
7.3.7.11.2. <u>Тест Стюдента при порівнянні за групами</u>	405
7.3.7.11.3. <u>Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами використанням ППП Statistica</u>	407
7.3.7.11.4. <u>Тестове визначення t-критерію Стюдента</u>	408
7.3.7.12. Аналіз вибірок за допомогою t - і z -тестів із використанням пакету аналізу Microsoft Excel.....	410
7.3.7.12.1. <u>Загальні положення</u>	410
7.3.7.12.2. <u>Виконання двовибіркового t-тесту із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel</u>	411
7.3.7.12.3. <u>Виконання двовибіркового t-тесту із статистично різними дисперсіями пакетом аналізу Excel</u>	413
7.3.7.13. Швидкий тест Вайєра.....	414
7.3.7.14. Оцінка різниці між коефіцієнтами варіації.....	415
7.3.8. Множинні порівняння вибірок	416
7.3.8.1. Помилки у використанні t -критерію Стюдента.....	416
7.3.8.2. Перевірка рівності декількох середніх за допомогою дисперсійного аналізу	417
7.3.8.3. Множинні порівняння за t -критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні	419
7.3.8.4. Застосування критерію Ньюмена–Кейлса	421
7.3.8.5. Критерій Тьюкі у множинних порівняннях	423
7.3.8.6. Множинні порівняння з контрольної групою	424
7.3.8.6.1. <u>Використання поправка Бонферроні у множинних порівняннях з контрольної групою</u>	424
7.3.8.6.2. <u>Використання критерію Даннета при множинних порівняннях з контрольної групою</u>	425

7.4. Обчислення НЕПАРАМЕТРИЧНИХ КРИТЕРІЇВ	426
7.4.1. Загальні положення	426
7.4.2. Порівняння двох незалежних вибірок	427
7.4.2.1. <i>U</i> -критерій Манна–Уїтні	427
7.4.2.1.1. <i>Загальні положення при застосуванні U-критерію</i>	427
7.4.2.1.2. <i>Розрахункове визначення U-критерію Манна-Уїтні</i>	429
7.4.2.1.3. <i>Визначення U-критерію Манна–Уїтні за допомогою</i> <i>ППП Statistica</i>	430
7.4.2.2. Визначення достовірності відмінності <i>T</i> -критерієм Уайта	432
7.4.2.3. Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова для оцінки розбіжності між емпіричними сукупностями	433
7.4.2.3.1. <i>Розрахунковий метод</i>	433
7.4.2.3.2. <i>Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова</i> <i>з використанням ППП Statistica</i>	436
7.4.2.4. Критерій серій Вальда–Вольфовиця	436
7.4.2.5. <i>X</i> -критерій Ван–дер–Вардена	437
7.4.3. Порівняння двох залежних вибірок	439
7.4.3.1. Критерій знаків	439
7.4.3.1.1. <i>Загальні положення</i>	439
7.4.3.1.2. <i>Гіпотеза про частку ознаки</i>	440
7.4.3.1.3. <i>Відповідність довільної величини певній вибірці</i>	440
7.4.3.1.4. <i>Гіпотеза однорідності парних вибірок</i>	441
7.4.3.1.5. <i>z-критерій знаків</i>	442
7.4.3.1. <i>Гіпотеза про значення медіани</i>	443
7.4.3.2. Обчислення заданого довірчого інтервалу для медіани	444
7.4.3.3. Знако–ранговий критерій (<i>T</i> -критерій Уїлкоксона)	445
7.4.3.3.1. <i>Розрахункове визначення T-критерію Уїлкоксона для двох</i> <i>залежних попарно зв'язаних вибірок</i>	445
7.4.3.3.2. <i>Розрахункове визначення T-критерію Уїлкоксона для двох</i> <i>незв'язаних вибірок</i>	447
7.4.3.3.3. <i>Застосування T-критерію Уїлкоксона і критерію знаків</i> <i>із використанням ППП Statistica</i>	448
7.4.3.4. Порівняння декількох середніх за допомогою рангового критерію Дункана	451
8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ОЗНАК	455
8.1. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРОК ЗА ЯКІСНИМИ ОЗНАКАМИ	455
8.2. ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ЧАСТКИ	457
8.3. АНАЛІЗ ТАБЛИЦЬ СПРЯЖЕНОСТІ (КРОСТАБУЛЯЦІЇ)	458
8.3.1. Загальні пояснення	458
8.3.2. Порівняння груп за якісними бінарних ознакою	459

8.3.3. Порівняння вибіркової відносної частоти з популяційною.....	460
8.3.3.1. Порівняння довірчого інтервалу вибіркової відносної частоти з популяційною.....	460
8.3.3.2. Відповідність ймовірності події певному значенню	462
8.3.3.3. Перевірка гіпотез за z -критерієм.....	463
8.3.4. Порівняння двох частот всередині однієї і у двох групах	464
8.3.4.1. Порівняння довірчого інтервалу вибіркової частоти з популяційною.....	465
8.3.4.1.1. <i>Розрахунковий метод порівняння довірчого інтервалу з використанням MS Excel</i>	465
8.3.4.1.2. <i>Порівняння двох пропорцій (часток) вибірок з використанням ППП Statistica</i>	466
8.3.4.2. Оцінка різниці між вибірковою і генеральною частками	467
8.3.4.3. Перевірка статистичної рівності частот у двох популяціях.....	468
8.3.4.3.1. <i>Розрахунковий метод перевірки статистичної рівності частот з використанням MS Excel</i>	468
8.3.4.3.2. <i>Перевірка статистичної рівності частот з використанням ППП Statistica</i>	468
8.3.4.3.3. <i>Оцінка різниці між частками</i>	469
8.3.4.4. Оцінка якісних ознак коефіцієнтом варіювання	471
8.3.4.5. Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при двох градаціях критерієм χ^2	472
8.3.4.5.1. <i>Розрахунковий метод з використанням MS Excel</i>	472
8.3.4.5.2. <i>Порівняння з використанням ППП Statistica</i>	475
8.3.4.6. Число градацій більше двох	476
8.3.4.6.1. <i>Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при більше ніж двох градаціях</i>	476
8.3.4.6.2. <i>Порівняння двох вибірок χ^2-критерієм</i>	477
8.3.4.6.3. <i>Порівняння розподілу вибірки із заданим</i>	479
8.3.5. Таблиці спряженості 2×2 : критерій χ^2 -Пірсона. Коефіцієнт асоціації (зв'язності).....	480
8.3.5.1. Розрахунковий метод для таблиць спряженості	480
8.3.5.2. Визначення коефіцієнту асоціації (зв'язності) за допомогою ППП Statistica	482
8.4. АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ: КРИТЕРІЙ СЕРІЙ.....	484
9. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ.....	487
9.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ	487
9.2. Лінійна кореляція (кореляція Пірсона).....	488
9.2.1. Лінійна кореляційна залежність	488
9.2.2. Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції	494
9.2.3. Довірчі оцінки коефіцієнта кореляції	499

9.2.4. Оцінка “підозрілих” значень при кореляційному аналізі	500
9.2.5. Мінімальний обсяг вибірки для оцінки коефіцієнта кореляції	502
9.2.6. Розрахунок параметрів коефіцієнту кореляції калькулятором ППП Statistica	503
9.2.7. Кореляційний аналіз квадратних матриць.....	504
9.2.7.1. Кореляційний аналіз застосуванням інструменту MS Excel КОРЕЛЯЦІЯ	504
9.2.7.2. Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica	505
9.2.8. Кореляційні залежності і побудова прямокутних матриць за допомогою ППП Statistica	509
9.2.8.1. Визначення кореляційних залежностей і побудова прямокутних матриць.....	509
9.2.1. Множинний кореляційний аналіз.....	511
9.2.2. Частинний коефіцієнт кореляції.....	513
9.2.2.1. Використання ПА MS Excel при визначенні частинного коефіцієнта кореляції	513
9.2.2.2. Визначення параметрів частинної кореляції за допомогою ППП Statistica	517
9.2.3. Кореляційний аналіз вибірок малого обсягу із застосуванням функції MS Excel КОРЕЛ	520
9.3. Міри зв’язку змінних, виражених у неметричних шкалах	521
9.3.1. Показники непараметричної кореляції	521
9.3.2. Розрахунковий метод рангової кореляції Спірмена	524
9.3.3. Визначення кореляційних залежностей у неметричних шкалах і побудова матриць.....	525
9.4. КОРЕЛЯЦІЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ	529
9.5. КОРЕЛЯЦІЯ БІНАРНИХ ДАНИХ.....	530
9.6. ПОРІВНЯННЯ ДВОХ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ	532
9.6.1. Порівняння кореляцій незалежних вибірок.....	532
9.6.1.1. Розрахункове порівняння кореляцій незалежних вибірок	532
9.6.1.2. Порівняння кореляцій незалежних вибірок з використанням ППП Statistica	534
9.6.2. Порівняння кореляцій залежних вибірок	535
9.7. ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ КРИВОЛІНІЙНОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ	536
9.7.1. Кореляційне відношення	536
9.7.2. Оцінка елементів криволінійного кореляційного зв’язку.....	545
9.7.3. Оцінки криволінійності кореляційного зв’язку критерієм Блекмана	550
9.8. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ.....	551

10. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ	555
10.1. Основні положення дисперсійного аналізу	555
10.2. Розрахунковий метод при порівняння двох вибірок.....	562
10.3. Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента Дисперсионный анализ ПА MICROSOFT EXCEL.....	563
10.4. Дисперсійний аналіз однофакторного досліджу	565
10.4.1. Розрахунковий метод із використанням пакету аналізу MS Excel.....	565
10.4.1.1. Дисперсійний аналіз з урахуванням впливу повторень досліджу	565
10.4.1.2. Дисперсійний аналіз без урахуванням впливу повторень досліджу	568
10.4.2. Використання інструменту Дисперсионный анализ MS Excel при однофакторному експерименті	572
10.4.2.1. Застосування для ДА інструменту Однофакторный дисперсионный анализ.....	572
10.4.2.2. Дисперсійний аналіз подвійним використанням інструменту Однофакторный дисперсионный анализ.....	574
10.4.3. Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica	575
10.4.3.1. Особливості дисперсійного аналізу експериментів засобами PPP Statistica	575
10.4.3.2. Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica	577
10.4.3.2.1. Використання опції Однофакторный дисперсионный анализ.....	577
10.4.3.2.2. Використання опції Повторные измерения.....	584
10.5. Дисперсійний аналіз двофакторного досліджу	587
10.5.1. Двофакторний експеримент без повторення.....	587
10.5.1.1. Застосування пакету Excel при двофакторному ДА без повторення.....	587
10.5.1.2. Двофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica	590
10.5.2. Двофакторний експеримент із повторенням	593
10.5.2.1. Розрахунковий метод дисперсійного аналізу	593
10.5.2.2. Використання пакету Excel Двофакторный дисперсионный анализ с повторениями	598
10.5.2.3. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні PPP Statistica	600
10.5.3. Оцінка простих ефектів	606

10.5.4. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторними вимірами	608
10.5.4.1. Загальні положення	608
10.5.4.2. Результати ДА без врахування повторних вимірів (за усіма даними вибірки)	610
10.5.4.2.1. <i>Особливості використання пакету Microsoft Excel</i>	610
10.5.4.2.2. <i>Використання ППП Statistica</i>	611
10.5.4.3. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторними вимірами при використанні ППП Statistica.....	612
10.6. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДІВ З БАГАТОРІЧНИМИ КУЛЬТУРАМИ.....	616
10.7. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ТРИФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ	623
10.7.1. Послідовне застосування інструменту ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ пакету Excel	623
10.7.2. Використання ППП Statistica для дисперсійного аналізу трифакторного експерименту з повторенням	627
10.8. ОСОБЛИВОСТІ ДА ВИБІРОК З ПРОПУЩЕНИМИ ТА ВІДНОВЛЕНИМИ ДАНИМИ.....	631
10.8.1. Однофакторний ДА вибірок нерівного розміру	631
10.8.2. Аналіз одно– і двофакторного експерименту інструментом дисперсионный аналіз при пропусках даних	631
10.9. АПОСТЕРІОРНІ КРИТЕРІЇ. ПОРІВНЯННЯ ГРУПОВИХ СЕРЕДНІХ ДИСПЕРСІЙНОГО КОМПЛЕКСУ	634
10.9.1. Множинний <i>t</i> -критерій Фішера (захищений <i>t</i> -критерій)	635
10.9.2. Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми дисперсійного комплексу.....	636
10.9.2.1. Основи статистичної оцінки за НІР. Розрахунковий метод	636
10.9.2.2. Визначення НІР Фішера застосуванням ППП Statistica	640
10.9.3. Попарне порівняння даних за методом Тьюкі	643
10.9.4. Основи розрахунку за тестом Шеффе.....	643
10.10. ОЦІНКА СИЛИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ.....	645
10.10.1. Оцінка сили впливу факторів за методом Снедекора	645
10.10.2. Метод Плохінського оцінки сили впливу факторів	645
10.10.3. Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі	647
10.10.4. Використання статистики ω^2 (омега квадрат)	649
10.11. НЕПАРАМЕТРИЧНІ РАНГОВІ ВИДИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ	650
10.11.1. Дисперсійний аналіз χ^2 -Фрідмана	650
10.11.1.1. Розрахунковий метод ДА χ^2 -Фрідмана	650
10.11.1.2. Дисперсійний аналіз Фрідмана за допомогою ППП Statistica	652

10.11.2. Дисперсійний H -аналіз Краскала–Уоллеса	654
10.11.2.1. Основані положення критерію H –Краскала–Уоллеса.....	654
10.11.2.2. Розрахунковий метод визначення критерію H –Краскала–Уоллеса	655
10.11.2.3. Визначення критерію H –Краскала–Уоллеса із застосуванням ППП Statistica	656
11. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ. ПЛАНУВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	659
11.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ	659
11.2. ВИБІР ФОРМУЛИ ДЛЯ ОПИСУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ	662
11.3. ОЦІНКА ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОЦІНКА РІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ ПАРНОЇ РЕГРЕСІЇ.....	665
11.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ	676
11.4.1.1. Використання інструментів пакету MS Excel при лінійному регресійному аналізі.....	676
11.4.1.1.1. <i>Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом.....</i>	<i>676</i>
11.4.1.1.2. <i>Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ MS Excel.....</i>	<i>679</i>
11.4.1.1.3. <i>Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel.....</i>	<i>685</i>
11.4.1.2. Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії за допомогою ППП Statistica	689
11.5. ОДНОФАКТОРНЕ НЕЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ	697
11.5.1. Отримання коефіцієнтів рівняння однофакторної нелінійної залежності з використання ППП Statistica	697
11.5.2. Трансформація нелінійно пов'язаних ознак.....	705
11.5.3. Аналіз двозонних кривих	707
11.6. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ	709
11.6.1. Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ ПА MS Excel.....	709
11.6.2. Визначення і оцінка коефіцієнтів лінійної регресії з використанням ППП Statistica	715
11.6.3. Визначення і оцінка коефіцієнтів регресії другого порядку з використанням ППП Statistica	736
11.7. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ.....	757
11.7.1. Множинна регресія	757

11.7.2. Оптимальні плани багатofакторних експериментів для моделей першого порядку.....	763
11.7.2.1. План першого порядку для двох змінних	763
11.7.2.2. Плани для моделі гіперболоїду при трьох і більше факторах.....	764
11.7.2.3. Плани для моделі у вигляді гіперплощини.....	765
11.7.2.4. Правило складання планів–таблиць для регулярних дробових реплік.	765
11.7.3. Плани другого порядку.....	767
11.7.3.1. Критерії оптимальності та типи планів.....	767
11.7.3.2. Особливості застосування градієнтної оптимізації спільно з методом планування експерименту	771
11.7.3.3. Плани для опису поверхні відгуку.....	772
11.7.3.3.1. <i>Ортогональне центральне композиційне планування</i>	772
11.7.3.3.2. <i>Ротатабельні центральні композиційні плани</i>	776
11.7.3.3.3. <i>Плани Бокса–Бенкіна типу VB_n</i>	780
11.7.3.3.4. <i>Композиційні плани Бокса типу B_n</i>	781
11.7.3.3.5. <i>Некомпозиційні D–оптимальні плани</i>	782
11.7.3.4. Основи побудови та вибору планів експерименту	783
11.8. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	788
11.9. ПАРАМЕТРИ ОПТИМІЗАЦІЇ	796
11.9.1. Вимоги до параметрів оптимізації	796
11.9.2. Узгодження декількох вихідних параметрів	797
11.9.3. Застосування критеріїв вилучення сумнівних результатів при інженерному експерименті	798
11.9.3.1. Використовувані критерії перевірки аномальності отриманих даних	798
11.9.3.2. Оцінка викидів за критерієм Смирнова–Граббса.....	801
11.9.3.3. Оцінка викидів за критерієм вибіркового розмаху	802
11.9.4. Перевірка відтворюваності результатів	802
11.9.4.1. Використання критерію Кохрена.....	803
11.9.4.2. Застосування критерію згоди Бартлетта	805
11.9.4.3. Критерій згоди Фішера–Снедекора	808
11.10. ВИКОРИСТАННЯ ППП STATIST ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОФАКТОРНОГО АКТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ	809
11.11. ВИКОРИСТАННЯ ППП STATISTICA ДЛЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ЕКСПЕРИМЕНТІВ, ВИКОНАНИХ ЗА ПЛАНАМИ ДРУГОГО ПОРЯДКУ.....	819
11.11.1. Отримання і оцінка математичної моделі багатofакторного активного експерименту.....	819
11.11.1.1. Попередня оцінка і обробка даних при регресійному аналізі	819

11.11.1.2. Розрахунок математичної моделі багатofакторного активного експерименту	822
11.11.1.3. Особливості оцінки результатів регресійного аналізу	830
11.12. Автокореляція в РЕГРЕСІЙНИХ ЗАЛИШКАХ.....	835
11.12.1. Визначення критерію Дарбіна–Уотсона	835
11.12.2. Використання коефіцієнта автокореляції першого порядку	841
11.13. Побудова ДВОВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ.....	842
11.14. Порівняння РЕЗУЛЬТАТІВ ІЗ НЕЗАДІЯНИМ І ЗАДІЯНИМ РАНГОМ РЕГРЕСІЇ	848
11.15. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРНАРНИХ ГРАФІКІВ	852
11.15.1. Обробка даних експерименту склад – властивість	852
11.15.2. Особливості оцінки результатів регресійного аналізу для експерименту склад–властивість.....	858
11.15.3. Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту.....	861
11.16. ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ	864
11.17. ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ДОЗАТОРІВ І ЗМІШУВАЧІВ	868
12. РЯДИ ДИНАМІКИ. ГЕНЕРАЦІЯ ТА ЗГЛАДЖУВАННЯ.....	877
12.1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ	877
12.2. КОМПОНЕНТИ ДИНАМІКИ.....	878
12.3. ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ.....	880
12.3.1. Згладжування за допомогою лінійного тренду.....	880
12.3.2. Ковзна проста середня, знайдена ПА MS Excel Анализ данных ..	883
12.3.3. Ковзна змінна середньозважена	884
12.3.4. Згладжування за допомогою експоненційно зваженої ковзної середньої	884
12.3.5. Нестационарність випадкового процесу за дисперсією.....	886
13. ВИКОНАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ	887
13.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	887
13.2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРУПУВАННЯ “К–СЕРЕДНІ”	889
13.3. КЛАСТЕРІЗАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОБ’ЄДНАННЯ (ДЕРЕВОПОДІБНА КЛАСТЕРІЗАЦІЯ)	895
13.4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ “TWO–WAY JOINING”	902
14. ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.....	905
14.1. МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ	905
14.1.1. Бракування “підозрілих” даних за М. Ф. Деревиським.....	905

14.1.2. Відновлення втрачених і забракованих даних	908
14.1.2.1. Відновлення одного втраченого чи забракованого значення ..	908
14.1.2.2. Відновлення декількох втрачених чи забракованих значень...	909
14.1.3. Особливості статистичної обробки однофакторного польового дослідження з повторними	910
14.1.4. Оцінка відмінності між середніми	912
14.1.5. Обробка дослідів з пропущеними і відновленими даними.....	916
14.2. Оцінка селекційного матеріалу	918
14.2.1. Пакетна обробка результатів селекційного експерименту	918
14.2.1.1. Однофакторний дисперсійний аналіз.....	918
14.2.1.2. Особливості дисперсійного аналізу результатів системного генетичного схрещування	923
14.2.2. Визначення екологічної пластичності сортів і гібридів.....	926
14.2.2.1. Оцінка пластичності за допомогою ековаленти.....	926
14.2.2.2. Оцінка пластичності сортів з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії	929
14.2.2.3. Оцінка адаптивної здатності сортів	933
14.2.3. Визначення індексу пластичності при двох градаціях експерименту.....	935
14.2.4. Визначення коефіцієнта успадкування	938
14.2.4.1. Загальні положення	938
14.2.4.2. Визначення коефіцієнта спадковості.....	938
14.2.4.3. Розрахунок коефіцієнту успадкування при однофакторному експерименті.....	939
14.2.4.4. Розрахунок коефіцієнту успадкування при двофакторному експерименті.....	940
14.3. ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	942
14.3.1. Коефіцієнт подібності Серенсена–Чекановського	942
14.3.2. Оцінка екологічного різноманітності	944
14.3.2.1. Індекси видового багатства	944
14.3.2.2. Індекси видового різноманіття.....	945
14.3.2.3. Оцінка ширини екологічної ніші (місця розповсюдження).....	946

15. ТАБЛИЧНЕ І ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ..... 949

15.1. Подання матеріалу у табличному вигляді	949
15.2. ТАБЛИЦІ–ВИСНОВКИ.....	955
15.3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ	956
15.4. ПОБУДОВА ГРАФІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАКЕТОМ MS EXCEL	957
15.4.1. Представлення залежностей між двома вибірками	957

15.4.1.1. Створення об'ємних гістограм.....	958
<u>15.4.1.1.1. Проста об'ємна гістограма.....</u>	<u>958</u>
<u>15.4.1.1.2. Об'ємна нормована гістограма з накопиченням</u>	<u>960</u>
15.4.2. Графічне представлення результатів дисперсійного аналізу	961
15.5. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ПППІ STATISTICA	963
<u>15.5.1. Побудова полігону розподілу</u>	<u>963</u>
<u>15.5.2. Представлення суміщених гістограм</u>	<u>968</u>
<u>15.5.3. Елементи аналізу суміщених гістограм</u>	<u>971</u>
<u>15.5.4. Побудова й аналіз одинарних гістограм</u>	<u>974</u>
15.6. ДІАГРАМИ ДІАПАЗОНІВ.....	981
15.7. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ РОЗМАХІВ	985
15.8. НАВЕДЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ КВАДРАТНИХ МАТРИЦЬ У ВИГЛЯДІ ПРЯМОКУТНИХ	989

16. РЕДАГУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ВНУТРІШНІМИ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМ..... 993

16.1. РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ MICROSOFT EXCEL	993
<u>16.1.1. Редагування графічних залежностей.....</u>	<u>993</u>
<u>16.1.2. Редагування гістограм</u>	<u>1000</u>
16.1.2.1. Обробка об'ємних гістограм	1000
16.1.2.2. Редагування об'ємних нормованих гістограм із накопиченням	1003
16.2. РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПППІ STATISTICA	1005
<u>16.2.1. Загальні моменти.....</u>	<u>1005</u>
<u>16.2.2. Обробка суміщених гістограм</u>	<u>1005</u>
16.2.2.1. Редагування зображення.....	1005
16.2.2.2. Редагування поля	1007
<u>16.2.3. Обробка одинарних гістограм</u>	<u>1010</u>
<u>16.2.4. Редагування кореляційних матриць. Обробка зображення</u>	<u>1011</u>
<u>16.2.5. Редагування двовимірних діаграм розсіювання</u>	<u>1015</u>
16.2.5.1. Обробка зображення двовимірних діаграм	1015
16.2.5.2. Редагування поля двовимірних діаграм	1018
16.2.5.3. Редагування графічної залежності.....	1019
<u>16.2.6. Редагування об'ємних представлень залежностей</u>	<u>1020</u>
16.2.6.1. Тривимірна гістограма розсіювання.....	1020
16.2.6.2. Редагування тривимірних поверхонь	1023
16.2.6.3. Редагування тернарних графіків	1026

ДОДАТКИ.....	1029
ДОДАТОК А ВИКОРИСТАНІ РОЗРАХУНКОВІ ФУНКЦІЇ ПАКЕТУ MICROSOFT EXCEL.....	1029
ДОДАТОК Б ГРАНИЧНІ ПОХИБКИ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ВИМІРІВ.....	1040
ДОДАТОК В ТАБЛИЦІ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ.....	1044
ДОДАТОК Г ВЕЛИЧИНА ПОВТОРНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	1069
ДОДАТОК Д ОЦІНКА СУМНІВНИХ І ВИКЛЮЧЕННЯ ПОМИЛКОВИХ ЗНАЧЕНЬ	1071
ДОДАТОК Е ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ СТАТИСТИЧНИХ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ	1089
ДОДАТОК Ж АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ: КРИТЕРІЙ СЕРІЙ	1120
ДОДАТОК И КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ	1127
ДОДАТОК К МАТРИЦІ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ	1138
ДОДАТОК Л РОЗРАХУНОК ПАРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ФУНКЦІЇ ВІДКЛИКУ	1164
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ.....	1167

ВСТУП

Плануванню й проведенню як одно-, так і багатофакторних досліджень, а також статистичній обробці й аналізу отриманих результатів експериментальних даних і їхньому представленню присвячена чисельна навчальна та довідкова література.

Проте, у більшості підручників досить ґрунтовно викладаються теоретичні основи цих питань і майже не наводяться приклади практичного застосування. Більшість посібників, присвячених практичному застосуванню методів статистики, зокрема, при дослідженнях біологічних об'єктів та процесів сільськогосподарського виробництва, написані ще до широкого впровадження персональних комп'ютерів, або розглядають використання для статистичної обробки лише одного із програмних продуктів — пакету аналізу **Excel** у складі **Microsoft Office** чи пакету прикладних програм **Statistica**.

Ісак Ньютон говорив: “При вивченні наук приклади не менш повчальні, ніж правила”, тому, переважно не подаючи суто математичних положень досліджуваних аспектів, нами зроблена спроба на основі власного досвіду та аналізу відповідної літератури навести у даному посібнику приклади використання пакету аналізу **Microsoft Excel** у складі **Microsoft Office** і пакетів прикладних програм **Statistica** і **Statist** для статистичної обробки й аналізу вибірок; текстового, табличного й графічного представлення результатів досліджень. Для ряду прикладів подано порівняння результатів застосування ПА **MS Excel** та ППП **Statistica**, та уперше розглянуто методи їхнього спільного використання.

Незважаючи на те, що значна кількість прикладів ґрунтується на результатах конкретних досліджень, хоч часто дещо змінених для більшої наочності, інтерпретація і аналіз результатів не наводиться, так як нашою метою є лише викладення методики обробки цифрового матеріалу.

Представлений матеріал може бути використаний студентами сільськогосподарських вузів, які навчаються з агрономічних і технічних спеціальностей, та на факультетах економіки й менеджменту; аспірантами при оформленні дисертаційних робіт; працівниками науково-дослідних установ при написанні наукових звітів і практичними працівниками при необхідності використання статистичних методів обробки й аналізу даних.

Не претендуючи на вичерпаність і безпомилкове викладення матеріалу, будемо всім вдячні за критичні зауваження й побажання.

Автори

1. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ТА ВИБІРКИ. ВАРІАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

1.1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧНОЇ СУКУПНОСТІ

Об'єктами дослідження в сільському господарстві можуть бути ґрунти, рослини чи тварини, конструкційні параметри й режими роботи машин і таке інше, яким властива певна мінливість, тобто варіювання за багатьма ознаками, будь-якими кількісними, або якісними параметрами, рисами, або прикметами, за якими можна відрізнити один предмет від іншого. Наприклад, група рослин на полі складає сукупність організмів (*генеральну сукупність*), тобто сукупність об'єктивно існуючих чи допустимих угруповань об'єктів або їх ознак при даному комплексі умов, які є предметом досліджень.

Генеральні сукупності можуть бути кінцевими та нескінченними. Частіше за все вони настільки великі, що їх не можна охопити обліком. Тому для оцінювання, тобто визначення приближеного значення невідомого параметра генеральної сукупності, доводиться використовувати *вибірку* — її скінченну підмножину, призначену безпосередньо для досліджень, або *вибіркову сукупність* — групу об'єктів, яка входить в одну генеральну сукупність і відбираються з неї за принципом випадковості для узагальнених досліджень. Слід мати на увазі, що дослідника завжди цікавлять властивості генеральної сукупності, а не вибірки, тому вибірка має бути такою, щоб вона цілком відображала властивості генеральної сукупності.

Досліджені властивості вибірки можуть поширюватися на всю генеральну сукупність або лише на дану вибірку. Використання відповідних методів математичної статистики дозволяє за обчисленими характеристиками вибірки визначити невідомі параметри генеральної сукупності [1]. Тобто, статистичні методи слід застосовувати для того, щоб на основі результатів аналізу вибірових спостережень (*вибірки*, або *вибіркової сукупності*) зробити висновок щодо всього досліджуваного масиву (*генеральної сукупності*).

Спостережувані значення x_i вибірок називаються *варіантами*, а послідовне їх представлення за зростанням — *варіаційним рядом*. Числа спостережень n_i називаються частотами, а їх сума N обсягом вибірки [2]. Переважно обсяг генеральної вибірки позначається N , а вибіровий обсяг — n .

За характером вираження розрізняють атрибутивні і кількісні ознаки:

— атрибутивні (описові) — виражаються словесно, наприклад, вид основного обробітку ґрунту та ін. За ним можна отримати підсумкові відомості про кількість статистичних одиниць, які мають дані значенням ознаки;

— кількісні — виражаються числовий мірою (температура ґрунту, урожайність і т.д.). За ними можна отримати підсумкові дані про кількість одиниць з конкретним значенням ознаки, і сумарне або середнє значення ознаки за сукупністю.

За характером варіації ознаки діляться на:

— альтернативні які можуть приймати тільки одне з двох можливих значень ознаки. Це ознаки володіння або не володіння будь чим. Наприклад, стать, стан “наявність–відсутність” і т.д.;

— дискретні — кількісні ознаки приймають тільки окремі значення, без проміжних між ними — як правило цілі числа, наприклад, кількість насінин у стручку т.д.);

— безперервні кількісні ознаки, які можуть набувати будь-якого значення. На практиці вони, як правило, округлюються відповідно до прийнятої точністю (наприклад: урожайність, сума опадів і т.д.).

За характером взаємозв’язку ознаки діляться на:

— факторні, що викликають зміни інших ознак, або створюють можливості для змін значень інших ознак. Факторні ознаки поділяються відповідно на ознаки причини та ознаки умови;

— результативні (ознаки слідства), що залежать від варіації інших ознак. Наприклад, урожайність є результативним ознакою, величина якого залежить від ряду факторних ознак — погодних умов, агроприйомів, сорту і ряду інших [3].

За обсягом вибірки поділяються на **малі** ($n \leq 30$) і **великі** ($n > 30$) [4]. Крім цього поділу існує ще їх поділ на обмежені й необмежені. **Обмежені вибірки** — обсяг яких становить менше 20 % генеральної сукупності й **необмежені** — з обсягом 20 % і більше.

Так як при використанні методів описової статистики для опису невеликого числа об’єктів дослідження можна отримати спотворення реальності, наприклад, наявних даних може бути недостатньо для аналізу виду розподілу досліджуваної ознаки, вибірки із кількістю об’єктів менше ніж 20, прийнято в текстах дисертацій, статей і звітів представляти дані у початковому вигляді, а методи статистики використовувати лише як допоміжний спосіб її опису [5].

Основні правила отримання вибірок у сільському господарстві такі:

1. **Рандомізація** (у деяких роботах ([50] та ін.) використовується термін “**Рендомізація**”), тобто відбір зразків для вимірювання проводиться у випадковому порядку. Випадковість означає, що кожний зразок як член генеральної сукупності має відмінну від нуля ймовірність попасти у вибірку й ця ймовірність дорівнює частоті зустрічі з ним у генеральній сукупності.

2. **Якісна однорідність матеріалу** — усі досліджувані зразки повинні мати однакову категорію якості. Об’єктивність у поєднанні з точною відповідністю вибірки генеральній сукупності забезпечує тільки випадковий відбір зразків для аналізу. При цьому ставиться вимога до **якісної однорідності матеріалу**, коли всі досліджувані зразки мають однакову категорію якості [6].

3. **Репрезентативність** полягає в тому, що вибірка повинні відображати генеральну сукупність у всіх досліджуваних особливостях. Виходячи з закону великих чисел вибірка буде представницькою якщо всі її об’єкти ві-

дібрані випадково з генеральної сукупності і всі вони мають однакову імовірність потрапити до неї [2].

4. **Надійність вибірки** вимагає, щоб вона була **репрезентативною**, тобто, вибіркові показники якомога більше відповідали параметрам генеральної сукупності, відображаючи її у всіх важливих особливостях [7].

5. **Надійністю результату** серії вимірювань називається ймовірність того, що справжнє значення вимірюваної величини потрапляє в довірчий інтервал. Ця величина α виражається в частках одиниці чи у відсотках [8].

Зазвичай ситуація вивчення властивостей, які цікавить дослідника, вивчається на двох або більше вибірках з метою їх подальшого порівняння. Ці вибірки можуть перебувати в різних співвідношеннях — залежно від процедури їх організації. **Незалежні вибірки** характеризуються тим, що ймовірність відбору будь-якого досліджуваного показника однієї вибірки не залежить від аналогічного відбору з іншої вибірки. Навпаки, **залежні вибірки** характеризуються тим, що для кожного досліджуваного показника однієї вибірки, поставлений у відповідність за певним критерієм, існує аналогічний показник з іншої вибірки [9].

У загальному випадку залежні вибірки припускають **попарний добір** досліджуваних показників у порівнюваних вибірках, а незалежні вибірки — незалежний їх відбір.

Слід зазначити, що випадки “частково залежних” (або “частково незалежних”) вибірок неприпустимі: це непередбачуваним чином порушує їхню репрезентативність.

1.2. Типи групування статистичних даних

Залежно від ступеня складності досліджуваного явища і від поставлених завдань статистичні угруповання можуть виконуватися за однією або декількома ознаками групування.

Групування називається простим (одновимірним), якщо однорідні групи формуються за однією ознакою одночасно і складним, якщо однорідні групи утворюються за двома і більше ознаками.

У класі одновимірних угруповань виділяють наступні типи:

- структурні — для виявлення складу досліджуваного явища;
- типологічні — для виділення у статистичній сукупності різних типів явищ;
- аналітичні (факторні), які використовуються для вивчення зв'язку і залежності між ознаками варіювання.

1.2.1. Структурне групування значень варіаційного ряду

Структурні угруповання використовуються для вивчення внутрішньої будови статистичної сукупності і характеристики структурних зрушень.

Вони дають інформацію про поточний стан масових явищ і застосовуються з метою оперативного управління.

Структурна угруповання виконується в кілька етапів:

- вибір ознаки групування;
- визначення необхідного числа груп;
- визначення параметрів груп;
- розподіл одиниць спостереження за виділеними групами;
- розрахунок структурних характеристик;
- формування висновків.

Вибір ознаки групування здійснюється відповідно до цілей статистичного дослідження. Нею зазвичай виступає істотна ознака. Обов'язковою умовою виконання будь-якого групування, в тому числі і структурного є впорядкування статистичної сукупності за значеннями ознаки групування.

Проведення *варіаційного аналізу* для визначення необхідного числа груп починається з побудови *варіаційного ряду* — упорядкованого розподілу одиниць сукупності за зростанням чи за убубанням, і підрахунку частот їхніх появ.

Ряди розподілу поділяються на *рангові*, *дискретні* та *інтервальні*.

Ранговий варіаційний ряд містить перелік окремих одиниць сукупності в порядку зростання або убубання рангової ознаки.

Дискретний варіаційний ряд представляється таблицею з 2-х рядків — полімерних значень варіюваної ознаки й кількості одиниць із даними її значеннями. Графічно дискретний варіаційний ряд зображується за допомогою полігону (див. підрозділ **15.5.1 Побудова полігону розподілу**).

Інтервальний варіаційний ряд характеризується тим, що:

- ознака приймає дискретні значення, але кількість їх занадто велика;
- ознака приймає будь-які значення в певному діапазоні.

При побудові *інтервального варіаційного ряду* слід вибрати оптимальну кількість K груп (класів), яких повинно бути *непарна кількість від n 'яти [10] до дев'ятнадцяти*, дробові значення округляються до цілого числа. Перед розбивкою нижні крайні значення сукупності округляють до меншого, а верхні — до більшого значення. Утворений *груповий інтервал* λ слід округлити, щоб він був не занадто дрібним [11, 12].

В [13] показано, що величина ухилення гістограми від щільності розподілу в кращому випадку становить $1/\sqrt[3]{n}$, яке досягається при числі інтервалів K порядку $\sqrt[3]{n}$, де n — обсяг вибірки.

Рекомендована для розбивки вибірки обсягом n даних на кількість груп (класів) K формула Стерджеса (1.1) дає прийнятні результати за умов від 30 до 50 статистичних сукупностей [2, 14–17]

$$K=1+\log_2 n = 1+1.44 \cdot \ln n. \quad (1.1)$$

Залежність Стерджеса (зустрічаються різні написання прізвища — Стаерджес [14, 15], Старджес [16], а то і Штюрґес [17]) дає хороші результати, якщо сукупність складається з великої кількості одиниць, розподіл близько до нормального, і при цьому використовуються рівні інтервали [3].

При сукупності від 50 до 100 об'єктів рекомендується використання формули, яку запропонували К. Брукс і Н. Краузерс [15]

$$K=2.17 \cdot \ln n. \quad (1.2)$$

Також рекомендується при сукупності від 100 до 200 об'єктів і від 200 до 300 використовувати відповідно формули [15]

$$K=3.04 \cdot \ln n; \quad (1.3) \quad K=3.47 \cdot \ln n. \quad (1.4)$$

І. Хаінхолт і К. Гаеде пропонують кількість груп визначати як квадратний корінь від досліджуваної сукупності [18]

$$K=\sqrt{n}. \quad (1.5)$$

Вибірковий розмах R є показником змінювання ознаки й визначається різницею між максимальним x_{\max} та мінімальним x_{\min} значенням показника вибірки [14]

$$R=x_{\max} - x_{\min}. \quad (1.6)$$

При визначенні розмаху варіації R спостереження виключаються аномальні значення ознаки.

Розмах вловлює тільки крайні значення ознаки в сукупності, не враховує повторюваність його проміжних значень, а також не відображає відхилень всіх варіантів значень ознаки.

Розмах часто використовується в практичній діяльності, наприклад, відмінність між максимальними і мінімальними значеннями.

Максимальне x_{\max} та мінімальне x_{\min} значення вибірки за допомогою ПА **MS Excel** знаходиться за статистичними функціями **МАКС** і **МИН** (див. Додаток А).

Для практичного застосування доцільно використовувати умову [19]

$$0.55n^{-0.4} < K < 1.25n^{-0.4}, \quad (1.7)$$

яка отримані для розподілів, які найбільш часто зустрічаються на практиці і мають ексцес у межах від 1.8 до 6, тобто, від рівномірного до Гауса [20].

При розрахунках за початок відліку приймається середина інтервального варіаційного ряду. Для вивчення варіаційного ряду істотну допомогу надає графічне зображення, де він зображується за допомогою гістограми — графічного представлення статистичного ряду (див. рис. 2.17, с. 115).

Також рекомендується використовувати наступні залежності [12, 15, 17, [21, 22]:

Кількість вимірів n	10–30	31–70	> 70	40–100	100–500	500–1000	1000–10000
Кількість класів K	6	6–9	10–12	7–9	8–12	10–16	12–22
Кількість вимірів n	25–40	40–60	60–100	100–200	> 200	<100	>100
Кількість класів K	5–6	6–8	7–10	8–12	10–15	7	9–15

Очевидно, що “оптимальна” величина кількості K груп (класів) залежить не тільки від обсягу вибірки, а й від виду закону розподілу. Вона, звичайно, залежить і від способу групування.

В [23] для інтервалів рівної імовірності їх кількість задається виразом

$$K \approx 4\sqrt[5]{2} \left(\frac{N}{z_\alpha} \right)^{0.4}, \quad (1.8)$$

де z_α – квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) стандартного нормального розподілу для заданого рівня значущості α .

Квантиль порядку α є значенням випадкової величини, для якого функція розподілу приймає значення α або має місце “стрибок” зі значення, меншого ніж α , до значення, більшого ніж α . Тобто, квантиль — є рішенням відносно x рівняння $F(x)=\alpha$, де α – задана статистична ймовірність, тобто це точка на числовій осі, яка ділить всю сукупність упорядкованих вимірів на дві групи з заданим співвідношенням їх чисельності — α і $1-\alpha$.

Для даного розподілу для одностороннього критерію квантиль визначається за статистичною функцією ПА MS Excel [24, 25] **НОРМ.СТ.ОБР** з синтаксисом **НОРМ.СТ.ОБР(вероятность)** при **вероятность=(1- α)** (див. Додаток А, де наведено синтаксис функцій ПА MS Excel та особливості її застосування).

У ряді робіт наводяться модифікації даної формули. В [26] пропонується використовувати залежність

$$K=1.74 \cdot \ln n, \quad (1.9)$$

а також подальший розвиток цього співвідношення [27]

$$K=2.17 \cdot \ln n - 5. \quad (1.10)$$

Тут і всюди в тексті використовується американський стандарт представлення десяткових чисел — у якості розділового знака цілої і дробової частини використовується точка, як це прийнято майже у всіх комп'ютерних програмах.

Для визначені кількості груп І. У. Алексєєва [28] пропонує враховувати не лише величину вибірки n , а й величину контрексцесу \aleph (алеф, буква івріту) (див. вираз (1.121) вибірки

$$K = \frac{1}{3} \sqrt[5]{\frac{N^2}{\aleph^8}}. \quad (1.11)$$

Для великих вибірок за рекомендаціями Д. Юлла і М. Кендела слід виділяти 15–25 класових інтервалів незалежно від обсягу спостережень [15].

Існує спосіб визначення кількості виділених груп пов'язаний із застосуванням середньоквадратичного відхилення: якщо ширина інтервалу дорівнює $0.5s$, то виділяється 12 груп, якщо $2/3s$, — то 9 груп, якщо s — то 6 груп [3].

Для визначення параметрів групи у кожній виділеній групі розраховуються наступні параметри:

Верхня на нижня межа інтервалу, тобто найменше x_i^H і найбільше x_i^B значення ознаки в групі.

Ширина інтервалу a_i . Інтервали угруповання бувають рівними і нерівними (прогресивно зростаючими, прогресивно зменшуються, довільними, спеціалізованими). Якщо варіація ознаки проявляється у порівняно вузьких межах і розподіл статистичних одиниць носить досить рівномірний характер, то будують угруповання з рівними інтервалами, визначаючи ширину інтервалу a_i за формулою

$$\lambda = R/K. \quad (1.12)$$

Значення ширини інтервалу λ , округляється у більшу сторону.

На основі розрахованої ширини інтервалу λ послідовно визначається межі інтервалів x_i^H і x_i^B . Визначення меж починається з першої групи її нижня межа приймається рівною мінімальному значенню ознаки в сукупності.

тобто $x_1^H = x_{\min}$ а верхня межа визначається як $x_1^B = x_1^H + \lambda$. Для другої групи нижня межа приймається рівною верхній межі першої групи, тобто $x_2^H = x_1^B$, а верхня визначається як $x_2^B = x_2^H + \lambda$ і т.д. [3].

Середина інтервалу (центральна варіанта) b_i визначається як середнє верхньої і нижньої меж, тобто за формулою $b_i = x_1^H + \lambda/2$.

Параметр середина інтервалу b_i використовується при розрахунку узагальнюючих характеристик досліджуваної сукупності.

Досить часто при виконанні угруповання використовуються відкриті інтервали. У відкритих інтервалах вказується тільки одна межа: верхня — у останнього інтервалу, нижня — у першого. Для закриття таких інтервалів необхідно попередньо визначити їх ширину.

Проблема ширини відкритих інтервалів вирішується таким чином: при рівноінтервальному угрупованні вона є постійною величиною; при нерівноінтервальному угрупованні попередньо визначається закономірність зміни ширини інтервалу для не крайніх груп виявлена закономірність дозволяє визначити ширину відповідного інтервалу і розрахувати відсутню межу [3].

При розподілі одиниць спостереження за виділеними групами, ознака, що за значенням збігається з межею інтервалу включаються в групу, в якій нижня межа збігається зі значенням ознаки.

При формулювання висновків про склад сукупності для структурних угруповань у висновках відображаються два положення:

— які значення ознаки зустрічаються в сукупності найбільш часто, які значно рідше;

— який характер зміни структури в залежності від зміни значення ознаки. Зі збільшенням x частка може збільшуватися, або зменшуватися. Це досить типово для економічних показників.

Висновки повинні бути зроблені обов'язково, інакше пропадає сенс угруповання.

Дані структурних угруповань зазвичай подаються у формі відповідної таблиці [3].

1.2.2. Типологічні угруповання

Її мета полягає у вивченні поширеності різних типів економічних явищ в статистичній сукупності.

Типологічні угруповання застосовуються, як правило, до неоднорідною сукупності і здійснюються за допомогою складних нерівноінтервальних угруповань.

Результатом типологічних угруповань є поділ сукупності на класи, типи, однорідні групи одиниць.

За своєю суттю типологічне угруповання є групою–класифікатором. Такі угруповання часто ґрунтуються на стійкому переліку груп, не змінних або незначно мінливих у часі.

Прикладом такого угруповання є групування сортів сільськогосподарської культури за строком стиглості або урожайністю.

При виконанні типологічних угруповань важливо правильно вибрати підставу угруповання. Для цього необхідно попередньо виявити можливі типи явища на основі аналізу сутності і закономірностей його розвитку. Число груп і їх параметри встановлюються неформально на основі виділених якісних закономірностей, часто із залученням кількісних ознак.

За технікою виконання типологічна угруповання схожа на структурну угруповання, за винятком перших етапів — ознака групування, кількість груп, їх параметри визначаються на основі якісного аналізу. У таких угрупованнях дуже часто застосовуються спеціалізовані інтервали.

Типологічні угруповання представляються в табличній формі, об'єктом аналізу в них є показники структури [3].

1.2.3. Аналітичні угруповання

Аналітичне угруповання призначене для виявлення зв'язку між досліджуваними ознаками. Воно дозволяє виявити наявність і напрямок зв'язку, а також виміряти її тісноту і силу.

Всі досліджувані ознаки в цьому випадку діляться на дві групи: факторні і результативні. Взаємозв'язок між ними проявляється в тому, що зі зміною середнього значення факторної ознаки систематично змінюється середнє значення результативної ознаки.

Аналітичні угруповання відрізняються від структурних і типологічних, за технікою виконання, яка полягає в наступному:

1. Проводиться угруповання одиниць сукупності за факторною ознакою, вона виконується як структурна.

- 2, У кожній виділеній групі відбираються відповідні значення результативної ознаки, і на їх основі розраховується деякий узагальнюючий показник, як правило, середнє значення.

- 3, Аналізуються зміни узагальнюючого показника — середнього значення результативної ознаки по групах, і робиться висновок про наявність чи відсутність взаємозв'язку і її напрямку. Якщо при зміні значень факторної ознаки, покладеного в основу угруповання змінюється величина результативного, то визнається наявність зв'язку між ознаками: при цьому, якщо зі збі-

льшенням значень факторної ознаки збільшується значення результативного, то зв'язок відноситься до прямої: у противному випадку — до зворотного.

Приклад виконання аналітичного угруповання: необхідно встановити залежність між дозою внесення добрив і урожайністю. Тут факторною ознакою є доза добрив, результативною — урожайність. За факторною ознакою раніше було проведено структурне групування — за тривалість першої просяпної обробки розбили на певну кількість груп. Була отримана величина урожайності для груп періоду її проведення.

Об'єктом аналізу є середнє значення результативної ознаки — величина урожайності в групах і середина інтервалу середня дата проведення обробки. Якщо значення результативної ознаки, встановлене за групами має певну різницю, то зв'язок між ознаками можна вважати встановленою. Якщо середній результат при переході від однієї групи до іншої практично не змінюється, то зв'язок між ознаками відсутній.

За допомогою аналітичної угруповання можна лише встановити наявність зв'язку між ознаками, але описати її не можна. Для цього необхідно використовувати апарат кореляційного, дисперсійного та регресійного аналізу (див. розділи **9 Кореляційні залежності та їх аналіз**, **10 Дисперсійний аналіз** і **11 Регресійний аналіз. Планування і обробка результатів експериментальних досліджень**) [3].

1.3. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРІАЦІЙНОГО РЯДУ

При аналізі отриманих залежностей, а також для оцінки прийнятності статистичного розподілу, тобто відповідності реального розподілу змінної прийнятому (нормальному, рівномірному, експоненціальному, Пуассона тощо), використовується **статистичні критерії: χ^2 (хі-квадрат)** [29] (див. підрозділ **6.5.4 Використання χ^2 -критерію для перевірки нормальності статистичного розподілу (підгонка розподілу)**). При аналізі гістограм найбільш часто застосовується критерій Колмогорова–Смирнова (див. підрозділ **6.6 Одновібірковий тест Колмогорова для перевірки виду статистичного розподілу**) [30].

Статистичний аналіз отриманого **варіаційного ряду** — ряду рангових значень ознаки, у якому визначена кількість (частота прояву) окремих варіант розподілу, передбачає розрахунок характеристик його центру, структури, оцінку ступеню варіації й диференціації досліджуваної ознаки, вивчення форми розподілу. При цьому ставиться вимога до **рандомізації**.

До **описових первинних статистик** відносять числові характеристики розподілу ознак вибірки. Основне призначення кожної з первинних описових статистик — заміна **множини значень** відповідної ознаки вибірки,

одним числом (наприклад, *середнім значенням* як мірою центральної тенденції).

В середніх величинах нівелюються індивідуальні відмінності одиниць сукупності, обумовлені випадковостями, тобто середні не відображають меж коливання ознаки. Всі середні величині діляться на **ступеневі середні** — *арифметичні* \bar{x} (1.22), *геометричні* \bar{x}_g , (1.24), *гармонійні* \bar{x}_h (1.26), *квадратичні* \bar{x}_q (1.28), *кубічні* \bar{x}_Q (див. (1.30), с. 46) і т.п., та *структурні середні* — *моду* Mo (див. с. 47) і *медіану* Me (1.33) і (1.34) [2].

Компактний опис групи за допомогою первинних описових статистик дозволяє інтерпретувати результати вимірів, зокрема, шляхом порівняння первинних статистик різних груп. При цьому слід мати на увазі, що будь-яка інтерпретація статистичних показників повинна ґрунтуватися на інформації фізичного, біологічного чи іншого характеру.

Міри центральної тенденції (міри локалізації, положення) показують найбільш типові значення для даної вибірки, тобто характеризують вибірку за рівнем вираження замірів ознаки. До них відносяться:

— середнє значення \bar{x} — середнє арифметичне вибірки чи генеральної сукупності, див. (1.22), с. 43;

— медіана (Me) — значення, праворуч і ліворуч від якого на осі значень ознаки розташовуються рівні кількості значень ознаки даної вибірки, див. (1.34), с. 47;

— мода (Mo) — значення ознаки, яке найбільш часто зустрічається у вибірці, див. с. 47;

— середнє геометричне значення \bar{x}_g , див. (1.24).

Кожна міра центральної тенденції має характеристики, які роблять її цінною за певних умов.

Часто експериментальні дані містять до 10 % аномальних значень, тобто ми найчастіше маємо справу зі змішаними розподілами, що задаються сумою, принаймні, двох функцій розподілу з кілька розрізняються параметрами. Тому центр розсіювання краще оцінювати за медіаною, а не за середнім арифметичним, так як в цьому випадку оцінка розсіювання за розмахом варіювання більш точна, ніж оцінку дисперсії. Можна, звичайно, відкидати за допомогою того чи іншого критерію грубі (аномальні) спостереження (див. підрозділ **5.12 Виключення результатів з грубими похибками**), але ця процедура також веде до зниження ефективності — адже доводиться відкидати певну кількість спостережень [51].

Для **номінативних даних** (див. с. 351), зрозуміло, єдиною придатною мірою центральної тенденції є мода, або модальна категорія — та градація номінативної змінної, яка зустрічається найбільше часто. Клас з найбільшою частотою називається модальним [15].

Міри розсіювання показують розкид значень ознаки у вибірці. До них відносяться:

— **розмах R** — різниця максимального і мінімального значень ознаки, див. (1.6);

— **інтерпроцентильний розмах (інтервал)** — значення будь-яких процентилів розподілу, наприклад 10-го і 90-го;

— **інтерквартильний (міжквартильний) розмах R_Q (інтервал)**, який незалежно від виду розподілу включає 50 % значень вибірки, див. с. 48;

— **вибірковий стандартний відхил — середній квадратичний відхил (СКВ) s** , див. (1.56), с. 54 (**стандартний відхил (СВ) σ** для генеральної сукупності (1.56), с. 54) відображає розкид даних по інтервалу значень ознаки щодо середнього значення вибірки \bar{x} чи генеральної середньої μ сукупності.

Центральні тенденції і розсіювання кількісних ознак, що мають наближено нормальний статистичний розподіл (і тільки таких ознак!), а це переважна більшість — близько 80 % розподілів біологічних ознак, слід описувати середнім значенням (\bar{x}) і середнім квадратичним відхилом s .

І навіть якщо вибіркові одиниці відбираються з нормально розподілених генеральних сукупностей, обсяг вибірок часто виявляється занадто малим для того, щоб взагалі зробити певні висновки щодо виду розподілу. Це робить параметричні оцінки непридатними і вибірки слід описувати медіаною і інтерквартильним розмахом (25-й і 75-й процентилі) або іншим інтерпроцентильним розмахом (наприклад, 80 %-інтерпроцентильний розмах — між 10-ми і 90-ми перцентилями) [5].

Числові характеристики, обчислені за генеральною сукупністю, або ті, що використовуються для опису даних генеральної сукупності, називаються **генеральними параметрами**, а числові характеристики, розраховані за вибіркою, або ті, що використовуються для опису її даних — **статистиками**. Вони є функціями результатів спостережень, використовуваних для оцінки параметрів розподілу і/або для перевірки статистичних гіпотез. Таким чином, статистичні характеристики вибірки є наближеними оцінками невідомих параметрів генеральної сукупності, тобто статистиками, і слугують основою для оцінювання невідомого параметру розподілу. Причому переконливою оцінкою є оцінка, яка сходиться за ймовірністю до значення оцінюваного параметра при необмеженому зростанні обсягу вибірки.

Щоб забезпечити достатньо добре наближення до істинного значення a , вибірка повинна мати такі властивості.

Незміщення. Оцінка є незміщеною якщо її теоретичне середнє значення (математичне очікування) збігається зі значенням a , тобто $M(X)=a$.

Спроможність. Оцінка називається спроможною, якщо при необмеженому збільшенні числа вимірювань n вона прямує за ймовірністю до значення a .

Це означає, що при $n \rightarrow \infty$ будь-якому фіксованому значенні $\varepsilon > 0$ ймовірність $P(|x-a| < \varepsilon)$ наближається до одиниці, тобто твердження, що відхилення оцінки x від значення a стане менше ε , буде практично достовірним.

Ефективність. Незміщена оцінка називається ефективною, якщо вона має найменше розсіювання серед усіх незміщене оцінок значення a за результатами вимірювання [31].

Оцінка сукупності може бути виражена одним числом, тобто точкою (**точкове оцінювання**), коли значення оцінки приймають як невідоме значення параметру розподілу, яка характеризується кількома одиночними узагальнюючими оцінками, або деяким **довірчим інтервалом**, межі якого встановлені із заданою довірчою ймовірністю (**інтервальне оцінювання**), коли статистичний ряд оцінюється деяким інтервалом “від” і “до”, у межах якого з відповідною статистичною ймовірністю може знаходитись визначуваний параметр [1].

Ідея оцінювання за допомогою довірчого інтервалу полягає в тому, щоб за точковим оцінюванням спробувати побудувати довірчий інтервал, який із деякою, відмінною від нуля довірчою ймовірністю накрив би відоме значення оцінюваний параметр розподілу [17].

Для **ТОЧКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ генеральної сукупності** використовуються наступні оцінки, які позначають літерами грецького алфавіту:

μ – **генеральна середня сукупності** (математичне сподівання, яке ряд авторів вважають центральним моментом розподілу першого порядку [32], хоч, як стверджують інші [33], такого моменту взагалі не існує) — середнє арифметичне, яке знаходиться в середині ряду і в ранговому ряді мовби ділить його навпіл, див. (1.22), с. 43;

σ^2 – **дисперсія генеральної сукупності** (центральний момент розподілу другого порядку), точкове параметричне оцінювання статистичного ряду, є мірою розкиду окремих значень навколо математичного сподівання. Вона найчастіше використовується для оцінки мінливості показників, пов’язаних із помилками окремих обліків і є квадратом стандартного відхилення. Її зручність у тому, що, сума стандартних відхилів характеристики розкиду даних завжди дорівнює нулю, а дисперсія завжди позитивна і її абсолютна величина тим більша, чим більше розкид даних у статистичному ряду, див. (1.48), с. 51;

σ – **стандартний відхил (СВ) генеральної сукупності, (стандартна помилка** або просто **стандарт**) який дозволяє з більшою чи меншою ймовірністю виділити зону рангового статистичного ряду, в якій знаходиться та чи інша кількість даних, див. (1.56), с. 54 і с. 59;

Точкове оцінювання вважається **переконливим**, якщо зі збільшенням вибірки вона прямує до генерального параметра і **ефективним**, якщо вибірка має найменшу дисперсію, тобто найменшу варіацію порівняно з іншими оцінками [15].

У тому випадку, коли виконується **ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ вибірки**, то для позначення використовуються латинські літери:

\bar{x} – вибіркове середнє арифметичне, див. (1.22), с. 43;

s^2 – вибіркова дисперсія, див. (1.48), с. 51;

s – вибірковий *середній квадратичний відхил (СКВ)* одиничних спостережень, див. (1.56), с. 54;

$s_{\bar{x}}$ – вибірковий *середній квадратичний відхил середнього арифметичного (стандартний відхил вимірів σ_{μ})*, див. (1.63), с. 56 [6].

Тобто, \bar{x} є оцінкою μ , а s^2 і s відповідно оцінками σ^2 і σ для досить великих вибірок обсягом $n > 20-30$ і особливо для $n > 100$ [34], див. с. 36.

При описі кількісних ознак для характеристики досліджуваних масивів виконують *варіаційний аналіз* — проводять вибіркові оцінки відповідних генеральних параметрів, зокрема, *оцінки положення* (центральної тенденції), розсіювання й форми розподілу. Як показники центральної тенденції розподілу використовуються: мінімальне x_{\min} (*Minimum*), максимальне x_{\max} (*Maximim*) і середнє арифметичне значення \bar{x} (*Meam*) (1.22) вибірки обсягом n (*Valid n*), а також мода Mo (*Mode*), яка часто використовується в селекційних дослідженнях, і медіана Me (*Median*) (1.34).

Основними показниками *варіації* є відхилення будь-якої ознаки від її середнього значення у варіаційному ряді — розмах R (*Range*) (1.6), вибіркова дисперсія s^2 (*Variance*) (1.48), середньоквадратичний відхил s (1.56), коефіцієнт варіації V (1.100).

Для характеристики *структури розподілу* використовуються такі показники як медіана Me , а також нижній (перший) кuartиль Q_1 (*Lower/Lowerquartile*), верхній (третій) кuartиль Q_3 (*Upper/Upper quartile*) (1.36); міжкuartильний (інтеркuartильний) розмах R_Q (*Interquartile range*); 95 %-й довірчий інтервал істинного середнього значення; децилі — при діленні вибірки на 10 частин і процентилі (які також називаються перцентилями або центилями) — при діленні вибірки на 100 частин.

При аналізі форми розподілу виконується оцінка асиметрії, тобто її відсутності чи порушення (As — показник асиметрії (*Skewness*) (1.118) і коефіцієнт ексцесу $\gamma = Ex - 3$ (*Kurtosis* — куртозис) (1.36) [15].

Перелічені показники мають самостійне аналітичне значення, оскільки відображають різні властивості сукупності, що вивчається, а всі разом дозволяють отримати комплексну характеристику емпіричного розподілу [35].

Для опису статистичних розподілів, що не є “нормальними”, крім обсягу вибірки, слід указувати значення медіани Me та інтеркuartильний розмах R_Q . При традиційному використанні 25 % і 75 % процентилів, тобто Q_1 і Q_3 цей запис може виглядати так: Me (25 %; 75 %)=125 (53; 182) [36].

Відомо, що величини даних x_i , отримані в результаті незалежних вимірів із повторністю n , тобто у вибірці обсягом $n \geq 100$, відповідно до центральної граничної теореми Ляпунова, за якою сума масиву незалежних випадкових величин, якщо жодна них не домінує над іншими, відповідає закону нормального розподілу, навіть тоді, коли його складові йому не підпорядко-

вуються, розподіляються за законом нормального (гаусового) статистичного розподілу [12, 37].

Слід зауважити, що **“Повторність”** — кількість вимірів конкретної ознаки при постійній умові (режимі) досліду, тобто кількість ділянок кожного варіанту в польовому досліді, а в часі — кількість років випробування. Повторність у свою чергу може складатися з декількох вимірів, наприклад, рослин ділянки, чи зразків при оцінці якості дозування чи змішування. **“Повторення”** — кількість змін умов (режимів) вирощування чи роботи машини з повним набором варіантів схеми досліду.

Серед безперервних випадкових величин нормальний розподіл займає центральне місце. З ним доводиться зустрічатися при аналізі похибок вимірювань, контроль технологічних процесів і режимів, при аналізі і прогнозуванні різних явищ в економіці, біології, медицині та інших галузях знань.

Нормальний закон проявляється у всіх випадках, коли випадкова величина X є результатом дії великої кількості факторів, причому кожен фактор окремо на випадкову величину X впливає незначно і не переважає за своїм впливом над іншими.

Основна особливість, що виділяє нормальний закон серед інших законів, — то, що він є граничним законом, до якого, за певних умов, наближаються інші закони розподілу.

На практиці нормальний закон розподілу використовується при визначенні довірчих інтервалів і довірчих ймовірностей, перевірці статистичних гіпотез і інші методи статистичного аналізу. Практично у всіх цих випадках необхідно визначати значення функції щільності або функції розподілу в заданій точці [24, 78]. Часто замість терміну “функція розподілу” використовується “інтегральна функція”, а замість “щільність імовірності” — “диференційна функція” [78].

Цьому розподілу підпорядковується більшість досліджуваних об’єктів, і він найчастіше застосовується при статистичному аналізі вибірок [6, 38–41], а також їх похибок [15], хоч насправді дослідження нормальності розподілу біомедичних ознак, проведених протягом останніх 20 років більш ніж на 10 тисяч якісних змінних, показали, що біля 75 % з них не підлягає нормальному розподілу. У своїй більшості вони характеризуються негативною асиметрією (зміщенням вправо, див. рис. 1.5, а) на с. 78) і ексцесом (плоскою вершиною, див. рис. 1.5, г) і д) на с. 78) [2, 42–44].

Крім того, на практиці, якщо випадкове явище, тобто явище, реалізацію якого при відповідному комплексі умов не можливо передбачити, підпорядковується дії багатьох випадкових факторів, то їхній сумарний вплив можна описати за допомогою нормального статистичного закону [17].

Якщо ж повторність становить $n \leq 100$, то потрібні вагомі докази нормальності статистичного розподілу генеральної сукупності [37].

1.4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧНИХ СУКУПНОСТЕЙ

1.4.1. Ряди розподілу

Результати статистичних зведень і угруповань можуть бути представлені у вигляді *статистичних рядів* — упорядкованих сукупностей значень показників (статистичної ознаки). За своїм змістом статистичні ряди поділяються на ряди динаміки і ряди розподілу.

Рядом динаміки називають систематизовану сукупність числових даних, що характеризують зміни досліджуваних явищ у часі.

Ряд розподілу — систематизована послідовність статистичних одиниць, згрупованих за конкретною ознакою. Він характеризує склад досліджуваного явища, дозволяє судити про однорідність сукупності, закономірності розподілу статистичних одиниць. Зазвичай ряд розподілу являє собою результат структурної угруповання.

Ряд розподілу вважається побудованим, якщо відомо, яким чином змінюються в сукупності значення ознаки і як часто зустрічаються окремі значення ознаки.

Для різних статистичних ознак будуються різні типи рядів розподілу:

— атрибутивні — будуються по описовим ознакам в порядку зростання або зменшення спостережених значень ознаки; прикладом атрибутивних рядів можуть служити розподілу населення за національністю, за професіями, за статтю; розподіл підприємств за формами власності;

— варіаційні — будуються за кількісними ознаками, наприклад, розподіл робочих за рівнем кваліфікації, по заробітній платі, розподіл студентів по успішності.

Варіаційні ряди діляться на *дискретні* та *інтервальні*.

У *дискретних рядах* ознака приймає тільки цілі значення, наприклад, кількість гілок, насінин у стручку.

Інтервальні ряди ґрунтуються на безперервних ознаках, які приймають будь-які, в тому числі і дробові значення. Залежно від того, яка структурна угруповання лежить в основі інтервального ряду, розрізняють *рівноінтервальні* та *нерівноінтервальні* ряди.

У рівноінтервальних рядах ширина інтервалу є величиною постійною, в нерівноінтервальних — вона різна для різних груп.

Основними елементами рядів розподілу є:

1. Значення ознаки (варіанти):

— x_i — дискретне в дискретних рядах;

— $x_i^B - x_i^H$ — інтервал для інтервальних рядів, де $i = \overline{1, n_i}$, n_i — частота;

2. Частота n_i — число одиниць сукупності, що володіють даним значенням ознаки. Частота показує, скільки раз дане значення ознаки зустрічається

в сукупності; сума всіх частот завжди дорівнює обсягу статистичної сукупності, тобто $\sum_{i=1}^m n_i = N$.

Дослідження рядів розподілу здійснюється в два етапи:

— **емпіричне дослідження**, метою якого є отримання узагальнюючих характеристик досліджуваної сукупності;

— **теоретичне дослідження** з метою виявлення закономірності даного розподілу і його теоретичного опису.

Емпіричне дослідження починається з визначення частотних характеристик ряду розподілу [3].

1.4.2. Частотні характеристики рядів розподілу

Вихідною частотною характеристикою будь-якого ряду розподілу є частота n_i . На її основі можна розрахувати такі характеристики:

— **частковість** — питома вага (частка) одиниць сукупності, що мають певне значення ознаки, тобто це частота, виражена у вигляді відносної величини (частки одиниці або відсотка):

$$q_i = \frac{n_i}{N}, \quad (1.13)$$

де $i = \overline{1, m}$ і $\sum_{i=1}^m q_i = 1$.

Ця характеристика має важливе значення при дослідженні рядів розподілу, так як дозволяє зв'язати показники рядів розподілу з відповідними показниками та апаратом теорії ймовірностей. У теорії ймовірностей q_i є ймовірність того, що дане значення ознаки зустрінеться в сукупності. Частість використовується для зіставлення рядів розподілу, що містять рівне число статистичних одиниць.

— **накопичена частота** — число одиниць сукупності, у яких значення ознаки не перевищує даного x^* , тобто це частота з наростаючим підсумком:

$$N_{x^*} = \sum_{i=1}^{m^*} n_i, \quad N_{x^*} = N, \quad (1.14)$$

де x^* — дане значення ознаки в i -ій групі, для якої розраховується накопичена частота.

За накопиченими частотами можна побудувати кумулятивний ряд розподілу — ряд значень числа одиниць сукупності з меншими і рівними верхній межі відповідного інтервалу значеннями ознаки.

— **накопичена частинність** — питома вага (частка) одиниць, у яких значення ознаки не перевищує дане x^* , тобто це частинність з наростаючим підсумком:

$$Q_{x^*} = \sum_{i=1}^{m^*} q_i, \quad Q_{x^*} = 1. \quad (1.15)$$

— **щільність розподілу** — універсальна частотна характеристика, що дозволяє перейти від емпіричного до теоретичного розподілу. Для рядів з нерівними інтервалами тільки ця характеристика дає правильне уявлення про характер розподілу. Щільність розподілу розраховується в 2-х варіантах:

– як **абсолютна щільність розподілу** φ_i , показує число одиниць сукупності, що припадають на одиницю ширини інтервалу значення ознаки:

$$\varphi_i = \frac{n_i}{a_i}. \quad (1.16)$$

– як **відносна щільність розподілу** φ_i' показує питому вагу одиниць сукупності, що припадають на одиницю ширини інтервалу:

$$\varphi_i' = \frac{n_i}{a_i}. \quad (1.17)$$

Щільність розподілу забезпечує порівнянність різних рядів розподілу.

Різні ряди розподілу характеризуються різним набором частотних характеристик: мінімальним — атрибутивні ряди (частота n_i і частинність q_i), для дискретних використовуються чотири характеристики (частота n_i , частинність q_i , накопичена частота N_i , накопичена частинність Q_i), для інтервальних — всі п'ять (частота n_i , частинність q_i , накопичена частота N_i , накопичена частинність Q_i , абсолютна φ_i і відносна φ_i' щільності розподілу) [3].

1.4.3. Графічне представлення рядів розподілу

Графіки є наочною формою відображення рядів розподілу. Для зображення рядів застосовуються лінійні графіки та площинні діаграми, побудовані в прямокутній системі координат.

Для графічного представлення атрибутивних рядів розподілу використовуються стовпчикові, лінійні, кругові, фігурні, секторні і т.п. типи діаграм.

Для дискретних варіаційних рядів графіком є полігон розподілу.

Полігоном розподілу називається ламана лінія, що з'єднує точки з координатами $\{x_i, n_i\}$ або $\{x_i, q_i\}$, де x_i – дискретне значення ознаки, n_i – частота, q_i – частинність.

Графік будується в прийнятому масштабі. Вид полігону розподілу наведено на рис. 15.12 на с. 968.

Для зображення інтервальних варіаційних рядів застосовують **гістограми**, що представляють собою ступінчасті фігури, що складаються з прямокутників, підстави яких дорівнюють ширині інтервалу a_i , а висота — частоті n_i (частинність q_i) рівноінтервального ряду або щільності розподілу нерівноінтервального φ_i і φ_i^* . Побудова діаграми аналогічно побудові стовпчикової. Загальний вигляд гістограми наведено на рис. 15.10 на с. 966.

Для графічного представлення варіаційних рядів може використовуватися також **кумулята** — ламана лінія, складена з нагромадженням частот (частоті). Накопичені частоти наносяться у вигляді ординат; поєднуючи вершини окремих ординат відрізками прямої, одержуємо ламану лінію, що має неубуваючий вигляд. Координатами точок на графіку для дискретного ряду є $\{x_i, N_i\}$; для інтервального ряду — $\{x_i^B, N_i\}$. Початкова точка графіка має координати $\{x_i^H, 0\}$, найвища точка — $\{x_i^B, N\}$. Загальний вигляд кумуляти наведено на рис. 3.6, б). Використання кумуляти особливо зручно при проведенні порівнянь варіаційних рядів.

При побудові графіків рядів розподілу велике значення має співвідношення масштабів по осі абсцис і осі ординат.

В цьому випадку і необхідно керуватися “правилом золотого перетину”, відповідно до якого висота графіка повинна бути 1.62 [3].

1.4.4. Показники центра розподілу варіаційного ряду

Середні показники є найбільш поширеною формою статистичних показників. Середнім називається узагальнюючий показник статистичної сукупності, що характеризує найбільш типовий рівень явища. Він висловлює величину ознаки, віднесеної до одиниці сукупності. Особливості середніх показників полягають в тому, що вони, по-перше, відображають те загальне, що притаманне всім одиницям сукупності; по-друге, в них взаємно нівелюються ті відхилення значень ознаки, які виникають під впливом випадкових факторів. Це означає, що середній показник відображає типовий рівень ознаки, що формується під впливом основних домінуючих не випадкових факторів.

Застосування середніх величин дозволяє охарактеризувати певну ознаку сукупності одним числом, незважаючи на те, що у різних одиниць сукупності значення ознаки відмінні один від одного.

У статистичній обробці даних використовуються два види середніх величин: *степеневі* та *структурні* середні.

До степеневих середніх відносяться кілька видів середніх, побудованих за одним загальним принципом:

$$\bar{x}_k = \sqrt[k]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^k}{n}}, \quad (1.18)$$

де x_i – варіанти;

n – обсяг статистичної сукупності (вибірки);

k – показник ступеня [3].

При цьому при $k = -1$ маємо середньогармонійні (1.26) і (1.27); при $k=0$ — середньгеометричні (1.24) і (1.25); при $k = 1$ — середньоарифметичні (1.22) і (1.23); при $k = 2$ — середньоквадратичні (1.28) і (1.29); при $k = 3$ — середньокубічні (1.30) і (1.31); при $k = 4$ — середньоквартитні; при $k = 5$ — середньоквінтитні.

Степеневі середні у залежності від форми представлення вихідних даних можуть бути простими і зваженими.

Якщо вихідні дані представлені простим перерахуванням значень ознаки у статистичних одиниць, то використовується формула простої степеневі середньої (1.19), якщо дані попередньо згруповані (представлені рядом розподілу), то використовується формула степеневі середньої зваженої (1.20)

$$\bar{x}_k = \sqrt[k]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^k}{n}}; \quad (1.19)$$

$$\bar{\bar{x}}_k = \sqrt[k]{\frac{\sum_{i=1}^m x_i^k f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}}, \quad (1.20)$$

де f_i – частота повторення індивідуальних значенні ознаки;
 m – кількість однорідних груп.

Середня арифметична \bar{x} є найбільш поширеним видом степеневих і використовується у випадках, коли обсяг усередненої ознаки є **адитивною величиною**, тобто утворюється як сума його значень за всіма одиницям статистичної сукупності. При цьому якщо індивідуальні значення ознаки у статистичних одиниць замінити середньою арифметичною, то сумарний обсяг ознаки за сукупністю в цілому зберігається незмінним. Це означає, що середня арифметична є середнє доданків [3].

Середня арифметична проста використовується при роботі з незгрупованими даними. При розрахунках експериментальні значення замінюються середнім арифметичним значенням \bar{x} (1.22), яке є незміщеною точковою оцінкою для генеральної середньої μ (1.21) [45] нормального статистичного розподілу. Середнє арифметичне значення \bar{x} з найбільшою **ймовірністю**, тобто, показником об'єктивної можливості очікуваного результату, представляє собою вимірювану величину і є також математичним сподіванням [1, 12].

У виразі (1.22) наводяться просте вибіркове середнє (середнє арифметичне) \bar{x} [3, 31, 45]

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i; \quad (1.21) \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad (1.22)$$

де x_i – значення i -го виміру випадкової вибірки (варіанти) обсягом n .

Якщо у вихідних даних окремі значення усередненої ознаки повторяться, а всі вимірювання **рівноточні**, тобто виконані з однаковою точністю [31], то розрахунок середньої проводиться по згрупованих даних або варіаційним рядах. У подібних випадках для розрахунку необхідно застосовувати середню арифметичну зважену $\bar{\bar{x}}$ — середню згрупованих величин (1.23) [3, [15, 31]

$$\bar{\bar{x}} = \sum_{i=1}^m x_i f_i / \sum_{i=1}^m f_i, \quad \text{чи} \quad \bar{\bar{x}} = \sum_{i=1}^m x_i q_i, \quad (1.23)$$

де q_i — частинність, тобто, питома вага статистичних одиниць з певними значенням ознаки у загальному обсязі сукупності.

Середня арифметична має ряд корисних властивостей, до найважливіших з яких відносяться:

- середня арифметична постійної величини дорівнює цій величині;
- алгебраїчна сума відхилень варіант від їх середньої арифметичної дорівнює нулю, а сума квадратів їх відхилів мінімальна;
- якщо всі варіанти зменшити (збільшити) на постійне число, то середня арифметична з них зменшиться (збільшиться) на це ж число;
- якщо всі варіанти однаково збільшити (зменшити) в одне ж число раз, то середня арифметична збільшиться (зменшиться) в стільки ж разів;
- якщо все ваги середньої однаково збільшити (зменшити) в кілька разів, то середня арифметична не зміниться.

Використання середнього обмежується тим, що на його величину впливає кожне окреме значення. Таким чином, середнє значення досить чутливе до “викидів” — екстримально малих чи великих значень змінної [9]. Крім того для інтервального ряду даних воно є зміщеною оцінкою для a . Величина зміщення має порядок λ^2 , якщо довжина інтервалу λ досить мала — у 2–3 рази менше, ніж s [31].

Також для статистичної оцінки використовується **урізане середнє** (*Trimmed mean*), (див. табл. 2.16, с. 106 та рис. 2.10, с. 107 і рис. 2.11, с. 108) шляхом відкидання певної кількості менших і більших значень даних, і **вінсоризоване середнє** (*Winsorized mean*), яке визначається при заміні певної кількості менших і більших значень даних відповідно наступними і передуючими показниками. Ці критерії, які розраховуються у ППП **Statistica**, менш чутливі до викидів даних, ніж середньоарифметичне, але використовують більше інформації від розподілу за медіану й дають більш зважену оцінку статистичних моделей. Однак, для нормального статистичного розподілу урізане середнє менш ефективне за середньоарифметичне, а при несиметричному — вінсоризоване середнє менш точне за середньоарифметичне чи медіану.

Середня геометрична застосовується в тих випадках, коли загальний обсяг усередненої ознаки є **мультиплікативною величиною**, тобто визначається не підсумовуванням, а множенням індивідуальних значень ознаки.

Форма середньої геометричної зваженої в практичних розрахунках не застосовується [3].

Геометричне середнє, наприклад, використовується для визначення середнього приросту маси біологічного об’єкта за певний період. Просте середньгеометричне \bar{x}_g подано виразом (1.24) [14], зважене $\bar{\bar{x}}_g$ — виразом (1.25) [15, 14]

$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}; \quad (1.24)$$

$$\bar{\bar{x}}_g = \left(\sum_{i=1}^n f_i \right) \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n (x_i)^{f_i}}. \quad (1.25)$$

Середня гармонійна використовується в тих випадках, коли статистична інформація не містить частот по окремим значенням ознаки, а представлена добутком значення ознаки на частоту.

Середня геометрична використовується також для визначення рівновіддаленої величини від максимального і мінімального значення ознаки [3].

Середня гармонійна \bar{x}_h є сумою обернених значень варіант, ділених на їх число. Якщо вихідні дані не груповані, то застосовується проста середня гармонійна \bar{x}_h (1.26), при роботі зі згрупованими даними використовується середня гармонійна зважена $\bar{\bar{x}}_h$ (1.27) [3, 15]

$$\bar{x}_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{x_i}}; \quad (1.26)$$

$$\bar{\bar{x}}_h = \frac{\sum_{i=1}^m f_i}{\sum_{i=1}^m \frac{f_i}{x_i}}. \quad (1.27)$$

де f_i – статистична вага; $f_i = x_i \cdot n_i$.

Використовується гармонійне середнє, наприклад, для визначення середнього часу, необхідного для виконання одиниці роботи всім колективом, виходячи з індивідуальної продуктивності кожного його члену.

У пакеті аналізу **MS Excel** (див. Додаток А) арифметичне середнє визначається за допомогою статистичної функції **СРЗНАЧ**, для визначення геометричного середнього використовується функція **СРГЕОМ**, середнього гармонійного — **СРГАРМ**, для знаходження обсягу n вибірки використовується статистична функція **СЧЁТ** [24, 46].

Застосовують ще прості й зважені *степеневі середні*: квадратичні (\bar{x}_q та $\bar{\bar{x}}_q$, див. (1.28) і (1.29)).

$$\bar{x}_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}; \quad (1.28)$$

$$\bar{\bar{x}}_q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}}. \quad (1.29)$$

Середня квадратична використовується в тих випадках, коли при заміні індивідуальних значень ознаки на середню величину необхідно зберегти

незмінною суму квадратів вихідних величин.

Головна сфера її використання — вимір ступеня коливання індивідуальних значень ознаки щодо середньої арифметичної (середнє відхилення). Крім цього, середня квадратична застосовується в тих випадках, коли необхідно обчислити середній величину ознаки, вираженого в квадратних одиницях виміру (для варіаційного ряду площ, наприклад визначення середньої площі кошиків соняшника, при обчисленні середньої величини квадратних ділянок, середніх діаметрів труб, стовбурів і т.д.).

Середні кубічні — (\bar{x}_Q та $\bar{\bar{x}}_Q$, див. (1.30) і (1.31) використовуються для обсягів, наприклад, при визначенні об'ємів стовбурів дерев чи моментів опору їх перетинів, кватирктні — для моментів інерції перетинів, квінтиктні і т.д. [15]

$$\bar{x}_Q = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^3}{n}}; \quad (1.30)$$

$$\bar{\bar{x}}_Q = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^3 f_i}{\sum_{i=1}^n f_i}}. \quad (1.31)$$

Все статечні середні різняться між собою значеннями показника ступеня. При цьому, *чим вище показник ступеня, тим більше кількісне значення середнього показника.*

Це властивість статечних середніх називається властивістю мажорантності середніх. Із правила мажорантності маємо [3, 15]

$$\bar{x}_h \leq \bar{x}_g \leq \bar{x} \leq \bar{x}_q \leq \bar{x}_Q \leq \bar{x}_{(\text{кварт.})} \leq \bar{x}_{(\text{квинт.})} \text{ і т.д.} \quad (1.32)$$

На відміну від середньої арифметичної, що розраховується на основі всіх варіант, мода **Мо** і медіана **Ме** характеризує значення ознаки у статистичній одиниці, що займає певне положення у варіаційному ряду.

Медіана вибірки є значенням, яке розбиває рангову вибірку на дві рівні частини і є другим (середнім) Q_2 квантилем, рівним 50 процентилів, тобто значенням випадкової величини, яка може приймати будь-яке значення й з якою зв'язаний імовірнісний розподіл, для якої функція відклику, залежність математичного сподівання відклику від факторів, приймає значення 1/2, або має місце стрибок зі значенням менше ніж 1/2 до більше ніж 1/2.

Медіану використовують як найбільш надійний показник типового значення неоднорідною сукупності, так як вона нечутлива до крайніх значень ознаки, які можуть значно відрізнитися від основного масиву його значень. Крім цього, медіана знаходить практичне застосування внаслідок особливого математичного властивості $\sum |x_i - Me| \rightarrow \min$.

При *непарній* кількості членів варіаційного ряду чисел, які характеризують значення даної ознаки, медіаною є центральна варіанта рангового ряду (1.33), при *парній* — половина суми сусідніх середніх варіант (1.34) [14]

$$Me = x_{n/2+1}; \quad (1.33)$$

$$Me = \frac{x_{n/2} + x_{n/2+1}}{2}. \quad (1.34)$$

Розраховується медіана з використанням статистичної функції ПА MS Excel **МЕДИАНА** (див. Додаток А).

Для визначення похибки медіани використовується вираз [15]

$$s_{Me} = s_{\bar{x}} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \quad (1.35)$$

Мода вибірки — значення, яке найчастіше зустрічається у вибірці, тобто є максимумом на диференційній кривій розподілу. Наприклад, мода добре описує реакцію водіїв на сигнали світлофору.

Причому (*Multiple* означає, що розподіл має не одну моду (див. графу **Мода** табл. 2.16, с. 106), а є мультимодальним. Це свідчить, що вибірка не є однорідною і отримані результати викликані накладанням двох чи більше розподілів. Для вертикального масиву мода визначається статистичними функціями **МОДА.ОДН** і **МОДА.НСК** для транспонованого горизонтального масиву — **ТРАНСП(МОДА.НСК)**.

Для порядкових і метричних змінних, розподіл яких унімодальний й симетричний, мода, медіана й середнє збігаються. Чим більше відхилення від симетричності, тим більше розбіжність між значеннями показників центральної тенденції. За цією розбіжністю можна оцінювати наскільки симетричний або асиметричний розподіл [9].

Антимодальні розподіли мають посередині мінімум [2].

Крім *Мо* і *Ме* в варіантних рядах можуть бути визначені й інші структурні характеристики — квантілі.

Квартіль розподілу — три значення ознаки (Q_1 , Q_2 і Q_3), які ділять ранговий варіаційний ряд на чотири рівні частини. Квартіль 0.25 % називається 25-ою провентилією або нижнім — першим, квартіль 0.75 % — 75-а провентилією або верхнім — третім [14].

Нижній (перший) Q_1 і верхній (третій) Q_3 визначається виразом

$$Q_{1,3} = \frac{x_{i_{1,3}} + x_{j_{1,3}}}{2}, \quad (1.36)$$

тут

$$\begin{aligned} i_1 &= \text{floor}[(n+1)/4]; j_1 = \lceil n/4 \rceil; \\ i_3 &= \text{floor}[3(n+1)/4]; j_3 = \lceil 3n/4 \rceil, \end{aligned} \quad (1.37)$$

де **floor** – округлення до найближчого цілого числа;

$\lceil n/4 \rceil$ і $\lceil 3n/4 \rceil$ – округлення до найближчого **більшого** цілого числа.

Округлення величини **m** до найближчого **меншого** цілого числа представляється позначенням $\lfloor m \rfloor$.

Квартилі знаходяться з використанням статистичної функції **КВАРТИЛЬ.ВКЛ** (див. Додаток А).

Міжквартильний (інтерквартильний) розмах R_Q (*Interquartile range*) становить $Q_3 - Q_1$, тобто дорівнює різниці значень 75-ої й 25-ої процентилі й являє собою діапазон навколо медіани, який містить 50 % спостережень. Він є характеристикою розкиду розподілу величини й служить аналогом дисперсії. Медіана й інтерквартильний розмах використовуються замість математичного сподівання й дисперсії у разі розподілів із великими викидами, або при неможливості обчислення останніх, зокрема, для рангової шкали (див. с. 337).

Процентиль (Перцентиль) — відсоток елементів із вибірки, показник яких такий же, або нижчий ніж у конкретного елемента. Він може використовуватися для стандартизації як статистично розподілених показників, так і даних із ненормальним статистичним розподілом. У його шкалі відсутнє поняття середнього арифметичного й середньоквадратичного відхилення.

Для розрахунків процентилі потрібно для кожного з елементів вибірки визначити, яка їх кількість має такий же або менший показник, і вирахувати скільки її відсотків від усієї вибірки. Процентиль має діапазон від 1 до 100 і є досить розповсюдженою шкалою стандартизації, як дуже зручний і зрозумілий.

Крім процентилів застосовуються також **децилі**, які характеризують розподіл сукупності, ділячи його на десять рівних частин.

Таким чином, для характеристики стану центру ряду розподілу можна використовувати три показники: **середнє значення ознаки, мода, медіана**.

При виборі виду і форми конкретного показника центру розподілу необхідно виходити з таких рекомендацій:

— для стійких соціально-економічних процесів в якості показника центру використовують середню арифметичну. Такі процеси характеризуються симетричними розподілами, в яких $\bar{x} = Me = Mo$;

— для нестійких процесів положення центру розподілу характеризується за допомогою **Mo** або **Me**. Для асиметричних процесів кращою характеристикою центру розподілу є медіана, оскільки займає проміжне положення між середньою арифметичною і модою.

1.4.5. Показники варіювання

Друге найважливіше завдання при визначенні загального характеру розподілу — це оцінка ступеня його однорідності. Однорідність статистичних сукупностей характеризується величиною варіації (розсіювання) ознаки, тобто розбіжністю його значень у різних статистичних одиниць. Для її вимірювання в статистиці використовуються абсолютні та відносні показники.

1.4.5.1. Розмах варіації R

Визначення параметрів розмах варіації R наведено на с. 27);

Відносний розмах ϵ_R варіації, який називається також коефіцієнтом осциляції V_R [47], визначається на основі виразів (1.6) та (1.22) і наводиться у відсотках (1.38)

$$V_R = 100 \cdot \frac{R}{\bar{x}}. \quad (1.38)$$

Якщо не потрібно високої точності можна визначити наближене значення середнього арифметичного і СКВ

$$\bar{x} = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2}; \quad (1.39)$$

$$s = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{M}. \quad (1.40)$$

Число M знаходиться із табл. 1.1 [60].

Таблиця 1.1 – Значення числа M

N	2–8	6–15	16–49	50–200	201–1000	>1000
M	2	3	4	5	6	7

1.4.5.2. Середній лінійний відхил

Середній лінійний відхил \bar{d} є більш суворою характеристикою варіації ознаки, що враховує відмінності всіх одиниць досліджуваної сукупності. Він представляє собою середню арифметичну абсолютних значень відхилень окремих варіантів від їх середньої арифметичної.

Середній лінійний абсолютний відхил \bar{d} [15] і середній зважений абсолютний відхил $\bar{\bar{d}}$ представляють собою лінійний відхил параметрів і розраховується за формулами (1.41) і (1.42)

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n (|x_i - \bar{x}|)}{n}; \quad (1.41) \quad \bar{\bar{d}} = \frac{\sum_{i=1}^n (|x_i - \bar{x}|) \cdot f_i}{\sum_{i=1}^n f_i n}. \quad (1.42)$$

Для визначення середнього абсолютного відхилу \bar{d} (1.41) в ПА **MS Excel** використовується статистична функція **СРОТКЛ**, див. Додаток А.

Відомо, що для теоретичного нормального розподілу виконується відношення (1.43)

$$\frac{\bar{d}}{s} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}. \quad (1.43)$$

Відносні лінійні відхили $\varepsilon_{\bar{d}}$ (лінійний коефіцієнт кореляції $V_{\bar{d}}$ [47]) і $\varepsilon_{\bar{\bar{d}}}$ визначається за виразами (1.41) і (1.22) та (1.42) і (1.23). У виразах (1.44) і (1.45) наводиться у відсотках

$$V_{\bar{d}} = 100 \cdot \frac{\bar{d}}{\bar{x}}; \quad (1.44) \quad \varepsilon_{\bar{\bar{d}}} = 100 \cdot \frac{\bar{\bar{d}}}{\bar{\bar{x}}}. \quad (1.45)$$

У практичних розрахунках середній лінійний відхил використовується для оцінки ритмічності виробництва, рівномірності поставок [3].

Середній квадрат відхилу s^2 — емпірична вибіркова дисперсія (виправлена дисперсія) (1.48) є незміщеною точковою оцінкою (математичним сподіванням) для генеральної дисперсії σ^2 (1.47) [45, 48].

Оцінка вважається незміщеною, якщо при даному обсязі вибірки n математичне очікування помилки рівнет нулю. Для незміщеної оцінки її математичне очікування точно дорівнює середньому характеристики вибірки

$$M[\tilde{\alpha} - \alpha] = 0, \quad (1.46)$$

де α – значення характеристики генеральної сукупності;
 $\tilde{\alpha}$ – середнє значення характеристики вибірки.

Сама дисперсія σ^2 характеризує розсіювання значень кількісної ознаки навколо середнього арифметичного і визначається при невідомій генеральній середній μ [25, 45]

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2; \quad (1.47)$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (1.48)$$

Оцінка емпіричної вибіркової дисперсії s^2 (1.48), є незміщеною і спроможною, але не ефективною, так як вона є лише асимптотично ефективною, тобто її розсіювання прямує до мінімального при необмеженому збільшенні числа вимірювань n [31].

При розрахунковому визначенні виразу $\sum (x_i - \bar{x})^2$ іноді доцільно використовувати $\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 / n$ та $\sum x_i^2 - \bar{x}^2 \cdot n$ [50].

При обчисленні середнього квадрата відхилення від будь-якого числа c має місце формула (1.49) [31]

$$s_c^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - c)^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + (\bar{x} - c)^2 = \sigma^2 + (\bar{x} - c)^2. \quad (1.49)$$

У пакеті аналізу **MS Excel** генеральна дисперсія (стандартний відхил) σ^2 визначається за допомогою статистичної функції **ДИСП.Г**, вибіркова дисперсія s^2 — функції **ДИСП.В** з синтаксичною частиною обох функцій (**число1;[число2];...**) (див. Додаток А).

Знаменник $n-1$ у формулі (1.48) враховує поправку Бесселя, рівну $\frac{n}{n-1}$ і представляє собою *ступінь вільності* ν — кількість вільно варійованих величин при визначенні вибіркової дисперсії — різницю між числом дослідів n та числом знайдених констант, тобто $\nu = n - 1$ [1, 15].

Число ступенів вільності ν — це поняття, яке враховує в статистичних ситуаціях зв'язки, що обмежують свободу зміни випадкових величин. Тому воно обчислюється як різниця між числом експериментальних точок n і числом зв'язків f , що обмежують свободу вимірювання випадкової величини.

При обчисленні вибіркової дисперсії s^2 за формулою (1.48) для n експериментальних точок порівнянням x з вибіркоким середнім \bar{x} , спостерігається один зв'язок, обумовлений визначенням вибіркового середнього \bar{x} , яке

розраховується за формулою (1.22), тому число ступенів свободи вибіркової дисперсії дорівнюватиме $\nu = n - 1$. Для вибіркової дисперсії s^2 , знайденої порівнянням n експериментальних точок з константою, чи іншою величиною, знайденою незалежним, наприклад, розрахунковим способом, число ступенів вільності дорівнює числу випробувань $\nu = n$ [49].

1.4.5.3. Правило додавання дисперсій

Якщо досліджувана сукупність складається з кількох частин, то для кожної з них можна розрахувати середнє значення ознаки і дисперсію. Крім цього можна розрахувати дисперсію, що вимірює варіацію ознаки між виділеними частинами сукупності.

Таким чином, за допомогою різних видів дисперсії можна більш глибоко вивчити варіацію ознаки в сукупності. Розрізняють такі види дисперсій: загальна дисперсія, міжгрупова і внутрішньогрупова.

Загальна дисперсія s_Y^2 вимірює варіацію ознаки в усій статистичній сукупності під впливом усіх факторів, що викликають цю варіацію. Вона розраховується за формулою

$$s_Y^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2}{\sum n_i}. \quad (1.50)$$

Міжгрупова дисперсія s_v^2 характеризує зміну ознаки обумовлене факторами, покладеними в основу угруповання. Таким чином, міжгрупова дисперсія є дисперсія локальних середніх. Її розрахунок проводиться за формулою

$$s_v^2 = \frac{\sum_{i=1}^m (\tilde{x}_i - \bar{x})^2}{m}. \quad (1.51)$$

де \tilde{x}_i – локальна середня (середнє значення ознаки) у кожній групі;
 m – кількість груп (частин) в сукупності.

Внутрішньогрупова дисперсія $s_{z_i}^2$ характеризує випадкову варіацію, тобто

коливання ознаки, що виникають під впливом неврахованих факторів і незалежну від варіації ознаки — фактору, покладеного в основу угруповання. Внутрігруппова дисперсія $s_{z_i}^2$ розраховується для кожної однорідної групи

$$s_{z_i}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_i} (x_i - \tilde{x}_i)^2}{n_i}. \quad (1.52)$$

На основі внутрішньогруппової дисперсії розраховується *середня внутрішньогруппових дисперсій (залишкова дисперсія)* $\overline{s_z^2}$

$$\overline{s_z^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n_i} s_i^2}{m}. \quad (1.53)$$

Перелічені дисперсії пов'язані між собою наступним відношенням

$$s_0^2 = s_v^2 + \overline{s_z^2}. \quad (1.54)$$

Це співвідношення називається *правилом додавання дисперсій*. Чим більше групова дисперсія, тим якісніше угруповання і тим сильніше факторна ознака впливає на загальну варіацію. Користуючись цим правилом, можна за двома відомими дисперсіями розрахувати невідому третю дисперсію.

1.4.5.4. Стандартний і середньоквадратичний відхил

Так як середнє арифметичне не відображає меж коливання досліджуваної ознаки, за нормального статистичного розподілу для характеристики середньої мінливості застосовується СВ σ генеральної сукупності [45] та вибіркового СКВ s виражені позитивним квадратним коренем з генеральної σ^2 чи вибіркової дисперсії s^2 [1, 45]. В ряді робіт вирази (1.55)–(1.58) наводяться зі знаком “ \pm ” на основі того, що відхили від середнього арифметичного можуть бути в обидві сторони [2].

$$\sigma = + \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad (1.55)$$

$$s = + \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad (1.56)$$

$$s = + \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^n x\right)^2}{n}}{n-1}}; \quad (1.57)$$

$$s = + \sqrt{\frac{n}{n-1} \cdot \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \bar{x}^2 \right)}. \quad (1.58)$$

Стандартний відхил, а відповідно і середній квадратичний відхил є однією з найважливіших статистичних величин, за допомогою якої при нормальному розподілі можна оцінювати приналежність того чи іншого спостереження до відповідного ряду спостережень [2].

Таблиця 1.2. Коефіцієнти k для наближеного обчислення s за розмахом варіювання

n	k	n	k	n	k
2	0.886	8	0.351	18	0.275
3	0.591	9	0.337	20	0.268
4	0.486	10	0.325	30	0.245
5	0.430	12	0.307	40	0.231
6	0.395	14	0.294	50	0.222
7	0.370	16	0.283		

Наближену оцінку СКВ s за даними малої вибірки можна швидко обчислити, користуючись певною залежністю між числом спостережень — n і розмахом варіювання R . Наприклад, якщо $n=2$, то, незалежно від значень обох членів даної вибірки, СКВ дорівнюватиме 0.886 різниці між ними, тобто $s=0.886R$. Коефіцієнти, за допомогою яких можна визначити прибли

лизну, але тим не менш досить точну для багатьох цілей, оцінку s за розмахом варіювання, обчислені Карлом Пірсоном, наведені в табл. 1.2 [50].

Відсутні в таблиці значення s можна розрахувати, застосовуючи лінійне інтерполювання.

Слід мати на увазі, що чим менше n , тим ближче наближена оцінка СКВ, обчислена за розмахом варіювання, до її значенням, обчисленому за фактичними даними спостережень. При збільшенні n ефективність наближеного способу визначення s зменшується.

Зауважимо, що ефективністю у статистиці називається повнота використання інформації, що міститься в досвідчених даних, при обчисленні оцінок параметрів. Ефективність 0.85 (або 85%) означає, що для отримання максимально точної оцінки даного параметра необхідно взяти на 15% більше спостережень. Максимальна ефективність дорівнює одиниці, або 100% .

Грубу оцінку СКВ за Снедекором, можна отримати, якщо розділити розмах варіювання на $2, 3, 4, 5$, коли n приблизно $5, 10, 25, 100$ [50].

У пакеті аналізу **MS Excel** вони знаходяться за допомогою статистич-

них функцій **СТАНДОТКЛОН.Г** і **СТАНДОТКЛОН.В** з синтаксичною частиною обох функцій (**число1;[число2];...**) (див. Додаток А).

Середньозважений стандартний відхил $\bar{\sigma}$ і виправлений середній квадратичний відхил \bar{s} визначається за виразом (1.59), який представляє собою зміщену оцінку стандарту σ [31]

$$\bar{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k f_i (x_i - x)^2}{\sum_{i=1}^k f_i}}. \quad (1.59)$$

Якщо величина класового (групового) інтервалу λ вибірок достатньо великого обсягу ($n \geq 50$) становить менше десятої частини діапазону вимірювання R , тобто $\lambda/R < 10$, а також якщо довжина інтервалу λ досить мала — у 2–3 рази менше, ніж s , то в якості оцінки дисперсії застосовують *виправлену* емпіричну дисперсію (1.60) [31]

$$\bar{s}^2 = \bar{\sigma}^2 - \lambda^2 / 12, \quad (1.60)$$

де $\bar{\sigma}$ — середньозважений стандартний відхил.

Відповідно *виправлений* емпіричний стандарт \bar{s} визначається за виразом (1.61)

$$\bar{s} = \sqrt{\bar{\sigma}^2 - \lambda^2 / 12}, \quad (1.61)$$

Тут $\lambda^2/12$ — поправка Шеппарда, яка усуває головну частину зміщення оцінки [31].

Середній квадратичний відхил використовується для оцінки розсіювання вимірів і служать показником найбільш імовірної середньої похибки одиничного даного загальної вибірки, тобто ступеня концентрації навколо середнього значення і має розмірність варійованої величини [34].

Середнє арифметичне \bar{x} має дисперсію в n разів менше за дисперсію σ^2 (1.47) генеральної чи вибіркової s^2 (1.48) сукупності, тобто похибка середнього незалежних спостережень в \sqrt{n} разів менше похибки одиничного вимірювання [51], тому у якості його точкової оцінки використовується *абсолютна (стандартна) похибка генерального (стандартна похибка) σ_μ* (1.62) [14, 45] чи *середнє квадратичне відхилення вибіркового середнього $s_{\bar{x}}$* (1.63) [45] (*Стандартная ошибка* у російськомовних MS Excel (табл. 2.15, с. 101) і

ППП **Statistica** (табл. 2.16, с. 106) та *Standart Error* в англomовній версії **Statistica** (табл. 2.17 на с. 111). також використовуються відповідно вирази *середня похибка генерального* і *середня похибка вибірки* [37]

$$\sigma_{\mu} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \quad (1.62)$$

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (1.63)$$

Виразом (1.63) користуються при нескінченному чи невідомому обсязі генеральної сукупності, чи коли вибірка становить лише 5–10 % від нього.

Величина $s_{\bar{x}}$ є відхиленням для середнього арифметичного \bar{x} вибірки від генерального середнього сукупності μ , тобто показує, що вибіркове середнє \bar{x} оцінює середнє μ генеральної сукупності з похибкою $s_{\bar{x}}$. Це дає змогу визначити межі, у яких із певним рівнем імовірності може знаходитись значення μ , вони залежать від ступеня мінливості ознаки й обсягу вибірки [34] За умови $n \geq 30$ маємо $\sigma_{\mu} \approx s_{\bar{x}}$ [15].

Величина *середнього квадратичного відхилення* $s_{\bar{x}}^{\pm}$ *середнього зваженого* \bar{x} (1.23), виходячи з того, що критерієм частот прояву є величини, обернені дисперсіям [49], знаходиться за виразом (1.64), де i – кількість порівнюваних груп (серій спостережень)

$$s_{\bar{x}}^{\pm} = \sqrt{\frac{1}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{s_{\bar{x}_i}^2}}}. \quad (1.64)$$

Похибка зваженої середньої з суми частинних або групових середніх визначають за формулою (1.63), в якій замість вибіркової дисперсії s^2 (1.48) беруть зважену дисперсію $s_{\bar{x}}^2$, яку визначають за формулою

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (n_i - 1) \cdot s_i^2}{\sum_{i=1}^n n_i - k}, \quad (1.65)$$

де n_i – обсяги незалежних вибірок з нормально розподіленої генеральної сукупності;
 s_i^2 – дисперсії цих вибірок;

k – число обмежень свободи варіації, яка дорівнює кількості незалежних вибірових груп.

При відомому обсязі генеральної сукупності N похибка загальної зваженої середньої \bar{x} визначається за формулою

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{s_{\bar{x}}^2}{n} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right)}. \quad (1.66)$$

При відборі варіант кількістю n без повторень із загального масиву N при $n \approx 0.2N$ використовується поправка Пірсона у повному (1.67) чи спрощеному (1.68) вигляді [15]

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}; \quad (1.67)$$

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{n}{N}}. \quad (1.68)$$

Похибка вибіркового середнього, як **точкова оцінка** генерального середнього записується разом із похибкою вибіркового середнього, тобто $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$. Це означає, що середньоарифметичне \bar{x} є оцінкою середнього μ генеральної сукупності з абсолютною похибкою, яка дорівнює $s_{\bar{x}}$ [1, 34, 50].

Як відомо, похибка s_d різниці або суми середніх арифметичних незалежних вибірок при однаковому числі спостережень $n_1=n_2$ визначається співвідношенням (1.69) [34]

$$s_d = \sqrt{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2}. \quad (1.69)$$

де $s_{\bar{x}_1}^2$ і $s_{\bar{x}_2}^2$ – похибки порівнюваних середніх арифметичних \bar{x}_1 і \bar{x}_2 .

Відносна похибка вибіркового середнього $s_{\bar{x}\%}$, виражена у відсотках середнього арифметичного, є похибкою вибірки, або похибкою **репрезентативності вибірки** (див. с. 29), і представляє собою різницю між зведеними показниками вибіркової і генеральної сукупності. Вона служить оцінкою міри впевненості в істинності отриманого результату, тобто ймовірністю похибки, пов'язаної з поширенням результату на всю генеральну сукупність, а саме, ризик зробити помилковий висновок [1] і розраховується за виразом [34]

$$s_{\bar{x}\%} = 100 \frac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}; \quad (1.70)$$

$$s_{\bar{x}\%} = \frac{V}{\sqrt{n}}, \quad (1.71)$$

де V – коефіцієнт варіації див. (1.100).

При оцінці міри впевненості в істинності отриманого результату Відносна похибка вибіркового середнього $s_{\bar{x}\%}$ служить розрахунковим рівнем статистичної значущості й позначається літерою p (p –рівень, p –value), представляючи собою **показник точності дослід** (**точність аналізу**) або точність аналізу, тобто **ймовірність помилки**, пов’язаної з поширенням спостережуваного результату на всю популяцію [1, 2, 6, 34] (див. с. 339).

Яку саме ймовірність вважати дуже малою, залежить від конкретних умов розв’язуваної задачі: якщо призначити занадто низький рівень малих ймовірностей, то грубі помилки можуть залишитися, якщо ж взяти цей рівень невиправдано великим, то можна виключити результати з випадковими помилками, необхідні для правильної обробки результатів вимірювання. Зазвичай застосовують один з трьох рівнів малих ймовірностей:

- 5 % рівень (виключаються помилки з ймовірністю появи менше 0.05);
- 1 % рівень — з ймовірністю появи менше 0.01);
- 0.1 % рівень — з ймовірністю появи яких менше 0.001) [31].

У сільськогосподарських дослідженнях як “припустима межа” рівня похибки прийнято p –рівень 0.05, тобто висновки достовірні при $p \leq 5\%$.

Умовно прийнято при $p < 2(3)\%$ дослід вважати проведеним із високою точністю, при $2(3)\% \leq p \leq 5\%$ — дослід задовільним, при більшому ніж 5(7–8) % — точність низька і **свідчить про значні помилки в його проведенні** [15, 50, 52].

Деякі автори [115] не сприймають вираз (1.70) як якісну оцінку точності дослід, хоч саме на ньому ґрунтується загальноприйнята теорія похибок (див. розділ **5 Урахування похибок при вимірюваннях**). Це досить дивно ще й тому, що такі ж самі аргументи можна висунути і проти використання для якісної оцінки коефіцієнта варіації V (див. (1.99) та (1.100), з’язаного з виразом (1.70) простою арифметичною залежністю (1.71), але у правомірності використання коефіцієнта варіації V ніхто не сумнівається.

Як видно з формули (1.70), показник точності дослід знайдений емпірично й подібно до коефіцієнта варіації V (див. (1.100) виходить з передумови, що чим більший урожай, тим будуть більші й середньоквадратичний відхил та дисперсія, проте, це припущення не підтвердилось [6].

Сама ж відносна похибка вибіркового середнього $s_{\bar{x}\%}$ теж супроводжується похибкою $s_{s_{\bar{x}\%}}$, яку визначають за формулою [15]

$$s_{s_{\bar{x}\%}} = s_{\bar{x}\%} \sqrt{\frac{1}{2n} + \left(\frac{s_{\bar{x}\%}}{100}\right)^2}. \quad (1.72)$$

Середньоквадратична похибка $s_{\bar{x}}$ суми або різниці середніх арифметичних незалежних між собою вибірок (наприклад, різниці при порівнянні відповідних середніх показників двох вибірок однакового обсягу, або суми при врахуванні систематичної похибки засобу вимірювання приладу) визначається виразом [50]

$$\bar{s}_{\bar{x}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n s_{\bar{x}_i}^2} . \quad (1.73)$$

Для повнішої оцінки точності отриманих результатів користуються не точковим оцінюванням, а **довірчим інтервалом** — інтервалом, у межах якого із заданою ймовірністю потрапляє дійсне значення оцінюваної величини [8].

ІНТЕРВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ґрунтується на тому, що середнє арифметичне \bar{x} з деякою ймовірністю повинно знаходитись в певному інтервалі, який в узагальненій формі має значення [8, 14, 53] (рис. 1.1):

- в інтервалі $\pm 3\sigma$ — з імовірністю 99.7300 %;
- в інтервалі $\pm 2\sigma$ — з імовірністю 95.4500 %;
- в інтервалі $\pm 1\sigma$ — з імовірністю 68.2689 %.

Розрахунок цих величин див. на с. 143.




Рис. 1.1. Значення надійності P (зафарбована область) при різних відношеннях $\Delta x/s_{\bar{x}}$:

а — $\Delta x/s_{\bar{x}} = 1$; б — $\Delta x/s_{\bar{x}} = 2$; в — $\Delta x/s_{\bar{x}} = 3$.

Таким чином, відмінність значень випадкової величини з нормальним законом статистичного розподілу (Z -розподілу) від її математичного сподівання не перевершує потроєного СВ з імовірністю 0.9973. Це властивість у математичній статистиці носить назву “правило трьох сигм” (див. с. 304).

При використанні довірчих інтервалів для опису точності оцінок, наприклад, середнього арифметичного, представлених **двобічними** 95 %-ми інтервалами, що задаються виразом $\bar{x} \pm 1.96 \cdot s_{\bar{x}}$ (часто за допомогою бло-

кових діаграм, див. рис. 2.19, с. 117) необхідно прийняти величину довірчого рівня статистичної значущості $\alpha=0.05$. Більш точно визначається за допомогою статистичної функції пакету **Excel** [25] двобічного 95 %-го інтервалу **НОРМ.СТ.ОБР** при **вероятность**=(1-0.05/2) маємо 1.959964.

Докладніше відсотковий розподіл числа варіант при різних відхиленнях від середнього арифметичного приведено в табл. 1.3 (для властивостей, варіаційні ряди яких відповідають закону нормального розподілу) [2].

Таблица 1.3 – Відсотковий розподіл кількості варіант (величини площі, обмеженою нормальною кривою, для різних відхилень від середнього арифметичного)

Відхилення показника від середнього значення \bar{x} у частках σ	Кількість варіант, що знаходяться в даних межах, %	Відхилення показника від середнього значення \bar{x} у частках σ	Кількість варіант, що знаходяться в даних межах, %
0.1	8.0	1.6	89.0
0.2	15.9	1.7	91.1
0.3	23.6	1.8	92.8
0.4	31.1	1.9	94.3
0.5	38.3	2.0	95.4
0.6	45.1	2.1	96.4
0.7	51.6	2.2	97.2
0.8	57.6	2.3	97.9
0.9	63.2	2.4	98.4
1.0	68.3	2.5	98.8
1.1	72.9	2.6	99.1
1.2	77.0	2.7	99.3
1.3	80.6	2.8	99.5
1.4	83.8	2.9	99.6
1.5	86.6	3.0	99.7

Значення табл. 1.3 розраховуються як відсотковий показник статистичної функції пакету **Excel** **2*НОРМ.СТ.РАСП(z;интегральная)-1** з логічним значенням **истина**.

Середнє відхилення від середнього, розраховується за (1.41).

Для порівняння будь-яких варіаційних рядів використовують нормовані відхилення. Стандартизація (нормалізація) даних представляється нормованим відхилом, розрахованим за аналогією до виразу (3.21), с. 139

$$x_{i_n} = \frac{x_i - \bar{x}}{s}. \quad (1.74)$$

Для нормалізації використовується функція **НОРМАЛІЗАЦІЯ**, див. Додаток А) пакету аналізу **MS Excel**.

За показниками нормованого відхилю кожної окремої варіанти визначають середній показник нормованого відхилю

$$x_{\text{вн}} = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{(n-1)s}. \quad (1.75)$$

Фактично середнє арифметичне знаходиться в інтервалі $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)}s$, який називається *довірчим інтервалом сукупності (результатів спостереження)*, а $t_{\alpha(v)}s$ — є *областю розкиду індивідуальних даних* [34] — *граничною похибкою експериментальних даних* для прийнятого рівня значущості [1, 37].

Тут $t_{\alpha(v)}$ — квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) *двобічного зворотного t-критерію* Стюдента, який визначається за табл. В.5 на с. 1051, де довірчий рівень статистичної значущості α приймається за верхнім рядком.

Але його краще розраховувати статистичною функцією пакету **MS Excel** **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**, (див. Додаток А) ПА **MS Excel** при прийнятому довірчому рівні статистичної значущості α і ступені вільності $v=n-1$.

Першим з індексів при t є показник рівня значущості α (0.1, 0.05 і 0.01), тобто 10 %-му рівню статистичної значущості відповідає 90 %-й рівень імовірності P , 5 %-му рівню — 95 %-й, 1 %-му — 99 %-й (див. с. 339); другим — ступінь вільності v .

Імовірність того, що істинне значення вимірюваної величини потрапить в заданий інтервал, рівне $P=1-\alpha$, називається *довірчою ймовірністю*, надійністю, або *коефіцієнтом довіри* P , а відповідний інтервал, який визначається величиною абсолютної похибки — *довірчим інтервалом*. Достовірність результату при даній кількості вимірів можна збільшити, зменшуючи його точність — розширюючи довірчий інтервал.

Рівнем значущості α називають ймовірність, при якій подія практично неможлива, тобто це ймовірність того, що досліджуване подія за даних умов *не відбудеться*.

З загальних позицій, *надійністю* P називають імовірність того, що описується подія матиме місце.

Рівні значущості задаються заздалегідь, при плануванні досліджень, виходячи з уявлення про більшу чи меншу відповідальність можливих результатів роботи. Практика біологічних досліджень, що проводилися за допомогою біометрії, виробила чотири порога рівня значущості безпомилкових прогнозів: 0,1, 0,05, 0,01 і 0,001.

Для досить великих вибірок величина критерію надійності пов'язана з цими чотирма порогамі ймовірності певним чином (табл. 1.4) [54].

Таблиця 1.4. Чотири порога рівня значущості безпомилкових прогнозів

Поріг	Застосування порога	Рівень значущості безпомилкових прогнозів, α	Мінімальний обсяг великих вибірок, n
0	Зниження вимоги надійності в грубо-орієнтовних дослідженнях важко вимірюваних ознак	0.1	20
1	Звичайні вимоги надійності в більшості біологічних досліджень	0.05	30
2	Підвищені вимоги надійності при перевірочних дослідках і в економічних роботах	0.01	100
3	Високі вимоги надійності при перевірці гіпотез при вирішенні спірних питань і при дослідженні шкідливих і отруйних речовин	0.001	200

Довірчий інтервал результатів вимірювання визначає проміжок між **довірчими межами**, у яких із заданою ймовірністю міститься **розрахункове** значення оцінюваного параметра генеральної сукупності, наприклад, для середнього арифметичного \bar{x} ці крайні точки відповідно становлять $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}$ [5].




Рис. 1.2. Криві довірчих інтервалів при розподілі Стюдента:

1 – $\sigma=1$ і 4 – $\sigma=6$ при $\alpha=0.05$ для нормального розподілу;
 2 – $\alpha=0.05$ і 3 – $\alpha=0.1$ при $s=1$ та 5 – $\alpha=0.05$ і 6 – $\alpha=0.1$ при $s=6$ для розподілу Стюдента.

Відхил $t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}$, названий у [48] **точність оцінки** і позначений як Δ , представляє собою **граничну похибку вибіркової середньої** [34], тобто **результатів вимірювання** і знаходиться за допомогою статистичної функції **ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ** ПА MS Excel на **основі двобічного** зворотного t -розподілу Стюдента **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** (рис. 1.2) (Додаток А).

Для нормального розподілу генеральної сукупності вираз $z \cdot s_{\bar{x}}$ — це **ДОВЕРИТ.НОРМ** на основі нормального розподілу (рис. 1.3). Маємо зауважити, що z_{α} — двобічний критерій квантиля нормального розподілу для рівня значущості α , який розраховується функцією **НОРМ.СТ.ОБР** при **вероятность=** $=(1-\alpha/2)$ (див. Додаток А).

Довірчий інтервал за розподілом Стюдента, табульованим від числі

вимірів $n \geq 2$ [55], хоч деякі автори це значення використовувати не рекомендують [56], а розпочинають застосування t -критерію рекомендується розпочинати при $n=5$ [57], так як лише при повтореннях $n \geq 7$ можна вважати, що значення розподілені за нормальним законом [58]¹⁾.

При $n \geq 20$ розподіл Стюдента добре апроксимується нормальним, а при $n \geq 30$ практично переходить в нього. Саме це є умовою поділу вибірок за обсягом на *малі* і *великі* (див. с. 23). Велика різниця між z_α і t_α виникає при $n < 10$ [2].

Теоретичний рівень значущості α приймається у межах від 0 до 1 і є мірою ризику зробити помилковий висновок, оцінюючи результати дослід. Використовують 0.05 рівень істотності, за якого ризик зробити помилковий висновок становить 5 %, **але 0.01 більш надійний**, високочисельний [5].

У практиці експериментів частіше обмежуються трьома градаціями ймовірності [2]:

а) $\alpha = 0.95$, коли правильність висновку не підтверджується тільки 5 випадками з 100. Таке доказ приймається як висновок, що лежить “на межі достовірності”, і практично вважається достатнім при оцінці результатів не дуже відповідальних, попередніх випробувань;

б) $\alpha = 0.99$, коли правильності виведення суперечить 1 випадок з 100. Статистичний висновок при такій ймовірності вважається широко поширеним критерієм надійності;

в) $\alpha = 0.999$, коли правильності виведення суперечить 1 випадок з 1000. При такій ймовірності висновок практично можна вважати критерієм максимальної строгості. Така ймовірність може бути застосована при оцінці достовірності найбільш відповідальних випробувань.

Слід звернути увагу, що функції **ДОВЕРИТ.НОРМ** і **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ** із заданою ймовірністю знаходять *граничну похибку вибіркової середньої* відповідаючи формулам $z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma_\mu$ та $t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}$ і використовуються для оцінки розрахункового середнього арифметичного \bar{x} результатів повторних вимірювань одного і того ж розміру певного об’єкту, див. вираз (5.52) чи складових вибірки, тоді, як $t_{\alpha(v)} s$ (див. с. 61) представляє со-




Рис. 1.3. Криві довірчих інтервалів при нормальному розподілі:

1 – $\alpha=0.05$ і 2 – $\alpha=0.1$ при $\sigma=1$;
3 – $\alpha=0.05$ і 4 – $\alpha=0.1$ при $\sigma=6$.

¹⁾ Чи не є це основою приказки “Сім раз відмірь — один раз відріж”?

бою область розкиду індивідуальних значень за [34] і оцінює довірчий інтервал результатів спостереження, інтервал для окремого значення і межі генеральної сукупності (1.76) [34].

$$\bar{x} - t_{\alpha(v)} \cdot s \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha(v)} \cdot s. \quad (1.76)$$

Так, для середнього арифметичного \bar{x} ці крайні точки відповідно становлять довірчий інтервал *вибірки експериментальних даних* що застосовується для виключення грубих похибок, які виникають при вимірюванні, знаходиться за виразом $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)} s$ (див. с. 89).

Якщо генеральна дисперсія σ^2 відома (чи визначена статистичною функцією ПА MS Excel **ДИСП.Г**), довірчий інтервал результатів спостереження, інтервал для окремого значення і межі генеральної сукупності знаходиться за виразом (1.77) для математичного сподівання знаходять за виразом (1.78) із застосуванням двобічних меж (при $\alpha/2$) [59]

$$\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma \leq \mu \leq \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \cdot \sigma, \quad (1.77)$$

$$\bar{x} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (1.78)$$

де $-z_{1-\alpha/2}$ – квантиль двостороннього критерію стандартного нормального розподілу (розраховується функцією Excel **НОРМ.СТ.ОБР**).

Сенс отриманого співвідношення (1.78) такий: з надійністю α можна стверджувати, що довірчий інтервал покриває невідомий параметр μ . Тут число z визначається з рівності $\Phi(z)=\alpha/2$, яка впливає з $2\Phi(z)=\alpha$ і знаходиться за табл. В.3.

Рівень значущості того, що випадкова величина потрапляє у даний інтервал знаходиться за залежністю (1.79)

$$p(\bar{x} - \mu < \Delta_{\bar{x}}) = 2F_0\left(\frac{\Delta_{\bar{x}}}{s_{\bar{x}}}\right) - 1. \quad (1.79)$$

Тут $2F_0\left(\frac{\Delta_{\bar{x}}}{s_{\bar{x}}}\right)$ є функцією стандартного (нормованого) нормального розподілу (3.23), яка визначається за статистичною функцією MS Excel **НОРМ.СТ.РАСП** з логічним значенням **истина**.

Якщо заздалегідь відомий стандартний відхил, тобто відома генеральна дисперсія, то довірча оцінка має вигляд (1.80) [31]

$$|a - \bar{x}| < \frac{z_{\alpha} \cdot \sigma}{\sqrt{n}}, \quad (1.80)$$

де z_{α} – квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) стандартного нормального розподілу для заданого рівня значущості α ;
 n – число вимірювань.

Приклад. Для десяти вимірів маємо $\bar{x}=36.06$ і $\sigma=0.28$; необхідно оцінити справжнє значення вимірюваної величини a з рівнем значущості $\alpha=0.01$.

Рішення. Використавши статистичну функцію **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР**, де аргумент **вероятность** для двостороннього критерію становить $1-\alpha/2=1-0.01/2=0.995$ маємо $t_{\alpha}=2.5758$.

За виразом (1.80) отримуємо $|a - \bar{x}| = |a - 36.06| < 2.5758 \frac{0.28}{\sqrt{10}} = 0.2281$, звідки $a = 36.01 \pm 0.23$ [31].

Так як вибір надійності довірчої оцінки допускає певну довільність, в практиці обробки результатів експерименту набуло поширення правило трьох сигм — відхилення істинного значення вимірюваної величини від середнього арифметичного значення результатів вимірювань не перевищує потроєного середньоквадратичного відхилення середнього значення.

Таким чином, правило трьох сигм представляє собою довірчу оцінку в разі відомої величини σ

$$|a - \bar{x}| < \frac{3 \cdot \sigma}{\sqrt{n}}, \quad (1.81)$$

чи у разі невідомої величини s

$$|a - \bar{x}| < \frac{3 \cdot s}{\sqrt{n}}. \quad (1.82)$$

Перша з цих оцінок (1.81) має надійність $2\Phi(3)=0.9973$ (визначається функцією ПА **MS Excel 2*НОРМ.СТ.РАСП(z;інтегральная)-1** з логічним значенням **истина**) незалежно від кількості вимірів [31].

Надійність оцінки (1.82) істотно залежить від кількості вимірювань n . Залежність надійності p від кількості вимірювань n для оцінки (1.82) вказана в табл.1.5 [31].

Якщо генеральна дисперсія невідома, довірчий інтервал математичного очікування знаходять як **двобічний довірчий інтервал генеральної середньої**, тобто її межі визначається за формулою [34, 59]

$$\bar{x} - t_{\alpha(v)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha(v)} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (1.83)$$

де $t_{\alpha(v)}$ – квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) **двобічного t -критерію** Стюдента при прийнятому рівні значущості α і ступені вільності v (визначається за верхнім рядком табл. В.5 чи розраховується за функцією **MS Excel** **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** (див. Додаток А).

Сенс отриманого співвідношення (1.83) такий: з надійністю α можна стверджувати, що довірчий інтервал покриває відомий параметр \bar{x} .

Таблиця 1.5. Залежність надійності α від кількості вимірювань n

n	p	n	p	n	p
5	0.96	12	0.988	30	0.995
6	0.97	14	0.99	50	0.996
7	0.976	16	0.991	150	0.997
8	0.98	18	0.992	∞	0.9973
9	0.983	20	0.993		
10	0.985	25	0.994		

Табличні значення t -критерію Стюдента можна визначити з достатнім наближенням

$$t_{\alpha(v)} = t_{\infty} + \frac{t_{\infty}^2}{v + 3 - 1.5 \cdot t_{\infty}}, \quad (1.84)$$

де $t_{\alpha(\infty)}$ – квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) **двобічного t -критерію** Стюдента при прийнятому рівні значущості α і ступені вільності $v = \infty$, яке визначається з використанням функції **НОРМ.СТ.ОБР**.

Для звичайних вимог надійності при $\alpha = 0.05$ ця формула набуває більш простого вигляду [60]

$$t_{\alpha(v)} = 2 + \frac{4}{v}. \quad (1.85)$$

Крайні точки довірчого інтервалу — початок (1.88) і кінець (1.89) називаються нижньою і верхньою довірчими межами [34].

При оцінці нерівноточних вимірів передбачається, що кожен результат вимірювання містить тільки випадкову помилку, яка підпорядковується деякого нормального закону розподілу.

Якщо результати нерівноточних вимірювань x_1, x_2, \dots, x_n можна розглядати як середні для серій рівноточних вимірювань, причому точність вимірювань в кожній серії одна і та ж і кількість вимірювань у кожній серії відомо (m_1, m_2, \dots, m_n), то довірна оцінка істинного значення a вимірюваної величини має вигляд (1.86)

$$|a - \bar{x}| < \frac{t_{\alpha(v)} \cdot s}{\sqrt{n}}, \quad (1.86)$$

$$\text{де } \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n m_i x_i; \quad N = \sum_{i=1}^n m_i; \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n m_i (x_i - \bar{x})^2}.$$

Якщо відомі s_i^* — середні квадратичні відхилення від середніх для кожної серії вимірів, то має місце більш точна оцінка ніж за виразом (1.86) з емпіричним стандартом

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-n} \sum_{i=1}^n m_i s_i^{*2}}, \quad (1.87)$$

тут число ступенів свободи n становить $v = N - n$.

Більша точність оцінки тут досягається за рахунок більшого числа ступенів свободи $v = N - n$ проти $v = n - 1$ [31].

Якщо нас цікавить тільки нижня межа x_n (тобто значення, нижче якого з рівнем значущості α не може перебувати істинне значення середнього) або верхня межа x_v , то відповідні формули мають вигляд [61]

$$x_n = \bar{x} - t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}; \quad (1.88)$$

$$x_v = \bar{x} + t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}, \quad (1.89)$$

де $t_{\alpha(v)}$ — квантиль теоретичне (критичне) значення однобічного t -критерію Стюдента при рівні значущості α і ступені вільності v .

Тут значення $t_{\alpha(v)}$ критерію Стюдента визначається за табл. В.5, де рівень значущості α приймається за нижнім рядком. Значення лівобічного зворотного t -розподіл Стюдента (зі знаком мінус) знаходяться за статисти-

чною функцією ПА MS Excel **СТЬЮДЕНТ.ОБР** для **вероятность=1- α** чи **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** для рівня значущості 2α (див. Додаток А).

Крайні точки інтервалу, представлені виразами (1.88) і (1.89) називаються **довірчими межами** [34].

Вираз (1.90) є відсотковою точністю результатів вимірювання

$$\gamma = 100 \cdot \frac{t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}}{\bar{x}}. \quad (1.90)$$

Останнім часом у науковій літературі подання результатів дослідження з використанням довірчого інтервалу стало обов'язковою вимогою.

Варто зазначити:

1. При порівнянні **групових середніх арифметичних** для текстового опису вибірових параметрів генеральної сукупності краще вживати запис $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$ з його розрахунковим рівнем статистичної значущості p .

2. Якщо ж просто приводяться **вибіркові характеристики** окремих груп, то доцільніше використовувати запис $\bar{x} \pm s$.

3. Для подання **результатів вимірювання** одного і того ж розміру певного об'єкту в тексті чи таблицею слід наводити абсолютну похибку меж $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}$ довірчого інтервалу при довірчій імовірності $P=1-\alpha$. (див. с. 62).

При цьому завжди слід указувати яка саме величина представлена після знаку “ \pm ” s , $s_{\bar{x}}$ чи $t_{\alpha(v)} s_{\bar{x}}$ приводячи значення обсягу вибірки n і прийнятий α чи розрахунковий рівень значущості p .

З огляду на те, що ці показники взаємопов'язані співвідношенням (1.63), знаючи $s_{\bar{x}}$ можна обчислити s , і навпаки [36].

Слід звернути увагу, що урожайність сільськогосподарських культур наводиться у **тонах на гектар**, причому, при урожайності нижче 1 т/га подається з точністю до 0.01 т/га, при вищій — з точністю до 0.1 т/га [39].

Похибки дисперсії $s_{\bar{s}^2}$ і середньоквадратичного відхилу $s_{\bar{s}}$ розраховуються відповідно виразів [15].

$$s_{\bar{s}^2} = \frac{s^2}{2n}; \quad (1.91)$$

$$s_{\bar{s}} = \frac{s}{\sqrt{2n}}. \quad (1.92)$$

Також застосовуються вирази (1.93) і (1.94) [2]

$$s_{\bar{s}^2} = \frac{s^2}{2(n-1)}; \quad (1.93)$$

$$s_{\bar{s}} = \frac{s}{\sqrt{2(n-1)}}. \quad (1.94)$$

Аналогічно формули виглядатимуть і для генеральної сукупності.

Як бачимо з виразу (1.92) ширина довірчого інтервалу залежить від обсягу вибірки та її варіабельності — чим ширше довірчий інтервал, тим менш точною стає вибіркова оцінка генерального середнього.

Довірчий інтервал для дисперсії нормально розподіляти генеральної сукупності можна подати у вигляді

$$\sigma^2 = s^2 \left(1 \pm t_{\alpha(n-1)} \cdot \sqrt{\frac{2}{n}} \right). \quad (1.95)$$

Для знаходження довірчого інтервалу для середнього квадратичного відхилення σ з рівнем значущості α можна стверджувати, що довірчий інтервал $s \pm sq$ покриває невідомий параметр σ з точністю оцінки $\Delta = sq$ [48].

У табл. Д.1 на с. 1071 наведено значення $q = q(\alpha, n)$ для різних обсягів вибірки n і рівнів значущості α .

Приклад. Ознака X розподілена у генеральної сукупності нормально. Знайдемо довірчий інтервал для σ з рівнем значущості $\alpha = 0.95$, якщо $n = 20$, $s = 0.40$.

Для значущості $\alpha = 0.95$ і $n = 20$ знаходимо в табл. Д.1 маємо $q = 0.37$. Далі отримуємо $sq = 0.40 \cdot 0.37 = 0.15$. Межі довірчого інтервалу становлять $0.40 - 0.15 = 0.25$ і $0.40 + 0.15 = 0.55$. Отже, довірчий інтервал $(0.25; 0.55)$ покриває σ з рівнем значущості 0.95 [48].

Більш точно довірчий інтервал для генеральної дисперсії будують із застосуванням χ^2 -критерію Пірсона.

При його використанні для побудови довірчого інтервалу дисперсій використовується табличний критерій Пірсона $\chi^2_{\alpha(v)}$ (хі-квадрат) із двобічним рівнем значущості (α діленим навпіл) — для нижньої межі — $\alpha/2$ і для верхньої — $(1 - \alpha/2)$ [15].

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2)}}. \quad (1.96)$$

Беручи квадратний корінь з усіх частин нерівності, отримуємо інтервальну оцінку СКВ.

Визначається критерій $\chi^2_{\alpha(v)}$ згідно підрозділу **6.5.1 Використання χ^2 -критерію для оцінювання дисперсій**, де α — прийнятий рівень значущості і v — ступінь вільності. $\chi^2_{\alpha(v)}$ береться з табл. В.10 на с. 1061, але його краще розраховувати за статистичною функцією **ХИ2.ОБР.ПХ** пакету аналізу **MS Excel** (див. Додаток А).

Для порівняння варіації ознак у різних сукупностях або для порівняння варіації різних ознак в одній сукупності використовуються відносні показники, де базою служить середнє арифметичне \bar{x} .

При обробці експериментального матеріалу, коли необхідно визначити статистичну значущість величини x_0 , отриманої за вибіркою обсягом n , розраховують значення t для неї за формулою

$$t = \frac{x\sqrt{n}}{s}. \quad (1.97)$$

Потім враховуючи ступінь вільності, отримана величина порівнюється з табличним значенням t_T . Величина x_0 значуща за умови $t > t_T$.

Критерій істотності різниці вибірових середніх рідких проявів у порівнюваних великих сукупностях, які підлягають розподілу Пуассона, визначаються за формулою (1.98) [34]

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\bar{x}_1^2 + \bar{x}_2^2}}, \quad (1.98)$$

де \bar{x}_1 і \bar{x}_2 — безпосередньо підраховане число рідких проявів у порівнюваних великих сукупностей.

1.4.5.5. Коефіцієнт варіації — його оцінювання і застосування

1.4.5.5.1. Визначення і оцінювання коефіцієнту варіації

Відносні показники варіації призначені для оцінки та порівняння варіації декількох ознак по одній сукупності або ж варіації одного і того ж ознаки за кількома сукупностями. Базою для їх обчислення є середня арифметична.

Найпоширенішим відносним показником варіації є коефіцієнт варіації V , який є мірою розсіювання (відносним показником мінливості). Його значення наводиться у відсотках, пов'язуючи стандартний відхил з математичним сподіванням (генеральний коефіцієнт варіації (1.99) чи середньоквадратичний відхил з середнім арифметичним (вибіровий коефіцієнт варіації, (1.100) [59]. Він є додатковим показником характеристики розкиду даних і за ним оцінюється однорідність сукупності [34], зокрема, коефіцієнт варіації використовується як показник якості дозування та змішування [62, 63]

$$V = 100 \cdot \frac{\sigma}{\mu}; \quad (1.99)$$

$$V = 100 \cdot \frac{s}{\bar{x}}. \quad (1.100)$$

Коефіцієнт варіації використовується для характеристики однорідності досліджуваної статистичної сукупності. Вона вважається кількісно однорідною, якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33.3 % (правило трьох сигм, див с. 304) [3].

Для сільського господарства та біології прийнята градація величини коефіцієнта варіації: мінливість вважають незначною якщо він менше 10 %, невеликою при 10–20 %, середньою при межах 20–40 %, великою — від 40 до 60 % і дуже великою при перевищенні 60 % [1, 6, 34]. Також за [15] прийнята градація величини коефіцієнта варіації: мінливість вважають слабкою якщо він менше 10 %, середньою при 10–25 % і значною при перевищенні 25 %. За [52] ці значення відповідно менше 10 %, 10–20 % і 20 %.

Загалом величини коефіцієнта варіації повинна бути менше 53 %.

При характеристиці ступеня вирівненості селекційного матеріалу, родючості ґрунту доцільно використовувати величину коефіцієнта вирівненості **B** (у %), яка доповнює коефіцієнт варіації до 100 %, тобто [34, 52].

$$B = 100 - V. \quad (1.101)$$

Показники, наведені у виразах (1.38), (1.44) і (1.45) та (1.99) і (1.100), дають не тільки порівняльну оцінку, а й визначають однорідність сукупності. Сукупність вважається однорідною якщо коефіцієнт варіації не перевищує 33.3 %.

Похибка коефіцієнту варіації розраховується за формулою [15]

$$s_V = \frac{V}{\sqrt{2(n-1)}} \sqrt{1 + 2 \left(\frac{V}{100} \right)^2}. \quad (1.102)$$

У [50] для розрахунку похибка коефіцієнту варіації наведена формула (1.103), очевидно вона застосовується для генеральної вибірки, наприклад при оцінці роботи дозаторів, для яких обсяг вибірки приймається $n=30$ [63].

$$s_V = \frac{V}{\sqrt{2n}} \sqrt{1 + 2 \left(\frac{V}{100} \right)^2}. \quad (1.103)$$

Також наводиться розрахунок за спрощеними виразами (1.104) [34] і (1.105) [2]

$$s_V = \frac{V}{\sqrt{2n}}; \quad (1.104) \quad s_V = \frac{V}{\sqrt{2n}} \cdot \sqrt{1 - 2\left(\frac{V}{100}\right)^2}. \quad (1.105)$$

Межі довірчого інтервалу коефіцієнту варіації представлені виразом [15]

$$\frac{V}{1 + t_{\alpha(v)_T} \cdot \left(\frac{s_V}{100}\right)} \leq V \leq \frac{V}{1 - t_{\alpha(v)_T} \cdot \left(\frac{s_V}{100}\right)}. \quad (1.106)$$

Визначення меж довірчого інтервалу коефіцієнту варіації для генеральної вибірки чи при $n \geq 30$ представлене формулою [64]

$$\frac{V}{1 + z_{\alpha} \cdot \left(\frac{s_V}{100}\right)} \leq V \leq \frac{V}{1 - z_{\alpha} \cdot \left(\frac{s_V}{100}\right)}. \quad (1.107)$$

На наш погляд спільне використання виразів (1.103) і (1.107) доцільно для обсягів вибірок з $n \geq 30$, тобто, великих вибірок.

Таким чином межі довірчого інтервалу коефіцієнту варіації не симетричні до його номінального значення V . Проте ніде не наводиться як об'єднувати коефіцієнти варіації n серій вимірювань (див. (5.103), адже межі їх довірчих інтервалів не симетричні (див. (1.106) і (1.107).

Оцінка статистичної значущості різниці d_V між двома коефіцієнтами варіації V_1 і V_2 вибірок обсягом відповідно n_1 і n_2 виконується з використанням критерію Стюдента

$$t = \frac{|V_2 - V_1|}{\sqrt{s_{V_1}^2 + s_{V_2}^2}}, \quad (1.108)$$

де $s_{V_1}^2, s_{V_2}^2$ – дисперсії коефіцієнтів варіації першої й другої вибірок.

Нульова гіпотеза відкидається за умови $t \geq t_{\alpha(v)}$, де $v = n_1 + n_2 - 2$ [15].

Також рекомендують її відхиляти при $t \geq 3$ [65].

Також достовірність різниці між середніми арифметичними вибірок може відхиляти при $t \geq 3$ [2, 65] з поправкою $\frac{6}{n-4}$ на малу кількість спостережень, тобто

$$\frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2}} \geq 3 + \frac{6}{n-4}. \quad (1.109)$$

Формула (1.109) може застосовуватися за умови $n \geq 5$, проте при $n \geq 125$ поправку на число спостережень не використовують, так як вона стає незначною [2].

1.4.5.5.2. Теоретичні основи обґрунтування оціночних значення коефіцієнта варіації дозаторів і змішувачів

Оціночним критерієм якості роботи дозаторів і змішувачів є коефіцієнт варіації V [62, 63]. При цьому для дозаторів використовується коефіцієнт варіації маси проб, відібраних за постійний проміжок часу; для змішувачів — коефіцієнт варіації умісту контрольованого чи контрольного компонента в пробах. Отримані значення коефіцієнтів варіації V порівнюються з допустимими V_d за зоотехнічними чи технологічними вимогами і за результатами порівняння робляться відповідні висновки [62].

Таким чином оціночним показником є відношення середньоквадратичного відхилення для дозаторів чи стандартного відхилення для змішувачів до середньоарифметичного значення певної кількості проб, тобто ступінь стиснення кривих розподілу у першому випадку Стюдента і нормального у другому (див. рис. 1.4).

Як у нормативній документації, так і у чисельних наукових роботах говориться лише про те, що якість роботи змішувачів оцінюється коефіцієнтом варіації, отриманим статистичним аналізом певної кількості проб — 15–20 проб (зазвичай 15 проб) при триразовій повторності [62] і 30 проб для оцінки дозаторів, отриманих також у триразовій повторності [63]. При цьому через відсутність теоретичних основ оціночних значення коефіцієнта варіації дозаторів і змішувачів ці величини задаються довільно. Наприклад, для оцінки процесу змішування слід притримуватися таких показників: при $V_d < 3\%$ — якість суміші вважається відмінною; $3 \leq V_d \leq 7\%$ — середньою; $7 \leq V_d \leq 15\%$ — задовільною і при $V_d > 15\%$ — поганою [66].

Ґрунтуючись на відповідності проб вибірок нормальному розподілу як при оцінці змішувачів, так і дозаторів, виконаємо теоретичні обґрунтування оціночних значення коефіцієнта варіації дозаторів і змішувачів.

Виходячи з того, що маса проби для дозатора та уміст контрольованого чи контрольного компонента в пробах для змішувачів є додатною величиною на основі виразів (1.76) і (1.77) відповідно маємо значення середньоквадратичного відхилення s (1.110) і стандартного відхилення σ (1.111)

$$s < \frac{\bar{x}}{t_{\alpha(v)}}; \quad (1.110)$$

$$\sigma < \frac{\bar{x}}{z_{1-\alpha/2}}. \quad (1.111)$$

Звідки довірчі межі середнього арифметичного маси дози для дозаторів і математичного сподівання умісту в пробах контрольованого чи контрольованого компоненту для змішувачів не залежать від прийнятої значущості і становлять

$$\mu = \bar{x} \pm \frac{\bar{x}}{\sqrt{n}}; \quad (1.112)$$

Саме у цих межах і повинні знаходитися якісні показники роботи дозаторів і змішувачів, тобто на основі виразів (1.76) і (1.77) відповідно маємо значення середньоквадратичного відхилення s' (1.113) і стандартного відхилення σ' (1.114).

$$s' = \frac{\bar{x}}{\sqrt{n} \cdot t_{\alpha(v)}}; \quad (1.113)$$

$$\sigma' = \frac{\bar{x}}{\sqrt{n} \cdot z_{1-\alpha/2}}. \quad (1.114)$$

Звідки маємо максимальні допустимі значення коефіцієнтів варіації V_d для дозаторів (1.115) і змішувачів (1.116)

$$V_{d_{\max}} = \frac{100}{\sqrt{n} \cdot t_{\alpha(v)}}; \quad (1.115)$$

$$V_{d_{\max}} = \frac{100}{\sqrt{n} \cdot z_{1-\alpha/2}}. \quad (1.116)$$

Таким чином максимальні допустимі значення коефіцієнтів варіації V_d для дозаторів і змішувачів, тобто коли їх робота вважається задовільною, пов'язані лише з прийнятим рівнем статистичної значущості α .

Саме за ним і відрізняються вимоги до змішування і дозування у фармацевтичній промисловості і у кормоприготуванні.

Розрахунки за наведеними у підрозділі формулами для одиничного середньоарифметичного значення подано в табл. 1.6.

За її даними для дозаторів при $V_d < 6.3\%$ ($\alpha=0.001$) — якість суміші вважається відмінною; $6.3 \leq V_d \leq 8.7\%$ ($\alpha=0.01$) — середньою; $8.7 \leq V_d \leq 12.0\%$ ($\alpha=0.05$) — задовільною і при $V_d > 14.7\%$ ($\alpha=0.1$) — поганою.

Для змішувачів при $V_d < 5.5\%$ ($\alpha=0.001$) — якість суміші вважається відмінною; $5.5 \leq V_d \leq 7.1\%$ ($\alpha=0.01$) — середньою; $7.1 \leq V_d \leq 9.8\%$ ($\alpha=0.05$) — задовільною і при $V_d > 11.1\%$ ($\alpha=0.1$) — поганою, хоч при більш строгому

підході у зазначених межах повинен знаходитися верхній відхил максимального значення коефіцієнтів варіації V_d (див. вирази (1.106) і (1.107)).

Таблиця 1.6. Розрахунки максимально допустимих значень коефіцієнтів варіації дозаторів і змішувачів

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Показник	Дозатор				Змішувач			
2	Значущість α	0.001	0.010	0.050	0.100	0.001	0.010	0.050	0.100
3	Обсяг вибірки n	15				30			
4	Середнє значення	1				1			
5	s та σ	0.242	0.336	0.466	0.568	0.304	0.388	0.510	0.608
6	Відхил середнього	0.258	0.258	0.258	0.258	0.183	0.183	0.183	0.183
7	s' та σ'	0.062	0.087	0.120	0.147	0.055	0.071	0.093	0.111
8	Допустима варіація V_d	6.2	8.7	12.0	14.7	5.5	7.1	9.3	11.1

$B5=B4/\text{СТЮДЕНТ.ОБР.}2X(B2;B3-1)$
 $B6=\text{ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ}(B2;B5;B3)$
 $B7=B6/\text{СТЮДЕНТ.ОБР.}2X(B2;B3-1)$
 $B8=100*B7/B4$

$F5=F4/\text{НОРМ.СТ.ОБР}(1-F2/2)$
 $F6=\text{ДОВЕРИТ.НОРМ}(F2;F5;F3)$
 $F7=F6/\text{НОРМ.СТ.ОБР}(1-F2/2)$
 $F8=100*F7/F4$

Криві розподілу Стюдента (для дозаторів) і нормального розподілу (для змішувачів) для визначених в табл. 1.6 допустимих значені коефіцієнтів варіації V_d подано на рис. 1.4.




Рис. 1.4. Криві розподілу допустимих значені коефіцієнтів варіації V_d :

а – розподіл Стюдента (для дозаторів)

1 – $V_d=6.3\%$ ($\alpha=0.001$); 2 – $V_d=8.7\%$ ($\alpha=0.01$); 3 – $V_d=12.0\%$ ($\alpha=0.05$);
 3 – $V_d=14.7\%$ ($\alpha=0.1$).

б – нормальний розподіл (для змішувачів)

1 – $V_d=5.5\%$ ($\alpha=0.001$); 2 – $V_d=7.1\%$ ($\alpha=0.01$); 3 – $V_d=9.3\%$ ($\alpha=0.05$);
 3 – $V_d=11.1\%$ ($\alpha=0.1$).

1.4.5.6. Дослідження форми розподілу

З'ясування загального характеру розподілу передбачає не тільки оцінку ступеня його однорідності, але і дослідження форми розподілу, тобто оцінку симетричності і ексцесу.

З математичної статистики відомо, що при збільшенні обсягу статистичної сукупності ($N \rightarrow \infty$) і одночасного зменшення інтервалу угруповання ($x_i \rightarrow \infty$) полігон або гістограма розподілу все більш і більш наближається до деякої плавною кривою, що є для зазначених графіків межею. Ця крива називається *емпіричною кривою розподілу* і являє собою *графічне зображення у вигляді безперервної лінії зміни частот, функціонально пов'язаного зі зміною варіант*.

У статистиці розрізняють наступні види кривих розподілу:

- одновершинні криві;
- багатoverшинні криві.

Однорідні сукупності описуються одновершинними розподілами. Багатoverшинний розподіл свідчить про неоднорідність досліджуваної сукупності або про неякісне виконання угруповання.

Одновершинні криві розподілу діляться на симетричні, помірно асиметричні і вкрай асиметричні.

Розподіл називається симетричним, якщо частоти будь-яких 2-х варіантів, рівновіддалених в обидві сторони від центру розподілу, рівні між собою. У таких розподілах $\bar{x} = Mo = Me$ [3].

1.4.5.6.1. Коефіцієнт асиметрії Пірсона

Коефіцієнт асиметрії Пірсона визначається за формулою.

$$As = \frac{\bar{x} - Mo}{s}. \quad (1.117)$$

У одновершинних розподілів величина цього показника змінюється від -1 до +1, причому в симетричних розподілах $As = 0$.

При $As > 0$ спостерігається правобічна асиметрія (рис. 1.5, а на с. 78). У розподілах з правобічної асиметрією $Mo < Me < \bar{x}$.

При $As < 0$ - асиметрія негативна лівостороння, $Mo > Me > \bar{x}$ (рис. 1.5, б на с. 78).

Чим ближче за модулем As до 1, тим асиметрія істотніше:

- якщо $|As| < 0.25$, то асиметрія вважається незначною;

— якщо $0.5 < |As| < 0.25$ то асиметрія вважається помірною;

— якщо $|As| > 0.5$ — асиметрія значна.

Коефіцієнт асиметрії Пірсона характеризує асиметрію тільки в центральній частині розподілу [3].

1.4.5.6.2. Визначення асиметрії і ексцесу розподілу

Більш поширеним і більш точним є коефіцієнт асиметрії, розрахований на основі центрального моменту 3-го порядку:

Асиметрія As представляє собою нормований центральний (з відхиленням від середнього) момент розподілу третього порядку і є мірою несиметричності розподілу даних вибірки (1.118) [2]

$$As = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^{3/2}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{n \cdot \sigma^3}. \quad (1.118)$$

При симетричному розподілі $\bar{x} = Me = Mo$ та $s = \bar{s} / 2$. Якщо показник асиметрії відрізняється від нуля, тобто $As \neq 0$, розподіл асиметричний, причому зміщення його вершини *вліво* ($As < 0$) називається **позитивною** (рис. 1.5, б), а *вправо* ($As > 0$) — **негативною асиметрією** (рис. 1.5, а) [2].

При $As < 0.25$ асиметрія вважається незначною і виключається з розгляду на симетричність, а при $As > 0.5$ — значною.

Причинами асиметричних розподілів може бути неправильно узятая вибірка, коли в неї увійшло непропорційно багато (або мало) представників варіанта з більшим чи меншим їх значенням, а також дія певних чинників, що зміщують частоту ознаки варіювання у ту або іншу сторону від середнього значення [34].




Рис. 1.5 – Криві розподілів:

а – з негативною асиметрією; б – з позитивною асиметрією; в – з позитивним ексцесом; г – з негативним ексцесом; д, е – з вищою формою негативних ефектів

Величина асиметрії визначається за статистичною функцією ПА MS Excel **СКОС**, див. Додаток А.

Ексцес Ex відображає порушення будь-якого нормального прояву явищ. Наприклад, у вибіркових сукупностях надмірне, або недостатнє накопичення варіант у центральних класах варіаційного ряду. Це виникає відповідно “пікоподібність” або “округлість” (“плоскість”) розподілу. Якщо ексцес значуще відмінний від нуля, то функція щільності має **більш округлий** ($Ex < 0$), **негативний** (рис. 1.5, г) і е), або **гостріший** ($Ex > 0$), **позитивний** ексцес (рис. 1.5, в) пік, порівняно з піком щільності нормального розподілу. Крім одновершинних зустрічаються й **дво-** і **багатовершинні**, а також **плосCOVERшинні** криві, що свідчить про наявність у такого розподілу **негативного ексцесу**. Функція щільності нормального розподілу має ексцес, рівний нулю.

Багатовершинні і двовершинні криві у більшості випадків вказують, що у вибірку потрапили представники декількох сукупностей з різними середніми. Наприклад, посіяна суміш сортів, мають закономірні відмінності в родючості ґрунту на окремих частинах земельної ділянки і т. п. В генетиці двовершинні і багатовершинні криві можуть свідчити про появу об’єктів з новими властивостями або ознаками, зокрема у гібридів, і вказувати на результативність застосовуваного чинника [34].

Четвертий нормалізований центральний момент розподілу четвертого порядку характеризує протяжність розподілу, його відносне значення називається **ексцесом**, позначуваний символом Ex (1.119) [32]

$$Ex = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \right]^2} = \frac{1}{n \cdot \sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4. \quad (1.119)$$

Не слід плутати *ексцес* Ex (1.119) з *коефіцієнтом ексцесу* γ [32], який також називається *показник ексцесу* [2, 15] чи навіть *ексцесом* [33] і визначається за виразом (1.120) [32, 49]

$$\gamma = Ex - 3. \quad (1.120)$$

Оцінити гостроту вершинної частини функції розподілу можна і інакше. За еталон гостроти піка вибрана гострота вершинної частини нормального розподілу, див. рис. 3.7, а).

Якщо для цього розподілу визначати лише дріб вона рівне трьом. Щоб отримати нормовані параметри по всім моментам розподілу, і було застосоване дане віднімання.

Якщо *коефіцієнт ексцесу (куртозис)* γ менше нуля, то вершинна частина розглянутого розподілу більш гостра ніж у нормального нормованого розподілу. І навпаки [33].

Для нормального розподілу $Ex = 3$.

Саме *коефіцієнт ексцесу (куртозис)* γ , розрахований за формулою (1.120) визначається статистичною функцією **MS Excel ЕКСЦЕСС** (див. Додаток А), та подається інструментами табличного процесора **MS Excel** (табл. 2.15, с. 101), а також інструментами ППП **Statistica** (табл. 2.16, с. 106 та рис. 2.10, с. 107 і рис. 2.11, с. 108).

Для класифікації розподілів за формою зручніше користуватися функцією контрексцесу \aleph [49]

$$\aleph = \frac{1}{\sqrt{\mu_4 / \sigma^4}} = \frac{1}{\sqrt{Ex}}. \quad (1.121)$$

Стандартизована асиметрія *Std. err. (Standardized skewness)* і стандартизований куртозис *Stderr. (Standardized kurtosis)* характеризують відносні показники цих величин. Похибки показників асиметрії s_{As} й ексцесу s_{Ex} (а також і коефіцієнт ексцесу γ) визначаються відповідно за наближеними формулами (1.122) і (1.123) [15]

$$s_{As} = \sqrt{\frac{6}{n+3}}; \quad (1.122)$$

$$s_{Es} = 2\sqrt{\frac{6}{n+5}}, \quad (1.123)$$

чи за формулами (1.124) і (1.125) [14]

$$s_{As} = \sqrt{\frac{6}{n}}; \quad (1.124)$$

$$s_{Es} = 2\sqrt{\frac{6}{n}}. \quad (1.125)$$

З формул (1.124) і (1.125) маємо [14]

$$t_{As} = \frac{As}{s_{As}}; \quad (1.126)$$

$$t_{Ex} = \frac{Ex}{s_{Ex}}. \quad (1.127)$$

Більш точно похибки показників асиметрії s_{As} й ексцесу s_{Ex} представлені виразами (1.128) і (1.129) [123] та (1.130) і (1.131) [50]

$$s_{As} = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+3)}}; \quad (1.128) \quad s_{Ex} = 2\sqrt{\frac{6n(n-2)(n-3)(n-5)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}}. \quad (1.129)$$

$$s_{As} = \sqrt{\frac{6n(n-1)}{(n-2)(n+1)(n+3)}}; \quad (1.130)$$

$$s_{Ex} = 2\sqrt{\frac{6n(n-1)^2}{(n-3)(n-2)(n+3)(n+5)}}. \quad (1.131)$$

За умови $\frac{As}{s_{As}} > 3$ асиметрія є статистично істотною [3].

Причинами асиметрії і ексцесу може бути також порушення правил формування вибірки, коли деяким представникам сукупності надаються переваги над іншими [50].

Використання асиметрії і ексцесу для оцінки нормальності розподілу вибірки наведено в підрозділі **6.11 Перевірка нормальності статистичного розподілу за допомогою коефіцієнтів асиметрії й ексцесу.**

1.5. ПОРАДИ ДО РОБОТИ З ФУНКЦІЯМИ ПАКЕТУ АНАЛІЗУ MS EXCEL

Хоч цей підрозділ дещо не відповідає темі самого розділу, розглянемо деякі особливості роботи з функціями пакету аналізу MS Excel.

Для прикладу розглянемо вставку в задану чарунку формули, що представляє собою статистичну функцію **СРЗНАЧ** для визначення середнього значення вибірки, або декількох вибірок, виконувану “класичним способом”, використо-





Рис. 1.6. Вікно **Мастер функций**

вуваним для всіх прикладів у [24].

Знаходячись у заданій чарунці слід вибрати діапазон даних зі значеннями вибірки і натиснути кнопку , після чого на екрані з'явиться панель **Мастер функций** (рис. 1.6) з розгорнутим списком останніх використовуваних функцій. На поле **Категория:** необхідно вибрати вид функцій (у даному разі **Статистические**), з яких використовувати потрібну опцію **СРЗНАЧ** (1) і натиснути **ОК** (2).

Виникає панель **Аргументы функции** (рис. 1.7), де слід задати необхідні вибірки (1), виділяючи їх мишею з натиснутою лівою клавішею, після чого натиснути **ОК** (2).

У результаті в задану чарунку вноситься відшуковане значення середньо-





Рис. 1.7. Вікно **Аргументы функции** (функція **СРЗНАЧ**)


го, яке також представлено і на панелі **Аргументы функции**.

З набуттям досвіду роботи с таблицями пакету аналізу **MS Excel** використовується ручний набір функцій відповідно їх синтаксису: спочатку набирається знак рівності, потім сама функція.

Після введенні першої літери виникає список всіх функцій, назви яких починаються з неї (рис. 1.8, а). Виділена функція супроводжується коротким описом її призначення.




а)



б)

Рис. 1.8 – Список функцій при ручному введенні назви:

а – які розпочинаються літерою “с”; б – з початковими літерами “ср”.

Причому, назви функцій у попередніх версіях ПА **MS Excel**, відмінні від використовуваної позначені значком .

Відшукувати потрібну функцію у такому великому списку незручно і слід ввести наступна літеру. Після її введення виникає значно менший список функцій, які розпочинаються з них (рис. 1.8, б).

У ньому слід вибрати необхідну функцію і двічі клацнути лівою








Рис. 1.9. Вікно вибору функцій

клавiшею миші. Виникає її назва, яка закінчується відкритою круглою дужкою. Мишею слід виділити необхідний діапазон даних, закрити круглу дужку і натиснути клавiшу **Enter**.

Для зручності меню  (1) (рис. 1.9) слід натиснути  (2) і на відкритому меню (3), де представлені найуживаніші статистичні функції, вибрати необхідну. Подальша робота з нею описана вище.

Вкладка  в ній відповідає натисненню кнопки .

2. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАНИХ

2.1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

При плануванні, організації й проведенні експериментів, у першу чергу слід установити кількість повторності дослідів, що дає змогу оцінити похибку та забезпечити точне визначення впливу досліджуваних факторів — змінних величин, які в тій чи іншій формі впливають на результат експерименту, забезпечити доказовість і надійність отриманих результатів.

Необхідна кількість дослідів (вимірів однієї й тієї ж величини) повинна бути не менше двох [15]. Вона залежить від величини СКВ і заданої надійності результату. Тут під надійністю розуміємо ймовірність отримання тих самих результатів при нових вимірюваннях цієї ж величини або ймовірність одержання тих самих результатів при повторності досліду в аналогічних умовах, тобто забезпечення їх відтворюваності. Це є запорукою **достовірності експериментів**, тобто ступеня визначення того, що параметри, знайдені для вибіркової сукупності, відповідають об'єктивно існуючим параметрам. **Чим більше відносне коливання результатів, а відповідно й СКВ і пов'язаний із ним коефіцієнт варіації, і чим більшу надійність досліду бажано отримати, тим більшою повинна бути повторність** [12].

Визначення необхідної повторності дослідів, виходячи із заданої похибки й надійності досліду викладено у підрозділі **5.2 Визначення числа спостережень (обсягу вибірки)**.

При простих однофакторних і маловаріантних багатфакторних дослідженнях застосовують 4–6-ти разову повторність (повторення); 6–8-ти — використовують при дослідіах на малих ділянках; більше ніж 8 — на початкових етапах роботи, у тому числі селекційної [34]. У дослідженнях із польовими й овочевими культурами для досягнення необхідної точності досить від 4 до 8 повторень [38]. При лабораторно-польових дослідіах, які поєднують польові спостереження та лабораторні дослідіаження й у своїй більшості є багатфакторними, застосовують 5–6 разову повторність [1].

У технічних науках, агрономії й тваринництві досить часто приймають мінімальні кількість повторності, яка забезпечує 95 % надійність досліду, — три, причому наведені кількості повторності повинні залишитися після перевірки достовірності вимірів і вибраковування недостовірних значень. Це дуже мала повторність для виявлення особливостей генеральної сукупності й отримання статистично достовірних висновків. Тому для опрацювання матеріалів таких дослідів вимагають особливої пильності.

Аналіз даних і представлення графічного матеріалу виконувався при застосуванні пакету програмного забезпечення пакету аналізу **Microsoft Excel** і пакетів прикладних програм **Statistica** і **Statist**.

У табл. 2.1 представлений фрагмент первинних даних досліджень, а саме, біометричні показники рижію ярого — висота рослини й висоти штам-

бу, кількості гілок першого порядку й стручків на центральній гілці, виконані на першій ділянці у 20–ти разовій повторності замірів.

Таблиця 2.1. Первинні дані досліджень

▲	A	B	C	D	E	F	G
	№ п.п.	№ ділянки	№ зразка	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
2							
3	1	1	1	72	4	5	22
4	2		2	65	4	7	38
5	3		3	73	19	8	39
6	4		4	64	4	10	44
7	5		5	69	24	7	52
8	6		6	69	10	14	33
9	7		7	69	14	11	46
10	8		8	66	11	8	28
11	9		9	75	10	10	50
12	10		10	78	50	4	36
13	11		11	75	11	15	28
14	12		12	62	4	6	42
15	13		13	63	29	8	49
16	14		14	62	5	11	36
17	15		15	61	2	10	40
18	16		16	65	22	8	40
19	17		17	73	5	13	18
20	18		18	67	9	10	45
21	19		19	65	12	9	36
22	20		20	67	31	6	36
23			21				
24			22				
25			23				
26			24				
27	21	2	1	75	19	10	42

Так як у ряді випадків може бути задіяна більша кількість замірів, варто мати деякий запас рядків для запису цих даних. Тому передбачалося максимальна кількість замірів 24.

Загальна характеристика вибірки 2004 р. (табл. 2.1) наведена в табл. 2.2. У неї також заноситься інформація про розподіл сортозразків за ділянками в 2004 р. (табл. 2.3) ²⁾.

Так як із первинними матеріалами не слід проводити будь які операції, треба створити зв'язану копію листа (перетягнувши його корінець із натиснутими лівою клавішею миші та клавішею **Ctrl**) і перейменувати утворений лист.

Його чарунки треба зв'язати з відповідними чарунками вихідного листа. Для цього слід у чарунці **A1** створеного листа набрати знак (=), перейти в чарунку **A1** вихідного листа і натиснути клавішу **Enter**. Потім скопіювати вміст чарунки **A1** створеного листа у всі чарунки з даними й прибрати нулі, які виникли при копіюванні пустих чарунок вихідного листа.

Далі додати одну колонку перед кожним показником, назвавши її **Кількість дослідів, шт. (1)**, та по чотири колонки після кожного показника, назвавши їх відповідно **Мінімальне значення (2)**, **Середнє значення (3)**,

Таблиця 2.2. Первинна інформація про вибірку, 2004 р.

Показник	Кількість ділянок	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
Кількість замірів	111	2178	2178	2178	2178
Мінімальне значення	-	40	0	1	1
Середнє значення	-	70.7	14.6	7.3	25.5
Максимальне значення	-	114	73	38	62

²⁾ За приклад взято дещо змінені для більш наочного відображення дані, наведені в роботі: Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу: дис... канд. с.-г. наук: спец. 06.01.05 / Комарова Ірина Борисівна. – Запоріжжя, 2010. – 204 с.

Максимальне значення (4) і **Стандартний відхил (5)**, і додати по три рядки після рядка даних останньої ділянки (після зразка з номером 24) (табл. 2.4).

У середньому (6) із доданих рядків (табл. 2.4) розташовуються: у колонці **№ ділянки** — номер ділянки, який задається посиланням на номер ділянки; у колонках **Кількість дослідів, шт.**, **Мінімальне значення**, **Середнє значення**, **Максимальне значення** й **Стандартний відхил** відповідно кількість дослідів, мінімальне, середньоарифметичне й максимальне значення показника та стандартний відхил, визначені з використанням вбудованих функцій пакету аналізу **MS Excel** (див с. 88–88), представленими на її полі.

Таким чином, цей рядок (названий **Інформаційний рядок**), містить статистичну інформацію про показники рослин даної ділянки (табл. 2.4).

Таблиця 2.3. Розподіл зразків за ділянками

	J	K	L
2	№ ділянки	Назва сортозразка	Походження
3	1	Степовий 1	Запорізька обл.
4	2	K-253	Пензенська обл.
5	3	K-257	Тамбовська обл.
6	4	K-339	Чернігівська обл.
7	5	K-344	Тамбовська обл.
8	6	K-349	Західний Сибір
9	7	K-407	Карелія
10	8	K-408	Карелія
11	9	K-414	Ярославська обл.
12	10	Степовий 1	Запорізька обл.
13	11	K-419	Ярославська обл.
14	12	K-519	Німеччина
15	13	K-548	Німеччина
16	14	K-1357	Франція
17	15	K-1811	Франція

Таблиця 2.4. Додавання колонок і рядків. Дані **Інформаційного рядка**

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				Кількість стручків на центральній гілці, шт.					
2	№ п.п.	№ ділянки	№ зразка	Кількість дослідів, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Мінімальне значення, шт.	Середнє значення, шт.	Максимальне значення, шт.	Стандартне відхилення, шт.
3	1	1	1		22				
4	2		2		38				
5	3		3		39				
23	20		20		36				
24			21						
25			22						
26			23						
27			24						
28				V29=СЧЕТ(W3:W28)		Z29=МАКС(W3:W28)			
29		1	B29=B3	20		18,0	37,9	52	9,0
30				Z29=МАКС(W3:W28) — Z29=СТАНДОТКЛОН(W3:W28)					
31	21	2	1						

Для зручності роботи слід закріпити рядки головку й боковик таблиці, ставши в чарунку **D4** і виконавши дії за порядком, представленим на (рис. 2.1) цифрами червоного кольору.

Основними статистичними характеристиками кількісної зміни досліджуваних параметрів є обсяг вибірки n , вибіркоче середньоарифметичне \bar{x} , абсолютна $S_{\bar{x}}$ та відносна похибка $S_{\bar{x}\%}$, мінімальне та максимальне значення показника x_{\min} і x_{\max} , СКВ s , коефіцієнт варіації V і його похибка s_v [34].

При використанні для обробки результатів досліджень ПА MS Excel для визначення середнього арифметичного \bar{x} слід застосовувати статистичну функцію **СРЗНАЧ** [25, 67] (див. с. 45). Розраховані значення заносять в *Інформаційний рядок* на перетині з колонкою *Середнє значення* (табл. 2.4).

Для визначення x_{\max} і x_{\min} використовуються статистичні функції **МАКС** і **МИН**. Значення x_{\max} заноситься в *Інформаційний рядок* на перетині з колонкою *Максимальне значення*, а значення x_{\min} — у цей же рядок колонки *Мінімальне значення* (табл. 2.4).

Для підрахунку кількості вимірів (повторності) n , задіяна статистична функція **СЧЕТ** (див. с. 45). Отримані значення ставляться в *Інформаційний рядок* на перетині з колонкою *Кількість дослідів, шт.* (табл. 2.4).




Рис. 2.1. Закріплення колонок і рядків

Для визначення середньоквадратичного відхилення s застосовують статистичну функцію **СТАНДОТКЛОН.В** (див. с. 51). Отримане значення заноситься в *Інформаційний рядок* на перетині з колонкою *Стандартний відхилення* (табл. 2.4). Застосовувані вище статистичні функції пакету аналізу MS Excel ігнорують пусті і нечислові чарунки.

При неодноразовому вимірюванні деякі з отриманих результатів можуть викликати сумнів у їхній достовірності (першочергово це x_{\max} і x_{\min} , а при вибравості їх, ті, що були за величиною відповідно перед або після зазначених), тому здійснюється перевірка гіпотези про грубі помилки й випадковість вибірки за допомогою гіпотези про їхнє виключення.

Перевірку нульової гіпотези про приналежність сумнівних дат до досліджуваного ряду часто проводять обчисленням довірчого інтервалу для всієї сукупності і визначенням ймовірності знаходження сумнівної дати у межах $\bar{x} \pm 2s$ (для великих вибірок ймовірність 95 %) або $\bar{x} \pm 3s$ (рівень ймо-

вірності 99 %). Якщо вона виходить за указані межі, то у першому випадку нульова гіпотеза відкидається на 5 %-му рівні, а у другому на 1%, тобто бракується на цьому рівні значущості [34].

Гіпотеза виключення грубих похибок, тобто істотність відхилень дослідних даних від контролю, для малих вибірок ($n < 30$) оцінюється за t -критерієм Стюдента (див. с. 88) порівнянням фактичного значення t із табличним $t_{\alpha(v)}$ [1, 15, 12, 39, 25, 68].

$$t = \frac{|x_{\max, \min} - \bar{x}_{n-1}|}{s_{n-1}}, \quad (2.1)$$

де \bar{x}_{n-1}, s_{n-1} – відповідно середньоарифметичне значення вимірів і середньоквадратичний відхил (за винятком сумнівних).

Хоч одні автори рекомендують проводити обчислення за всією вибіркою [15], інші — з попереднім виключенням сумнівних результатів [12].

При $t \geq t_{\alpha(v)}$ значення, яке розглядається, є грубою похибкою, яка із прийнятою довірчою ймовірністю α з розрахунків виключається. Після виключення слід перевірити наступне, відповідно до вибракуваної більше або менше значення величини [8].

Більш докладно критерій Стюдента описано у підрозділі **5.12.1.3 Оцінка за t -критерієм Стюдента**. Його застосування вимагає нормальності розподілу оцінюваних результатів, тобто не менше восьми повторностей [74], хоч ця вимога ніколи не виконується. При меншій вибірці, чи коли закон розподіл не є нормальним або невідомий, слід застосовувати інші критерії (див. підрозділ **5.12.1 Параметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань і виключення помилкових значень**), мало придатні для машинного обчислення.

Тобто довірчий інтервал оцінки експериментальних даних, який є *областю розкиду індивідуальних даних* і знаходиться за виразом $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)}s$ [1, 34]. Тут стандартне відхилення обчислюють за *всіма фактичними даними*, а критичний двобічний t -критерій Стюдента при прийнятому критичному довірчому рівні статистичної значущості α і числі ступенів вільності $n - 1$ визначаються функцією **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** ПА MS Excel (див. с. 61), використання якої дозволяє розраховувати $t_{\alpha(v)}$ з високою точністю.

Визначення табличного значення критерію Стюдента $t_{\alpha(v)_T}$ з допомогою **Калькулятора вероятностных распределений** ППП Statistica (рис. 2.2), використання якого дозволяє розраховувати $t_{\alpha(v)_\Phi}$ з високою точністю. Порядок його застосування проілюстрований на рис. 2.2.

У модулі **Statistics** / **Анализ** (1) відкриваємо **Probability Calculator** / **Вероятностный калькулятор** (2), далі **Distributions...** / **Распределения...** (3) для відкриття панелі **Probability Distribution Calculator** / **Калькулятор вероятностных распределений**, тут виби-

раємо тип перевірки **t (Student) / t (Стюдента)** (4), установлюємо рівень значущості **p: 0.05** (5) — при цьому автоматично активізується **обернена функція розподілу**³⁾ **✓ Inverse / ✓ Обратная ф.р.** (6), далі активізуємо **✓ (1-Cumulative p) / ✓ [1 - ф.р.]** (7) і **✓ Two-tailed / ✓ Двусторонняя** (8), задаємо кількість ступенів вільності **df: 17** / **ст. св.: 17** (9) і натиснувши **Compute / Вычислить** (10) отримуємо значення **t: 2.109816** (11), яке можна скопіювати й вставити в потрібне місце, наприклад, у чарунку Y27 табл. 2.5. Для закриття **Калькулятора...** слід натиснути **Exit / Выход** (12).

Докладний опис використання **Калькулятора вероятностных распределений** наведений тут для пояснення дій при інших використаннях (див. табл. В.1–В.3, В.5, В.7, В.10, В.11 і Ж.4).

Виключення аномальних (випадаючих) даних слід згадувати при описі та обговоренні отриманих результатів, також треба наводити обґрунтування цього виключення.

Оцінка похибок експерименту виконується за рекомендаціями [69 , 70], за якими слід урахувувати (за умови виключення систематичних похибок) невиключні залишки систематич-

них похибок [70, 71] і випадкові похибки вимірів (помилки, промахи, випадуючі варіанти), що визначають розкид експериментальних точок і враховуються статистичною обробкою даних. При аналізі точності вимірів виходять із того, що невиняткові залишки систематичних похибок розподілені в довірчому інтервалі за нормальним законом із відповідною ймовірністю [72, 73].

Середнє значення розташовується в чарунці колонки **Середнє значення** двома рядками вище **Інформаційного рядка**, над ним наводиться значення α . У цьому ж рядку в однойменних колонках розміщені **Мінімальне значення** й **Максимальне значення** показника. Над **Мінімальним значенням** і




Рис. 2.2. Визначення табличного критерію Стюдента $t_{\alpha(v)_T}$ за допомогою **Калькулятора вероятностных распределений** PPP Statistica

³⁾ **Функція розподілу** — функція, яка визначає, що для всіх дійсних x ймовірність того, що випадкова величина X прийме значення не більше ніж x .

під **Максимальним значенням** (табл. 2.5) ставляться отримані відповідно величини нижньої $\bar{x} - t_{\alpha(v)}s$ і верхньої $\bar{x} + t_{\alpha(v)}s$ граничної похибки.

Таблиця 2.5. Перевірка істотності даних за критерієм Стьюдента

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				Кількість стручків на центральній гілці, шт.					
2	№ п.п.	№ ділянки	№ зразка	Кількість дослідів, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Мінімальне значення, шт.	Середнє значення, шт.	Максимальне значення, шт.	Стандартне відхилення, шт.
3	1	1	1		22				
4	2		2		38				
5	3		3		39				
6	4		4		44				
7	5		5		52				
18	15		15		40				
19	16		16		40				
20	17		17		18				
21	18		18		45				
22	19		19		36				
23	20		20		36				
24			21		Y27=СТЮДРАСПОБР(\$Y\$26;(V29-1))				
25			22						
26			23			$\alpha=$	0,050		
27			24			$t_{\alpha(v)}=$	2,093		
28								56,7	
29		1		20		18,0	37,9	52	9,0
30						19,1			
31	21	2	1					Z28=Y29+\$Y\$27*AA29	

З табл. 2.5 видно, що крайнє менше значення “18” (чарунка **W20**) є неістотним й підлягає вибраковуванню. Подальша перевірка показала також неістотність значення “22” (чарунка **W3**).

Коли в серії спостережень є декілька сумнівних точок (промахів), їх аналіз слід проводити не шляхом послідовного відбору, коли спочатку залишають найменшу із сумнівних і розглядають усічену вибірку, до якої включаються точки, що не викликають сумніву, і найменші із різких відхилень (викидів). За сприятливого або несприятливого результату аналіз триває далі, розширюючи або звужуючи вибірку за рахунок наступного або попереднього за величиною промаху, і т.д. [82].

Для визначення **двобічного** критичного значення t -критерію Стьюдента $t_{\alpha(v)}$, розташованого в чарунці **Y27** (табл. 2.5) слід використовувати статистичну функцію **СТЮДЕНТ.ОБР.2X** (див. с. 61) пакету аналізу **MS Excel** [25], коли перше число пов'язане автоматичним посиланням зі значенням α (у даному випадку чарункою **Y26**), а друге представляє собою ступень вільності, виходячи з кількості дослідів (у даному випадку **=V29-1**). Це дозволяє автоматично одержувати необхідне значення $t_{\alpha(v)}$, для кількості даних, які залишилися при вибраковуванні неістотних значень експерименту.

Щоб зробити недостовірні дані табл. 2.6 недоступними для розрахунків, треба перед значенням із недостовірними даними, занесеними в чарунку, поставити знак зірочки (*).

Таблиця 2.6. Кінцевий вигляд *Інформаційного рядка*

	A	B	C	V	W	X	Y	Z	AA
1				Кількість стручків на центральній гілці, шт.					
2	№ п.п.	№ ділянки	№ зразка	Кількість дослідів, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Мінімальне значення, шт.	Середнє значення, шт.	Максимальне значення, шт.	Стандартне відхилення, шт.
3	1	1	1	*='Первинний матеріал-2004'!G3					
4	2		2		38				
5	3		3		39				
6	4		4		44				
7	5		5		52				
19	16		16		40				
20	17		17	*='Первинний матеріал-2004'!G19					
21	18		18		45				
22	19		19		36				
23	20		20		36				
24			21						
25			22						
26			23						
27			24						
28									
29		1		18		28,0	39,9	54,5	6,9
30						25,3			
31	21	2	1		42				

Так як при неістотності визначеного показника видаляються всі значення рядка, то зірочку слід ставити у всі чарунки з показниками цього рядка.

Перевірка припиняється при виконанні умов $\bar{x} - t_{\alpha(v)}s \leq x_{\min}$ і $\bar{x} + t_{\alpha(v)}s \geq x_{\max}$. При цьому кількість зразків повинно бути не менше зазначених у табл. Е.1.

Статистична інформація про вибірку, яку містить *Інформаційний рядок*, набуває остаточного виду (табл. 2.6).

Кінцева інформація про вибірку після вилучення неістотних значень (табл. 2.6) наведена в табл. 2.7.

Зв'язаними посиланнями сорту–стандарту за показниками 2004 р. (мала вибірка, $n \leq 30$) будується табл. 2.8 з використанням відповідних *Інформаційних рядків*

та додаванням після колонки *№ ділянки* колонки *Назва сортозразка* (1) (дані якої беруться з табл. 2.3) для сорту–стандарту за 2004 р.

Також у табл. 2.8 після колонки *Максимальне значення* додається колонка *Похибка середнього вибірки* (2), а після колонки *Стандартний відхилення* — дві колонки *Коефіцієнт варіації* і *Похибка коефіцієнта варіації* (3).

Таблиця 2.7. Кінцева інформація про вибірку, 2004 р.

Показник	Кількість дослідів, шт.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
Кількість замірів	111	2012	2012	2012	2012
Мінімальне значення	-	40	0	1	6
Середнє значення	-	71.0	14.7	7.4	27.1
Максимальне значення	-	114	73	38	62

Верхня частина табл. 2.8 (по 13 рядок включно) містить статистичну характеристику показників, яку варто наводити у додатках як ілюстрацію складових обробленої бази даних. У нижній частині розміщено рядки показників: *мінімальне (МИН), середнє (СРЗНАЧ) й максимальне значення (МАКС), кількість замірів (СЧЁТ), стандартний відхил (СТАНДОТКЛОН.В), похибка середнього вибірки (1.63), відносна похибка середнього вибірки (1.70), коефіцієнт варіації (1.100), похибка коефіцієнта варіації (1.103)*, які відображають статистичну характеристику даних, представлених у колонках. Аналогічно виконані нижні частини й у табл. 2.9, 2.12 і 2.13.

Таблиця 2.8. Статистична характеристика біометричних показників сорту–стандарту, 2004 р.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	№ п.п.	№ ділянки	Назва сортотрасска	Кількість дослідів, шт.	Мінімальне значення, шт.	Середнє значення, шт.	Максимальне значення, шт.	Похибка середнього вибірки, шт.	Стандартне відхилення, шт.	Коефіцієнт варіації, %	Похибка коефіцієнта варіації, %
3	1	1	Степовий 1	18	18.0	37.9	52.0	2.12	9.0	23.7	3.95
4	2	10	Степовий 1	20	21.0	36.7	54.0	1.75	7.8	21.4	3.38
5	3	20	Степовий 1	19	18.0	31.3	46.0	1.92	8.4	26.8	4.34
6	4	30	Степовий 1	17	18.0	31.5	39.0	1.67	6.9	21.9	3.75
7	5	40	Степовий 1	19	21.0	33.3	56.0	2.24	9.8	29.3	4.76
8	6	60	Степовий 1	19	19.0	30.7	42.0	1.38	6.0	19.6	3.18
9	7	80	Степовий 1	19	11.0	21.6	40.0	1.96	8.5	39.4	6.39
10	8	110	Степовий 1	20	11.0	29.9	60.0	3.02	13.5	45.3	7.16
11	9	130	Степовий 1	20	10.0	26.3	47.0	2.10	9.4	35.7	5.64
12	10	140	Степовий 1	20	10.0	27.1	52.0	2.33	10.4	38.5	6.09
13	11	150	Степовий 1	20	12.0	28.4	40.0	1.94	8.7	30.5	4.83
14	Нижнє надійне значення вибірки $x_{cp}-s \cdot t_r$				5.3	20.1	31.8	1.1	4.6	11.2	1.9
15	Нижня довірча межа середнього $x_{cp}-S_x$				12.3	27.3	43.1	1.8	7.6	24.5	4.0
16	Мінімальне значення x_{min}				10.0	21.6	39.0	1.4	6.0	19.6	3.2
17	Нижні значення середнього $x_{cp}-\Delta$				14.0	29.0	45.8	1.9	8.4	27.6	4.5
18	Середнє значення x_{cp}				15.4	30.4	48.0	2.0	8.9	30.2	4.9
19	Верхнє значення середнього $x_{cp}+\Delta$				16.7	31.8	50.2	2.2	9.5	32.8	5.3
20	Максимальне значення x_{max}				21.0	37.9	60.0	3.0	13.5	45.3	7.2
21	Верхня довірча межа середнього $x_{cp}+S_x$				18.4	33.5	52.9	2.3	10.3	35.9	5.7
22	Верхнє надійне значення вибірки $x_{cp}+s \cdot t_r$				25.4	40.8	64.2	3.0	13.3	49.2	7.8
23	Кількість замірів n , шт.				11	11	11	11	11	11	11
24	Ступінь вільності v				10	10	10	10	10	10	10
25	Середньоквадратичний відхил s				4.52	4.64	7.25	0.42	1.97	8.53	1.31
26	Гранична похибка вибірки $s \cdot t_r$				10.08	10.35	16.16	0.94	4.38	19.01	2.92
27	Похибка середнього вибірки s_x				1.36	1.40	2.19	0.13	0.59	2.57	0.39
28	Відносна похибка середнього вибірки p				0.09	0.05	0.05	0.06	0.07	0.09	0.08
29	Гранична похибка середнього Δ				3.04	3.12	4.87	0.28	1.32	5.73	0.88
30	Відносна гранична похибка середнього δ , %				19.78	10.26	10.15	13.93	14.76	18.98	18.10
31	Нижня довірча межа варіації, %				25.83	14.24	14.10	18.88	19.90	24.91	23.89
32	Коефіцієнт варіації V , %				29.44	15.27	15.11	20.74	21.98	28.26	26.94
33	Верхня довірча межа варіації, %				34.22	16.46	16.28	23.01	24.54	32.64	30.90
34	Похибка коефіцієнта варіації s_v , %				6.28	3.26	3.22	4.42	4.69	6.02	5.74
35	Асиметрія розрахункова As				-0.068	-0.126	0.194	1.009	1.034	0.437	0.426
36	Експес розрахунковий Ex				-2.043	0.228	-1.337	2.506	2.439	-1.031	-0.965
37	Прийнятий рівень значущості α				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
38	Табличний критерій Стюдента t_r				2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228

$E14=E18-E38 \cdot E25$ $E15=E18-E38 \cdot E27$ $E16=МИН(E3:E13)$ $E17=E18-E27$ $E18=СРЗНАЧ(E3:E13)$
 $E19=E18+E27$ $E20=МАКС(E3:E13)$ $E21=E18+E38 \cdot E27$ $E22=E18+E38 \cdot E25$ $E23=СЧЁТ(E3:E13)$
 $E24=E23-1$ $E25=СТАНДОТКЛОН.В(E3:E13)$ $E26=E25 \cdot E38$ $E27=E25/E23^{0.5}$
 $E28=E27/E18$ $E29=ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(E37;E25;E23)$ $E30=100 \cdot E29/E18$ $E31=E32/(1+E34 \cdot E38/100)$
 $E32=100 \cdot E25/E18$ $E33=E32/(1-E34 \cdot E38/100)$ $E34=E32/(2 \cdot E23)^{0.5}$
 $E35=СКОС(E3:E13)$ $E36=ЭКССЕСС(E3:E13)$ $E38=СТЮДРАСПОБР(E37;E24)$

Далі аналогічно табл. 2.8 створюється табл. 2.9. На них окремим рядком подаються середні дані сорту–стандарту, узятих посиланнями з табл. 2.8 і відповідну таблицю даних 2005 р. (рядок 15 позначено жовтим кольором).

Середні значення показників верхньої частини табл. 2.9 використовуються при побудові гістограм, а її нижня частина (нижче рядка 103) представляє статистичну характеристику всієї вибірки. На ній відмічена мінімальні

значення показників зеленим і максимальні блакитним кольором і відповідні їм у верхній частині номери ділянок і назви сортосразків, тобто, які із сортосразків мають найменші й найбільші значення відповідних показників.

Таблиця 2.9. Статистична характеристика біометричних показників колекції і сорту–стандарту, 2004 р.

1	AW	AX	AY	AZ	BA	BW	BX	BY	BZ	CA	CB
2	№ п.п.	№ ділянки	Назва сортосразка	Кількість дослідів, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.						
					Мінімальне значення, шт.	Середнє значення, шт.	Максимальне значення, шт.	Похибка середнього вибірки, шт.	Стандартне відхилення, шт.	Коефіцієнт варіації, %	Похибка коефіцієнта варіації, %
3	1	2	K-253	20	18	30,4	42	1,43	6,4	21,1	3,33
4	2	3	K-257	20	15	30,1	42	1,80	8,1	26,8	4,24
5	3	4	K-339	20	17	32,2	62	2,00	8,9	27,8	4,39
78	76	126	K-4152	18	15	32,4	55	2,93	12,4	38,4	6,39
79	77	127	K-4153	16	11	27,5	48	2,78	11,1	40,5	7,16
80	78	128	K-4154	15	13	24,9	40	2,26	8,8	35,1	6,42
81	79	129	K-4155	17	11	24,5	47	2,47	10,2	41,6	7,13
82	80	131	K-4156	11	10	17,5	28	1,85	6,1	35,0	7,46
83	81	132	K-4160	17	15	28,2	40	1,82	7,5	26,6	4,57
84	82	133	K-4162	11	6	13,7	24	1,70	5,6	41,1	8,76
101	99	155	Ісилькулець	17	17	28,6	37	1,44	5,9	20,8	3,57
102	100	156	ВН-17	15	10	23,4	45	2,54	9,8	42,0	7,67
103	101		Степовий 1	211	16,3	30,6	48,0	0,60	8,8	28,6	1,39

Величини абсолютної $s_{\bar{x}}$ й відносної $s_{\bar{x}\%}$ похибок вибіркового середнього арифметичного, коефіцієнту варіації V і його похибки s_v та інших показників визначаються ПА MS Excel за наведеними у розділі 1 **Статистичні показники генеральної сукупності та вибірки. Варіаційний аналіз формулами.**

Аналогічно обробляються біометричні дані 2005 р.

В табл. 2.10 (велика вибірка, $n > 30$), створеної також посиланнями, наведено середні значення біометричних показників колекції за даними 2004–2005 рр.

Далі створюємо об'єднану таблицю даних — середні числові значення біометричних показників колекції і сорту–стандарту (табл. 2.11), представлену посиланнями на середні значення біометричних показників верхньої частини табл. 2.9 для даних 2004 р. та таблиці відповідних даних 2005 р.

В табл. 2.12, представленої також на цьому листі, наведено за даними 2004–2005 рр. середні значення біометричних показників колекції і сорту–стандарту за співпадаючими ділянками. Дані верхньої частини табл. 2.12 використовуються при визначенні кореляційного зв'язку (див. розділ 9 **Кореляційні залежності та їх аналіз**) і розрахунках середніх даних ділянок за весь період досліджень. Використовувати її нижню частину у якості вихідних даних (наприклад для побудови табл. 2.14) недоцільно через звуження бази даних.

Таблиця 2.10. Середні значення біометричних показників колекції, 2004–2005 рр.

1	A	B	2004 р.				2005 р.			
			Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
2	C142=C146-C154 C143=C146-C157 C144=МИН(C3:C141) C145=C146-C155 C146=CP3НАЧ(C3:C141) C147=C146+C155 C148=МАКС(C3:C141) C149=C146+C157 C150=C146+C154 C151=СЧЁТ(C3:C141) C152=C151-1 C154=C153*C166 C155=C153/C151^0.5 C156=C155/C146 C158=100*C157/C146 C160=100*C153/C146 C162=C160/(2*C151)^0.5	№ п.п.								
3		1	75.4	24.4	9.3	30.4	73.0	16.7	13.6	37.9
4		2	68.4	18.4	7.0	30.1	64.0	22.9	9.0	39.0
5		3	84.7	34.9	8.1	32.2	72.9	19.5	11.6	38.1
6		4	75.6	23.3	8.4	33.5	66.0	12.0	12.8	45.2
7		5	67.2	19.2	7.2	30.0	59.9	10.9	11.4	17.9
100		96	67.6	11.3	6.9	20.6	60.3	17.9	10.3	42.3
101		99	65.3	15.4	6.6	28.6	60.9	13.5	12.9	37.5
102		100	63.3	7.3	7.8	23.4	63.1	17.6	13.4	42.8
103		101					60.6	14.3	12.2	47.8
104		102						14.8	11.0	35.0
105		103					12.0	11.9	34.2	
137		135						16.3	11.0	37.3
138		136					61.3	14.6	12.6	42.1
139		137					60.7	14.6	14.5	40.9
140		138					54.4	12.9	15.1	40.0
141		139					54.6	15.1	8.8	22.1
142	Нижнє надійне значення вибірки $x_{cp} \cdot s \cdot t_T$		58.9	2.6	4.6	17.0	51.8	8.9	7.0	23.1
143	Нижня довірча межа середнього $x_{cp} \cdot s_x$		69.8	13.3	7.1	25.5	60.5	16.0	10.8	35.1
144	Мінімальне значення x_{min}		58.4	3.3	3.8	13.7	49.4	4.8	6.8	17.9
145	Нижніє значення середнього $x_{cp} \cdot \Delta$		70.3	13.8	7.2	26.0	60.9	16.3	11.0	35.7
146	Середнє значення x_{cp}		71.0	14.4	7.4	26.4	61.3	16.7	11.1	36.2
147	Верхнє значення середнього $x_{cp} \cdot \Delta$		71.6	15.0	7.5	26.9	61.8	17.0	11.3	36.8
148	Максимальне значення x_{max}		85.3	34.9	12.4	39.9	79.0	28.4	15.9	55.3
149	Верхня довірча межа середнього $x_{cp} \cdot s_x$		72.1	15.6	7.6	27.4	62.1	17.3	11.5	37.3
150	Верхнє надійне значення вибірки $x_{cp} \cdot s \cdot t_T$		83.0	26.3	10.1	35.9	70.9	24.4	15.3	49.4
151	Кількість замірів n , шт.		100	100	100	100	139	139	139	139
152	Ступінь вільності v		99	99	99	99	138	138	138	138
153	Стандартний відхилення σ		6.06	5.98	1.38	4.77	4.83	3.93	2.09	6.66
154	Гранична похибка вибірки $s \cdot t_T$		12.03	11.86	2.74	9.47	9.55	7.77	4.13	13.16
155	Похибка середнього вибірки s_x		0.61	0.60	0.14	0.48	0.41	0.33	0.18	0.56
156	Відносна похибка середнього вибірки p		0.01	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
157	Гранична похибка середнього Δ		1.19	1.17	0.27	0.94	0.80	0.65	0.35	1.11
158	Відносна гранична похибка середнього δ , %		1.67	8.11	3.68	3.54	1.31	3.92	3.12	3.05
159	Нижня довірча межа варіації, %		8.44	39.11	18.29	17.60	7.80	22.95	18.33	17.98
160	Коефіцієнт варіації V , %		8.54	41.38	18.77	18.05	7.87	23.60	18.74	18.37
161	Верхня довірча межа варіації, %		8.65	43.93	19.28	18.52	7.95	24.27	19.17	18.78
162	Похибка коефіцієнту варіації s_v , %		0.60	2.93	1.33	1.28	0.47	1.42	1.12	1.10
163	Асиметрія розрахункова As		0.237	1.093	0.714	0.086	0.244	0.056	0.162	-0.137
164	Експес розрахунковий Ex		-0.602	1.965	1.741	0.269	0.950	0.822	-0.503	0.223
165	Прийнятий рівень значущості α		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
166	Табличний критерій Стюдента t_T		1.984	1.984	1.984	1.984	1.977	1.977	1.977	1.977

Дані табл. 2.10 і 2.11 використовуються побудови гістограм, а в поєднанні з 2.8 — для критеріальної оцінки відмінності вибірок.

Таблиця 2.11. Середні значення біометричних показників колекції і сорту-стандарту, 2004–2005 рр.

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1		2004 р.				2005 р.			
2	№ п.п.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
3	1	75,4	24,4	9,3	30,4	73,0	16,7	13,6	37,9
4	2	68,4	18,4	7,0	30,1	64,0	22,9	9,0	39,0
5	3	84,7	34,9	8,1	32,2	72,9	19,5	11,6	38,1
100	98	75,6	23,3	8,4	33,5	66,0	12,0	12,8	45,2
101	99	65,3	15,4	6,6	28,6	60,9	13,5	12,9	37,5
102	100	63,3	7,3	7,8	23,4	63,1	17,6	13,4	42,8
103	101	69,6	15,0	7,7	30,6	59,6	14,3	12,2	47,8
104	102					63,9	14,8	11,0	35,0
105	103					49,7	12,0	11,9	34,2
140	138					64,4	12,9	13,1	40,0
141	139					54,6	15,1	8,8	22,1
142	140					59,7	13,1	14,4	39,3

Таблиця 2.12. Середні значення біометричних показників колекції і сорту-стандарту за співпадаючими ділянками, 2004–2005 рр.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				2004 р.				2005 р.			
2	№ п.п.	№ ділянки	Назва сортосразка	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
3	1	2	K-253	75,4	24,4	9,3	30,4	73,0	16,7	13,6	37,9
4	2	3	K-257	68,4	18,4	7,0	30,1	64,0	22,9	9,0	39,0
5	3	4	K-339	84,7	34,9	8,1	32,2	72,9	19,5	11,6	38,1
6	4	5	K-344	75,6	23,3	8,4	33,5	66,0	12,0	12,8	45,2
7	5	6	K-349	67,2	19,2	7,2	30,0	59,9	10,9	11,4	17,9
95	94	153	K-4183	62,1	6,4	6,1	23,3	60,1	14,0	14,3	40,9
97	95	154	Ісилькулець	67,8	11,3	6,9	20,8	64,4	12,9	15,1	40,0
98	96	156	Степовий 1	69,6	15,0	7,7	30,6	59,7	13,1	14,4	39,3

Також створюється табл. 2.13.

Таблиця 2.13. Середні біометричні показники колекції за співпадаючими ділянками за роки випробувань

	AF	AI	AJ	AK	AL
2	№ п.п.	Висота роспини, см	Висота штамбу, см	Кількість гіпок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
3	1	74.2	20.5	11.4	34.1
4	2	66.2	20.6	8.0	34.5
97	95	66.1	12.1	11.0	30.4
98	96	64.6	14.0	11.0	34.9
99	Мінімальне значення	54.6	5.3	6.9	20.7
100	Середнє значення	66.3	15.5	9.3	31.4
101	Максимальне значення	78.8	27.2	12.7	43.4
102	Кількість замірів	96	96	96	96
103	Стандартне відхилення	4.3	3.8	1.2	4.3
104	Похибка середнього вибірки	0.44	0.39	0.12	0.44
105	Відносна похибка середнього вибірки, %	0.7	2.5	1.3	1.4
106	Коефіцієнт варіації, %	6.5	24.8	12.6	13.7
107	Похибка коефіцієнта варіації, %	0.47	1.79	0.91	0.99

Дані чарунок якої представляють собою середньорічні значення показників за співпадаючими ділянками, тобто середніми значеннями показників, наведених у табл. 2.12.

Для отримання даних у формі, придатній для використання, на цьому ж листі за допомогою посилань із табл. 2.9 та відповідної таблиці даних 2005 р. створюється таблиця середніх статистичних показників, які беруться з її нижньої частини (табл. 2.14, а) і будуються таблиці за середніми, мінімальними й максимальними статистичними показниками.

Таблиця 2.14. Статистичні показники кількості стручків на центральній гілці у 2004–2005 рр.

Показник	2004 р.	2005 р.
Мінімальне значення, шт.	13,7	17,9
Середнє значення, шт.	26,5	36,3
Максимальне значення, шт.	39,9	55,3
Кількість дослідів, шт.	101	140
Стандартне відхилення, шт.	4,8	6,7
Похибка середнього вибірки, шт.	0,48	0,56
Відносна похибка середнього вибірки, %	1,8	1,6
Коефіцієнт варіації, %	18,1	18,4
Похибка коефіцієнта варіації, %	1,27	1,10

а) середні значення колекції;

Показник	Мінімум		Максимум	
	2004 р.	2005 р.	2004 р.	2005 р.
Мінімальне значення, шт.	6	6	24	24
Середнє значення, шт.	13,0	22,5	42,7	49,5
Максимальне значення, шт.	29	46	62	69
Кількість дослідів, шт.	101	140	101	140
Стандартне відхилення, шт.	4,2	8,4	7,0	8,3
Похибка середнього вибірки, шт.	0,42	0,71	0,70	0,70
Відносна похибка середнього вибірки, %	3,2	3,1	1,6	1,4
Коефіцієнт варіації, %	32,5	37,3	16,4	16,8
Похибка коефіцієнта варіації, %	2,29	2,23	1,16	1,00
Сортотразок з мінімальними показниками	K-4162	K-2667	K-4162	K-349
Сортотразок з максимальними показниками	K-3817	K-4153	K-339	K-4153

б) мінімальні і максимальні значення колекції;

Показник	2004 р.	2005 р.	Показник	2004 р.	2005 р.
Мінімальне значення, шт.	17	46	Мінімальне значення, шт.	6	6
Середнє значення, шт.	32,2	55,3	Середнє значення, шт.	13,7	35,3
Максимальне значення, шт.	62	69	Максимальне значення, шт.	24	48
Кількість дослідів, шт.	20	10	Кількість дослідів, шт.	11	10
Стандартне відхилення, шт.	8,9	6,8	Стандартне відхилення, шт.	5,6	14,0
Похибка середнього вибірки, шт.	2,00	2,15	Похибка середнього вибірки, шт.	1,70	4,44
Відносна похибка середнього вибірки, %	6,2	3,9	Відносна похибка середнього вибірки, %	12,4	12,6
Коефіцієнт варіації, %	27,8	12,3	Коефіцієнт варіації, %	41,1	39,8
Похибка коефіцієнта варіації, %	4,39	2,75	Похибка коефіцієнта варіації, %	8,76	8,90
Сортотразок	K-3817	K-4153	Сортотразок	K-4162	K-2667

в) максимальні значення сортотразка; г) мінімальні значення сортотразка.

У табл. 2.14 а) наведені статистичні показники середньої кількості стручків на центральній гілці для 2004 і 2005 рр., представлені посиланнями на відповідні чарунки.

У табл. 2.14 б) наведені характеристики мінімального і максимального значення досліджуваного показника всієї колекції, поєднані безпосередньо з чарунками відповідних листів.

Далі в табл. 2.14 в) і г) представлено яким сортотразкам і ділянкам відповідають мінімальні і максимальні значення показника. Чарунки цих таблиць пов'язуються із чарунками відповідних листів. В їх нижній частині в табл. 2.14 в) і г) вказується назва сортотразка.

Таким чином, приведені в табл. 2.14 дані характеризують як колекцію за відібраними окремо, сортозразками з мінімальними й максимальними показниками, так і за мінімальними й максимальними показниками всієї колекції.

Хоч представлене оформлення результатів громіздке, проте поєднання бази даних зі статистичним аналізом дозволяє вставляти її не лише в таблиці ПА **Microsoft Excel**, а й у файли текстового редактора **Microsoft Word**.

2.2. ВИКОРИСТАННЯ ПА MS EXCEL І ППП STATISTICA ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ

2.2.1. Установка пакета **АНАЛИЗ ДАННЫХ** программы MS Excel

Для використання інструментів **Анализа данных** пакету аналізу **MS Excel** спочатку треба задіяти необхідні **Надстройки** (рис. 2.3).




Рис. 2.3. Установка додаткових інструментів ПА **Microsoft Excel 7**

Для цього у вікні ПА MS Excel (рис. 2.3) слід клацнути правою клявішею миші на **Панель быстрого доступа** (1), потім **Настройка панели быстрого доступа...** (2), відкриється панель **Параметры Excel**, на якій треба вибрати, **Надстройки** (3) і за допомогою **Надстройки Excel** (4) перейти на панель **Надстройки** (5). Тут відмітити **Пакет анализа** (5) і натиснути **ОК** (6). Якщо при інсталяції компонент не був встановлений, вставити інсталяційний диск і запустити установку компоненту натисненням **Да** (7) та натиснувши **ОК** (8), вийти з настройок.

2.2.2. Одержання основних статистичних показників за допомогою інструментів пакета **АНАЛИЗ ДАННЫХ** MS Excel

Для одержання основних статистичних показників використовується табл. 2.11, с. 96. Тут із меню **Данные** (1) (на рис. 2.4 і далі цифрами червоного кольору представлений порядок дій) після натиснення **Анализ данных** (2) виникає панель **Анализ данных**, де в **Инструменты анализа** обирається **Описательная статистика** (3) і натискається **ОК** (4). При цьому виникає панель **Описательная статистика**, на якій треба відмітити групування даних ☒ по столбцам (5), яке визначає характер розташування даних у вибірках — за рядками, чи за стовпцями.




Рис. 2.4. Статистична обробка даних за допомогою інструментів *Описательной статистики* (вибір інструмента)

Задаючи **Параметры вывода** слід визначитися визначаємо, де ми хочемо бачити результати проведеного аналізу:

а) ☒ **Выходной интервал** — виділяємо порожню чарунку, при цьому справа і нижче цієї чарунки не повинно бути ніяких даних, інакше вони будуть знищені. Можна виділити чарунку на іншому аркуші цієї ж книги **Excel**.

б) ☒ **Новый рабочий лист**: лист — можна просто встановити маркер напроти даного пункту. В цьому випадку при розрахунках програма створить новий лист з наступним порядковим номером (*Лист 3, Лист 4 ...*).

Якщо в даному пункті вказати ім'я листа, то програма створить лист з зазначеним Вами ім'ям.

в) ☒ **Новая рабочая книга** — встановивши маркер в даному пункті, можна розмістити результати аналізу в новій книзі **Excel**. При цьому ім'я нової книги

задати відразу не вдасться, тільки після її збереження, а дані аналізу розмістяться на **Листі 1** нової книги.

Указавши виведення даних на ☐ Новый рабочий лист: (6), активізуємо ☒ Метки в первой строке (7) — якщо вибірки даних підписані (стоїть номер вибірки, її назва тощо), то для включення в дані заголовків, у даному пункті слід поставити маркер. Якщо ж виділялися тільки числові дані, даний пункт не відмічаємо. Указати розташування вхідних даних (8) з урахуванням, що всі вибірки виділяються одночасно, задати виведення ☒ Итоговая статистика (9), призначити ☒ Уровень надежности: і ввести значення необхідного рівня довірчої ймовірності $P = 1 - \alpha$ (10) (див. с. 61), задати виведення ☒ К-ый наименьший: і ☒ К-ый наибольший: (11) (найбільше й найменше значення вибірки) і натиснути кнопку **ОК** (12).

У результаті одержуємо табл. 2.15 зі статистичною характеристикою показників.

Таблица 2.15. Статистична характеристика колекції, 2004–2005 рр.

Показник	2004 р.				2005 р.			
	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
Среднее	70.9	14.5	7.4	26.5	61.3	16.6	11.2	36.3
Стандартная ошибка	0.60	0.59	0.14	0.48	0.41	0.33	0.18	0.56
Медиана	70.1	13.4	7.3	26.2	61.3	16.7	11.0	36.8
Мода	78.6	20.9	7.8	27.0	64.0	16.5	10.3	39.0
Стандартное отклонение	6.06	5.98	1.38	4.79	4.83	3.94	2.10	6.66
Дисперсия выборки	36.75	35.74	1.90	22.97	23.34	15.54	4.43	44.37
Эксцесс	-0.578	2.009	1.775	0.254	0.974	0.810	-0.537	0.239
Асимметричность	0.244	1.096	0.710	0.066	0.251	0.070	0.152	-0.146
Интервал	26.9	31.6	8.6	26.2	29.6	23.6	9.1	37.4
Минимум	58.4	3.3	3.8	13.7	49.4	4.8	6.8	17.9
Максимум	85.3	34.9	12.4	39.9	79.0	28.4	15.9	55.3
Сумма	7164.7	1459.5	742.8	2675.6	8586.1	2328.5	1562.3	5076.3
Счет	101	101	101	101	140	140	140	140
Уровень надежности (95.0%)	1.197	1.180	0.272	0.946	0.807	0.659	0.352	1.113

2.2.3. Одержання основних статистичних показників за допомогою ППП Statistica

Пакет програм **Statistica** дозволяє одержати всі перелічені на с. 35–44 статистичні показники вибірки. При цьому статистичний ряд для самостійної ознаки складає змінну (**Variable**), представлену колонками, а члени статистичного ряду утворюють повторення, або випадки (**Cases**), які розташовуються в рядах.

Для числові значення табл. 2.11 на с. 96 слід скопіювати у лист **Statistica** та перейменувати колонки. Після цього відкрити вікно вибору па-

раметрів (рис. 2.5), де двічі клацнути правою клавішею миші по корінцю колонки (1) і у полі **Name/Имя** ввести нову назву (2) (рис. 2.5).

Кнопки **<< >>** дозволяють переміщатися по змінним уліво чи вправо й настраювати їхні параметри.

У цей файл вставляються також числові дані табл. 2.12, с. 96, тому у назвах показників, взятих з першої таблиці, позначення року подаються повністю, а з другої — скорочено, наприклад **Висота рослини-2004** і **Висота рослини-04**.

Для форматування в полі **Display format** /

Формат отображения вибираємо **Number**

/ **Числовой** (3) і в **Decimal places: 1** / **Дес. разряды: 1** (4) задаємо кількість десяткових знаків, в полі **Type/Тип** указуємо тип змінної (5) і натискаємо **OK** (6).

За замовчуванням тип змінної виставлений **Double** / **Двойной**, що підходить для випадків, коли значення змінної виражаються числами, що лежать в інтервалі $\pm 1.7 \times 10^{308}$. Якщо аналізовані дані представляють собою тільки цілі числа з інтервалу ± 2147483648 , то слід вибрати тип **Integer** / **Целый**. Для змінних, які виражаються цілими числами від 0 до 255 включно можна встановити спеціальний тип **Byte** / **Байтовый**. Нарешті, якщо змінна містить текстові значення, то вибирають **Text** / **Текстовый**. Оскільки кількість стручків на гілці може виражатися тільки цілими числами, виберемо **Integer** / **Целый**.

У головному меню **Statistics** / **Анализ** (1), вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables** / **Основная статистика/Таблицы** (2), потім опцію **Descriptive statistics** / **Описательные статистики** (3). Далі натиснувши **OK** (4) переходимо на панель процедур і установок **Descriptive Statistics** / **Описательные статистики** (рис. 2.6).




Рис.2.5. Перейменування колонок і форматування даних.




Рис. 2.6. Вибір факторів для аналізу

Натисненням **Variables/Переменные** (5) (рис. 2.6) відкриваємо вікно вибору змінних **Select the variables for the analysis/Выберите переменные для анализа** і відмічаємо необхідні змінні (6) і натисканням **OK** (7) повертаємося на панель процедур **Descriptive Statistics/Описательные статистики** (рис. 2.7).

На цій панелі у вкладці **Advanced/Дополнительно** (рис. 2.7) кнопкою **Select all stats/Выбрать все** (1) задаємо аналіз за всіма показниками, відмітивши (активізувавши) їх прапорцями, і встановивши числові межі процентилів.

У правому верхньому куті панелі знаходяться три кнопки, якими можна користуватися незалежно від того, на якій вкладці меню знаходиться користувач.

Процедура **Summary/Summary** (4), або **Summary: Statistics/Подобные описательные статистики** (4) — дозволяє побудувати таблиці за заданими опціями; **Cancel/Отмена** — вийти з меню й **Options/Опции** (2) — дозволяє виконати декілька дій за вибором користувача; **Close Analysis/Закрыть анализ** — вийти із процедури поточного аналізу; **Create Macro.../Создать макрос...** — створити макрос; **Output.../Диспетчер вывода...** (3) задати опції для вікон аналізу і інших вікон, задати опції для виводу і збереження вибраних процедур.




Рис. 2.7. Вікно вибору показників для аналізу

Опцію **Output...**/Диспетчер вывода... слід задіяти перед початком будь-якої процедури, щоб усі елементи роботи зберігалися в одній робочій книзі.

Натисненням **Output...**/Диспетчер вывода... (3) (рис. 2.7) відкривається вікно **Analysis/Graph Output Manager/Диспетчер вывода Аналіза/Графіка** (рис. 2.8), де кнопками альтернативного вибору відмічаємо **Use global Output settings (changes here will affect the global settings)** / **Использовать глобальные параметры вывода** (1), що означає використання заданих умов для всіх допустимих процедур.

У списку **Place all results (Spreadsheets, Graphs) in:/Размещать результаты (Таблицы, Графики) в:** слід указати **Workbook/Рабочей книге** (2) і її варіант **Workbook containing the datafile/Рабочая книга, содержащая файл данных** (3), потім активізувати (відмітити) поле **Place results in Workbook automatically/Автоматически помещать результаты в Рабочую книгу** (4). При необхідності в **Statistica 8** відмічаємо виведення табличних даних у форматі **Microsoft Word** **Microsoft Word Output/Multiple Word documents** (5).

Хоч за установками вікна можна відразу відправляти результати аналізу в звіт, проте слід уникати нагромадження інформації в робочій книзі. Тому поле **Also send to Report Window/Направлять также в окно Отчетов** краще залишити без мітки. Так само як і поле **New results go to top/Помещать новые результаты вверху**, оскільки це задається автоматично. Установки досить виконати один раз, так як вони зберігаються і використовуються автоматично для наступних аналізів.




Рис. 2.8. Вікно вибору виведення результатів аналізу у **Statistica 8** і вище

Натисканням **ОК** (6) повертаємося на панель **Descriptive Statistics** / **Описательные статистики**, де переходимо на вкладку **Robust**/Робастность, яка є у ППП **Statistica 8.0** і більш пізніх версіях (рис. 2.9).

Вибравши додаткові статистичні оціночні показники та рівні достовірності (1) і натиснувши кнопки **Summary** або **Summary: statistics** (2) (рис. 2.9) чи **Summary** / **OK** (4) або запустивши процедуру **Summary: Descriptive statistics** / **Подробные описательные статистики** (4) (рис. 2.7) отримуємо статистичну характеристику досліджуваних параметрів (табл. 2.16). Жовтим кольором з написом на англійській мові відмічені статистичні показники, які не розраховуються ППП **Statistica 6.1**.




Рис. 2.9. Вікно вибору додаткових показників для аналізу в ППП **Statistica 8-10**

Таблиця 2.16. Статистична характеристика колекції відповідно в 2004 і 2005 pp. (створена за допомогою ППП **Statistica 8.0**)

Variable	Описательные статистики (Биометрия-П. sta)						
	N набл.	% Valid obs.	Среднее	Доверит. -95.000%	Доверит. +95.000%	Trimmed mean 5.0000%	Winsorized mean 5.0000%
Висота рослини-2004	101	72.1429	70.94554	69.74927	72.14181	70.84615	70.90099
Висота штамбу-2004	101	72.1429	14.45743	13.27681	15.63804	14.02088	14.15743
Кількість гілок-2004	101	72.1429	7.36040	7.08795	7.63284	7.30989	7.32871
Кількість стручків-2004	101	72.1429	26.49604	25.54959	27.44249	26.49011	26.49109
Висота рослини-2005	140	100.0000	61.32857	60.52123	62.13591	61.28254	61.23929
Висота штамбу-2005	140	100.0000	16.63286	15.97407	17.29165	16.59841	16.58857
Кількість гілок-2005	140	100.0000	11.15929	10.80755	11.51103	11.13571	11.16214
Кількість стручків-2005	140	100.0000	36.25929	35.14601	37.37256	36.28968	36.23071

Variable	Описательные статистики (Биометрия-П. sta)								
	Grubbs Test Statistic	p-value	Геометр. Среднее	Гармонич. Среднее	Медиана	Мода	Частота моды	Сумма	Минимум
Висота рослини-2004	2.368822	1.000000	70.69111	70.43862	70.10000	66.80000	3	7165.500	58.40000
Висота штамбу-2004	3.418239	0.044062	13.30108	12.13264	13.40000	Multiple	3	1460.200	3.30000
Кількість гілок-2004	3.651680	0.016168	7.23560	7.11063	7.30000	7.60000	7	743.400	3.80000
Кількість стручків-2004	2.795832	0.446845	26.04900	25.57551	26.20000	Multiple	3	2676.100	13.70000
Висота рослини-2005	3.657616	0.025315	61.14020	60.95175	61.30000	60.70000	4	8586.000	49.40000
Висота штамбу-2005	3.001408	0.323994	16.12217	15.52136	16.65000	16.50000	5	2328.600	4.80000
Кількість гілок-2005	2.252184	1.000000	10.95910	10.75594	11.00000	10.30000	8	1562.300	6.80000
Кількість стручків-2005	2.858009	0.528442	35.60937	34.90413	36.80000	39.00000	4	5076.300	17.90000

Variable	Описательные статистики (Биометрия-П. sta)								
	Максимум	Нижняя Квартиль	Верхняя Квартиль	Процентиль 10.00000	Процентиль 90.00000	Размах	Квартиль Размах	Дисперс.	Стд. откл.
Висота рослини-2004	85.30000	66.80000	75.40000	63.30000	79.30000	26.90000	8.600000	36.72050	6.059745
Висота штамбу-2004	34.90000	10.60000	17.60000	7.20000	20.90000	31.60000	7.000000	35.76567	5.980441
Кількість гілок-2004	12.40000	6.50000	8.10000	5.90000	8.90000	8.60000	1.600000	1.90462	1.380078
Кількість стручків-2004	39.90000	23.80000	29.80000	20.80000	32.40000	26.20000	6.000000	22.98498	4.794266
Висота рослини-2005	79.00000	58.10000	64.40000	55.60000	66.95000	29.60000	6.300000	23.34249	4.831406
Висота штамбу-2005	28.40000	14.60000	19.10000	11.80000	21.05000	23.60000	4.500000	15.54280	3.942435
Кількість гілок-2005	15.90000	9.65000	12.60000	8.30000	14.10000	9.10000	2.950000	4.43078	2.104941
Кількість стручків-2005	55.30000	32.00000	40.60000	26.90000	44.15000	37.40000	8.600000	44.38531	6.662230

Variable	Описательные статистики (Биометрия-П. sta)							
	Confidence SD -95.000%	Confidence SD +95.000%	Coef.Var.	Станд. Ошибка	Асимметрия	Стд.ош. Асимметрия	Эксцесс	Стд.ош. Эксцесс
Висота рослини-2004	5.323740	7.033771	8.54140	0.602967	0.244843	0.240216	-0.576684	0.476065
Висота штамбу-2004	5.254068	6.941720	41.36587	0.595076	1.096641	0.240216	2.005051	0.476065
Кількість гілок-2004	1.212457	1.601908	18.75005	0.137323	0.713928	0.240216	1.766244	0.476065
Кількість стручків-2004	4.211964	5.564882	18.09427	0.477047	0.062246	0.240216	0.257093	0.476065
Висота рослини-2005	4.324075	5.474675	7.87790	0.408328	0.249965	0.204847	0.976122	0.406942
Висота штамбу-2005	3.528453	4.467343	23.70270	0.333197	0.068614	0.204847	0.809764	0.406942
Кількість гілок-2005	1.883908	2.385199	18.86269	0.177900	0.154094	0.204847	-0.537643	0.406942
Кількість стручків-2005	5.962650	7.549260	18.37386	0.563061	-0.145932	0.204847	0.238441	0.406942

Натиснення кнопки **Graphs** (лише в ППП **Statistica 8.0**) представляє в графічній формі зведені статистичні характеристики цих показників (дві з них подано на рис. 2.10 і 2.11).

На рис. 2.10 і 2.11 окрім даних статистичної характеристики, наведеної у табл. 2.16, зображений нормальний імовірнісний графік, який представляє собою залежність очікуваного нормального розподілу від отриманого спостереженням і дозволяє візуально оцінювати, наскільки розподіл даних близький до нормального.




Рис. 2.10. Зведена статистична характеристика кількості стручків на центральній гілці у 2004 р.




Рис. 2.11. Зведена статистична характеристика кількості стручків на центральній гілці у 2005 р.

Якщо значення спостережень розподілені нормально, то всі точки на графіку розташовуються на прямій лінії, якщо значення не є нормально розподіленими, то буде спостерігатися відхилення від прямої. На цьому графіку можна візуально виявити промахи. При очевидних розбіжностях дані розташовуються щодо лінії певним чином (наприклад, у вигляді літери *S*), то перед застосуванням статистичних методів, для яких суттєве значення має нормальність розподілу, можна перетворити змінні, зокрема, логарифмічне перетворення часто використовується для того, щоб “втягнути” кінець розподілу.

Наявність невеликої кількості значень на будь-якому з кінців графіка, які істотно відхиляються від прямої лінії, визначаються середнім арифметичним значенням, тому їх не можна розглядати як показник відхилення від нормального статистичного розподілу [1].

Також на рис. 2.10 і 2.11 зображена гістограму розподілу показника з накладеною на неї кривою щільності нормального розподілу та значення критерію відповідності нормальному розподілу Колмогорова–Смирнова, критеріїв Шапіро–Уїлка та Лілліфорса (*Lilliefors*), який є власне варіантом критерію Колмогорова–Смирнова, модифікованого спеціально для перевірки нормальності.

При цьому слід зауважити, що гістограми на рис. 2.10 і 2.11, а також рис. 2.17 на с. 115 і рис. 6.4 на с. 319 виконуються з межами групування $a < x \leq b$, тобто аналогічно суміщенням гістограм (див. рис. 15.15, с. 970).

Критерії Колмогорова–Смирнова застосовується коли середньоарифметичне значення й середнє квадратичне відхилення ознаки відомі апіорі, а не обчислюються за вибіркою; Лілліфорса й Шапіро–Уїлка — коли середнє арифметичне значення й середнє квадратичне відхилення ознаки апіорі невідомі й обчислюються за вибіркою. Причому непараметричний критерій Шапіро–Уїлка, який використовується згідно міжнародного стандарту ISO 3479–97 [74] для вибірок чисельністю від 8 до 50 є найбільш потужним та універсальним і при цьому найбільш “строгим” із перерахованих. Тому якщо критерії Лілліфорса й Шапіро–Уїлка дають різні результати, то приймати слід результати оцінки критерієм Шапіро–Уїлка.

Тут також наведений блоковий статистичний графік “ящик із вусами” типу Median/Quart./Range / Медиана/Квартиль/Размах (рис. 2.12), який представляє со-




Рис. 2.12. Пояснення до блокового статистичного графіка

бою: *медіану*; прямокутник (“ящик”) висотою H , у який потрапляє 50 % спостережень (від 25 до 75 %); зону *розмаху без викидів* — найбільші чи найменші значення, які не є викидами чи екстремумами, *зони викидів*, які відстоять від 25 і 75 % центилів на відстані більше ніж добуток висоти ящика на коефіцієнт викиду (за умовчанням 1.5) і на кінець — *крайні точки (екстремуми)*, які відстоять від цих центилів на відстані більше ніж дві довжини зони викидів. Більш докладно ці діаграми розглянуто на с. 116.

Данні в табл. 2.16 розташовані по строках, для її транспонування (рис. 2.13) у пункті головного меню **Data** / **Данные** (1) слід вибрати модуль **Transpose** / **Транспонировать** (2) і опцію **File** / **Файл** (3).

У результаті маємо транспоновану табл. 2.17, де змінні (**Variable**) стали повтореннями або випадками (**Cases**) і навпаки.

Ця таблиця подана редагованою. Вона аналогічна табл. 2.15 на с. 101, але зі значно більшою кількістю показників.

Статистичні показники, аналогічні табл. 2.14 а) на с. 98, але представлені на основі табл. 2.15 і 2.17, значно ширше, наведені у табл. 2.18 [75]. При розрахунках використовувалися статистичні функції MS Excel **МИН**, **СРЗНАЧ**, **МАКС**, **СЧЁТ**, **СТАНДОТКЛОН**, **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ**, **КВАРТИЛЬ.ВКЛ**, **МЕДИАНА**, **СКОС**, **ЭКССЕСС**.

Так як вибірка $n > 30$ використовуються розрахункові формули (1.103) і (1.107) та статистична функція **НОРМ.СТ.ОБР(1- α /2)**.

За умови $n < 30$ використовуються розрахункові формули (1.102) і (1.106) та статистична функція **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

Таке представлення даних дає змогу оцінити однорідність вибірок за середнім чи медіаною інтервальним методом, за яким порівнювальні вибірки вважаються однорідними якщо нижня межа інтервалу однієї з вибірок не перевищує верхню межу іншої. За такою ж умовою оцінюється і однорідність коефіцієнту кореляції вибірок.

Згідно даних табл. 2.18 неоднорідними є як самі вибірки, так і їх коефіцієнти кореляції.

У двох останніх рядках табл. 2.18 представлені значення асиметрії і коефіцієнту ексцесу, що дає змогу оцінити відповідність даних нормальному статистичному розподілу (див. підрозділ **6.11 Перевірка нормальності статистичного розподілу за допомогою коефіцієнтів асиметрії й ексцесу**).




Рис. 2.13. Вибір дій при транспонуванні табл. 2.16

Таблиця 2.17. Статистична характеристика колекції (табл. 2.16)⁴⁾

Variable	Показатель	2004 р.				2005				Показник
		Висота рослини-2004	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на центральній гілці-2004	Висота рослини-2005	Висота штамбу-2005	Кількість гілок-2005	Кількість стручків на центральній гілці-2005	
Valid N	N набл.	101	101	101	101	140	140	140	140	Обсяг вибірки
% Valid obs.	% годн. набл.	72.1	72.1	72.1	72.1	100.0	100.0	100.0	100.0	Відносний об'єм вибірки, %
Mean	Среднее	70.9	14.5	7.4	26.5	61.3	16.6	11.2	36.3	Середнє арифметичне
Confidence -95 %	Доверит. -95.000 %	69.75	13.28	7.09	25.55	60.52	15.97	10.81	35.15	Нижня межа довірчого інтервалу -95 %
Confidence +95 %	Доверит. +95.000 %	72.14	15.64	7.63	27.44	62.14	17.29	11.51	37.37	Врхня межа довірчого інтервалу +95 %
Trimmed mean 5 %	Усеченн. средн. 5.0000 %	70.85	14.02	7.31	26.49	61.28	16.60	11.14	36.29	Урізана середня 5 %
Winsorized mean 5 %	Винсориз. средн. 5.0000 %	70.90	14.16	7.33	26.49	61.24	16.59	11.16	36.23	Вінсоризоване середнє 5 %
Grubbs Test	Кр. Граббса Статист.	2.37	3.42	3.65	2.80	3.66	3.00	2.25	2.86	Тест Граббса
p-value	p-значение	1.000	0.044	0.016	0.447	0.025	0.324	1.000	0.528	p-рівень значущості
Geometric Mean	Геометр. Среднее	70.7	13.3	7.2	26.0	61.1	16.1	11.0	35.6	Середнє геометричне
Harmonic Mean	Гармонич. Среднее	70.4	12.1	7.1	25.6	61.0	15.5	10.8	34.9	Середнє гармонічне
Median	Медиана	70.1	13.4	7.3	26.2	61.3	16.7	11.0	36.8	Медіана
Mode	Мода	66.8	Multiple	7.6	Multiple	60.7	16.5	10.3	39.0	Мода
Frequency of Mode	Частота	3	3	7	3	4	5	8	4	Частота модального значення
Sum	Сумма	7165.5	1460.2	743.4	2676.1	8586.0	2328.6	1562.3	5076.3	Сума
Minimum	Минимум	58.4	3.3	3.8	13.7	49.4	4.8	6.8	17.9	Мінімум
Maximum	Максим.	85.3	34.9	12.4	39.9	79.0	28.4	15.9	55.3	Максимум
Lower (Lower quartile)	Нижня Квартиль	66.80	10.60	6.50	23.80	58.10	14.60	9.65	32.00	Нижній (перший) квартиль
Upper (Upper quartile)	Верхня Квартиль	75.40	17.60	8.10	29.80	64.40	19.10	12.60	40.60	Врхній (третій) квартиль
Percentile 5	Процентиль 10.00000	63.30	7.20	5.90	20.80	55.60	11.80	8.30	26.90	Перцентиль 10
Percentile 95	Процентиль 90.00000	79.30	20.90	8.90	32.40	66.95	21.05	14.10	44.15	Перцентиль 95
Range	Размах	26.90	31.60	8.60	26.20	29.60	23.60	9.10	37.40	Размах варіацій
Quartile Range	Квартиль размах	8.60	7.00	1.60	6.00	6.30	4.50	2.95	8.60	Міжквартильний розмах
Variance	Дисперсія	36.72	35.77	1.90	22.98	23.34	15.54	4.43	44.39	Дисперсія
Std.Dev.	Ст. откл.	6.06	5.98	1.38	4.79	4.83	3.94	2.10	6.66	Стандартне відхилення (СВ)
Confidence SD -95 %	Дов.инт. Ст.откл. -95.000 %	5.32	5.25	1.21	4.21	4.32	3.53	1.88	5.96	Нижн.межа довірч.інтервалу СВ -95 %
Confidence SD +95 %	Дов.инт. Ст.откл. +95.000 %	7.03	6.94	1.60	5.56	5.47	4.47	2.39	7.55	Врхн.межа довірч. інтервалу СВ +95 %
Coef.Var.	Коеф.Вар.	8.54	41.37	18.75	18.09	7.88	23.70	18.86	18.37	Коефіцієнт варіації
Standard Error	Станд. Ошибка	0.60	0.60	0.14	0.48	0.41	0.33	0.18	0.56	Похибка середнього вибірки
Skewness	Асимметрия	0.245	1.097	0.714	0.062	0.250	0.069	0.154	-0.146	Асиметрія
Std.Err. Skewness	Стд.ош. Асимметрия	0.240	0.240	0.240	0.240	0.205	0.205	0.205	0.205	Стандартна похибка асиметрії
Kurtosis	Эксцесс	-0.577	2.005	1.766	0.257	0.976	0.810	-0.538	0.238	Коефіцієнт ексцесу (куртозис)
Std.Err. Kurtosis	Стд.ош. Эксцесс	0.476	0.476	0.476	0.476	0.407	0.407	0.407	0.407	Стандартна похибка куртозису

⁴⁾ Жовтим кольором з написом на англійській мові відмічені статистичні показники, які не розраховуються ППП Statistica 6.1.

На вкладці **Normality** / **Нормальность** панелі процедур **Descriptive Statistics:** / **Описательные статистики** задаємо число інтервалів групування **Number of intervals: 10** / **Число интервалов: 10** (1) і вигляд представлення **Normal expected frequencies test** / **Ожидаемые нормальные частоты** та критерії перевірки нормальності статистичного розподілу **Kolmogorov-Smirnov & Lilliefors test for normality** / **Критерий нормальности Колм-Смирнова и Лил** і **Shapiro-Wilk's W test** / **Критерий Шапиро-Уилка** (2) (рис. 2.15).

Потім, задіявши процедуру **Frequency table** / **Таблицы частот** (3), отримуємо відповідні таблиці розподілу частот. Дві з них (табл. 2.19) містять дані кількості стручків на центральній гілці у 2004 і 2005 рр. досліджень.

На панелі **Select the variables for the analysis** / **Выберите два списка переменных** (рис. 2.14), яка виведена процедурою **3D histograms, bivariate distributions** / **3М гистограммы** (4) (рис. 2.15) вибираємо необхідні змінні і натиснувши **ОК**, одержуємо тривимірну гістограму розподілу кількості стручків у 2004 і 2005 рр. (рис. 2.16).

Натисненням кнопки **Histograms** / **Гистограммы** (5) викликається панель **Select the variables for the analysis** / **Выберите переменные для анализа**, де вибравши змінні




Рис. 2.14. Вікно вбору параметрів тривимірної гістограми розсіювання

статистичні показники, спільні з табл. 6.7 на с. 318..

Перейшовши на вкладку **Quick** / **Быстрый** (6) (рис. 2.15) панелі процедур **Descriptive Statistics:** / **Описательные статистики** (рис. 2.18), бачимо, що тут ще мо-

Таблиця 2.18. Статистичні показники кількості стручків у 2004–2005 рр.

Показник	2004 р.	2005 р.
Мінімальне значення, шт.	13.7	17.9
Нижня межа довірчого інтервалу, шт.	25.5	35.3
Середнє значення, шт.	26.5	36.3
Верхня межа довірчого інтервалу, шт.	27.4	37.3
Максимальне значення, шт.	39.9	55.3
Кількість дослідів, шт.	101	140
Середньостатистичний відхил, шт	4.79	6.03
Похибка середнього вибірки, шт.	0.48	0.51
Похибка результатів вимірювання, шт.	0.95	1.01
Нижній (перший) кuartиль, шт.	23.8	32.0
Медіана, шт.	26.2	36.8
Верхній (третій) кuartиль, шт.	29.8	40.5
Нижня межа довірчого інтервалу варіації, %	17.6	16.3
Коефіцієнт варіації, %	18.1	16.6
Верхня межа довірчого інтервалу варіації, %	18.6	17.0
Похибка коефіцієнта варіації, %	1.36	1.05
Теоретичний рівень значущості	0.05	0.05
Асиметрія	0.066	-0.146
Коефіцієнт ексцесу (куртозис)	0.254	0.239

для аналізу й натиснувши **ОК**, одержуємо гістограми даних (рис. 2.17), числові значення яких наведені у табл. 2.19.

На ній кольорами відмічені ста-

жна виконати процедуру
 [Box & whisker plot for all variables]
 [Діаграма розмаху для всіх змінних] (7).

[Box & whisker plot for all variables]




Рис. 2.15. Вибір параметрів нормальності статистичного розподілу

Таблиця 2.19. Інтервали групування сортозразків за кількістю стручків на гілці і щільність нормального статистичного розподілу за цією ознакою

дані 2004 р.

Таблиця частот: Кількість стручків-2004 (Біометрія-П)										
K-S d=.04367, p> .20;Лилієфорса p> .20 Шапіро-Уїлка W=.99542, p=.98385										
Група	Частота	Кумул. частота	Процент допуст.	Кумул. % допуст.	% всех набл.	Кумул. % от всех	Ожидаем. частота	Кумул. ожидаем.	Процент ожидаем.	Кумул. % ожидаем.
10.00000<x<=15.00000	2	2	1.98020	1.9802	1.98020	1.9802	0.83296	0.8330	0.82471	0.82471
15.00000<x<=20.00000	5	7	4.95050	6.9307	4.95050	6.9307	8.03483	8.8678	7.95528	8.77999
20.00000<x<=25.00000	32	39	31.68317	38.6139	31.68317	38.6139	29.29766	38.1655	29.00758	37.78758
25.00000<x<=30.00000	38	77	37.62376	76.2376	37.62376	76.2376	39.40324	77.5687	39.01311	76.80069
30.00000<x<=35.00000	19	96	18.81188	95.0495	18.81188	95.0495	19.60398	97.1727	19.40988	96.21057
35.00000<x<=40.00000	5	101	4.95050	100.0000	4.95050	100.0000	3.58407	100.7567	3.54858	99.75915
Пропущ.	0	101	0.00000		0.00000	100.0000				

дані 2005 р.

Таблиця частот: Кількість стручків на гілці-2005 (Біометрія-П.sta)										
K-S d=.05005, p> .20;Лилієфорса p> .20 Шапіро-Уїлка W=.99278, p=.70096										
Група	Частота	Кумул. частота	Процент допуст.	Кумул. % допуст.	% всех набл.	Кумул. % от всех	Ожидаем. частота	Кумул. ожидаем.	Процент ожидаем.	Кумул. % ожидаем.
10.00000<x<=15.00000	0	0	0.00000	0.0000	0.00000	0.0000	0.09924	0.0992	0.07089	0.07089
15.00000<x<=20.00000	1	1	0.71429	0.7143	0.71429	0.7143	0.92740	1.0266	0.66243	0.73331
20.00000<x<=25.00000	8	9	5.71429	6.4286	5.71429	6.4286	5.34508	6.3717	3.81792	4.55123
25.00000<x<=30.00000	14	23	10.00000	16.4286	10.00000	16.4286	17.95081	24.3225	12.82201	17.37324
30.00000<x<=35.00000	32	55	22.85714	39.2857	22.85714	39.2857	35.18294	59.5055	25.13067	42.50391
35.00000<x<=40.00000	47	102	33.57143	72.8571	33.57143	72.8571	40.28164	99.7871	28.77260	71.27651
40.00000<x<=45.00000	28	130	20.00000	92.8571	20.00000	92.8571	26.94601	126.7331	19.24715	90.52366
45.00000<x<=50.00000	8	138	5.71429	98.5714	5.71429	98.5714	10.52553	137.2587	7.51824	98.04190
50.00000<x<=55.00000	1	139	0.71429	99.2857	0.71429	99.2857	2.39775	139.6564	1.71268	99.75458
55.00000<x<=60.00000	1	140	0.71429	100.0000	0.71429	100.0000	0.31798	139.9744	0.22713	99.98170
Пропущ.	0	140	0.00000		0.00000	100.0000				






Рис. 2.16. Тривимірна гістограма розсіювання кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр.

Так як занадто довгі назви змінних незручні при побудові діаграм розмаху, перейменовуємо їх (див. с. 101). Після натиснення **Variables:** / **Переменные:** (1) відкривається панель вибору змінних для аналізу **Select the variables for the analysis** / **Выберите переменные для анализа**, де вибираємо змінні для побудови діаграм розмаху (за показниками досліджень, проведених у 2004 р.) (2) і натиснувши **ОК** (3), повертаємося на панель процедур та установок **Descriptive Statistics:** / **Описательные статистики:** (рис. 2.18) і відкриваємо вкладку **Options** / **Опции** (4), де відмічаємо необхідні види діаграм розмаху (5).



2004 р.



2005 р.

Рис. 2.17. Гістограма розподілу за кількістю стручків на центральній гілці та її нормальний статистичний розподіл





Рис. 2.18. Вибір параметрів діаграм розмаху

Після повернення на вкладку **Quick** / **Быстрый** панелі **Descriptive Statistics** / **Описательные статистики** виконавши процедуру **Box & whisker plot for all variables** / **Диаграмма размаха для всех переменных** (6) отримуємо діаграми розмаху рис. 2.19. Слід відмітити недоцільність побудови діаграм розмаху за безпосередніми даними спостережень через їхню несумісність як за величинами, так і за видом (у нас, наприклад, це виміри кількості й довжини). Краще використовувати стандартизовані (нормалізовані) дані, одержані функцією пакету аналізу **MS Excel НОРМАЛИЗАЦИЯ** (див. с. 60 і табл. 13.1, с. 888).


Пакет програм **Statistica** будує декілька типів блокових діаграм у двомірній системі координат. На осі **y** відкладаються абсолютні значення ознаки, яка аналізується, а на осі **x** указуються номери або назви досліджуваних статистичних рядів. Сміслові навантаження прямокутника (“ящика”), точки в його центрі й прибудованих вусів може бути різним.

При інтервальному оцінюванні в якості ілюстрації використовується графік коробчастого типу — “ящик із вусами” **Mean/SD/1.96*SD** / **Среднее/Стд.Откл./1.96*Стд.Откл.** (рис. 2.19 в). У такому випадку точка в центрі “ящика” відповідатиме значенню середнього арифметичного й величини $\bar{x} + \sigma$ та $\bar{x} - \sigma$ визначатимуть відповідно верхню та нижню межі “ящика”. Значення $+1.96 \cdot \sigma$ та $-1.96 \cdot \sigma$ — відповідно довжину верхнього і нижнього “вуса”, тобто межі довірчого інтервалу для 95-ти відсоткової імовірності, тобто **довірчий інтервал результатів спостереження** для нормального розподілу (див. с. 61)


При побудові “ящика з вусами” типу **Mean/SE/SD** / **Среднее/Ст.Ош./Стд.Откл.** (рис. 2.19 б) точка в його центрі відповідає величині середнього арифметичного, верхня й нижня межі “ящика” визначаються значеннями $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$, а довжина “вусів” — величиною стандартного відхилення σ .




а)



б)



в)



г)

Рис. 2.19. Блокові діаграми (“ящики з вусами”):

а — Median/Quart./Range / Медиана/Квартиль/Размах;

б — Mean/SE/SD / Среднее/Ст.Ош./Ст.Откл.;

в — Mean/SD/1.96*SD / Среднее/Ст.Откл./1.96*Ст.Откл.;

г — Mean/SE/1.96*SE / Среднее/Ст.Ош./1.96*Ст.Ош.

У “ящики з вусами” типу $\bar{x} \pm 1.96 \cdot s$ / $\bar{x} \pm 1.96 \cdot \sigma$ (рис. 2.19 г) точка в центрі відповідає величині середнього арифметичного, верхня і нижня межі “ящика” визначаються значеннями стандартного відхилу σ , а довжина відповідно верхнього і нижнього “вуса” $+1.96 \cdot s$ та $-1.96 \cdot s$ дають межі інтервалу відбраковування даних для 95-ти відсоткової імовірності.

Тип “ящики з вусами” $\text{Median/Quart./Range}$ / $\text{Медіана/Квартіль/Размах}$ (рис. 2.12 і 2.19 а) характеризується точкою в центрі яка відповідає медіані, межі прямокутника (“ящика”) представляють собою нижній (перший) Q_1 і верхній (третій) Q_3 , у який потрапляє 50 % спостережень (від 25 до 75 %), а довжина “вусів” — зону *розмаху без викидів*, найбільші чи найменші значення, які не є викидами чи екстремумами [6].

Після цього переходимо на вкладку $\text{Prob. \& Scatterplots}$ / Диаграммы (7) (рис. 2.18). На вкладці $\text{Prob. \& Scatterplots}$ / Диаграммы (рис. 2.20) запустивши процедуру $\text{Scatterplot matrix}$ / Матричный график (1) і відмітивши на панелі вибору змінних Select Variables / $\text{Выбрать переменные}$ показники лише 2004 р. та натиснувши **ОК**, одержуємо кореляційну квадратну матрицю (рис. 2.21).




Рис. 2.20. Панель вибору діаграм

Натисненням кнопки процедури 2D scatterplots / 2М рассеяния (2) (рис. 2.20) відкриваємо панель $\text{Select two var. lists (horizontal and vertical vars in plots)}$ / $\text{Выберите два списка переменных (по осям X и Y на графиках)}$, на якій вибираємо змінні аргументу й функції (3) і натиснувши **ОК** (4) отримуємо двовимірну діаграму розсіювання з графіком залежності та поясом довірчих меж (рис. 2.22 а).




Рис. 2.21. Графічне відображення кореляційної квадратної матриці (табл. 9.10 на с. 507)


Особливістю версій **Statistica 8.0** і вище є додаткова процедура **Graphs** (4) у вкладці **Quick** (рис. 9.6 а), яка видає діаграму виду рис. 2.22 а), але у поєднанні з гістограмами аргументу і функції (рис. 2.22 б).

Ці діаграми, у верхній частині яких наведено рівняння регресії, що пов'язує вибрані змінні, та коефіцієнт кореляції, деталізують рис. 2.21 і 9.8 (с. 511).


Пояс довірчих меж (рис. 2.22), дві криві по обидві сторони від графіку залежності, відмічають задані довірчі межі і показують їх зміну від зміни аргументу. Для лінійної залежності вони представляються гіперболами [76].

Вибором процедури **3D scatterplot** / **3D рассеяния** (5) на рис. 2.20 відкриваємо панель вибору змінних **Select the three variables for the scatterplot** / **Выберите три переменные для графика**. Позначивши їх відповідно рис. 2.20 (6), і натиснувши **OK** (7) одержуємо тривимірну діаграму розсіювання (рис. 2.23).

Кнопкою **Surface plot** / **График поверхности** (8) (рис. 2.20) відкриваємо панель **Select the three variables for the scatterplot** / **Выберите три переменные для графика**, вибираємо змінні згідно рис. 2.20 (6), і натиснувши **OK** (7), отримуємо поверхню функції відклику у залежності від двох показників, побудовану за зваженими найменшими квадратами **Distance Weighted** / **Наим. квадраты** (рис. 2.24).



а – створена ППП Statistica 6.1;



б – створена ППП Statistica 8.0.

Рис. 2.22. Двовимірна діаграма розсіювання з графіком залежності



Рис. 2.23. Тривимірна діаграма розсіювання




Рис. 2.24. Поверхня, побудована за зваженими найменшими квадратами

Distance Weighted Наим. квадраты

Двічі клацнувши на зображенні поверхні отримуємо **Plot Layout**/**Подгонка** — вікно вибору установки її параметрів, зокрема, типу поверхні (рис. 2.25).







Рис. 2.25. Вікно вибору типу поверхні

Установивши квадратичну залежність  **Квадратичная**, отримемо поверхню, зображену на рис. 2.26, а лінійну  **Линейная** — на рис. 2.27. На рис. 2.26 і 2.27 не лише зображена сама поверхня, а й наведені рівняння цих залежностей, представлені відповідно виразами (2.2) і (2.3)

Рис. 2.26. Поверхня другого порядку  **Квадратичная**

$$Z = -174.6405 + 5.5849H - 0.1059S - 0.0381H^2 - 0.0062H \cdot S + 0.0246S^2; \quad (2.2)$$

$$Z = 13.8163 + 0.144H + 0.1704S, \quad (2.3)$$

де H , S і Z — відповідно висота рослини й висота штамбу (см) та кількість стручків на гілці (шт.).





Рис. 2.27. Поверхня першого порядку

Linear / Линейная

Таким чином також одержуємо інші види поверхонь: експонентного негативного згладжування **Neg Expon Weight** / **Отр. эксп. взвеш.** (рис. 2.28); сплайну **Spline** / **Сплайны** (рис. 2.29); “Проекції” **Water** / **Проекции** (рис.2.30), яка отримується у ППП **Statistica 8.0** і вище .

Рис. 2.28. Поверхня, отримана негативним експонентним згладжуванням **Neg Expon Weight** / **Отр. эксп. взвеш.**




Рис. 2.29. Поверхня сплайну  Сплайны







Рис. 2.30. Поверхня “Проекції”  Проекции

Задіявши процедури  Нормальные вероятностные графики (9) (рис. 2.20) одержуємо нормальний імовірнісний графік розподілу досліджуваних параметрів (рис. 2.31). Виконання  Полунормальные вероятностные графики (10) дає півнормальний імовірнісний графік розподілу досліджуваних параметрів (рис. 2.32), а процедури  Нормальные вероятн. графики без тренда (11) — нормальний імовірнісний графік без тренду (рис. 2.33).




Рис. 2.31. Нормальный ймовірнісний графік розподілу кількості стручків на центральній гілці у 2004 р.




Рис. 2.32. Півнормальний ймовірнісний графік розподілу кількості стручків на центральній гілці у 2004 р.




Рис. 2.33. Нормальний ймовірнісний графік без тренду розподілу кількості стручків на центральній глці у 2004 р.

З рис. 2.31 і 2.32, який представляє зображення розподілу досліджуваного параметра на нормальному і півнормальному ймовірнісному папері, видно, що отримані дані досить добре укладаються на прямій, яка відповідає нормальному закону статистичного розподілу, підтверджуючи його для даної вибірки.

2.3. ОБЧИСЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ІНТЕРВАЛЬНОГО РЯДУ ДАНИХ

При обчислення середніх для інтервального ряду даних при групуванні інтервалами однакового розміру λ через x_i позначаються середини інтервалів, в якості початку відліку з вибирають середину середнього інтервалу (або одного з середніх інтервалів).

Порядок розрахунку проілюстровано в табл. 2.20, отриманій на основі табл. 2.19, с. 113.

Обчислення показників виконується за формулами. Середньозважене середнє \bar{x} розраховується за виразом (1.23), зважений стандартний відхил $\bar{\sigma}$ — за формулою (1.59), виправлений емпіричний стандарт \bar{s} з поправкою Шеппарда визначається за виразом (1.61) [31].

Таблиця 2.20. Обчислення показників для інтервального ряду даних

	A	B	C	D	E	F
1	Нижня межа x_n	Верхня межа x_v	Частота f	Середнє x_{cp}	$x_{cp} \times f$	Квадрат різниці з середнім
2	15	20	1	17.5	17.5	348.89
3	20	25	8	22.5	180.0	1496.83
4	25	30	14	27.5	385.0	1054.45
5	30	35	32	32.5	1040.0	433.02
6	35	40	47	37.5	1762.5	82.07
7	40	45	28	42.5	1190.0	1118.89
8	45	50	8	47.5	380.0	1025.40
9	50	55	1	52.5	52.5	266.39
10	55	60	1	57.5	57.5	454.60
11	Середньозважене $x_{св} = 36.18$					
12	Зважений стандартний відхил $\sigma_{зв} = 6.70$					
13	Виправлений емпіричний стандарт $s^* = 6.68$					

D2=CP3НАЧ(A2:B2)

E2=D2*C2

F2=C2*(D2-\$C\$12)^2

E11=СУММ(E2:E10)/СУММ(C2:C10)

F12=(СУММ(F2:F10)/СУММ(C2:C10))^0.5

F13=(F12^2-((B2-A2)/12)^2)^0.5

За даними табл. 2.14 а на с. 98, де подані розрахунки, які визначаються за всією вибіркою, маємо $\bar{x} = 36.26$ і $s = 6.66$.

Таким чином основні статистичні показники, отримувані за всією вибіркою і за середніми інтервалів, у нашому випадку відмінні між собою на 0.2–0.3 %.

3. ОСНОВНІ ВИДИ ТЕОРЕТИЧНИХ РОЗПОДІЛІВ

3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Емпіричні криві розподілу, побудовані на основі, як правило, невеликого числа спостережень дуже важко описати аналітично, тому для виявлення статистичних закономірностей, порівняння та узагальнення різних сукупностей аналогічних даних використовуються теоретичні розподіли — добре вивчені залежності між щільністю розподілу і значеннями ознаки, що відображають закономірності розподілу. Вони описуються статистичними функціями, параметри яких обчислюються за статистичними характеристиками досліджуваної сукупності [3].

Розподіл випадкових величин є математичною моделлю імовірнісного процесу, що відрізняється тим, що елементарні результати можуть проявлятися в самій різноманітній формі за чисельним значенням і частотою [2].

Математичної моделі може бути підібрана фізична модель, а для неї в свою чергу — математична модель розподілу, яка є деякою ідеалізованою моделлю емпіричного розподілу, і аналіз варіаційного ряду зводиться до зіставлення емпіричного і теоретичного розподілів і визначенню відмінностей між ними.

Дослідження форми розподілу передбачає заміну емпіричного розподілу відомим теоретичним, близьким йому за формою. При цьому необхідно дотримуватися умова: відмінності між емпіричним і теоретичним розподілами повинні бути мінімальними. Це означає, що сума частот емпіричного розподілу повинна відповідати сумі частот теоретичного розподілу, тобто

$$\sum_{i=1}^m n_i \approx \sum_{i=1}^m n_{i_T}, \text{ де } n_{i_T} \text{ — частота теоретичного розподілу.}$$

Отже, ряд розподілу є законом розподілу для дискретної (безперервної) випадкової величини. Найпростішим прикладом дискретного розподілу є ситуація з n рівноймовірнісними наслідками (див. підрозділ **3.2.1 Закон розподілу рівномірної щільності**). Фізичною моделлю такого розподілу є результати кидання монети, кубики і т.п.

Але для безперервної величини ряду не існує. У той же час різні області можливих значень випадкової безперервної величини не є однаково ймовірними, тому і для безперервної величини існує також розподіл ймовірностей.

У разі безперервної ознаки для геометричного уявлення доцільно будувати гістограму, наприклад, рис. 2.17, с. 115).

При її побудові весь інтервал, в якому укладені всі спостережувані значення ознаки, розбивають на декілька інтервалів довжиною λ , знаходять для кожного з них n_i — суму частот варіант, які потрапили в нього. Гістограмою частот називають ступінчасту фігуру, що складається з прямокутників, підставами яких служать приватні інтервали довжиною λ , а висоти рівні N/λ (щільність частоти).

Площа такого прямокутника дорівнює n_i , а сума площ всіх прямокутників (площа гістограми) n . У разі використання відносних частот або ймовірностей площа гістограми дорівнює одиниці.

Імовірність безперервного події x є функція від x . Ця функція називається функцією розподілу випадкової величини x і позначається $F(x)$. Функцію розподілу називають також інтегральною функцією розподілу або інтегральним законом розподілу величин

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \varphi(x) dx. \quad (3.1)$$

Функція розподілу неперервної випадкової величини $F(x)$, яка визначає ймовірність того, що випадкова величина x приймає якесь значення в межах інтервалу a, b видання, визначиться як

$$P(a \leq x \leq b) = P(b) - P(a). \quad (3.2)$$

Інтегральна крива цієї функції монотонно зростає від нуля (при $x=-\infty$) до одиниці (при $x=\infty$), див. рис. 3.6 в) на с. 137. Зворотній функція $x=x(F_x)$ дає значення x , відповідне заданій ймовірності неперевикнення $P(x)$. Ці значення називають квантиль ймовірності $P(x)$.


Функція $\varphi(x)$ є похідною функції розподілу $F(x)$ і характеризує щільність, з якою розподіляються значення випадкової величини. Ця функція називається щільністю розподілу або щільністю ймовірності. Іноді її називають функцією розподілу, або диференціальним законом розподілу випадкової величини. Щільність розподілу є межею відносини ймовірності події, яка полягає у тому, що безперервна випадкова величина приймає значення, що лежать в заданому малому інтервалі, до довжини інтервалу, коли ця довжина прямує до нуля.

Криву, яка зображує щільність розподілу випадкової величини на графіку диференціальної функції розподілу, див. рис. 3.6, г) на с. 137, називають кривою розподілу. Криві розподілу можуть мати надзвичайно різноманітну форму.

Диференціальна крива разом з віссю абсцис обмежує площу, рівну одиниці. Заштрихована площа, обмежена координатами, що проходять через точки x_a і x_b , визначає ймовірність попадання x в інтервал між x_a і x_b (рис. 3.1).

Функція розподілу є деякою абстрактною математичною моделлю, за допомогою якої описують випадкові експериментально спостережувані величини.

Аналітичні вирази функції розподілу містять в собі параметри розподілу. Якщо відомий закон розподілу випадкової величини, то вона може бути повністю охарактеризована чисельними значеннями закону її розподілу [2].



3.2. БЕЗПЕРЕРВНІ РОЗПОДІЛИ

3.2.1. Закон розподілу рівномірної щільності

Рівномірний розподіл використовується для опису змінних, у яких кожне значення рівноімовірне, іншими словами, значення змінної рівномірно розподілені в деякій області.

Якщо випадкова величина X лежить на відтинку від a до b , і відсутні підстави надати перевагу будь-якому з цих значень, то вона розподілена за законом *розподілу рівномірної щільності*, який позначається як $R(a,b)$. Цей закон визначається двома параметрами — початком a і кінцем b інтервалу зміни випадкової величини X . За параметри закону рівномірної щільності часто використовують довжину інтервалу випадкової величини X , який позначають $2l$, і середину інтервалу c , яка є точкою симетрії щільності розподілу.

Цьому закону підпорядковуються, наприклад, похибки при вимірюваннях з округленням, або положення об'єкта у просторі, коли ні одне з можливих положень не має переваги над іншими (див. задачу Бюффона) [77].

Щільність (диференціальне рівняння) рівномірного розподілу (хоч термін “рівномірний розподіл” може бути зрозумілий як детермінований рівномірний розподіл, тому для вживання у даному випадку не рекомендується) описується виразом $f(x)$, представленим на рис. 3.2 а) [30].

$$f(x;a,b) = \begin{cases} 0 & \text{при } -\infty < x \leq a \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } x < a \leq b \\ 0 & \text{при } b < x < \infty \end{cases}. \quad (3.3)$$

Будь-якій точці в інтервалі від 0 до 1 відповідає постійна вірогідність.




Рис. 3.2. Закон рівномірної щільності

а – щільність розподілу; б – функція розподілу

Функція розподілу $F(x)$, тобто інтегральне рівняння рівномірно розподіленої випадкової величини x геометрично представляє собою площу, обмежену кривою розподілу, яка лежить лівіше точки x (рис. 3.2, б) [30, 55]

$$F_{a,b}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } -\infty < x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{при } a < x < b \\ 1 & \text{при } b \leq x < \infty \end{cases}. \quad (3.4)$$

Математичне сподівання $M(x)$ або середнє значення \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 і СКВ s відповідно становлять $\bar{x} = \frac{b+a}{2}$, $s^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$ і $s = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$,

коефіцієнт варіації $V = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b-a}{a+b}$, коефіцієнт асиметрії $As = 0$, коефіцієнт ексцесу $\gamma = -1.2$, ексцес $Ex = 1.8$. Медіана розподілу співпадає з математичним сподіванням $Me = \bar{x}$, мода відсутня, так як всі значення щільності ймовірності рівні між собою [30, 82].

Приблизно 57.74 % всіх випадкових реалізацій рівномірно розподілених випадкових величин розташовуються у межах $\pm s$.

Сума n незалежних рівномірно розподілених випадкових величин описується нормальним розподілом вже при $n \geq 5$. Функція розподілу будь-якої випадкової величини y — $P(y)$ сама розподілена рівномірно на відрізку $[0,1]$.

Розглянемо два окремих випадки, властивих рівномірному розподілу (рис. 3.3).

Щільність такого розподілу дорівнює $P = \frac{1}{y_k - y_0}$, тобто випадкова величина приймає значення від y_0 до y_k . А яка ймовірність того, що випадкова величина буде приймати значення від y_m до y_n , з безлічі $[y_m, y_n] \subset [y_0, y_k]$, тобто $y_0 \leq y_m \leq y_n \leq y_k$. З формули (3.3) видно, що ймовірність дорівнює $f(x) = \frac{d+c}{b-a}$.



Рис. 3.3. Розподіл за законом рівномірної щільності

$$p = \frac{y_n - y_m}{y_k - y_0}. \quad (3.5)$$

Ось тут і виникають два названих окремих випадки:

1) $y_0 = y_m$ і $y_n = y_k$, тоді $P=1$, тобто, якщо випадкова величина змінюється в межах від y_0 до y_k , то ймовірність того, що випадкова величина знаходиться всередині інтервалу $y_0 \dots y_k$ дорівнює одиниці;

2) яка ймовірність того, що випадкова величина прийме значення, наприклад, y_m ? Отримуємо несподівану відповідь: хоча y_m знаходиться всередині інтервалу $y_0 \dots y_k$, ймовірність появи величини, рівної точно y_m , дорівнює нулю, так як $y_m = y_n$ [2, 78].



Рис. 3.4. Визначення проекції відрізка на вісь

Приклад. Відповідно задачі Бюффона [77] відрізок довжиною l може розташовуватися на площині так, що всі напрями рівнозначні. Визначити середнє значення його проекції на нерухому вісь V (рис. 3.4).

Рішення. За теорією ймовірності ця проекція знаходиться з виразу

$$l_v = l \int_0^{\pi} |\cos x| f(x) dx, \quad (3.6)$$

де x — кут між стеблом і вертикальною площиною;

$f(x)$ — закон розподілення щільності випадкової величини x .

Випадкова величина x , яка представляє собою кут між стеблом і вертикальною площиною V змінюється у межах від 0 до π . Виходячи з (3.3)

щільність розподілу випадкової величини для рівномірного розподілу, який саме характеризує даний випадок, становить

$$f(x) = \frac{1}{\pi}. \quad (3.7)$$

Таким чином маємо

$$l_V = \frac{2 \cdot l}{\pi} \int_0^{\pi/2} |\cos x| dx, \quad (3.8)$$

звідки остаточно отримуємо

$$l_V = \frac{2}{\pi} l. \quad (3.9)$$

3.2.2. Трикутний розподіл (розподіл Сімпсона)

Нехай кожна з двох незалежних випадкових величин Y і Z підпорядковуються закону рівномірної щільності в інтервалі (a, b) . Тоді їх сума підпорядковується закону Сімпсона (трикутному розподілу). Інакше кажучи, розподіл Сімпсона є композицією двох однакових законів рівномірної щільності.

Розподіл Сімпсона визначається двома параметрами a і b — межами зміни випадкових величин Y і Z або параметрами: $l = \frac{b-a}{2}$; $c = \frac{b+a}{2}$.

Щільність ймовірності визначається рівністю

$$f_{c,l}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq c - 2l; \\ \frac{x - (c - 2l)}{4l^2} & \text{при } c - 2l < x \leq c; \\ \frac{c + 2l - x}{4l^2} & \text{при } c < x \leq c + 2l; \\ 0 & \text{при } x > c + 2l. \end{cases} \quad (3.10)$$

Функція розподілу дорівнює

$$F_{c,l}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq c - 2l; \\ \frac{[x - (c - 2l)]^2}{4l^2} & \text{при } c - 2l < x \leq c; \\ 1 - \frac{[c + 2l - x]^2}{4l^2} & \text{при } c < x \leq c + 2l; \\ 1 & \text{при } x > c + 2l. \end{cases} \quad (3.11)$$

Можна записати щільність ймовірності і функцію розподілу залежно від параметрів a і b , подаючи c і l через ці параметри.

Розподіл Сімпсона симетричний. Графік щільності ймовірності наведено на рис. 3.5.

Математичне сподівання $M(x)$ чи середнє значення \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 і СКВ s , коефіцієнт варіації V відповідно становлять:




Рис. 3.5. Розподіл Сімпсона

$$\bar{x} = c = \frac{b+a}{2}; \quad (3.12) \quad s^2 = \frac{3}{2}l^2 = \frac{(b-a)^2}{24}. \quad (3.13)$$

$$s = \sqrt{\frac{3}{2}}l = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{(b-a)}{6}}; \quad (3.14) \quad V = \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot \frac{b-a}{b+a}. \quad (3.15)$$

Коефіцієнт асиметрії $As = 0$, ексцес $Ex = 2.4$, коефіцієнт ексцесу $\gamma = -0.6$. Медіана і мода збігаються з математичним сподіванням $Me = Mo = \bar{x}$ [30, 82].

Приклад. Довжина відрізка вимірюється лінійкою, яка коротше відрізка, але довший її половини.

Вимірювання проводиться таким чином. На вимірюваний відрізок поблизу його середини наноситься позначка. Вимірюються відстані від позначки до кінців відрізка і потім складаються. Передбачається, що суміщення початку відліку на лінійці з відміткою, зробленою на відрізку, виконується досить точно.

Потрібно визначити СКВ вимірювання, якщо відстань між поділами лінійки дорівнює 1 см і округлення проводиться до найближчої поділки.

Рішення. За порядком виміру складаються похибки виміру (похибки округлення) на кожному кінці відрізка. Кожна з похибок, які приймаються

незалежними, є рівномірною у межах половини ділення шкали, тобто від 0 до 0.5 см. Таким чином, $a=0$; $b=0.5$. Звідки отримаємо $s=0.204$ см [30].

3.2.3. Нормальний закон розподілу

Відповідно до центральної граничної теореми Ляпунова результати незалежних вимірів вибірок обсягом більше ніж 50–100, розподіляються за законом нормального або гаусового статистичного розподілу [12, 37, 79].

Таким чином нормальний закон розподілу (Z – розподіл, розподіл Гауса), що позначається як $N(\mu, \sigma)$, займає серед інших законів особливе положення, з ним пов'язано більшість завдань, що вирішуються в науковій і інженерній практиці [80].

Зокрема, нормальному закону розподілу підпорядковуються: тривалість безвідмовної роботи виробничих систем, втрата роботоздатності яких пов'язана в основному з поступовими відмовами при малій частці раптових відмов, та випадкові величини масових явищ, на які впливає велика кількість різних за величиною факторів (наприклад, знос і втома деталей, технологічні похибки, точність розмірів, одержуваних при обробці, і т.д.) [81].

Нормальний розподіл дає хорошу модель для реальних явищ, в яких:

- є сильна тенденція даних групуватися навколо центру;
- позитивні і негативні відхилення від центру різномірно;
- частота відхилень швидко падає, коли відхилення від центру стають великими.

Випадкова величина X розподілена за нормальним законом із середнім арифметичним \bar{x} і дисперсією σ^2 , якщо її щільність яка характеризується частотою прояв (3.16) (рис. 3.6, а, г) і є першою похідною (за умови, що вона існує) функції розподілу (3.17) (рис. 3.6, б, в), тобто функцію, яка визначає що для всіх дійсних x імовірність того, що випадкова величина X прийме значення не більше ніж x

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{або} \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad (3.16)$$

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \quad \text{або} \quad F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx, \quad (3.17)$$

де x – поточне значення точки;

e – число Ейлера, основа натурального логарифма, у ПА MS Excel вводиться набиранням *латиницею* виразу =EXP(1);

π – відношення довжини кола до діаметра, вводиться набиранням **кирилицею** виразу =**П**И().

Вирази (3.16) і (3.17), які представляють диференціальну (3.18) і інтегральну (3.19) функцію нормального розподілу, записуються також у вигляді

$$n(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad (3.18) \quad N(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \quad (3.19)$$

аналогічне представлення щільності нормальної функції подається ППП **Statistica** при одержанні гістограм (див. (15.1), с. 968 та рис. 15.22, с. 981).




Рис. 3.6. Щільність (а, г) і функція (б, в) нормального закону розподілу випадкової величини

Графік щільності (3.16) розподілу ймовірностей називається кривою розподілу.

До основних властивостей кривої нормального розподілу відносяться:

- крива розподілу одновіршинна, координати вершини $\{\bar{x}; \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\}$;
- крива розподілу симетрична відносно осі, що проходить через центр розподілу $\bar{x} = Mo = Me$;
- крива має три точки перегину — на вершині, на лівій гілці $\{\bar{x} - \sigma; \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi} \cdot e}\}$ і на правій гілці $\{\bar{x} + \sigma; \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi} \cdot e}\}$;
- крива має дві гілки, асимптотично наближаються до осі абсцис, продовжуючись до нескінченності;
- якщо змінюється значення \bar{x} , крива переміщується вздовж осі ординат, при цьому форма кривої не змінюється;
- якщо змінюється значення σ , змінюється форма розподілу при незмінному положенні центру розподілу: при зменшенні σ — зменшується варіація, крива стає більш пологою, збільшується ексцес; при збільшенні σ — збільшується варіація, ексцес зменшується;
- площа, обмежена кривою зверху і віссю абсцис знизу, характеризує ймовірність появи певних значень ознаки: якщо всю її прийняти за 100 %, то в межах $\bar{x} \pm \sigma$ знаходиться 68.3 % усіх значень ознаки, в межах $\bar{x} \pm 2\sigma$ — 95.44 % значень, в межах $\bar{x} \pm 3\sigma$ — 99.73 % значень ознаки.

Цей висновок називається правилом "трьох сигм", відповідно, з яким можна вважати, що всі можливі значення нормально розподіленої ознаки укладаються в інтервал $\bar{x} \pm 3\sigma$ [3].

На (рис. 3.7) показані криві нормального розподілу при різних значеннях σ ; з цього малюнка видно, що при зменшенні параметра σ крива нормального розподілу стискається вздовж осі Ox і витягується уздовж осі Oy ; і, отже, чим менше σ , тим швидше убуває щільність розподілу $f(x)$ зі зростанням $|x|$.

Ймовірність попадання в інтервал (x_1, x_2) графічно зображується площею відповідної криволінійної трапеції під кривою розподілу ймовірностей. Зокрема, ймовірність попадання в симетричний інтервал $(-z_1, z_2)$ ($z_1 > 0$) зображується площею фігури, заштрихованої на рис. 3.6, г). З рис. 3.7 а) також видно, що чим менше σ , тим менше розкид помилок близько нуля [31].

Суттєвим є те, що крива нормального статистичного розподілу характеризується лише двома параметрами — постійними, від яких саме залежить функція розподілу: μ — генеральним середнім сукупності (математичним сподіванням, тобто середнім зваженим за ймовірнісними значеннями випадкової величини), яке знаходиться в середині ряду і в ранговому ряді немовби ділить його навпіл, і σ — стандартним відхилом елементів числового ряду від їх середнього арифметичного, або σ^2 — дисперсією генеральної сукупності (для експериментальних даних відповідно позначення \bar{x} і s , або s^2). Це дозволяє з певною ймовірністю виділити ту зону рангового статистичного ряду, у якій знаходиться та чи інша кількість даних (рис. 3.6) [1, 17]. Геомет-

рично стандартний відхил σ співпадає з відстанню від генерального середнього сукупності μ до точок перегинів кривої [82], де абсциса становить $\frac{1}{\sqrt{e}}$

від максимального значення розподілу $y_{\max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ [83].

Більшість інших розподілів, які використовуються в математичній статистиці (Стюдента, Фішера, Пірсона, Кохрена, а також розподіли, за якими складені різні критеріальні таблиці), отримані на основі нормального статистичного розподілу. Нормальний закон розподілу, виходячи із центральної граничної теореми (див. с. 36), є граничним законом, до якого прямують при виконанні деяких умов усі інші закони розподілу [17].

Функція нормального розподілу парна $f(x) = f(-x)$ і симетрична відносно точки $x = \bar{x}$, коефіцієнт асиметрії $As = 0$, ексцес $Ex = 0$, коефіцієнт ексцесу $\gamma = -3$. Також $\bar{x} = Me = Mo$ та $s = \bar{x} / 2$ і $Ex = 3$ [30, 82].

Часто використовується нормований нормальний статистичний розподіл для нормованої випадкової величини z , яка є відношенням випадкової величини до її квадратичного відхилу. Він називається **стандартним нормальним** з нульовим середнім і одиничною дисперсією: $N(0,1)$ [82].

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}, \quad (3.20) \quad z = \frac{x - \bar{x}}{s} \quad (3.21)$$

Стандартний (нормований) нормальний розподіл приймає параметри середнього арифметичного $z = 0$ та середнього квадратичного відхилу $s^2 = 1$ [15], тому вирази (3.16) і (3.17) виглядають (3.22) і (3.23)

$$f_0(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} \quad (3.22) \quad F_0(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz. \quad (3.23)$$

Графіки цих функцій наведені на рис. 3.6 г) і в), причому

$$F_0(-z) = 1 - F_0(z), \quad f(-z) = f(z) \quad \text{і} \quad F(a \leq z \leq b) = F(b) - F(a).$$

Функція $\Phi(z)$, яка називається функцією Лапласа і є інтегралом ймовірностей (3.24) [17]

$$\Phi(z) = F_0(z) - \frac{1}{2} \quad (3.24)$$

і відповідає виразу (3.25)

$$\Phi(z) = F_0(z) - F_0(0) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz, \quad (3.25)$$

$$\text{де } F_0(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \frac{1}{2}.$$

Геометрично значення функції Лапласа $\Phi(z)$ (3.24) представляє собою площу під кривою розподілу від осі симетрії (від нуля) до конкретної величини z . Вони наведені в табл. В.3, де подано лише позитивні значення аргументу; для негативних значень аргументу функція $\Phi(z)$ визначається як

$$\Phi(-z) = -\Phi(z). \quad (3.26)$$

Для нормованої випадкової величини у загальному випадку відповідно маємо (3.27) і (3.28) [84]

$$F(a \leq z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a); \quad (3.27)$$

$$F\left(z_2 \leq z \leq z_1\right) = \Phi\left(\frac{z_2 - \mu}{s_z}\right) - \Phi\left(\frac{z_1 - \mu}{s_z}\right). \quad (3.28)$$

У більшості посібників з теорії ймовірностей і математичній статистиці наводяться таблиці інтегральної функції (інтеграла) Лапласа $\Phi(z)$ табл. В.3 чи пов'язаної з нею функції $\Phi_0(z)$

$$\Phi_0(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^z e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 2\Phi(z) - 1. \quad (3.29)$$

Функція $\Phi_0(z)$ є непарною, тобто $\Phi(-z) = -\Phi(z)$, і представляє собою площу під графіком нормального розподілу від 0 до z (рис. 3.6 г). Довідкові таблиці значень $\Phi_0(z)$ складені лише для $z > 0$.

Табульовані значення функцій (3.22) і (3.24) подано в табл. В.1 і В.3.

Саме за виразом (3.25) представлені дані табл. В.3, тобто, **зменшені на 0.5** значення даних нормованої інтегральної функції нормального розподілу, розрахованих статистичною функцією **Excel НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значеннями **ИСТИНА** (Додаток А) для $x \geq 0$ (крива 1, рис. 3.7 б, с. 141).

При збільшенні дисперсії щільність нормального розподілу розпливається або розтікається уздовж осі абсцис, при зменшенні дисперсії вона, навпаки, стискається, концентруючись навколо однієї точки — точки макси-

мального значення, що збігається із середнім значенням. У граничному випадку нульової дисперсії випадкова величина вироджується і приймає єдине значення, рівне середньому.




Рис. 3.7. Нормальний розподіл **НОРМ.РАСП**:

а – щільність (**ЛОЖЬ**); б – функція розподілу (**ИСТИНА**)

1 – **НОРМ.СТ.РАСП**; 2 – $n(0, 2.5), N(0, 2.5)$; 3 – $n(0, 0.5), N(0, 0.5)$.

З графіка щільності стандартного нормального розподілу (рис. 3.8) вид-



Рис. 3.8. Квантиль стандартного нормального статистичного розподілу

з довільними параметрами \bar{x} і σ^2 .

Для визначення параметрів нормального розподілу в пакеті програм **MS Excel** [25] використовуються статистичні функції **НОРМ.РАСП**, **НОРМ.ОБР**, **НОРМ.СТ.РАСП** і **НОРМ.СТ.ОБР** (див. Додаток А).

Зауважимо, тут і далі **Інтегральна** — обов'язковий аргумент, логічне значення, що визначає форму функції. Для графіків щільності аргумент “**інтегральна**” має логічне значення **ЛОЖЬ**, для інтегральних функцій розподілу — **ИСТИНА**.

но, що площа під ним лівіше квантилі z_p дорівнює p . Значить, площа правіше цієї точки дорівнює $1-p$. Така ж площа розташована лівіше точки z_{1-p} . Отже, площі лівіше z_{1-p} і правіше z_p рівні між собою. Оскільки графік симетричний відносно осі ординат, то ці точки розташовані на однаковій відстані від нуля.

Знаючи квантиль z_p порядку p нормованого нормального розподілу ($\bar{z} = 0$ і $\sigma_z^2 = 1$), завжди можна знайти квантиль x_p відповідного порядку p для нормального статистичного розподілу

На рис. 3.7 показані три криві нормальних розподілів — щільності і інтегральних: для всіх трьох $\bar{x} = 0$; для кривої $1\sigma = 1$; для кривої $2\sigma = 2.5$; для кривої $3\sigma = 0.5$.

Для кривої 1 на рис. 3.7 а) і б) використана функція **НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значеннями для щільності — **ложь** (3.22) і для інтегральних — **истина** (3.23), для кривих 2 і 3 функція **НОРМ.РАСП** з логічним значенням для щільності — **ложь** (3.16) і для інтегральних — **истина**.

Для $x \geq 0$ значення даних щільності **НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значенням **ложь** подано в табл. В.1 на с. 1044, інтегральної функції з логічними значенням **истина**, а саме, це одиниця мінус **НОРМ.СТ.РАСП** наведено в табл. В.2 на с. 1046, зменшені на 0.5, подано в табл. В.3 на с. 1048.

На рис. 3.9 представлена зміна значень оберненої функції нормального розподілу **НОРМ.СТ.ОБР** у залежності від прийнятого рівня значущості α .




Рис. 3.9. Значення оберненої функції нормального розподілу **НОРМ.СТ.ОБР** і **НОРМ.ОБР** у залежності від прийнятого рівня значущості α .

1 — **НОРМ.СТ.ОБР**; 2 — $n(0, 2.5)$, $N(0, 2.5)$; 3 — $n(0, 0.5)$, $N(0, 0.5)$.

Приклад 1 Визначення імовірності попадання в заданий інтервал нормальної випадкової величини.

1. Визначення імовірності того, що абсолютний відхил Δx випадкової величини x не перевищить деяке задане число ε , тобто [84]

$$P(\Delta x \leq \varepsilon) = P(\bar{x} - \varepsilon \leq x \leq \bar{x} + \varepsilon). \quad (3.30)$$

Зокрема для нормованої випадкової величини ця умова має вигляд

$$P(\Delta x_0 \leq \varepsilon) = P(-\varepsilon \leq x_0 \leq +\varepsilon) = \Phi(\varepsilon) - \Phi(-\varepsilon) = 2\Phi(\varepsilon). \quad (3.31)$$

Для випадкової величини з параметрами розподілу x_0 і s маємо

$$P(\Delta x \leq \varepsilon) = P\left(\Delta x_0 \leq \frac{\varepsilon}{s}\right) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{s}\right). \quad (3.32)$$

Позначивши $k = \varepsilon/\sigma$ отримаємо

$$P(\Delta x \leq k\sigma) = 2\Phi(k). \quad (3.33)$$

Звідки для k яке дорівнює 1, 2 і 3 у відповідності до табл. В.3 чи за статистичною функцією **MS Excel НОРМ.СТ.РАСП(k ; истина)-0.5** відповідно маємо 0.6826, 0.9544 і 0.9973.

Таблиця3.1. Імовірність попадання у заданий інтервал	
А	В
1 Найменування показника	Значення
2 Середнє x_{cp}	30
3 Вибірковий відхил s	10
4 Верхня межа інтервалу b	50
5 Нижня межа інтервалу a	10
6 Значення інтегральної функції Fb	0.9772
7 Значення інтегральної функції Fa	0.0228
8 Імовірність знаходження в інтервалі Fab	0.9545
B6=НОРМ.РАСП(B4;B2;B3;ИСТИНА) B7=НОРМ.РАСП(B5;B2;B3;ИСТИНА) B8=B6-B7	

Приклад 2. Величина X розподілена за нормальним законом з характеристикою $\bar{x}=30$ і $s=10$. Знайти імовірність її знаходження у інтервалі (10, 50) [77].

Рішення. Розрахунок з використанням функції пакету **MS Excel НОРМ.РАСП** представлено на полі табл. 3.1.

Приклад 3. Величина X розподілена за нормальним законом з характеристикою $\bar{x}=20$ і $s=10$. Знайти імовірність того, що відхил середнього за абсолютною величиною буде менше трьох [77].

Рішення. Розрахунок з використанням функції пакету **Excel НОРМ.РАСП** представлено на полі табл. 3.2.

Приклад 4. Згідно зоотехнічних вимог до заготівлі кукурудзяного силосу довжина часток 80 % маси корму повинна бути у межах від 20 до 60 мм, тобто $a=20$ мм, $b=60$ мм. Визначити верхню межу варіювання і статистичну характеристику довжиною часток силосної маси.

Рішення. Приймавши розподіл часток за довжиною нормальним і позначивши максимальну їх довжи-

Таблиця3.2. Імовірність відхилення середнього	
А	В
1 Найменування показника	Значення
2 Середнє x_{cp}	20
3 Вибірковий відхил s	10
4 Відхилення Δ	3
5 Верхня межа інтервалу b	23
6 Нижня межа інтервалу a	17
7 Значення інтегральної функції Fb	0.6179
8 Значення інтегральної функції Fa	0.3821
9 Імовірність знаходження в інтервалі Fab	0.2358
B5=B2+B4 B6=B2-B4 B7=НОРМ.РАСП(B5;B2;B3;ИСТИНА) B8=НОРМ.РАСП(B6;B2;B3;ИСТИНА) B9=B7-B8	

ну l , маємо $\bar{x} = \frac{l+a}{2}$ і $s_{\bar{x}} = \frac{l-a}{6}$, далі використовуємо функцію пакету Excel **НОРМ.РАСП** (табл. 3.3).

Підберіємо значення допустимої довжини часток (чарунка **B4**) за умови, щоб уміст часток заданої довжини (чарунка **B7**) становив 0.8, тобто 80 %. Отримані результати подано в табл. 3.3.

З усіх законів розподілу найчастіше в дослідженнях вдаються до нормального розподілу. Ним користуються не тільки тому, що він якнайкраще описує емпіричний матеріал, а й тому, що нормальний розподіл добре розроблена математична модель, якою зручно користуватися для статистичного аналізу результатів вимірювань [2].

Приклад 4. Середнє напрацювання на відмову подрібнювача кормів має нормальний розподіл з параметрами $t_{\text{ср}} = 400$ год. і $s = 50$ год.

Потрібно визначити ймовірність безвідмовної роботи за періоди $t_1 = 300$ і $t_2 = 450$ год. [81].

Рішення. За виразом $x_i = (t_i - t_{\text{ср}}) / t_{\text{ср}}$ знаходимо відповідно значення $x_1 = 2$ і $x_2 = -1$, звідки використовуючи функцію пакету MS Excel **НОРМ.СТ.РАСП(x;истина)** відповідно отримуємо $P_{(300)} = 0.97725$ і $P_{(450)} = 0.158655$.

Таблиця 3.3. Визначення меж варіювання		
	А	В
1	Найменування показника	Значення
2	Нижня межа довжини часток a	20
3	Верхня межа довжини часток b	60
4	Допустима довжина часток l	82.5
5	Середня довжина часток $x_{\text{ср}}$	51.25
6	Вибірковий вдхил s	10.42
7	Уміст часток заданої довжини x	0.80
$B5=(B2+B4)/2$ $B6=(B4-B2)/6$ $B7=НОРМ.РАСП(B3;B5;B6;ИСТИНА)$		

3.2.4. Логнормальний розподіл

Логнормальний розподіл є двопараметричним абсолютно безперервним, де випадкова величина має логнормальний розподіл, а її логарифм — нормальний.

Логнормальний розподіл застосовується для аналізу логарифмічно перетворених даних і використовується в теорії надійності.

Якщо випадкова величина X має логнормальний розподіл, то її логарифм $Y = \ln(X)$ має нормальний розподіл. Справедливо і зворотне твердження: якщо випадкова величина Y має нормальний розподіл, то випадкова величина $X = \exp(Y)$ має логнормальний розподіл. З властивості логарифма випливає, що $X > 0$.

Як відомо, нормальний розподіл найчастіше розглядається як відповідна модель для опису такого процесу, коли діє велика кількість незалежних

випадкових причин. В цьому випадку щільність розподілу випадкової величини має симетричну, дзвіноподібну форму (рис. 3.7, а).

Однак, у деяких випадках спостереження показують, що випадкова величина має помітно скошене (несиметричне) розподіл, і, відповідно, не може бути описана нормальним розподілом.

Скошені розподілу мають місце коли, випадкові величини не можуть бути негативними ($X > 0$) або наявна інша природна межа (не може бути менше певного значення). Логнормальний розподіл є одним із прикладів скошеного розподілу.

Хоч обидва розподілу мають місце коли на описуваний об'єкт впливає безліч випадкових і незалежних факторів, їх відмінність у тому, що нормальний розподіл має адитивний (впливу кожного з факторів підсумовується) характер взаємодії факторів, а логнормальний — мультиплікативний характер взаємодії, тобто, фактори не складаються, а перемножуються. Хоч фактори також незалежні як і в разі нормального розподілу, але ефект від їх впливу накопичується в об'єкті залежно від попереднього їх кількості. Мультиплікативний ефект від всіх випадкових незалежних впливів, наприклад, на деталь в процес зносу, акумулюється до тих пір поки не відбудеться її руйнування.

Прикладами, коли має місце логнормальний розподіл можуть бути такі ситуації:

- збій через хімічних реакцій або деградації, таких як корозія або дифузія, які є частою причиною відмови напівпровідникового елемента;
- час до руйнування в металах за умови росту тріщини від втоми.

Він також задовільно описує розподіл кількості часток за їх розмірами при подрібненні.

Тобто, це розподіл випадкової величини X , при якому її логарифм $Y = \ln(X)$ *розподілений нормально* з функцією щільності

$$f(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{y - \mu_y}{\sigma} \right)^2}. \quad (3.34)$$

Слід звернути увагу, що хоча μ_y і σ_y — математичне сподівання функції, $\mu_y = M[Y]$ та σ_y — стандартний відхил функції, $s_y = \sqrt{D[Y]}$ є параметрами розподілу, вони не є середнім значенням, яке позначається \bar{x} і середньоквадратичним відхилом s_y цього розподілу (як у нормального розподілу).

Випадкова величина X за умови $0 < X < \infty$ має функцію щільності

$$f(x) = \frac{1}{xs_y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x) - \bar{y}}{s_y} \right)^2}. \quad (3.35)$$

Статистичні оцінки параметрів розподілу — середнього \bar{y} і дисперсії s_y^2 визначаються відповідно за формулами (3.36) і (3.37)

$$\tilde{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i; \quad (3.36) \quad \tilde{s}_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \left[\ln(x_i) - \sum_{i=1}^n \ln x_i \right]^2. \quad (3.37)$$

Логнормальний розподіл, який позначається $\ln N(\bar{x}, s^2)$ чи $LN(\bar{x}, s^2)$, має параметри $-\infty \leq \bar{x} \leq \infty$ та $s \geq 0$.

Середнє значення (математичне сподівання) \bar{x} та СКВ аргументу s_x^2 обчислюються відповідно за формулами (3.42) і (3.43)

$$\bar{x} = e^{\tilde{s}_y^2/2 + \tilde{y}}; \quad (3.38) \quad s_x^2 = e^{\tilde{s}_y^2 + 2\tilde{y}} (e^{\tilde{s}_y^2} - 1). \quad (3.39)$$

Його медіана і мода відповідно становлять (3.40) і (3.41)

$$Me = e^{\bar{x}}, \quad (3.40) \quad Mo = e^{\bar{x} - s^2}; \quad (3.41)$$

коефіцієнти асиметрії і ексцесу відповідно (3.42) і (3.43)

$$As = \left(e^{s^2} + 2 \right) \sqrt{e^{s^2} - 1}, \quad (3.42) \quad Ex = e^{4s^2} + 2e^{3s^2} + 3e^{2s^2} - 6. \quad (3.43)$$

Особливістю логнормального розподілу є логнормальність їх добутків.

Синтаксис функції ПА MS Excel **ЛОГНОРМ.РАСП** має вигляд **ЛОГНОРМ.РАСП(х;середнее;стандартное_откл;интегральная)** (див. Додаток А). Тут **середнее** – середнє, обчислене за значеннями $\ln(x_i)$, **стандартное_откл** – СКВ, обчислений за значеннями $\ln(x_i)$.

Графік функції щільності (при логічному значенні **ложь**) наведено на рис. 3.10 а).

Інтегральна функція логнормального розподілу (при логічному значенні **истина**) виглядає (ймовірність, що випадкова величина X прийме значення менше або рівне x) виглядає (3.44)

$$F(x) = \frac{1}{s_y \sqrt{2\pi}} \int_0^x \frac{1}{x} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln(x) - \bar{y}}{s_y} \right)^2} dx. \quad (3.44)$$

Графік функції розподілу (при логічному значенні **истина**) наведено на рис. 3.10 б).

На рис. 3.10 показані криві щільності і інтегральні логнормальних розподілів — для кривої 1 — $\bar{x}=1, s_y=1$; 2 — $\bar{x}=1, s_y=0.6$ і 3 — $\bar{x}=2, s_y=1$.

Для кривих, поданих на рис. 3.10, а) використана функція **ЛОГНОРМ.РАСП** з логічними значеннями для щільності — **ложь** (3.46) і для інтегральних (рис. 3.10, б) — **истина** (3.44).




Рисунок 3.10. Графіки функції **ЛОГНОРМ.РАСП**
а – щільності; б – розподілу

1 — $\bar{x}=1, s_y=1$; 2 — $\bar{x}=1, s_y=0.6$; 3 — $\bar{x}=2, s_y=1$

При визначенні аргументу за значенням функції розподілу використовується функція **ЛОГНОРМ.ОБР**, див. Додаток А. Тут **вероятность** — ймовірність, пов'язана з логарифмічно нормальним розподілом, **среднее** — середнє, обчислене за значеннями $\ln(x_i)$, **станд_откл** — середній квадратичний відхил, обчислений за значеннями $\ln(x_i)$.

На рис. 3.10 показані три криві 1 — $\bar{x}=1, s_y=1$; для кривої 2 — $\bar{x}=1, s_y=0.6$ і для кривої 3 — $\bar{x}=2, s_y=1$.

При використанні цієї функції вирішується зворотна задача: що випадкова величина x має логнормальний розподіл, який визначається законом розподілу (3.44) з параметрами \bar{x} та s_y і значення функції в точці x , тобто

необхідно за відомими параметрами визначити точку x , в якій функція розподілу приймає задане значення.

На рис. 3.11 наведена побудовані гістограми розподілу кількості стручків на центральній гілці у 2004 р. за даними табл. 2.11, с. 96 з оцінкою її відповідності логнормальному статистичному розподілу, виконана як описано у підрозділі **15.5.4 Побудова й аналіз одинарних гістограм**.




Рис. 3.11. Гістограма розподілу за кількістю стручків на центральній гілці та її логнормальний статистичний розподіл

Порівнюючи оцінки відповідності цієї вибірки нормальному (рис. 15.22, с. 981) і логнормальному (рис. 3.11) розподілу показує, що хоч

логнормальний розподіл за критерієм Шапіро–Уїлка є статистично значущим ($W = 0.9772$, $p = 0.0773$), проте вибірка у більшій мірі відповідає нормальному, для якого ($W = 0.9954$, $p = 0.9839$), див. с. 305.

Для прикладу застосування логнормального розподілу розглянемо декілька задач.

Приклад 1. Обсяг подрібнення корму малогабаритним подрібнювачем до заточування має логнормальний розподіл з параметрами $\mu=2$ і $\sigma=15$ т. Яка ймовірність того, що він потребуватиме заточки ножів після переробки 4 тон?

Рішення. За допомогою інтегральної функції (3.44) розподілу обчислимо ймовірність того, що подрібнювач зможе переробити менше 4 т використовуючи функцію ПА MS Excel **ЛОГНОРМ.РАСП**

$$=\text{ЛОГНОРМ.РАСП}(4;2;1.5;\text{ИСТИНА})=0.3413.$$

Приклад 2. З огляду на умову задачі 1, визначити можливий обсяг переробки двох третин машин.

Рішення. При великій кількості подрібнювачів задане питання можна вважати еквівалентним питанню “Який обсяг переробки x без заточування ножів буде у випадково взятого подрібнювача з ймовірністю 0.667?”, тобто обчислити значення x (обсяг переробки), з ймовірністю $1-0.667=0.333$.

Для обчислення використовується функція ПА MS Excel **=ЛОГНОРМ.ОБР(0.333;2;1.5)=3.87** т, тобто після переробки 3.87 т від початку роботи дві третини всіх випущених подрібнювачів ще не потребуватимуть заточки ножів.

Приклад 3. За умовами задачі 1, обчислити середнє і СКВ тривалості стійкості ножів.

Рішення. Для заданих параметрів логнормального розподілу середня тривалість роботи ножів подрібнювача кормозбирального комбайна, вигачена за виразом (3.42) становить $\bar{x}=22.76$ т, а СКВ — $s_x=66.3$ т.

При цьому слід зауважити, що для логнормального розподілу, як для типового скошеного розподілу, **середньоквадратичний відхил істотно більше за середній**.

Приклад 4. Розглянемо розподіл середньої довжини часток 11 проб, отриманих при дослідженнях кормодробарки (колонка С табл. 3.4).

В колонці **D** знаходяться значення відповідних показників в колонці **C**. В колонці розташовані значення

Таблиця 3.4. Приклад застосування логнормального розподілу

	A	B	C	D	E
1	C13=CPЗНАЧ(C2:C12) D2=LN(C2) D17=EXP(D13)	№ п.п.	Довжина частки x	$\ln(x)$	$F(x)$
2		1	6.6	1.89	0.086
3		2	7.2	1.97	0.167
4		3	9.7	2.27	0.653
5		4	10.3	2.33	0.748
6		5	11.4	2.43	0.871
7		6	12.2	2.50	0.925
8		7	10.4	2.34	0.762
9		8	9.9	2.29	0.687
10		9	8.3	2.12	0.376
11		10	7.1	1.96	0.152
12		11	6.9	1.93	0.123
13	Середнє x_{mid}		9.09	2.186	
14	СКВ s		1.96	0.219	
15	Рівень значущості α			0.5	
16	Розрахована довжина x_p			8.90	
17	Медіана Me			8.90	

E2=ЛОГНОРМ.РАСП(C2;D13;D14;ИСТИНА)
D16=ЛОГНОРМ.ОБР(D15;D13;D14)
C14=СТАНДОТКЛОН.B(C2:C12)

функції розподілу, розраховані за функцією ПА MS Excel **ЛОГНОРМ.РАСП** для відповідних точок колонки С.

В чарунці **D16** подано результат розрахунку значення величини x функцією **ЛОГНОРМ.ОБР** для прийнятого значення α .

Отримана величина дорівнює значенню медіани логнормального розподілу, розрахованого за виразом (3.40), занесеного в чарунку **D17** табл. 3.4.

Слід відмітити, що для логнормального розподілу, як для типового скошеного розподілу, стандартне відхилення істотно більше середнього.

При застосуванні калькулятора ППП **Statistica** для оцінки розподілу Релея у меню **Statistics** / **Анализ** вибираємо модуль **Probability Calculator** / **Калькуляторы** і далі **Distributions...** / **Распределения**. Виникає панель **Probability Distribution Calculator** / **Вероятностный калькулятор распределений**, де вибирається вид розподілу **Log-Normal** / **Логнормальное** (1) (рис. 3.12).




Рис. 3.12 – Розрахунок значень логнормального розподілу ймовірностей:
а – функцією щільності; б – оберненою функцією.

Параметрами в цьому діалозі є середньоквадратичний відхил (параметр розподілу) s_y , який вноситься в поле **sigma** / **сигма** (3) і математичне сподівання функції μ_y , які вносяться в поле **mu** / **мю** (2). В поле **L** / **Л** (4) вводиться значення величини перероблюваного обсягу (рис. 3.26, а). Ми розглядаємо імовірність виникнення події, тому застосовуємо ☐ **(1-Cumulative p)** / ☐ **(1-Ф.р.)** (5). Натиснувши кнопку **Compute** / **Вычислить** (6) отримуємо результатом p – рівень довіри роботи машини (7), який становить $p=0.3412$.

Задіявши опцію ☒ **Inverse** / ☒ **Обратная Ф.р.** можна розрахувати кількість працюючих машин за заданими параметрами розподілу s_y і μ_y та рівнем значущості p (рис. 3.26, б). З нього видно, що після переробки 3.87 т третина всіх випущених подрібнювачів потребуватимуть заточки ножів.

Обидва отримані результати співпадають з результатами розрахунку за формулами.

3.2.5. Розподіл Стюдента

Як сказано вище, закон нормального розподілу проявляється при $n > 20-30$. Однак експериментатор часто проводить обмежене число вимірювань, ґрунтує свої висновки на малих вибірках, наприклад, польовий дослід проводиться в 4–6 повторностях і вибірковий відхил s у цьому разі буде менше, ніж стандартний відхил генеральної сукупності σ . Отже тут покладатися на критерії нормального розподілу в своїх висновках не можна, так як при малому числі щільність розподілу може істотно відхилятися від нормальної. У цьому випадку в математичній статистиці використовується симетричний t -розподіл Стюдента [80].

Якщо y — нормально розподілена випадкова величина з нульовим середнім і одиничною дисперсією, а незалежна від неї випадкова величина χ^2 має розподіл χ^2 -квадрат (див. підрозділ 3.2.7 **χ^2 -квадрат розподіл** (χ^2 -розподіл Пірсона) з ν ступенями вільності, то випадкова величина $t = y \left(\sqrt{\frac{\chi^2}{\nu}} \right)$ підлягає розподілу Стюдента з ν ступенями вільності. Сам t -розподіл Стюдента для вибіркових середніх визначається рівністю (3.45)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{s_{\bar{x}}} \quad (3.45)$$

з функціями щільності (3.46) і інтегральною (3.47) при $-\infty \leq x \leq \infty$ [2, 17]

$$f_{\nu}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \cdot \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}; \quad (3.46)$$

$$F_{\nu}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \int_{-\infty}^x \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}} dx. \quad (3.47)$$

де ν – число ступенів вільності, яке визначається різницею між обсягом вибірки n і числом параметрів, які оцінюються за вибіркою;

$\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)$ – гама-функція Ейлера.

Значення гама-функції $\Gamma(x)$ для числа x наведене в табл. В.6 на с. 1056. Знаходження в **MS Excel** виконується з використанням статистичної функції **ГАММАНЛОГ(x)** (див. Додаток А) таким чином **EXP(ГАММАНЛОГ(x))**.

Гама-функція $\Gamma(x)$ є узагальненням поняття факторіала і має рекурентну властивість: $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$ (для цілих чисел n справедливо $\Gamma(n+1)=n!$).

Чисельник формули (3.45) означає відхилення вибіркової середньої \bar{x} від середньої всієї сукупності μ , а знаменник $\frac{s}{\sqrt{n}} = s_{\bar{x}}$ є показником оцінки

величин $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sigma_{\mu}$ (формули (1.63), або стандартну похибку середньої генеральної сукупності. Таким чином, величина t вимірюється відхиленням вибіркової середньої \bar{x} від середньої сукупності μ і, вираженим в частках похибки вибірки $s_{\bar{x}}$ прийнятої за одиницю [34].

Математичне сподівання $M(x)$, чи середнє \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 і СКВ s для t -розподілу Стюдента відповідно становлять: $\bar{x} = 0$ при $\nu \geq 1$;

$s^2 = \frac{\nu}{\nu - 2}$ і $s = \sqrt{\frac{\nu}{\nu - 2}}$ при $\nu \geq 2$; коефіцієнт варіації $V = 0$, коефіцієнт асиметрії $As = 0$, ексцес $Es = \frac{3(\nu - 2)}{\nu - 4}$ при виконанні умови $\nu \geq 4$; $Me = Mo = 0$.

Розподіл Стюдента симетричний відповідно нуля, тому $t_{\alpha} = -t_{1-\alpha}$.

При $\nu = 1$ розподіл Стюдента переходить в розподіл Коші (див. підрозділ **3.2.11 Розподіл Коші**) [30, 82].

Для визначення параметрів розподілу Стюдента в пакеті аналізу **Excel** [25] використовуються статистичні функції **СТЮДЕНТ.ОБР**, **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**, **СТЮДЕНТ.РАСП**, **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** і **СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ** (див. Додаток А).

Розподіл Стюдента важливий у тих випадках, коли розглядаються оцінки середнього і невідома дисперсія вибірки. У цьому випадку використовують вибіркoву дисперсію і t -розподіл.

Розподіл t -критерію Стюдента дозволяє визначити довірчий, інтервал малих вибірок, який накриває середню сукупності μ , і дозволяє перевірити ту чи іншу гіпотезу щодо генеральної сукупності за оцінками \bar{x} і $s_{\bar{x}}$ для певного обсягу вибірки n [34, 79]. Цей розподіл представлено в табл. В.5 на с. 1051, графічне зображення показано на рис. 3.13.




Рис. 3.13 – Криві розподілу Стюдента **СТЮДЕНТ.РАСП**:
а – щільність розподілу (**ложь**); б – функція розподілу (**истина**)

1 – $v=1$; 2 – $v=5$; 3 – $v=30$; 4 – $n(0,1)$, $N(0,1)$.

Загалом він використовується тільки при оцінці помилок вибірок, взятих з генеральної сукупності з нормальним розподілом ознаки [3].

Максимуми частоти нормального і t -розподілу збігаються, але форма кривої t -розподілу залежить від числа ступенів вільності. Розподіл Стюдента є симетричним, унімодальним і асимптотично нормальним. При дуже малих значеннях ступенів вільності крива приймає плосковершинний вигляд, причому площа під кривою, більше, ніж при нормальному розподілі, а при збільшенні числа спостережень ($n > 30$) розподіл t наближається до нормального і переходить в нього при $n \rightarrow \infty$ з параметрами $\bar{x} = 0$ і $s = 1$.

Зі зростанням числа ступенів вільності розподіл Стюдента швидко наближається до нормального і при $n = 20$ розподіл Стюдента вже добре апроксимується нормальним розподілом, а при $n = 30$ вже можна замінити нормальним [34].

На рис. 3.13, а) і б) показані три криві t -розподілу Стюдента, отримані функцією **СТЮДЕНТ.РАСП** — щільності і інтегральних: 1, 2 і 3, отриманих відповідно для логічних значень **ложь** і **истина** для ступенів вільності 1, 5 і 30. Для порівняння на них також представлені криві 4, нормованого стандартного розподілу, визначену функцією **НОРМ.СТ.РАСП** з відповідними логічними значеннями. Графік щільності t -розподілу (рис. 3.13 а) нагадує за формою нормальний розподіл, але він більш повільно наближається до осі абсцис.

Сам графік функції щільності t -розподілу деформується при зростанні числа ступенів свободи наступним чином (рис. 3.13 а): пік збільшується, хвости більш круто йдуть до 0, і здається, ніби графіки функції щільності t -розподілу стискається з боків.

На рис. 3.14 а) і б) показані три криві 1, 2 і 3 t -розподілу Стюдента, отримані відповідно функцією відповідно **СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ** і **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х**.

Особливістю цих функцій є те, що вони на відміну від функцій нормального розподілу визначають не площі лівобічної частини під кривою розподілу, а у першому випадку правобічну площу, а у другому — сумарну площу обох кінців розподілу. Для порівняння на рис. 3.14 а) і б) також представлені їхні “нормальні аналоги” — криві нормованого стандартного розподілу, визначену функцією **2-2*НОРМ.СТ.РАСП** і **1-НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значеннями **истина**, позначені як 4.

На рис. 3.15, а) і б) представлена зміна значень оберненої функції розподілу Стюдента **СТЮДЕНТ.ОБР** і **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** у залежності від прийнятого рівня значущості α для ступенів вільності 1, 5 і 30.

Так як розподіл Стюдента при $n \rightarrow \infty$ переходить в нормальний, для визначення $t_{\alpha(\infty)}$ — табличне значення коефіцієнту Стюдента при рівні значущості α і ступені вільності $\nu = \infty$ (див. вираз (5.97)), слід використовувати функцію **НОРМ.СТ.ОБР** і **НОРМ.СТ.ОБР(1- $\alpha/2$)**, (див. рис. 3.15, а і б).




Рис. 3.14 – Криві розподілу Стюдента:

а – **СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ**; б – **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х**

1 – $\nu = 1$; 2 – $\nu = 5$; 3 – $\nu = 30$; 4 – $n(0,1)$, $N(0,1)$.

Використання функції пакету Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** для визначення табличного (критичного) значення критерію Стюдента $t_{\alpha(\nu)}$ та **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** для отримання розрахункового рівня значущості p наведено на полі табл. 7.12 на с. 369.




Рис. 3.15 – Значення оберненого розподілу Стюдента у залежності від прийнятого рівня значущості α :

а – **СТЮДЕНТ.ОБР**; б – **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

1 – $\nu=1$; 2 – $\nu=5$; 3 – $\nu=30$; 4 – **НОРМ.СТ.ОБР**.

3.2.6. Розподіл Фішера (F –розподіл)

Якщо дві незалежні випадкові величини χ_1 і χ_2 розподілені за законом χ^2 –квадрат відповідно з ν_1 і ν_2 ступенями вільності, то випадкова величина

$F = \frac{\chi_1^2 \cdot \nu_1}{\chi_2^2 \cdot \nu_2}$ має F –розподіл Фішера. Цей розподіл виникає в дискримінантному, регресійному і дисперсійному аналізі, а також в інших видах багатомірного аналізу даних. Його широко застосовують при обробці даних (при порівнянні дисперсій, аналізі кореляцій, оцінці регресійних залежностей). Також за допомогою F –розподілу можна розраховувати деякі дискретні розподіли, наприклад, біноміальний [80].

Розподіл Фішера використовують для порівняння дисперсій s_1^2 і s_2^2 двох незалежних вибірок обсягом n_1 і n_2 , причому F –критерій розраховується за умови $s_1^2 > s_2^2$ і при ступенях вільності вибірок $\nu_1 = n_1 - 1$ і $\nu_2 = n_2 - 1$, тому завжди $F \geq 1$

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}. \quad (3.48)$$

Диференціальна функція цього розподілу має вигляд [78, 79]

$$f_{v_1, v_2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0 \\ C_0 \cdot \frac{x^{\frac{v_1}{2}-1}}{(v_2 + v_1 x)^{\frac{v_1+v_2}{2}}} & \text{при } x > 0, \end{cases} \quad (3.49)$$

де
$$C_0 = \frac{\Gamma\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right) \cdot v_1^{v_2/2} \cdot v_2^{v_2/2}}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right)};$$

$\Gamma(y)$ – значення гамма-функції Ейлера в точці y .

Функція розподілу за умови $x \geq 0$ представляється виразом

$$S(x) = P\{F < x\} = \frac{\Gamma\left(\frac{v_1 + v_2}{2}\right) \cdot v_1^{v_2/2} \cdot v_2^{v_2/2}}{\Gamma\left(\frac{v_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{v_2}{2}\right)} \int_0^x y^{\frac{v_1}{2}-1} (v_1 + v_2 y)^{\frac{v_1+v_2}{2}} dy. \quad (3.50)$$

Математичне сподівання $M(x)$, чи середнє \bar{x} при $v_2 \geq 2$ і дисперсія $D(x)$, тобто s^2 при $v_2 \geq 4$ для розподілу Фішера відповідно наведені в (3.52)

$$\bar{x} = \frac{v_2}{v_2 - 2}; \quad (3.51)$$

$$s^2 = \frac{2v_2^2(v_1 + v_2 - 2)}{v_1(v_2 - 2)^2 \cdot (v_2 - 4)}. \quad (3.52)$$

Коефіцієнт варіації V при $v_2 \geq 4$ описується виразом (3.53), асиметрія As при $v_2 \geq 6$ виразом (3.54) та мода Mo виразом — (3.55) [30, 82], ексцес при $v_2 \geq 8$ — виразом (3.56)

$$V = \sqrt{\frac{2(v_1 + v_2 - 2)}{v_1(v_2 - 4)}}; \quad (3.53)$$

$$As = \frac{2v_1 + v_2 - 2}{v_2 - 6} \sqrt{\frac{8(v_2 - 4)}{v_1 + v_2 - 2}}; \quad (3.54)$$

$$Mo = \frac{v_2(v_1 - 2)}{v_1(v_2 + 2)}; \quad (3.55)$$

$$Ex = \frac{3(v_2 - 6)}{v_2 - 8} \cdot \left(2 + \frac{As^2}{2} \right) - 3. \quad (3.56)$$

Слід зауважити, що для F -розподілу справедливе співвідношення

$$F_{(\alpha; v_1; v_2)} = \frac{1}{F_{(1-\alpha; v_2; v_1)}}. \quad (3.57)$$

Крива F -розподілу Фішера для всіх можливих значень, яка представляє собою відношення двох квадратів, розташовується тільки в першому квадранті між 0 і ∞ (рис. 3.16).

Розподіл Фішера має асиметричну форму кривої розподілу щільності ймовірності і залежить тільки від числа ступенів вільності вибірових дисперсій, які визначаються за умови $v_1 = n_1 - 1$ і $v_2 = n_2 - 1$.

При $v_1 = 1$ і $v_2 = \infty$ чи $v_1 = \infty$ і $v_2 = 1$ розподіл збігається з нормальним, а при $v_1 = 1$ і $v_2 = \infty$ чи $v_2 = 1$ і $v_1 = \infty$ — з розподілом квадрата випадкової величини, що має t -розподіл Стьюдента з $v_2(v_1)$ ступенями вільності. При $v_2 \rightarrow \infty$ F -розподіл збігається з χ^2 -розподілом при v_1 ступенях вільності [30, 82].




Рис. 3.16 – Криві розподілу Фішера **F.РАСП**:

а – щільність (**ложь**); б – функція розподілу (**истина**)

1 – $v_1=20, v_2=20$; 2 – $v_1=4, v_2=100$; 3 – $v_1=2, v_2=500$.

Коли дві порівнювані вибірки є випадковими незалежними із загальної сукупності з генеральною середньою μ , то емпіричне значення F не вийде за певні межі і не перевищить критичне (табличне) значення критерію F_T для даних v_1 і v_2 тобто, $F < F_T$. Якщо генеральні параметри порівнюваних груп різні, то емпіричне значення більше за теоретичне, тобто, $F > F_T$. Теоретичні значення F_T для 5 %-го і 1 %-го рівня значущості дано у табл. В.7–В.9

(с. 1057–1060), де табульовані тільки праві критичні точки для $F \geq 1$, так як завжди прийнято знаходити відношення більшої дисперсії до меншої. При цьому зі зменшенням рівня значущості α значення F_T зростає.

Для визначення параметрів розподілу Фішера в пакеті **Excel** [25] використовуються статистичні функції **F.РАСП**, **F.РАСП.ПХ**, **F.ОБР** і

F.ОБР.ПХ (див. Додаток А).




Рис. 3.17 – Криві розподілу Фішера **F.РАСП.ПХ**:

1 – $v_1=20, v_2=20$; 2 – $v_1=4, v_2=100$; 3 – $v_1=2, v_2=500$.

$v_2=500$, отриманих відповідно для логічних значень **ЛОЖЬ** і **ИСТИНА**.

Криві, отримані для всіх можливих значень F , особливо при невеликому числі спостережень, зосереджені тільки на додатній напівосі, мають асиметричну форму — довгий “хвіст” великих значень і велику концентрацію малих величин F .

На рис. 3.18, а) і б) представлена зміна значень оберненої функції F –розподілу **F.ОБР** і **F.ОБР.ПХ** у залежності від прийнятого рівня значущості α при ступенях вільності $v_1=20, v_2=20$; $v_1=4, v_2=100$ і при $v_1=2, v_2=500$.

Наявні залежності, виражені у статистичних формулах ПА **MS Excel**, (див. Додаток А):

$$\mathbf{F.ОБР(1-\alpha) = F.ОБР.ПХ;}$$

$$\mathbf{F.ОБР = F.ОБР.ПХ(1-\alpha);}$$

$$\mathbf{F.РАСП(истина) = 1-F.РАСП.ПХ;}$$

$$\mathbf{F.ОБР(\alpha; v_1; v_2) = 1/F.ОБР(1-\alpha; v_2; v_1), \text{ див. залежність (3.57).}}$$

Відзначимо, що t –розподіл Стюдента є окремим випадком F –розподілу при числі ступенів вільності $v_1=1$ і $v_2=v$, тобто дорівнює числу ступенів вільності для t –розподілу. У цьому випадку наявні наступні співвідношення між F і t [34]

$$F_{(v_1=1, v_2)} = t_{(v=v_2)}^2, \quad \text{тобто} \quad t = \sqrt{F}. \quad (3.58)$$




Рис. 3.18 – Значення оберненого розподілу Фішера у залежності від прийнятого рівня значущості α :
а – **F.OBR**; б – **F.OBR.PX**

1 – $\nu_1=20, \nu_2=20$; 2 – $\nu_1=4, \nu_2=100$; 3 – $\nu_1=2, \nu_2=500$.

Використання функції пакету **Excel F.OBR.PX** наведено на полі табл. 7.8 (с. 360), **F.РАСП** — табл. 10.15 (с. 584).

3.2.7. Хі-квадрат розподіл (χ^2 -розподіл Пірсона)

За допомогою розподілу χ^2 перевіряються гіпотези щодо значень дисперсій, перевіряється узгодження експериментальних даних з теоретичними законами розподілу. Також він широко застосовується в непараметричній статистиці, будучи граничним для багатьох вибірових статистик. Розподіл χ^2 відіграє важливу роль при оцінці дисперсії нормальної вибірки, а також при перевірці залежностей в таблицях спряженості і критеріях згоди.

Випадкова величина X , що має розподіл χ^2 , визначається як сума квадратів n незалежних стандартних нормальних величин вибірки, математичне сподівання кожної з яких дорівнює нулю, а СКВ — одиниці. Тоді сума квадратів цих величин $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$ і розподілена за законом χ^2 з $\nu=n$ ступенями

вільності; якщо ж ці величини зв'язані одним лінійним співвідношенням, наприклад $\sum X_i = nM(x)$, то число ступенів вільності дорівнює $\nu=n-1$ [2, 79, 80, 85].

У окремому випадку, коли $\nu=1$ випадкова величина χ^2 -квадрат дорівнює квадрату стандартної нормальної величини. Отже, цей розподіл має тільки один параметр — число ступенів вільності ν і не залежить від інших параметрів, та цілі позитивні числа [172].

Крива розподілу щільності ймовірності виражається формулою

$$f_v(\chi^2) = \begin{cases} 0 & \text{при } (\chi^2) \leq 0 \\ \frac{1}{2^{v/2} \cdot \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \cdot (\chi^2)^{\frac{v}{2}-1} \cdot e^{-\frac{\chi^2}{2}} & \text{при } (\chi^2) > 0 \end{cases} \quad (3.59)$$

При $x \geq 0$ функція розподілу має вигляд

$$F_v(x) = P\{\chi^2(f), x\} = \frac{1}{2^{v/2} \cdot \Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \int_0^x y^{\frac{v}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} dy, \quad (3.60)$$

де x – значення випадкової величини χ^2 [30, 82].

Математичне сподівання $M(x)$, чи середнє \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 і СКВ s і коефіцієнт варіації V для розподілу χ^2 –квадрат відповідно становлять

$$\bar{x} = v; \quad (3.61) \quad s^2 = 2v; \quad (3.62) \quad V = \sqrt{\frac{2}{v}}. \quad (3.63)$$

Коефіцієнти асиметрії As і ексцесу Ex відповідно становлять


$$As = 2\sqrt{\frac{2}{v}}; \quad (3.64) \quad Ex = 3 + \frac{12}{v}. \quad (3.65)$$

Медіана приблизно може бути визначена з виразу (3.67), мода при $v \geq 2$ теж з цього виразу, причому, при $v=1$ мода відсутня [30]

$$Me \approx v - 0.666, \quad (3.66) \quad Mo \approx v - 2. \quad (3.67)$$

Розподіл χ^2 так само як і t –розподіл є частинним випадком F –розподілу при $v_1=v$ і $v_2=\infty$: $F_{(v_1, v_2=\infty)} = \chi^2/2$ [34].

Розподіл χ^2 повністю визначається лише числом ступенів вільності і не залежить від інших параметрів. Для малого числа ступенів вільності v , при $v=1$ і $v=2$ функція монотонна, а при $v>2$ — унімодальна (має одну моду) і несиметрична. Розподіл є асимптотично нормальним, тобто зі збільшенням v асиметрія зменшується — зменшується і зміщується вправо пік щільності розподілу і він начебто розпливається по додатній напівосі і повільно на-



ближається до нормального, яким стає при $v \rightarrow \infty$ (крива 3 на рис. 3.19). Для порівняння червоним кольором на цьому рисунку наведено криву 4, яка представляє собою нормальний розподіл з $\bar{x} = 20$ і $s = \sqrt{2 \cdot 10}$, отриманий за допомогою функції **НОРМ.РАСП** з відповідними логічними значеннями.

χ^2 -розподіл має властивість адитивності, тобто, сума двох незалежних величин $\chi^2(v_1)$ і $\chi^2(v_2)$ розподіляється $\chi^2(v_1 + v_2)$.

Для визначення параметрів

χ^2 -розподілу в ПА MS Excel [25] використовуються статистичні функції **ХИ2.РАСП**, **ХИ2.РАСП.ПХ**, **ХИ2.ОБР** і **ХИ2.ОБР.ПХ** (див. Додаток А).




Рис. 3.20 – Криві розподілу χ^2 -квадрат **ХИ2.РАСП**:

а – щільність (**ложь**); б – функція розподілу (**истина**)

1 – $v=1$; 2 – $v=2$; 3 – $v=4$.

На рис. 3.20, а) і б) показані три криві χ^2 -розподілу, отримані функцією **ХИ2.РАСП** — щільності і інтегральних для ступенів вільності $v=1$, $v=2$ і $v=4$, отримані відповідно для логічних значень **ложь** і **истина**, а на рис. 3.21 — для **ХИ2.РАСП.ПХ**.




Рис. 3.21 – Криві розподілу χ^2 **ХИ2.РАСП.ПХ**:

1 – $v=1$; 2 – $v=2$; 3 – $v=4$.

На рис. 3.22 а) і б) представлена зміна значень оберненої функції χ^2 -розподілу **ХИ2.ОБР** і **ХИ2.ОБР.ПХ** у залежності від прийнятого рівня значущості α при прийнятих ступенях вільності.

Використання функції пакету Excel **ХИ2.ОБР.ПХ** і **ХИ2.РАСП.ПХ** наведені на полі табл. 6.2 (с. 308).




Рис. 3.22 – Криві оберненого розподілу χ^2 -квадрат **ХИ2.ОБР** і **ХИ2.ОБР.ПХ**:

1 – $v=1$; 2 – $v=2$; 3 – $v=4$.

3.2.8. Закон розподілу Вейбулла–Гніденка

Двопараметричний розподіл Вейбулла (Вейбулла–Гніденка) широко використовується в статистичній теорії надійності. Цьому розподілу, який є проміжним між нормальним і експонентним, підпорядковується тривалість напрацювання до відмови через різні експлуатаційні явища (знос, старіння, перевантаження) електронних приладів (електродних ламп, напівпровідникових приладів), шарикопідшипників, та ін., які не підлягають ремонту. Розподіл характеризується різноманіттям форм кривих [2, 79].

Крива розподілу щільності ймовірності для випадкової величини x для двопараметричного розподілу виражається формулою

$$f_{k,\lambda}(x) = \begin{cases} \frac{k}{\lambda} \cdot \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} \cdot e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad (3.68)$$

Функція розподілу ймовірності має вигляд

$$F_{k,\lambda}(x) = 1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}, \quad (3.69)$$

де λ – коефіцієнт масштабу, $\lambda > 0$;

k – коефіцієнт форми, $k > 0$.

Імовірність безвідмовної роботи

$$P(x) = 1 - F_{k,\lambda}(x) = e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}. \quad (3.70)$$

Коефіцієнт масштабу λ характеризує ступінь розтягнутості кривої по осі x і пов'язаний з середнім значенням випадкової величини часу. Коефіцієнт форми k визначає вигляд кривої щільності — її асиметрію і експес.

Інтенсивність відмов $h(x)$ і середня тривалість напрацювання $\lambda(x)$ на відмову визначаються виразами (3.71) і (3.72) [81]

$$h(x) = \frac{k}{\lambda} \cdot \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1}; \quad (3.71)$$

$$\lambda(x) = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\lambda^{1/k}}. \quad (3.72)$$

Гама–відсоткове напрацювання до відмови

$$t_\gamma = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{k} + 1\right)}{\lambda^{\frac{1}{k}}} k \sqrt{-\ln\left(\frac{\gamma}{100}\right)} = \lambda(x) \cdot Z_\gamma, \quad (3.73)$$

де Z_γ – квантиль розподілу функції Вейбулла–Гніденка [81].

Математичне сподівання $M(x)$, чи середнє \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 , СКВ s та коефіцієнт варіації V розраховуються за формулами

$$\bar{x} = \lambda \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right); \quad (3.74) \quad s^2 = \lambda^2 \left[\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right]; \quad (3.75)$$

$$s = \lambda \sqrt{\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right)}; \quad (3.76) \quad V = \sqrt{\frac{\Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right)} - 1}. \quad (3.77)$$

Коефіцієнти асиметрії As і ексцесу γ_{Ex} відповідно становлять

$$As = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right) - 3 \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right) + 2 \cdot \Gamma^3\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right]^2}, \quad (3.78)$$

$$Ex = \frac{\Gamma\left(1 + \frac{4}{k}\right) - 4 \cdot \Gamma\left(1 + \frac{3}{k}\right) \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{k}\right) \right]^2} + \frac{6 \cdot \Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) \cdot \Gamma^3\left(1 + \frac{1}{k}\right) - 3 \cdot \Gamma^4\left(1 + \frac{1}{k}\right)}{\left[\Gamma\left(1 + \frac{2}{b}\right) - \Gamma^2\left(1 + \frac{1}{b}\right) \right]^2}. \quad (3.79)$$

Мода при $k > 1$ і медіана розраховується за відповідними виразами

$$Mo = \lambda \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)^{1/k}; \quad (3.80) \quad Me = \lambda \cdot (\ln 2)^{1/k}. \quad (3.81)$$

При $k=1$ розподіл Вейбулла переходить в експонентний (див. підрозділ **3.2.9 Показниковий (експоненціальний) розподіл**), де $Exp(\lambda) \equiv W(1/\lambda, 1)$, з параметром λ , а при $k=2$ — в розподіл Релея (див. підрозділ **3.2.10 Розподіл Релея**).

Для визначення параметрів розподілу Вейбулла в MS Excel [25] використовуються статистичні функції з синтаксисом **ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х, альфа, бета, інтегральная)**, див. Додаток А. Її параметри розподілу **Альфа** і **Бета** відповідають k і λ .




Рис. 3.23 – Криві розподілу Вейбулла **ВЕЙБУЛЛ.РАСП**:
а – щільність (**ложь**); б – функція розподілу (**истина**)

1 – $\lambda=2, k=1$; 2 – $\lambda=3, k=2$; 3 – $\lambda=2, k=3$; 4 – $\lambda=3, k=4$.

На рис. 3.23, а) і б) показані три криві розподілу Вейбулла, отримані функцією **ВЕЙБУЛЛ.РАСП** відповідно для логічних значень **ложь** і **истина** — щільності і інтегральних для різних коефіцієнтів масштабу λ і щільності k : 1 — при $\lambda=2, k=1$; 2 — при $\lambda=3, k=2$; 3 — при $\lambda=2, k=3$ і 4 — при $\lambda=3, k=4$.

Приклад 1. Наробіток приладу підпорядковується розподілу Вейбулла з параметрами $\lambda=2$ год. і $k=3$.

Визначити середнє, медіану і моду розподілу та ймовірність розташування наробітку приладу в інтервалі між 5 і 6 годинами.

Рішення. Виконання розрахунку із застосуванням пакету програм MS Excel. представлено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Приклад застосування розподілу Вейбулла

	А	В	С
1	Показник		Значення
2	Коефіцієнт масштабу, λ		2
3	Коефіцієнт форми, k		3
4	Межа інтервалу	Верхня	6
5		Нижня	5
6	Математичне очікування		1.786
7	Медіана розподілу $C7=C2*((LN(2))^{(1/C3)})$		1.770
8	Мода розподілу $C8=C2*(1-1/C3)^{(1/C3)}$		1.747
9	Ймовірність розташування наробки		4.386E-02

$C6=C2*EXP(ГАММАНЛОГ(1+1/C3))$

$C9=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(C4;C2;C3;ИСТИНА)-ВЕЙБУЛЛ.РАСП(C5;C2;C3;ИСТИНА)$

Варто звернути увагу що при розрахунку математичного сподівання $M(x)$, яке виконується за формулою (3.75) з використанням гама-функції Ейлера, застосований підхід, описаний на с. 152.

Приклад 2. Наробіток приладу підпорядковується розподілу Вейбулла з параметрами розподілу $\lambda=200$ год. і $k=3$ [81].

Визначити ймовірність безвідмовної роботи за період $t=100$ год., щільність розподілу в точці $x=100$ год. і інтенсивність відмов в цій точці.

Рішення. Знаходимо $x/\lambda=100/200=0.5$.

1) За табл. В.11 для цього значення і $k=3$ одержуємо, що ймовірність безвідмовної роботи за період $x=100$ год. становить $P_{(100)}=0.8825$.

2) За табл. В.12 для цього значення і $k=3$ визначаємо щільність розподілу в точці $x=100$ год. $T_f(x)=0.6619$.

Звідси $f_{(100)}=0,6619/200=0.0033$.

3) За табл. В.13 визначаємо $T_\lambda(x)=0.7500$.

Звідси інтенсивність відмов у заданій точці $x=100$ год. дорівнює $h(x)=0.7500/200=0.00375$ год.⁻¹.

Інтенсивність відмов у заданій точці можна також обчислити за виразом (3.71).

Рішення цього прикладу з використанням відповідних статистичних формул пакету програм MS Excel і виразу (3.71) наведено в табл. 3.6.

Бачимо, що цей спосіб більш зручний порівняно з наведеним у [81].

Таблиця 3.6. Приклад застосування розподілу Вейбулла

	А	В	С
1	Задана точка x		100
2	Параметри розподілу	масштабу λ	200
3		форми k	3
4	Імовірність відмов		0.1175
5	Імовірність без відмов		0.8825
6	Щільність розподілу		0.00331
7	Інтенсивність відмов		0.00375

$C4=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(C1;C3;C2;ИСТИНА)$
 $C5=1-C4$ $C7=(C3/C2)*(C1/C2)^(C3-1)$
 $C6=ВЕЙБУЛЛ.РАСП(C1;C3;C2;ЛОЖЬ)$

3.2.9. Показниковий (експоненціальний) розподіл

Мають місце події, які на повсякденній мові можна назвати рідкісними. Якщо t – час між настаннями рідкісних подій, що відбуваються в середньому з інтенсивністю X , то величина T має експоненціальний розподіл з параметром λ (лямбда).

Експоненціальний розподіл часто використовується для опису інтервалів між послідовними випадковими подіями, наприклад, інтервалів між заходами на непопулярний сайт, так як ці відвідування є рідкісними подіями.

Цей розподіл має дуже цікаву властивість — відсутність післядії. Тобто, якщо розподіл між моментами настання деяких подій є показниковим, то

розподіл, відрахований від будь-якого моменту t до наступного події, також має показовий розподіл (з тим же самим параметром).

Іншими словами, для потоку рідкісних подій час очікування наступного відвідувача завжди розподілено показово незалежно від того, скільки часу ви його вже чекали.

Показниковий розподіл пов'язано з пуассоновими розподілом (див. підрозділ **3.3.2 Розподіл Пуассона**): у одиничному інтервалі часу кількість подій, інтервали між якими незалежні і показово розподілені, має розподіл Пуассона.

Показниковий розподіл також є частковим випадком розподілу Вейбулла (див. підрозділ **3.2.8 Закон розподілу Вейбулла–Гніденка**, зокрема с. 164) і записується у вигляді $W(\lambda)$, а якщо час не безперервний, а дискретний, то аналогом показового розподілу є геометричний розподіл.

Часто стосовно потоку подій функцію (3.82) називають **частотою відмов**. Показниковим (експоненціальний) називають розподіл ймовірностей, який описується диференціальною функцією

$$f_{\lambda}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} = \frac{1}{x_0} e^{-\frac{x}{x_0}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}. \quad (3.82)$$

де λ — постійна позитивна величина — параметр показникового розподілу, який виражає **інтенсивність** або **щільність** потоку подій (відмов).

Таким чином показниковий розподіл визначається одним параметром λ . Поряд з ним застосовують параметр x_0 — середній проміжок часу між моментами прояву двох суміжних подій (3.83)

$$x_0 = 1/\lambda. \quad (3.83)$$

Інтегральна функція показникового розподілу виражається залежністю і представляє собою імовірність того, що чергова подія відбудеться у проміжку часу від 0 до x

$$F_{\lambda}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{x}{x_0}} & \text{при } x \geq 0 \end{cases}. \quad (3.84)$$

Тому вираз (3.85)

$$P_{\lambda}(x) = e^{-\lambda x} = e^{-x/x_0} \quad (3.85)$$

означає відсутність події у проміжку часу від 0 до x [30, 64, 79].

Виникнення події у цей проміжок часу визначається з виразу (3.86)

$$Q_{\lambda}(x) = 1 - P_{\lambda}(x) = 1 - e^{-x/x_0}. \quad (3.86)$$

Гама-відсоткове напрацювання до відмови

$$t_{\gamma} = \frac{1}{\lambda} [-\ln(\gamma / 100)] = x_0 \cdot Z_{\gamma}, \quad (3.87)$$

де Z_{γ} – квантиль експоненціального розподілу [81].

Для визначення параметрів експоненціального розподілу в пакеті **Excel** [25] використовуються статистичні функції **ЭКСП.РАСП**. Вона повертає експоненціальний розподіл і використовується для моделювання тимчасових затримок між подіями, наприклад часу, який буде потрібно на доставку грошового переказу через автоматизовану банківську систему. Зокрема, за допомогою функції **ЭКСП.РАСП** можна визначити ймовірність того, що цей процес займе не більше 1 хвилини (див. Додаток А).

Графіки диференціальної та інтегральної функцій експоненціального розподілу для різних значень параметр розподілу λ , отриманих відповідно для логічних значень **ложь** і **истина**, зображені на рис. 3.24, а) і б).




Рис. 3.24 – Криві експоненціального розподілу **ЭКСП.РАСП**:

а – щільність розподілу (**ложь**);

б – функція розподілу (**истина**)

1 – $\lambda=0.02$; 2 – $\lambda=0.01$; 3 – $\lambda=0.005$; 4 – $\lambda=0.0025$; 5 – $\lambda=0.00125$.

Умовна ймовірність настання чергової події в проміжку часу $(x, x+dx)$ за умови його ненастання в проміжку $(0, x)$ дорівнює λdx . Безумовна ймовірність тієї ж події становить $f_\lambda(x)dx$.

Величини $f_\lambda(x)$ і $F_\lambda(x)$ пов'язані рівністю $\lambda = \frac{f_\lambda(x)}{1 - F_\lambda(x)}$.

Математичне сподівання $M(x)$, або середнє \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 , СКВ s відповідно становлять: $M(x) = x_0 = 1/\lambda$; $s^2 = x_0^2 = 1/\lambda^2$ і $s = x_0 = 1/\lambda$. Медіана і мода відповідно визначаються виразами $Me = \frac{\ln 2}{\lambda}$ і $Mo = 0$ [30]. коефіцієнт асиметрії $As = 2$, ексцес $Ex = 6$, коефіцієнт ексцесу $\gamma = 3$.

Приклад 1. Нехай час безвідмовної роботи технічного пристрою підпорядковується експоненціальному закону. Час між появою двох суміжних відмов, яке називається середнім часом безвідмовної роботи становить x_0 .

Потрібно визначити ймовірність безвідмовної роботи до моменту x_0 .

Рішення. З формули (3.85) випливає, що ймовірність безвідмовної роботи до моменту $x = x_0$ дорівнює $e^{-x/x_0} \Big|_{x=x_0} = e^{-1} = 0.3679$, причому ця ймовірність не залежить від того, скільки часу працював пристрій до моменту включення. Зазначена властивість середньоквадратичного відхилення, який підпорядковується експоненціальному розподілу, пов'язана з відсутністю післядії в найпростіших потоках [30].

Приклад 2. Визначити кількісні характеристики надійності віялки за період на $t = 10$ год. при $t_{cp} = 62$ год., якщо відомо, що напрацювання на відмову підпорядковується експоненціальним законом.

Рішення. Інтенсивність відмов обчислюють за формулою (3.83) :

$$\lambda = 1/t_{cp} = 1/62 = 0,016 \text{ год.}^{-1}.$$

Ймовірність безвідмовної роботи верстата обчислюють за формулою (3.85):

$$P_{(10)} = e^{-10/62} = e^{-0.161} = 0.85.$$

Ймовірність відмови знаходять за формулою (3.86):

$$Q_{(10)} = 1 - 0,85 = 0,15.$$

3.2.10. Розподіл Релея

Закон Релея може бути застосований при дослідженні надійності виробів, що мають елементи з вираженим ефектом старіння.

Цей розподіл зустрічається у ряді практичних ситуаціях. Спочатку цю щільність ймовірностей використовували при розгляді обвідної суми ряду гармонійних коливань різної частоти. Вона також зустрічається при пристрій-

лювання гармат, ракет і іншої вогнепальної і метальної зброї, якщо розкид (відхилення від цілі) в кожному з двох взаємно перпендикулярних напрямків незалежні і розподілені за нормальним законом.

Таким чином, якщо початок прямокутної системи координат вважати ціллю, а розкид по осях позначити через X і Y , то промах, який представляє собою випадкову величину R , буде виглядати як $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$.

Якщо X і Y — незалежні гаусові випадкові величини (нормальний розподіл) з нульовими математичними очікуваннями і однаковими дисперсіями s^2 , то щільність ймовірностей для випадкової величини R записується у вигляді (3.88)

$$f_R(x) = \begin{cases} \frac{x}{s^2} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{s}\right)^2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad (3.88)$$

де s — середньоквадратичний відхил (параметр розподілу).

Це і є щільність розподілу ймовірностей Релея, графік якої для різних значень дисперсії s^2 показаний на рис. 3.25 [81].

Слід звернути увагу на те, що максимум цієї функції відповідає СКВ, і що вона несиметрична щодо цього значення.

Математичне сподівання $M(x)$, чи середнє \bar{x} випадкової величини, розподіленої за законом Релея, тобто, середнє напрацювання на відмову (середній ресурс, середній термін служби, середній час відновлення працездатного стану) визначається наступним рівнянням

$$\bar{x} = \int_0^{\infty} x \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{s}\right)^2} dx = s \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \quad (3.89)$$

а середній квадрат має вигляд

$$\bar{x}^2 = 2s^2. \quad (3.90)$$

При цьому дисперсія $D(x)$, тобто s^2 та СКВ s випадкової величини R дорівнює

$$s_x^2 = (2 - \pi/2)s^2 \approx 0.429s^2; \quad (3.91) \quad s_x = s \cdot \sqrt{2 - \pi/2} \approx 0.655s \quad (3.92)$$

Коефіцієнт варіації V розраховуються за формулою

$$V = \sqrt{\frac{4 - \pi}{\pi}}; \quad (3.93)$$

Коефіцієнти асиметрії As і ексцесу γ_{Ex} відповідно становлять

$$As = \frac{2\sqrt{\pi}(\pi - 3)}{\sqrt{(4 - \pi)^2}}, \quad (3.94) \quad \gamma_{Ex} = -\frac{6\pi^2 - 24\pi + 16}{(4 - \pi)^2}. \quad (3.95)$$

Мода Mo і медіана Me розраховується за відповідними виразами

$$Mo = \sigma; \quad (3.96) \quad Me = \sigma\sqrt{\ln(4)} \approx 1.177\sigma. \quad (3.97)$$

Слід звернути увагу, що отримане значення дисперсії відрізняється від дисперсії s^2 випадкових величин розподілу Гауса, з яких отримана розглянута релейська величина. На відміну від гаусових випадкових величин, для випадкової величини, розподіленої за законом Релея, і математичне очікування і дисперсія залежать від одного і того ж параметра s^2 , в результаті чого вони не можуть змінюватися незалежно один від одного.

Функція розподілу ймовірностей для розподілу Релея знаходиться безпосередньо з відповідної щільності ймовірностей, яка легко інтегрується.

Таким чином маємо (3.98)

$$F_R(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{\sigma}\right)^2} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}. \quad (3.98)$$


Імовірність безвідмовної роботи визначається з рівняння

$$P_R(x) = e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{s}\right)^2}. \quad (3.99)$$

Інтенсивність відмов

$$\lambda(x) = \frac{1}{s^2}. \quad (3.100)$$

Гамма-процентні напрацювання до відмови (на відмову)



$$t_{\gamma} = \sqrt{2s^2[-\ln(\gamma / 100)]} = s \cdot Z_{\gamma}, \quad (3.101)$$

де Z_{γ} – квантиль розподілу.

Графіки залежностей основних показників подано на рис. 3.25 [81].

Імовірність влучення в круг, центр якого не збігається з центром розсіювання, зручно обчислювати в полярних координатах (r, φ) з початком в центрі круга (r – промах, φ – напрямок промаху). При круговому розсіюванні всі напрямки головні, декартову систему координат можна орієнтувати так, щоб центр розсіювання знаходився на осі OX . Тоді параметрами розсіювання декартових координат (X, Y) будуть $m_x = -d$, $m_y = 0$, $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$, де d – зміщення центру кола від центру розсіювання

$$f(r, \varphi) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2 + d^2}{2\sigma^2} - \frac{rd}{\sigma^2} \cos \varphi}. \quad (3.102)$$

Щільність розподілу промахів R отримується інтегруванням спільної щільності по всіх можливих значеннях Φ :

$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2 + d^2}{2\sigma^2}} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{rd}{\sigma^2} \cos \varphi} d\varphi. \quad (3.103)$$

Якщо зсув відсутній ($d=0$), промахи підкоряються закону Релея. У загальному випадку розподіл відрізняється від закону Релея множителем

$$I_0\left(\frac{r}{\sigma}, \frac{d}{\sigma}\right) = e^{-\frac{d^2}{2\sigma^2}} \int_0^{2\pi} e^{-\frac{rd}{\sigma^2} \cos \varphi} d\varphi. \quad (3.104)$$

Є таблиці функції нецентрального розподілу Релея (табл. В.14) за допомогою яких обчислюють ймовірність попадання в зміщений круг [90]

$$P((X-d)^2 + Y^2 \leq r^2) = F_R(r, d) = W(r/\sigma, d/\sigma). \quad (3.105)$$

Приклад. Розглянемо стрільбу з лука по мішені діаметром 60.8 см, з центром якої збігається початком прямокутної системи координат. Середні квадратичні відхили розкиду по абсцисі і ординаті однакові і рівні 7.6 см, тобто $s_x = s_y = 7.6$ см.

Рішення. Так як статистичні формули розрахунку функцій Релея відсутні ПА **MS Excel**, виконуємо розрахунки за наведеними вище формулами (звісно використовуючи при цьому **MS Excel**).

Якщо прийняти, що випадкові величини розподілені за нормальним законом, то відстань від точки попадання стріли до центру мішені (відхилення розкиду) буде випадковою величиною з розподілом Релея, щільність ймовірності, яка визначається за допомогою виразу (3.88)

$$f_R(x) = 7.6^{-2} x \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x}{7.6}\right)^2}.$$

Відстані від нього до точок попадання стріл — це випадкові величини, що мають X і Y ортогональні складові (випадковий вектор).

Математичне очікування розкиду, визначене за виразом (3.119), становить $R = 7.6 \times \sqrt{\pi/2} = 9.6$ см, а середній квадратичний відхил, згідно (3.121), дорівнює $s_R = \sqrt{0.492 \times 7.6} = 5$ см.

За допомогою функції розподілу ймовірностей знайдемо ймовірність промаху по мішені (3.98)

$$P_{\text{промах}} = 1 - F_R(30.4) = \exp\left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{30.4}{7.6}\right)^2\right] = e^{-8} = 0.000335.$$

Аналогічно, прийнявши діаметр яблучка мішені рівним 5.08 см, знайдемо, що ймовірність попадання в нього становитиме

$$P_{\text{попадання}} = F_R(30.4) = 1 - \exp\left[-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{30.4}{7.6}\right)^2\right] = 0.0540.$$

Очевидно, лучник з цього прикладу не дуже досвідчений, хоча майже всі його стріли і потрапляють в мішень.

При застосуванні калькулятора ППП **Statistica** для оцінки розподілу Релея у меню **Statistics** / **Анализ** вибираємо модуль **Probability Calculator** / **Калькуляторы** і далі **Distributions...** / **Распределения**. Виникає панель **Probability Distribution Calculator** / **Вероятностный калькулятор распределений**, де вибирається вид розподілу **Rayleigh** / **Релея** (1) (рис. 3.26).

Параметрами у цьому діалозі є середньоквадратичний відхил (параметр розподілу) s , який вноситься в поле **scale** / **масштаб** (2). В поле **Релея** / **R** (3) вводиться значення випадкової величини R . Так у першому випадку (рис. 3.26, а) розглядається імовірність промахів (подія не відбувається), то застосовуємо ☒ **(1-Cumulative p)** / ☒ **(1 - Ф.р.)** (4). Натиснувши кнопку **Compute** / **Вычислить** (5) отримуємо результатом p – рівень довіри промахів (6), який становить $p=0.000335$.




Рис. 3.26 – Розрахунок значень релейського розподілу ймовірностей:
а – для радіусу 30.4 см; б – для радіусу 2.54 см.


У другому випадку (рис. 3.26, б) розглядається імовірність попадання (подія відбувається), тому застосовуємо ☐ **(1-Cumulative p)** / ☐ **(1 - Ф.р.)** (4). У результаті подальших дій отримуємо результатом p – рівень довіри попадань (6), який становить $p=0.054317$.

Обидва отримані результати співпадають з результатами розрахунку за формулами.

Задіявши опцію ☒ **Inverse** / ☒ **Обратная ф.р.** можна розрахувати R за заданим параметром розподілу s і рівнем значущості p . Наприклад, щоб цей лучник допустив лише 0.05 промахів мішень повинна мати радіус 18.6 см.

3.2.11. Розподіл Коші

У цього розподілу іноді не існує середнього значення (математичного очікування) і дисперсії, так як щільність його дуже повільно прямує до нуля при збільшенні x по абсолютній величині. Також не визначені і його моменти старших порядків. Іноді кажуть, що математичне очікування не визначене, а дисперсія нескінченна.



Такі розподілу називають розподілами з важкими хвостами (рис. 3.27).

Такі розподілу називають розподілами з важкими хвостами (рис. 3.27).

Розподіл Коші, який у фізиці він називається розподілом Лоренца і розподілом Брейта–Вігнера є абсолютно безперервним.

Цим розподілом характеризується довжина відрізка, що відсікається на осі абсцис прямий, закріпленої в точці на осі ординат, якщо кут між прямою і віссю ординат має рівномірний розподіл на інтервалі $(-\pi; \pi)$ (тобто напрямком прямої ізотропно на площині).

У фізиці розподілом Коші (званим також формою Лоренца) описуються профілі рівномірно розширених спектральних ліній та амплітудно-частотні характеристики лінійних коливальних систем в околиці резонансних частот.

Розподіл унімодальний і симетричний щодо моди, яка одночасно є і медіаною, тобто $Mo = Me = x_0$, і для випадкової величини X задається щільністю $f_X(x)$, що має вигляд має

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{c}{c^2 + (x - x_0)^2} \quad (3.106)$$

де c – параметр масштабу, $c > 0$;

x_0 – параметр центру, який визначає також значення моди і медіани.

Якщо $x_0 = 0$ і $c = 1$, то такий розподіл називається стандартним розподілом Коші.

Інтеграл від щільності, тобто функція розподілу задається співвідношенням

$$F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{(x - x_0)}{c} \right). \quad (3.107)$$

Вона строго зростає і має зворотну функцію

$$F_X^{-1}(x) = x_0 + c \cdot \operatorname{tg} \left[\pi \left(x - \frac{1}{2} \right) \right]. \quad (3.108)$$

Це дозволяє генерувати вибірку з розподілу Коші за допомогою методу зворотного перетворення.

Розподіл Коші стійкий, зокрема, вибіркове середнє вибірки з стандартного розподілу Коші саме має стандартний розподіл Коші

Стандартний розподіл Коші є окремим випадком розподілу Стюдента.

3.3. ДИСКРЕТНІ РОЗПОДІЛИ

3.3.1. Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)

Біноміальний розподіл є найбільш важливим дискретним розподілом, яке зосереджено всього лише в кількох точках. Цим точкам біноміальний розподіл **приписує позитивні ймовірності**. Таким чином, біноміальний розподіл відрізняється від безперервних розподілів (див. підрозділ **3.2 Безперервні розподіли**), які приписують нульові ймовірності окремо обраним точкам і називаються безперервними.

Він використовується для опису розподілу біноміальних (альтернативних) подій, таких, наприклад, як кількість чоловіків і жінок в випадково обраних компаніях. Особливу важливість має застосування біноміального розподілу в ігрових завданнях.

Біноміальний розподіл проявляється відносно n незалежних випробувань коли можливі тільки два результати: поява чи не поява випадку. За умови, що в кожному випробуванні ймовірність p появи цієї події постійна, її не поява характеризується також постійною ймовірністю, рівною q , причому $q = 1 - p$. За цих умов, якщо очікувана подія у n випробуваннях з'явиться x разів, то протилежна — $n - x$ разів. Вірогідність, незалежно від того, у якому порядку ці події чергуються, виражається добутком $p^m q^{n-m}$ (за правилом множення ймовірностей)

$$f_{n,p}(x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot p^x (1-p)^{n-x}. \quad (3.109)$$

Ця формула (формула Бернуллі) дозволяє знаходити ймовірність того, що з n узятих навмання елементів виявиться x очікуваних [15].

Математичне сподівання $M(x)$, або середнє \bar{x} , дисперсія $D(x)$, тобто s^2 , СКВ s визначаються за відповідними формулами [30]

$$\bar{x} = np; \quad (3.110) \quad s^2 = np(1-p); \quad (3.111) \quad s = \sqrt{np(1-p)}. \quad (3.112)$$

Медіана розраховується за одним із виразів, поданих в (3.113), а мода — за одним із виразів, поданих в (3.114).

$$Me = \{\lfloor np \rfloor - 1, \lfloor np \rfloor, \lfloor np \rfloor + 1\}; \quad (3.113) \quad Mo = \lfloor (n+1)p \rfloor. \quad (3.114)$$

Коефіцієнт варіації V , асиметрії As , ексцесу Ex та коефіцієнту ексцесу γ_{Ex} відповідно становлять

$$V = \sqrt{\frac{1-p}{np}}; \quad (3.115) \quad As = \frac{1-2p}{\sqrt{np(1-p)}}; \quad (3.116)$$

$$Ex = 3 - \frac{6}{n} + \frac{1}{np(1-p)}; \quad (3.117) \quad \gamma_{Ex} = \frac{1-6p(1-p)}{np(1-p)}. \quad (3.118)$$

Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі) пов'язаний з розподіл Пуассона (див. підрозділ **3.3.2 Розподіл Пуассона**). Загалом наявна наступна закономірність: якщо за випробуванням Бернуллі n приймає великі значення, а ймовірність успіху p відносно мала, так що середнє число успіхів $\bar{x} = np$ і не мало і не велика, то розподіл Бернуллі з параметрами n і p можна замінити розподілом Пуассона з параметром $a = np$.

Для визначення параметрів розподілу в пакеті **Excel** [25] використовуються статистичні функції **БИНОМ.РАСП** і **БИНОМ.ОБР** (див. Додаток А).

На рис. 3.28 а) і б) подано п'ять кривих біноміального розподілу, отриманих функцією **БИНОМ.РАСП** — щільності і інтегральних для різних ймовірностей p при $n=10$, одержаних для логічних значень **ложь** і **истина**.

Графічно біноміальний розподіл представляє асиметричну криву, і асиметрія тим менше, чим більше різниця p наближається до 0.5; при $p < 0.5$ асиметрія позитивна. Зі зростанням p розподіл начебто розпливається по додатній напівосі і повільно наближається до нормального (див. підрозділ **3.2.3 Нормальний закон розподілу**), яким практично стає при $p=0.5$ (крива 3 на рис. 3.28).




Рис. 3.28 – Криві біноміального розподілу **БИНОМ.РАСП** при $n=10$:
а – щільність розподілу (**ложь**);
б – функція розподілу (**истина**)

1 – $p=0.1$; 2 – $p=0.25$; 3 – $p=0.5$; 4 – $p=0.75$; 5 – $p=0.9$;
6 – $n(5, \sqrt{2.5})$, $N(5, \sqrt{2.5})$.

На рис. 3.29 представлена зміна значень оберненої функції біноміального розподілу **БИНОМ.ОБР** у залежності від прийнятих ймовірностей p при $\alpha=0.05$.

Приклад розрахунку біноміального розподілу із застосуванням пакету **Excel** (табл. 3.7).

Імовірність запізнення кожного учня в школу становить $p=0.05$. Яка імовірність, що при кількості учнів $n=500$ запізняться шестеро ($m=6$)?




Рис. 3.29 – Криві оберненого біноміального розподілу **БИНОМ.ОБР** при $n=10$:

3 – $p=0.5$; 4 – $p=0.75$; 5 – $p=0.9$.

Таблиця 3.7. Приклад застосування біноміального розподілу

	А	В
1	Найменування	Значення
2	Імовірність події p	0.01
3	Кількість випробувань n	500
4	Прийняте число появ події x	6
5	Імовірність появ події $f(x)$	0.14696

B5=БИНОМ.РАСП(B4;B3;B2;ЛОЖЬ)

3.3.2. Розподіл Пуассона

Для визначення ймовірності x появ події в n незалежних випробуваннях використовують формулу Бернуллі, див. (3.109). Якщо ж n велике, то користуються асимптотичною формулою Лапласа. Однак, ця формула непридатна, якщо імовірність події мала

($p \leq 0,1$). У цих випадках коли n велике ($n \geq 100$), а p мале, наприклад, невелике число раз на 1000 або 10 000 звичайних явищ), то розподіл випадкової величини описується певним законом рідких подій, який виражається асимптотичною формулою Пуассона, яка дає добре наближення при досить великому n і малому p (наприклад, $n < 100$ і $a \approx n \cdot p < 10$).

Закон розподілу Пуассона застосовується для дослідження дискретних випадкових величин за умови, що події відбуваються незалежно один від одного з постійною середньою інтенсивністю за однакові проміжки часу. У практиці надійності до таких величинам відноситься число відмов виробу за фіксований проміжок часу.

Розподіл Пуассона є окремим випадком біноміального розподілу (див. підрозділ **3.3.1 Біноміальний розподіл (розподіл Бернуллі)**), коли в біномі $(p+q)^n$ значення p дуже мале, а q прямує до нескінченності, тому його іноді називають розподілом рідкісних подій.

Крім того розподіл Пуассона пов'язаний також з показниковим розподілом (див. підрозділ **3.2.9 Показниковий (експоненціальний) розподіл**).

Прикладами змінних, розподілених за законом Пуассона, можуть слугувати: число нещасних випадків, число дефектів у виробничому процесі і т.п., також він широко використовується на практиці, наприклад, в картах контролю якості як розподіл рідкісних подій.

Ним виражається ймовірність того, що при дуже великому числі випробувань, в кожному з яких ймовірність події дуже мала, подія наступить рівно x раз. При цьому робиться допущення: добуток $n \cdot p$ зберігає постійне значення, а саме $a \approx n \cdot p$, тобто середнє число появ події в різних серіях випробувань (при різних значеннях n) залишається незмінним [34, 78, 79]

$$f_a(x) = \frac{a^x}{x!} \cdot e^{-a}. \quad (3.119)$$

де x – число рідкісних подій в кожній групі ($x=0, 1, 2, 3$ і т.д.);
 a – середнє число рідкісних подій на кожен велику групу, найбільш ймовірна частота очікуваної події $a \approx n \cdot p$.

Функція розподілу має вигляд

$$F(x) = \frac{\Gamma(x-1, a)}{x!}. \quad (3.120)$$

Якщо число подій має розподіл Пуассона, то інтервали між подіями мають експоненціальне або показовий розподіл.

При вираженні формули Пуансона не ймовірністю, а сподіванням абсолютної частоти f' прояву рідкої події, їй надають вигляду

$$f' = n \cdot \frac{\bar{x}^x}{x!} \cdot e^{-\bar{x}}. \quad (3.121)$$

Тут f' – теоретична ордината розподілу Пуассона, або сподівання випадків рідкої події у кожному окремо взятому класі випробувань — 1, 2, 3 і т.д.; \bar{x} – середнє число спостережуваних випадків (взяте замість a) [15].

Якщо в середньому в одиницю часу t настає λ відмов і $a = \lambda t$, то ймовірність появи в період t рівно x відмов може бути представлена у вигляді

$$f_t(x) = \frac{(\lambda t)^x}{x!} \cdot e^{-\lambda t}. \quad (3.122)$$

Якщо потік відмов є найпростішим, то прийняте вище припущення можна вважати достатньою мірою виправданим для періоду нормальної експлуатації. У цьому випадку $\lambda = 1/T_{\text{ср}} = \text{const}$, і тоді формулу можна представити у вигляді

$$f_t(x) = \frac{1}{x!} \cdot \left(\frac{t}{T_{\text{ср}}} \right)^x \cdot e^{-\frac{t}{T_{\text{ср}}}}. \quad (3.123)$$

де $T_{\text{ср}}$ – середній час безвідмовної роботи.

На підставі цього рівняння можна обчислити вірогідність появи у виробничій системі будь-якого числа відмов x від 0 до ∞ для заданого значення відносного часу $t/T_{\text{ср}}$.

Розподіл Пуассона визначається одним параметром — середнім $\bar{x} = a$, його дисперсія також дорівнює середньому, тобто $s^2 = a$ і $s = \sqrt{a}$ [30]. Медіана і мода відповідно становлять

$$Me \approx \lfloor a + 1/3 - 0.02/a \rfloor; \quad (3.124) \quad Mo = \lfloor a \rfloor. \quad (3.125)$$

Звідси випливає, що всі характеристики розподілу можна побудувати лише на підставі однієї вибіркової середньої.

Коефіцієнт варіації V , асиметрії As , ексцесу Ex та коефіцієнту ексцесу γ_{Ex} відповідно становлять

$$V = \sqrt{\frac{1}{a}}; \quad (3.126)$$

$$As = \sqrt{\frac{1}{a}}; \quad (3.127)$$

$$Ex = \frac{1}{a} + 3; \quad (3.128)$$

$$\gamma_{Ex} = \frac{1}{a}. \quad (3.129)$$

Розподіл Пуассона різко відрізняється від нормального, і для його опису не можуть бути використані методи, що застосовуються для характеристики сукупностей з нормальним розподілом частот. Тому в кожному випадку дискретного розподілу частот з різко вираженою асиметрією необхідно перевірити відповідність його теоретичного розподілу Пуассона. Така перевірка проводиться шляхом зіставлення емпіричного розподілу з теоретично очікуваним для кожної 0, 1, 2 і т.д. події [50].

Для визначення параметрів розподілу Пуассона в пакеті **Excel** [25] використовуються статистичні функції **ПУАССОН.РАСП** (див. Додаток А).




Рис. 3.30 – Криві розподілу Пуассона **ПУАССОН.РАСП**:

а – щільність (**ложь**); б – функція (**истина**)

1 – $a=1$; 2 – $a=10$; 3 – $a=20$; 4 – $a=30$; 5 – $a=50$;
6 – $a=75$; 7 – $a=100$; 8 – $N(50, \sqrt{50})$.

На рис. 3.30 а) і б) показані сім кривих розподілу Пуассона, отриманих цією функцією — щільності і інтегральних для різних значень середнього a , отриманих відповідно для логічних значень **ложь** і **истина**.

Графічно розподіл рідкісних подій представляє асиметричну криву, і асиметрія тим більше, чим менше ймовірність події, але зі збільшенням середнього a асиметрія зменшується — пік щільності розподілу зменшується і зміщується вправо, розподіл начебто розпливається по додатній напівосі і поволі наближається до нормального (див. підрозділ **3.2.3 Нормальний закон розподілу**) і при $p \leq 0,1$, тобто при $\bar{x} > 10$ практично не відрізняється від нього [50] (крива 5 на рис. 3.30).

Для порівняння червоним кольором на цьому рисунку наведено криву 8, яка представляє собою нормальний розподіл з $\bar{x} = 50$ і $s = \sqrt{50}$, отриманий за допомогою функції **НОРМ.РАСП** з відповідними логічними значеннями.

Прикладами такого розподілу можуть служити кількість бур'янів в насінному зерні, народження чотирьох — шести близнюків [34].

Приклад 1. Імовірність запізнення учнів в школу підлягає розподілу Пуассона і становить $p=0.05$. Яка вірогідність, що при кількості учнів $n=500$ запізняться шестеро ($m=6$)?

Рішення наведене в табл. 3.8.

Таблиця 3.8. Приклад застосування розподілу Пуассона		
	А	В
1	Найменування	Значення
2	Імовірність події p	0.01
3	Кількість випробувань n	500
4	Число очукуваної події a	5
5	Прийняте число появ події x	6
6	Імовірність появ події $f(x)$	0.14622
$B4=B2*B3$ $B6=ПУАССОН.РАСП(B5;B4;ЛОЖЬ)$		

Приклад 2. У результаті експерименту, що складається з $N=520$ випробувань, в кожному з яких реєструвалося число x_i — появ деякої події, отримано наступне емпіричне розподіл (табл. 3.9).

Знайти вирівнювальні частоти n_v у припущенні, що випадкова величина (генеральна сукупність) розподілена згідно із законом Пуассона.

Рішення 2. Так як параметр λ , яким визначається розподіл Пуассона, дорівнює математичному очікуванню цього розподілу, і оскільки в якості оцінки математичного очікування приймають вибірккову середню, то і в якості оцінки λ , можна прийняти вибірккову середню, розрахувавши її як середньозважене. Таким чином для розрахунку використаємо формули середньозваженого (1.23) і для визначення імовірності — формули Пуансона (3.119).

Таблиця 3.9. Вирівнювання даних за розподілом Пуассона

	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	І
1	Спостережувані значення x	0	1	2	3	4	5	6	7
2	Емпірична частота n_e	120	167	130	69	27	5	1	1
3	Середнє x_{cp}	1.50							
4	Імовірність $P(x)$	0.2231	0.3347	0.2510	0.1255	0.0471	0.0141	0.0035	0.0008
5	Вирівнююча частота n_v	116	174	131	65	24	7	2	0

$$B3=(B1*B2+C1*C2+D1*D2+E1*E2+F1*F2+G1*G2+H1*H2+I1*I2)/СУММ(B2:I2)$$

$$B4=B3^B1*EXP(-B3)/ФАКТР(B1) \quad B5=B4*СУММ(B2:I2)$$

Вирівняні частоти знаходяться як добуток імовірності на обсяг вибірки і результати множення округлюються до цілих.

Порівняно невелике розходження емпіричних і теоретичних (вирівняних) частот підтверджує припущення, що розглядається розподіл підпорядковується закону Пуассона. Щоб перевірити це слід використовувати, наприклад, критерій Пірсона.

3.4. Зв'язок між окремими розподілами

На перший погляд може здатися, що всі розглянуті тут теоретичні розподілу абсолютно різні і не пов'язані між собою. Однак як показано вище, розподіл Пуассона (див. підрозділ **3.3.2 Розподіл Пуассона**) стає близьким до нормального (див. підрозділ **3.2.3 Нормальний закон розподілу**), коли виконується умова $x > 15$, t -розподіл Стюдента (див. підрозділ **3.2.5 Розподіл Стюдента**) також переходить наближається до нормального при $v > 30$ переходить в нього при $v \rightarrow \infty$.




Рисунок 3.31. Зв'язок між окремими теоретичними розподілами.

Подібні зв'язки існують також і між іншими розглянутими розподілами, вони схематично представлені на рис. 3.31.

Відомо, що спеціальні розподіли (t -розподіл Стюдента, F -розподіл Фішера, див. підрозділ, χ^2 -розподіл (див. підрозділи **3.2.5 Розподіл Стюдента**, **3.2.6 Розподіл Фішера (F-розподіл)** і **3.2.7 Хі-квадрат розподіл (χ^2 -розподіл Пірсона)**) представляють собою окремі випадки гаусового розподілу (див. підрозділ **3.2.3 Нормальний закон розподілу**) для виразно поставленого завдання і при обмеженому числі ступенів свободи [86].

4. ДВОМІРНІ РОЗПОДІЛИ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

4.1. ПОНЯТТЯ ПРО ДВОМІРНІ ВИПАДКОВУ ВЕЛИЧИНУ. ДВОМІРНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ

Поряд з одновимірними випадковими величинами, можливі значення яких визначаються одним числом, в теорії ймовірностей розглядаються і багатовимірні випадкові величини, які виникають коли випробування характеризується не однією випадковою величиною, а деякою їх системою. Таким чином випадковим вектором (n -мірної випадкової величини, системою n випадкових величин) називають упорядкований набір з n випадкових величин (X_1, X_2, \dots, X_n) [87].

Одновимірні випадкові величини X_1, X_2, \dots, X_n називаються *компонентами* або *складовими* n -мірної випадкової величини (X_1, X_2, \dots, X_n) . Їх можна розглядати як координати випадкової точки або випадкового вектора в просторі n вимірювань [88].

Системи випадкових величин можуть бути дискретними, безперервними і змішаними у залежності від типу випадкових величин, що утворюють систему. У першому випадку компоненти цих систем є дискретними випадковими величинами, у другому — безперервними випадковими величинами, в третьому — поєднанням випадкових величин різних типів.

Найбільш простий випадок це система, що складається з двох випадкових величин (двовимірної випадкової величини) .

Геометрично двовимірну випадкову величину (X, Y) можна представляти або як випадкову точку $M(X, Y)$ на площині (тобто як точку з випадковими координатами), або як випадковий вектор [89].

4.2. ДВОМІРНА ФУНКЦІЯ РОЗПОДІЛУ

4.2.1. Властивості двовимірної функції розподілу

Універсальної формою завдання двовимірної випадкової величини є функція розподілу (або “інтегральна функція”).

Функцією розподілу двовимірної випадкової величини (X, Y) називають ймовірність спільного виконання двох нерівностей $\{X < x\}$ і $\{Y < y\}$ [88]

$$F(x, y) = P\{X < x; Y < y\}. \quad (4.1)$$

Функція розподілу — найбільш універсальна форма закону розподілу і може бути використана для опису як безперервних, так і дискретних двовимірних випадкових величин.

Її геометрична інтерпретація — якщо двовимірну випадкову величину (X,Y) розглядати як випадкову точку в прямокутній декартовій системі координат, то функція розподілу $F(x,y)$ є ймовірність попадання випадкової точки (X,Y) у нескінченний квадрант з вершиною в точці (x,y) , що лежить лівіше і нижче її (рис. 4.1, а).

Аналогічно функція розподілу першої компоненти X випадкового вектора $F_1(x)$ являє собою ймовірність попадання випадкової точки в напівплощина, обмежену праворуч абсцисою x (рис. 4.1, б); функція розподілу величини Y — $F_2(y)$ — ймовірність попадання в напівплощина, обмежену зверху ординатою y (рис. 4.1, в)




Рис. 4.1. Геометрична інтерпретація розподілу двовимірної випадкової величини (X,Y) :

- а – функції розподілу двовимірної випадкової величини;
- б – функції розподілу першої компоненти $F_1(x)$;
- в – функції розподілу другої компоненти $F_2(y)$.

Властивості двовимірної функції розподілу:

1. $0 \leq F(x,y) \leq 1$ — так як це ймовірність.
2. $F(x,y)$ є неубуваюча функція своїх аргументів, тобто

$$F(x_2, y) \geq F(x_1, y) \quad \text{при } x_2 > x_1; \quad (4.2)$$

$$F(x, y_2) \geq F(x, y_1) \quad \text{при } y_2 > y_1. \quad (4.3)$$

3. Якщо хоча б один з аргументів перетворюється в $-\infty$, то функція розподілу $F(x, y)$ дорівнює нулю

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0.$$

4. Якщо обидва аргументи перетворюється в $+\infty$, то функція розподілу $F(x, y)$ дорівнює нулю

$$F(+\infty, +\infty) = 1.$$

5. Якщо один з аргументів, що дорівнює $+\infty$, функція розподілу двовимірного вектору перетворюється в функцію розподілу компоненти, відповідної іншому аргументу [78, 88]

$$F(x, \infty) = p(X < x, Y < \infty) = p(X < x) = F(x); \quad (4.4)$$

$$F(\infty, y) = p(X < \infty, Y < y) = p(Y < y) = F(y). \quad (4.5)$$

4.2.2. Імовірність влучення випадкової точки у напівсмугу і прямокутник

Використовуючи функцію розподілу системи випадкових величин X і Y , знайдемо ймовірність того, що в результаті випробування випадкова точка потрапить у напівсмугу $x_1 < X < x_2$ і $Y < y$ (рис. 4.2) [78]




Рисунок 4.2. Імовірність влучення в область напівсмуги.

$$p\{x_1 < X < x_2, Y < y\} = p(x < x_2, Y < y) - p\{X < x_1, Y < y\} = F(x_2, y) - F(x_1, y).$$

Аналогічно,

$$p\{X < x, y_1 < Y < y_2\} = F(x, y_2) - F(x, y_1).$$

Таким чином, ймовірність попадання випадкової точки у напівсмугу дорівнює приросту функції (x, y_1) розподілу по одному з аргументів.

Ймовірність влучення в прямокутну область (рис. 4.3)

$$p(x_1 \leq X \leq x_2; y_1 \leq Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1). \quad (4.6)$$

Приклад 2. Знайти ймовірність попадання випадкової точки (X, Y) в прямокутник, обмежений прямими $x_1 = \pi/6 = 0.524$; $x_2 = \pi/2 = 1.571$; $y_1 = \pi/4 = 0.785$; $y_2 = \pi/3 = 1.047$, для функції, представленої виразом $F(x, y) = \sin(x) \cdot \sin(y)$ ($0 \leq x < \pi/2$; $0 \leq y < \pi/2$) (рис. 4.3) [78].

Рішення. Розрахунки виконані “вручну” за формулою (4.6) наведені нижче, і використанням MS Excel — в табл. 4.1.




Рис. 4.3. Імовірність влучення у прямокутну область.

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4} < y < \frac{\pi}{3}\right) &= [F\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}\right) - F\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)] - [F\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right) - F\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)] = \\ &= \left[\sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{3} - \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{3}\right] - \left[\sin\frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{4} - \sin\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{4}\right] = \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{(\sqrt{3} - \sqrt{2})}{4}. \end{aligned}$$

Таблиця 4.1. Розрахунок попадання точки у прямокутник

	A	B	C	D	E	F	G
1		Координата		Функція			
2		x	y	X		Y	
3	1	0.524	0.785	1	0.500	1	0.707
4	2	1.571	1.047	2	1.000	2	0.866
5				P(X,Y)= 0.0795			

E3=SIN(B3)

E4=SIN(B3)

G3=SIN(C3)

G4=SIN(C4)

G5=E4*G4+E3*G3-E3*G4-G3*E4

4.2.3. Матриця розподілу двовимірної випадкової величини

Двовимірна випадкова величина (X, Y) є дискретною, якщо безлічі значень її компонент ΩX і ΩY є рахункові безлічі. Для опису імовірнісних характеристик таких величин використовується двовимірна функція розподілу і матриця розподілу.

Закон розподілу дискретної двовимірної випадкової величини (X, Y) задається матрицею розподілу у вигляді прямокутної таблиці з подвійним входом, яка задає перелік можливих значень кожного компонента і ймовірності твори подій (табл. 4.2) [78, 88].

Таблиця 4.2. Табличне представлення закону розподілу

X	Y					
	y_1	y_2	...	y_j	...	y_m
x_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_1, y_2)$...	$p(x_1, y_j)$...	$p(x_1, y_m)$
x_2	$p(x_2, y_1)$	$p(x_2, y_2)$
...
x_i	$p(x_i, y_1)$	$p(x_i, y_j)$
...
x_n	$p(x_n, y_1)$	$p(x_n, y_m)$

У чарунках на перетині рядка x_i і стовпця y_j указана імовірність $p(x_i, y_j)$ того, що двовимірна випадкова величина (X, Y) набуде значення (x_i, y_j) .

Властивості матриці розподілу ймовірностей:

1. Так як події $\{X=x_i; Y=y_j\}$, $i = \overline{1, n}$ і $j = \overline{1, m}$ утворюють повну групу подій, то сума ймовірностей у всіх чарунах таблиці дорівнює одиниці

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p_{ij} = 1. \quad (4.7)$$

2. Перехід до ряду розподілу ймовірностей складової X

$$p_i = p(X = x_i) = \sum_{j=1}^m p_{ij}, \quad i=1, \dots, n. \quad (4.8)$$

3. Перехід до ряду розподілу ймовірностей складової Y

$$p_j = p(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n p_{ij}, \quad j=1, \dots, m. \quad (4.9)$$

Приклад 3. Якість продукції характеризується двома випадковими величинами: X і Y . Закон розподілу випадкового вектора (X, Y) представлений в табл. 4.3 [78, 87].

Таблиця 4.3. Табличне представлення закону розподілу

X	Y				p_i
	0	0.1	0.2	0.3	
5	0.2	0.1	0.05	0.05	0.4
6	0	0.15	0.15	0.1	0.4
7	0	0	0.1	0.1	0.2
p_j	0.2	0.25	0.3	0.25	$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

Рішення. Знайдемо закон розподілу координат X і Y випадкового вектора. Імовірність події є сума ймовірностей, що знаходяться в i -му рядку. Ймовірності знаходяться в останньому стовпчику табл. 4.3.

Ряд розподілу випадкової величини X має вигляд (табл. 4.4)

Таблиця 4.4. Розподіл випадкової величини X

x_i	5	6	7
p_i	0.4	0.4	0.2

Ряд розподілу Y знаходимо, обчислюючи суми елементів стовпців табл. 4.3. Ці ймовірності знаходяться в її останньому рядку.

Ряд розподілу випадкової величини Y має вигляд (табл. 4.5)

Таблиця 4.5. Розподіл випадкової величини Y

y_j	0	0.1	0.2	0.3
p_j	0.2	0.25	0.3	0.25

4.2.4. Щільність імовірності двомірної випадкової величини

4.2.4.1. Двомірна щільність розподілу і її властивості

Двомірна випадкова величина (X, Y) є безперервною, якщо її функція розподілу $F(x, y)$ є безперервною, диференційовану функцію по кожному з

аргументів і існує друга змішана похідна $\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$ [78, 87].

Розподіл багатовимірних безперервних випадкових величин зазвичай характеризується щільністю розподілу.

Щільністю розподілу двовимірної випадкової величини називають межу відношення ймовірності попадання випадкової величини в малий прямокутник до площі цього прямокутника, коли обидва його розміру наближаються до нуля (рис. 4.4).

Двовірна щільність розподілу $f(x,y)$ характеризує щільність ймовірності в околі точки з координатами (x,y) і дорівнює другій змішаній похідній функції розподілу

$$f(x,y) = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{p\{x \leq X < x + \Delta x\} \{y \leq Y < y + \Delta y\}}{\Delta x \Delta y} = \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y}. \quad (4.10)$$

Щільність розподілу двовимірної випадкової величини обчислюється як друга змішана часткова похідна від функції розподілу.

Геометрично $f(x,y)$ — це деяка *поверхня розподілу*, вона аналогічна кривій розподілу для одновимірної випадкової величини.

Аналогічно можна ввести поняття *елементу ймовірності* $f(x,y)dxdy$ (рис. 4.4). Ймовірність влучення значення двовимірної випадкової величини (X,Y) в довільну область D дорівнює сумі всіх елементів ймовірності для цієї області.




Рис. 4.4. Елемент імовірності

Приклад. Знайдіть щільність розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин (X,Y) по заданій функції розподілу [89]

$$F(x,y) = (1 - e^{-9x})(1 - e^{-3y}).$$

Рішення.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left((1 - e^{-9x})(1 - e^{-3y}) \right) \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial y} \left((1 - e^{-3y}) \cdot \frac{\partial}{\partial x} (1 - e^{-9x}) \right) = \frac{\partial}{\partial y} (9e^{-9x} \cdot (1 - e^{-3y})) = \\ &= 9e^{-9x} \cdot \frac{\partial}{\partial y} (1 - e^{-3y}) = 9e^{-9x} \cdot 3e^{-3y} = 9e^{-9x} \cdot 3e^{-3y} \end{aligned}$$

Використовуючи щільність розподілу, можна записати формулу для обчислення ймовірності потрапляння двовимірної випадкової величини (X,Y) в прямокутник D (рис. 4.3), обмежений прямими $x=x_1, x=x_2, y=y_1, y=y_2$ [89].

$$p\{(X,Y) \in D\} = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f(x,y) dx dy. \quad (4.11)$$

Властивості двомірної щільності [87–89]

1. Щільність розподілу двовимірного випадкового вектору є функція невід'ємна $f(x,y) \geq 0$.

2. Ймовірність влучення випадкової точки (X,Y) в область D дорівнює подвійному інтегралу від щільності по області D

$$p\{(X,Y) \in D\} = \iint_{(D)} f(x,y) dx dy. \quad (4.12)$$

3. Умова нормування. Подвійний невластний інтеграл в нескінченних межах від щільності ймовірності двовимірної випадкової величини дорівнює одиниці

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = 1. \quad (4.13)$$

4. Перехід до функції розподілу. Функція розподілу двовимірної випадкової величини виражається через щільність розподілу наступним чином

$$F(x,y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x,y) dx dy. \quad (4.14)$$

5. Перехід до одновимірних характеристик. Щільності розподілу компонент двовимірного випадкового вектору можуть бути отримані за формулами

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy. \quad (4.15)$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx. \quad (4.16)$$

Приклад. Двовимірний випадковий вектор (X, Y) заданий щільністю розподілу ймовірностей $f(x, y) = \frac{A}{(1+x^2)(1+y^2)}$.

Знайти: 1) A ; 2) $p\{0 < X < 1, 0 < Y < 2\}$; 3) $f_1(x)$ і $f_2(y)$ [89].

Рішення. 1) Постійну A знайдемо, використовуючи умову нормування

$$(4.13) \text{ маємо } A \int_{-\infty}^x \frac{dx}{1+x^2} \int_{-\infty}^y \frac{dy}{1+y^2} = 1.$$

$$\text{Звідки } A \cdot \arctg(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} \cdot \arctg(y) \Big|_{-\infty}^{\infty} = 1, \text{ тоді, } A \cdot \pi^2 = 1.$$

$$\text{Відповідно } A = \frac{1}{\pi^2}$$

2) Використовуючи формулу (4.11), знаходимо:

$$p\{0 < X < 1, 0 < Y < 2\} = \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \int_0^2 \frac{dy}{1+y^2} = \frac{(\arctg 2 - \arctg 0)}{4\pi} = 0.088104$$

3) Можна було спочатку за формулою (4.14) знайти функцію розподілу і потім скористатися формулою (4.6).

$$f_1(x) = \frac{1}{\pi^2(1+x^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{\pi(1+x^2)},$$

$$f_2(y) = \frac{1}{\pi^2(1+y^2)} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$$

4.2.5. Залежні і незалежні випадкові величини

Раніше було показано, як, знаючи закон розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин (двовимірний вектор), визначити закони розподілу окремих випадкових величин, що входять в систему (тобто компонент вектору).

Природно, виникає питання: чи не можна за законами розподілу ймовірностей окремих величин, що входять в систему, знайти закон розподілу системи? Виявляється, у загальному випадку цього зробити не можна. Це можна зробити тільки в тому випадку, коли випадкові величини X і Y незалежні.

Випадкові величини X і Y називаються незалежними, якщо події $\{X < x\}$ і $\{Y < y\}$ незалежні при будь-яких x і y . В іншому випадку величини називаються залежними [78, 89].

Тобто, величина X незалежна від величини Y , якщо її закон розподілу

не залежить від того, яке значення прийняла величина Y . Для незалежних величин виконується наступні співвідношення, т. е. критерії незалежності

$$F(x,y)=p(X<x,Y<y)=p(X<x)\cdot p(Y<y)=F_X(x)\cdot F_Y(y); \quad (4.17)$$

Таким чином для безперервних випадкових величин необхідною і достатньою умовою незалежності двох безперервних випадкових величин, що утворюють систему (X,Y) , є рівність

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y); \quad (4.18)$$

Для дискретних випадкових величин необхідною і достатньою умовою незалежності двох дискретних випадкових величин, що утворюють систему (X,Y) , є рівність

$$P_{ij}=p_i\cdot p_j. \quad (4.19)$$

У тому випадку, якщо критерії не виконуються хоча б в одній точці, величини X і Y є залежними. Для незалежних величин двовірні форми закону розподілу не містять ніякої додаткової інформації, крім тієї, яка міститься в двох одновірних законах.

Таким чином, в разі залежності величин X і Y перехід від двох одновірних законів до двовірним закону здійснити неможливо. Для цього тому треба визначити умовні закони розподілу [78, 89].

Приклад. Щільність розподілу системи неперервних випадкових величин (X,Y) має вигляд $f(x,y)=\frac{1}{\pi^2(x^2+y^2+x^2y^2+1)}$.

Визначити, залежні або незалежні випадкові величини X і Y [89].

Рішення. Розкладаючи знаменник на множники, отримуємо

$$f(x,y)=\frac{1}{\pi^2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\cdot\frac{1}{1+y^2}.$$

З того, що функція $f(x,y)$ розпадається на добуток двох функцій, з яких одна залежить тільки від x , а інша тільки від y , робимо висновок, що величини X і Y незалежні.

Приклад. Визначити, залежні або незалежні дискретні випадкові величини X і Y , якщо закон розподілу випадкового вектору (X,Y) представлений в табл. 4.3 на с. 189 [89].

Рішення. З табл. 4.3 маємо $p\{X=5,Y=0\}=0.2$; з табл. 4.4 маємо $p\{X=5\}=0.4$; з табл. 4.5 маємо $p\{Y=0\}=0.2$.

Оскільки, $p\{X=5,Y=0\}=0.2\neq p\{X=5\}\cdot p\{Y=0\}=0.08$ можна зробити висновок, що величини X і Y залежні.

Поняття незалежності можна узагальнити на випадок n величин. Випадкові величини X_1, X_2, \dots, X_n *називаються незалежними в сукупності (або взаємно незалежними)*, якщо події $\{X_1 < x_1\}, \{X_2 < x_2\}, \dots, \{X_n < x_n\}$ незалежні в сукупності (взаємно незалежні) при будь-яких (x_1, x_2, \dots, x_n) .

Необхідною і достатньою умовою взаємної незалежності n випадкових величин є рівність [48, 89]

$$F_{x_1, x_2, \dots, x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = F_{x_1}(x_1) \cdot F_{x_2}(x_2) \cdot \dots \cdot F_{x_n}(x_n); \quad (4.20)$$

для n безперервних випадкових величин

$$f_{x_1, x_2, \dots, x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{x_1}(x_1) \cdot f_{x_2}(x_2) \cdot \dots \cdot f_{x_n}(x_n). \quad (4.21)$$

4.2.6. Умовні закони розподілу

Умовним законом розподілу називається розподіл однієї випадкової величини, знайдене за умови, що інша випадкова величина прийняла певне значення.

Для того, щоб повністю описати систему, недостатньо знати розподіл кожної зі складових; потрібно ще знати залежність між величинами, які входять в систему. Ця залежність характеризується за допомогою *умовних законів розподілу* [48, 78, 89].

Відповідно до визначення умовних ймовірностей подій *), умовна ймовірність того, що випадкова величина X прийме значення x_i за умови $Y=y_j$, визначається рівністю при $i=1, 2, \dots, n$ і $j=1, 2, \dots, m$ [89]

$$p(x_i | y_j) = p\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{p\{X = x_i, Y = y_j\}}{p\{Y = y_j\}}, \text{ для } f_Y(y) \neq 0. \quad (4.22)$$

Сукупність ймовірностей (4.22), тобто $p(x_1 | y_j), p(x_2 | y_j), \dots, p(x_n | y_j)$, являє собою умовний закон розподілу випадкової величини X за умови $Y=y_j$.

Сума умовних ймовірностей $\sum_{i=1}^n p(x_i | y_j) = 1$.

Аналогічно визначаються умовна ймовірність і умовний закон розподілу випадкової величини Y за умови $X=x_i$ при $i=1, 2, \dots, n$ і $j=1, 2, \dots, m$ [89]

$$p(x_j|y_i) = p\{Y = y_j|X = x_i\} = \frac{p\{X = x_i|Y = y_j\}}{p\{X = x_j\}}, \text{ для } f_X(x) \neq 0. \quad (4.23)$$

Приклад. Нехай закон розподілу двовимірного випадкового вектору (X, Y) заданий табл. 4.3 на с. 189. Знайти умовний закон розподілу випадкової величини X при $Y=0.1$ [89].

Рішення. З урахуванням формули (4.22) маємо ⁵⁾

$$p\{X = 5|Y = 0.1\} = \frac{p\{X = 5, Y = 0.1\}}{p\{Y = 0.1\}} = \frac{0.1}{0.25} = 0.4;$$

$$p\{X = 6|Y = 0.1\} = \frac{p\{X = 6, Y = 0.1\}}{p\{Y = 0.1\}} = \frac{0.15}{0.25} = 0.6;$$

$$p\{X = 7|Y = 0.1\} = \frac{p\{X = 7, Y = 0.1\}}{p\{Y = 0.1\}} = \frac{0}{0.25} = 0$$

Таким чином, умовний закон розподілу випадкової величини X при $Y=0.1$ на основі табл. 4.3 представлено у табл.4.6 .

Таблиця 4.6. Умовний закон розподілу випадкової величини X при $Y=0.1$

X	5	6	7
$p_{Y=0.1}$	0.4	0.6	0

Порівнюючи знайдений умовний закон розподілу випадкової величини X з безумовним законом її розподілу (табл. 4.3 на с. 189), бачимо, що вони різні. Отже, випадкові величини X і Y знаходяться в ймовірнісній залежності.

Нехай тепер (X, Y) — безперервна двовимірна випадкова величина з щільністю $f(x, y)$; $f_1(x)$ і $f_2(y)$ — щільності розподілу відповідно випадкової величини X і випадкової величини Y [89].

Умовної щільності розподілу складової X за умови $Y=y$ називають відношення щільності спільного розподілу до щільності розподілу складової Y

⁵⁾ Значення $p\{Y=0.1\}=0.25$ взято з безумовного закону розподілу випадкової величини Y , наведеного в табл. 4.5 на стор. 190).

$$f_X(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_2(y)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dx}, \quad f_2(y) \neq 0. \quad (4.24)$$

Аналогічно визначається умовна щільність розподілу складової Y за умови $X=x$

$$f_Y(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_1(x)} = \frac{f(x,y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dy}, \quad f_1(x) \neq 0. \quad (4.25)$$

З (4.24) і (4.25) отримаємо

$$f(y,x) = f_2(y) \cdot f_X(x|y) = f_1(x) \cdot f_Y(y|x). \quad (4.26)$$

Таким чином, щільність розподілу системи двох безперервних випадкових величин дорівнює добутку щільності однієї складової на умовну щільність іншої складової.

Як і будь-яка щільність розподілу, умовні щільності мають наступні властивості [89]

$$\begin{aligned} f_X(x|y) &\geq 0, \quad f_Y(y|x) \geq 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x|y)dx &= 1, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y|x)dy = 1 \end{aligned} \quad (4.27)$$

Приклад. Безперервний вектор (X,Y) рівномірно розподілений в колі з радіусом 1, тобто $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & \text{якщо } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{якщо } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$.

Знайти умовні щільності розподілу компонент цього вектора [89].

Рішення. Умовну щільність складової X при $|x| \leq \sqrt{1-y^2}$ знайдемо за формулою (4.24)

$$f_2(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) = \frac{1}{\pi} \cdot \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2};$$

$$f_X(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_2(y)} = \frac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2}} = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-y^2};$$

Так як $f(x,y)$ при $x^2+y^2>1$, то $f(x|y)=0$ при $|x| \leq \sqrt{1-y^2}$.

Аналогічно знаходимо

$$f_1(x) = \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2}, \quad f_Y(y|x) = \frac{2}{\pi} \cdot \sqrt{1-x^2} \quad \text{при } |y| \leq \sqrt{1-x^2}.$$

Отже, шукані умовні щільності розподілу складових системи (X,Y) мають вигляд

$$f_X(x|y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, & \text{якщо } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{якщо } x^2 + y^2 > 1 \end{cases};$$

$$f_Y(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}, & \text{якщо } x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{якщо } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}.$$

Для незалежних випадкових величин умовна щільність розподілу збігається з безумовною щільністю розподілу. Дійсно [89]

$$f_X(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_2(y)} = \frac{f_1(x) \cdot f_2(y)}{f_2(y)} = f_1(x). \quad (4.28)$$

Аналогічно

$$f_Y(y|x) = f_2(y). \quad (4.29)$$

Ступінь залежності між випадковими величинами зазвичай оцінюють за допомогою числових характеристик залежності.

Умовні ряди розподілу для дискретних складових X і Y визначаються за формулами [88]

$$p_{ij} = p(X=x_i/Y=y_j) = p_{ij}/p(Y=y_j), i=1, \dots, n; \quad (4.30)$$

$$p_{ij} = p(Y=y_j/X=x_i) = p_{ij}/p(X=x_i), j=1, \dots, m. \quad (4.31)$$

Матриця розподілу ймовірностей дискретної двомірної випадкової величини (X,Y) , якщо її компоненти залежні, “породжує” два одновимірних

ряду ймовірностей (див. (4.8) і (4.9) і два сімейства умовних рядів ймовірностей (4.30) і (4.31).

Умовні щільності розподілу для неперервних складових X і Y визначаються за формулами (4.22) і (4.23).

Умовні закони розподілу мають всі властивості відповідних їм одновимірних форм законів розподілу.

Якщо величини X і Y незалежні, то умовні закони розподілу дорівнюють відповідним безумовним [88]

$$p_{ij} = p_i, \quad i = 1, \dots, n; \quad (4.32)$$

$$p_{ji} = p_i, \quad j = 1, \dots, m; \quad (4.33)$$

$$f(x/y) = f_X(x); \quad (4.34)$$

$$f(y/x) = f_Y(y). \quad (4.35)$$

Слід розрізняти функціональну і статистичну (вірогідну) залежності між випадковими величинами. Якщо X і Y — випадкові величини, які пов'язані між собою функціональною залежністю $y = \varphi(x)$, то, знаючи значення X , можна точно обчислити відповідні значення Y , і навпаки.

Якщо між випадковими величинами існує статистична залежність (величини X і Y залежні — див. (4.17)–(4.19), то за значенням однієї з них можна встановити тільки умовний розподіл ймовірностей інший, тобто визначити, з якою ймовірністю з'явиться те чи інше значення іншої величини.

Приклад. Y — урожай зерна, X — кількість добрив на деякій ділянці землі. Очевидно, що між X та Y існує статистична залежність, так як значення Y (врожайність на ділянці) залежить і від багатьох інших факторів [88].

4.3. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДВОВИМІРНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

При проведенні n незалежних дослідів де двовірна випадкова величина (X, Y) приймає певні значення і результати дослідів представляють собою двовірну вибірку виду $\{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$. Статистична обробка дослідних даних включає в себе обробку та аналіз складових X і Y , як одновимірних величин, і обчислення оцінок і аналіз параметрів, властивих тільки двовірним (багатовимірним) випадковим величинам. Як правило, визначаються такі оцінки числових характеристик випадкових величин X і Y [88]:

— визначення обсягу попарно зв'язаних вибірок використанням статистичної функції ПА **MS Excel СЧЁТ** (див. Додаток А);

— для кожної з вибірок визначення математичних сподівань (арифметичних середніх) очікувань, виконуваних за формулою (1.23) і з використанням статистичної функції ПА **MS Excel СРЗНАЧ** (див. Додаток А);

— визначення генеральної (вираз (1.47) та функція **ДИСП.Г**) та вибіркової (вираз (1.48) та функція **ДИСП.В**) дисперсії;

— оцінка коефіцієнта кореляції за виразом (9.2) чи (9.3) або функцією **КОРРЕЛ**.

Далі визначаються статистичні критерії двовірних випадкових величин, зокрема перевіряється гіпотеза про відсутність кореляційної залежності. Передбачається, що двовірна випадкова величина (X, Y) розподілена за нормальним законом.

Розрахунки при оцінці коефіцієнта кореляції описані у підрозділі **9.2.2 Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції**, застосування для цієї мети ППП Statistica викладено у підрозділі **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica**.

Перевірки гіпотези про рівність дисперсій за умови, що X і Y розподілені нормально виконується за F –критерієм за описом, наведеним у підрозділах **7.3.3.1 Розрахункове виконання двовибіркового F –тесту за критерієм Фішера–Снедекора** та **7.3.3.2 Визначення гомоскедастичності двовибірковим F –тестом за критерієм Фішера–Снедекора ПА MS Excel**.

Порівняння двох середніх значень з нормально розподілених попарно зв'язаних генеральних сукупностей з рівними чи нерівними дисперсіями описано у підрозділі **7.3.7 Використання t –критерію Стьюдента для середніх арифметичних**.

Якщо розподіли випадкових величин не відповідають нормальному закону, використовується критерій Уїлкоксона. Він є непараметричним аналогом t –критерію Стьюдента і служить для перевірки, чи належать дві вибірки до однієї і тієї ж генеральної сукупності. Його застосування у розрахунковому варіанті для попарно зв'язаних генеральних сукупностей викладено у підрозділі **7.4.3.3.1 Розрахункове визначення T –критерію Уїлкоксона для двох залежних попарно зв'язаних вибірок**, використання ППП Statistica описано у підрозділі **7.4.3.3.3 Застосування T –критерію Уїлкоксона і критерію знаків із використанням ППП Statistica [88]**.

4.4. ДВОВИМІРНИЙ НОРМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ

4.4.1. Теоретичні основи розподілу

З двовимірних систем випадкових величин особливий інтерес представляє двовимірний нормальний розподіл на площині. Він використовується, зокрема, для опису 2-х спільних результатів вимірювання, абсциси і ординати точка попадання в ціль при стрільбі. Він відображає результати впливу великого числа випадкових факторів, серед яких немає переважаючих.

Нехай в площині O_1UV (рис. 4.5) розташовано два вироджених випадкових вектора, які мають властивість:

- вони підлягають закону нормального розподілу,
- не пов'язані між собою функціонально і різнонаправлені [30].

Тоді система цих вироджених випадкових векторів утворює випадковий вектор $R(U, V)$, який підлягає двовимірному нормальному розподілу. Його складові U і V являють собою систему випадкових величин, кожна з яких підпорядковується нормальному розподілу.

Двовимірний нормальний розподіл повністю визначається п'ятьма параметрами. На відміну від координат центру розсіювання u_0, v_0 , інші параметри нормального розподілу — стандартні відхилення σ_u, σ_v випадкових величин U і V та їхній коефіцієнт кореляції r позбавлені наочності.

Двовимірна випадкова величина називається (U, V) є розподіленою за нормальним законом, якщо її спільна щільність $f(u, v)$ виглядає [16, 30]

$$f(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma_u\sigma_v\sqrt{1-r^2}} e^{-\frac{1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(u-u_0)^2}{\sigma_u^2} - 2r \cdot \frac{(u-u_0)(v-v_0)}{\sigma_u\sigma_v} + \frac{(v-v_0)^2}{\sigma_v^2} \right]}, \quad (4.36)$$

де u_0, v_0 — математичне очікування величин U і V ;

σ_u, σ_v — стандартний відхил величин U і V ;

r — коефіцієнт кореляції випадкових величин x і y .

Розподіл (4.36) називається також нормальним законом розподілу на площині або двовимірним нормальним гаусовим) розподілом.

Для функції щільності $f(u, v)$ справедлива рівність [16]




Рис. 4.5. Двовимірний нормальний розподіл в головній (OXY) і довільній ($O'UV$) системах координат

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u,v) du dv = 1, \quad (4.37)$$

Графік щільності $f(u,v)$ нормального розподілу двовимірної випадкової величини представляє собою дзвіноподібну поверхню, вершина якої знаходиться в точці $(u_0, v_0, \frac{1}{2\pi\sigma_u\sigma_v\sqrt{1-r^2}})$, тобто максимум функції $f(u,v)$ досягається в точці (u_0, v_0) , рис. 4.6.

Перетини поверхні розподілу площинами, що проходять через цю точку перпендикулярно площині OUV , є кривими Гауса виду (3.16). Перетинаючи поверхню розподілу $z=f(u,v)$ площиною $z=z_0$, де $0 < z_0 < z_{\max}$, отримаємо еліпси рівних ймовірностей, рівняння проекції якого на площину OUV , виражене через параметри $u_0, v_0, \sigma_u, \sigma_v$ і r , має вигляд

$$\frac{(u-u_0)^2}{\sigma_u^2} - 2r \cdot \frac{(u-u_0)(v-v_0)}{\sigma_u\sigma_v} + \frac{(v-v_0)^2}{\sigma_v^2} = \lambda^2, \quad (4.38)$$

де $\lambda^2 = -2(1-r^2)\ln(2\pi z_0 \sigma_u \sigma_v \sqrt{1-r^2})$.

Цей вираз представляє собою еліпс з центром в точці $O(u_0, v_0)$ довільної системи координат $O'UV$ (рис. 4.5) [16]. У цій точці, яка називається **центром розсіювання**, щільність імовірності досягає максимуму.

На еліпсах щільність нормального розподілу постійна. Тому вони називаються **еліпсами рівних ймовірностей**. Існують також інші назви — **еліпси рівній щільності**, **еліпси розсіювання**. Осі еліпсів рівних ймовірностей називаються **головними осями розсіювання**.




Рис. 4.6. Геометричне представлення щільності двовимірного нормального розподілу

Якщо коефіцієнт кореляції r випадкових величин x і y відповідають закону нормального розподілу, дорівнює нулю, тобто $r=0$ то вони незалежні. Для інших законів розподілу таке твердження несправедливе.

При $r = \pm 1$ двовимірний нормальний розподіл вироджується в випадковий вектор, розташований на прямій

$$\frac{u - u_0}{\sigma_u} = \pm \frac{v - v_0}{\sigma_v}.$$

При $u_0=v_0=0$ — отримуємо канонічну форму двовимірного нормально-го розподілу.

Двовимірний нормальний розподіл називають іноді *еліптичним*.

Це означає, що двовимірне нормальний розподіл повністю визначається спільною щільністю $f(u,v)$ двох нормально розподілених випадкових величин U і V .

Залежність між складовими U і V випадкового вектору R істотно ускладнює розрахунки, пов'язані з двовимірним нормальним розподілом. Значні спрощення можуть бути досягнуті, якщо провести перетворення координат їх поворотом та подальшим переміщенням.

Тоді виконавши поворот системи координат $O'UV$ у новій системі координат $O'X'Y'$ маємо

$$\left. \begin{aligned} x' &= u \cos \alpha + v \sin \alpha; \\ y' &= -u \sin \alpha + v \cos \alpha, \end{aligned} \right\} \quad (4.39)$$

де α — кут повороту системи координатних осей $O'X'Y'$ відносно $O'UV$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctg \left(\frac{2r\sigma_u\sigma_v}{\sigma_u^2 - \sigma_v^2} \right). \quad (4.40)$$

При цьому перетворенні складові X' і Y' випадкового векторе R стають незалежними випадкові величини.

Якщо різниця між головними стандартними відхилами зменшується до нуля, співвідношення (4.40) не визначене при нульовому коефіцієнті кореляції або при $\alpha = \pi/4$. Розсіювання з параметрами $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$ і нульовим коефіцієнтом кореляції називають *круговим* (еліпс розсіювання приймає форму кола). У круговому розсіюванні всі напрямки головні. Розсіювання можна вважати практично круговим, якщо різниця між стандартними відхилами становить менше чверті від їх середнього арифметичного.

Рівність (4.40) визначає кут α з точністю до 90° . Для усунення невизначеності прийнято вибирати а так, щоб новій випадковій змінній X відповідали великі випадкові величини. При цьому необхідна величина кута а визначається табл. 4.7. У ній прийнято, що кут, який визначається через арктангенс, позитивний і лежить в першій чверті, якщо аргумент під знаком арктангенса позитивний. У іншому випадку кут негативний і лежить в четвертій чверті.

Таблиця 4.7. Значення кута повороту координат α у залежності від σ_u , σ_v , r

Кореляція	$\sigma_u < \sigma_v$	$\sigma_u = \sigma_v$	$\sigma_u > \sigma_v$
$r < 0$	$\frac{1}{2} \arctg \left(\frac{r \sigma_u \sigma_v}{\sigma_u^2 - \sigma_v^2} \right) - \frac{\pi}{2}$	-45°	$\frac{1}{2} \arctg \left(\frac{r \sigma_u \sigma_v}{\sigma_u^2 - \sigma_v^2} \right)$
$r = 0$	90°	будь яке	0°
$r > 0$	$\frac{1}{2} \arctg \left(\frac{r \sigma_u \sigma_v}{\sigma_u^2 - \sigma_v^2} \right) + \frac{\pi}{2}$	45°	$\frac{1}{2} \arctg \left(\frac{r \sigma_u \sigma_v}{\sigma_u^2 - \sigma_v^2} \right)$

Щільність двовимірного нормального розподілу незалежних (некорельованих) ⁶⁾ випадкових величин X' , Y' матиме вигляд

$$f(x', y') = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{(x' - x'_0)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y' - y'_0)^2}{\sigma_y^2} \right]}. \quad (4.41)$$

де σ_x , σ_y – стандарті відхили випадкових величин X' і Y' відповідно;
 x'_0 , y'_0 – координати центру розсіювання в системі $O'X'Y'$ (рис. 4.5).

Для визначення величин x'_0 і y'_0 служать рівності

$$\left. \begin{aligned} x'_0 &= u_o \cos \alpha + v_o \sin \alpha; \\ y'_0 &= -u_o \sin \alpha + v_o \cos \alpha. \end{aligned} \right\}. \quad (4.42)$$

Величини σ_x і σ_y називаються *головними стандартними відхилами* випадкових величин і визначаються за формулами

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x^2 &= \frac{1}{2} \left[\sigma_u^2 + \sigma_v^2 + \sqrt{(\sigma_u^2 - \sigma_v^2) + 4r\sigma_u^2\sigma_v^2} \right]; \\ \sigma_y^2 &= \frac{1}{2} \left[\sigma_u^2 + \sigma_v^2 - \sqrt{(\sigma_u^2 - \sigma_v^2) + 4r\sigma_u^2\sigma_v^2} \right]. \end{aligned} \right\} \quad (4.43)$$

Функція розподілу випадкової величини X' і Y' матиме вигляд

⁶⁾ При статистично незначущому коефіцієнта кореляції див. підрозділ 9.2.2 Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції.

$$F(x', y') = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \int_{-\infty}^{x'} \int_{-\infty}^{y'} e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{(\xi - x'_0)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(\eta - y'_0)^2}{\sigma_y^2} \right]} d\xi d\eta. \quad (4.44)$$

Після повороту на кут α рівняння еліпсів рівних ймовірностей в системі координат $O_1X'Y'$ набуває вигляду

$$\frac{(x' - x'_0)^2}{\sigma_x^2} + \frac{(y' - y'_0)^2}{\sigma_y^2} = \mu^2. \quad (4.45)$$

Далі рівняння (4.41) спрощується перенесенням початку координат у точку центру розсіювання (x'_0, y'_0) , що рівнозначно використанню випадкових величин у новій координатній системі OXY , яка пов'язана з вихідною координатною системою OUV залежностями

$$\left. \begin{aligned} X &= (U - u_o)\cos\alpha + (V - v_o)\sin\alpha; \\ Y &= -(U - u_o)\sin\alpha + (V - v_o)\cos\alpha. \end{aligned} \right\} \quad (4.46)$$

Щільність двовимірного розподілу випадкових величин X і Y виражається рівністю

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2} \right)}. \quad (4.47)$$

Ця рівність називають *законом двовимірного нормального розподілу в канонічному вигляді*. Йому відповідає рівняння еліпсів рівних ймовірностей

$$\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2} = \mu^2. \quad (4.48)$$

Під *одиничним еліпсом розсіювання* (одиничним еліпсом) розуміють еліпс рівних ймовірностей (4.48) при $\mu = 1$

$$\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2} = 1. \quad (4.49)$$

Його напівосі дорівнюють головним стандартним відхилам (див. (4.43) двовимірного нормального розподілу.

Зручність рівності (4.44) і (4.47) в тому, що їх праві частини в силу незалежності випадкових величин X і Y розпадаються на два множники, кожен з яких містить лише одну випадкову величину (4.50)

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} e^{-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}}, \quad (4.50)$$

завдяки чому вивчення двовимірного нормального розподілу зводиться до дослідження двох одновимірних нормальних розподілів виду (4.51)

$$f(x, x_0, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}. \quad (4.51)$$

Функція розподілу випадкової величини X і Y матиме вигляд

$$F(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\xi^2}{\sigma_x^2} + \frac{\eta^2}{\sigma_y^2}\right)} d\xi d\eta \quad (4.52)$$

вона також розпадаються на два множники

$$F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{\xi^2}{2\sigma_x^2}} d\xi \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{\eta^2}{2\sigma_y^2}} d\eta, \quad (4.53)$$

тобто на дві табличні функції Лапласа

$$F(x, y) = \Phi\left(\frac{x}{\sigma_x}\right) \cdot \Phi\left(\frac{y}{\sigma_y}\right). \quad (4.54)$$

Аналогічно розпадається на два множника функція розподілу у вигляді (4.44).

При обчисленні у разі незалежних випадкових величин права частина формули розбивається на два множники, як це зроблено у формулі (4.50). Значення кожного співмножника обчислюється за допомогою табл. В.1, а для обчислення значень функції розподілу використовуються табл. В.3.

4.4.2. Порядок розрахунку двовимірного нормального розподілу

Для прикладу розглянемо вибірку двопараметричного розподілу зв'язаних значень U і V обсягом $n=256$.

По-перше її слід ранжувати за зростанням величини U , використанням пакета аналізу **MS Excel**.

Для оцінки її даних на аномальність був використаний критерій Смирнова–Грасса. Для рівня значущості $\alpha = 0.01$ для вибірки заданого обсягу за розрахунками згідно табл. 5.8 його квантиль становить $t_{01(256)} = 3.9722$. Тобто він істотно перевищує 3σ і майже відповідає критерію наближається до критерію Райта (див. підрозділ **5.12.1.10 Критерій 3s. Критерій Райта (4s)**).

Величина квантиля критерію Смирнова–Грасса $t_{01(256)} = 3.9722$ (табл. 4.8) відповідає рівню значущості нормального розподілу $p = 0.0001495$ (отримано статистичною функцією пакета аналізу **MS Excel НОРМ.СТ.РАСП(3.9722;ЛОЖЬ)**, тобто $P=0.9998505$.

Саме для цієї імовірності на діаграмі розсіювання експериментальних даних (рис. 4.7) побудовано довірчий еліпс і довірчі межі рівняння регресії. З нього бачимо, що хоч за критерій Смирнова–Грасса не при досить високому квантилі значущості виявив аномальних значень, проте ряд величин виходять за межі довірчого еліпса навіть з осями $a=3.9722\sigma_u$ і $b=3.9722\sigma_v$.




Рисунок 4.7. Діаграма розсіювання експериментальних даних

Розрахунки з використанням пакета аналізу **MS Excel** наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8. Результати розрахунку двовимірного нормального розподілу

	A	B	C	D
1	C261=CP3HACH(C2:C257) C263=МАКС(C2:C257)	№ п.п.	<i>U</i>	<i>V</i>
2	C258=C261-C269*C266 C259=МИН(C2:C257)	1	49.4	9.6
3	C260=C261-ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(C268;C266;C265)		49.7	24.0
4	C262=C261+ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(C268;C266;C265)		50.8	15.6
5	C264=C261+C269*C266 C265=СЧЁТ(C2:C257)	4	51.4	38.2
6	C271=КОРРЕЛ(C2:C257;D2:D257)	5	51.7	33.2
253	C274=C261*COS(C272)+D261*SIN(C272)	252	81.6	29.8
254	C275=-C273*НОРМ.СТ.ОБР(C268)	253	81.6	34.6
255	C278=C277/C273 C280=C279*D279	254	83.8	69.2
256	C279=НОРМ.СТ.РАСП(C278;ЛОЖЬ)	255	84.7	69.8
257		256	85.3	65.2
258	Нижня довірча межа вибірки (за Грабсом) $x_{mid}-s \cdot t_{0.01(n)}$		37.3	-8.5
259	Мінімальне значення вибірки x_{min}		49.4	6.6
260	Нижня довірча межа середнього $x_{mid}-s \cdot t_{\alpha(n-1)}$		64.36	29.63
261	Середнє значення вибірки x_{mid}		65.51	31.25
262	Верхня довірча межа середнього $x_{mid}+s \cdot t_{\alpha(n-1)}$		66.66	32.87
263	Максимальне значення вибірки x_{max}		85.3	69.8
264	Верхня довірча межа вибірки (за Грабсом) $x_{mid}-s \cdot t_{0.01(n)}$		93.68	70.96
265	Обсяг вибірки <i>n</i>		256	256
266	Середній квадратичний відхил <i>s</i>		7.09	10.00
267	Коефіцієнт варіації <i>V</i> , %		10.83	31.99
268	Прийнятий рівень значущості α		0.01	0.01
269	Критерій Грабса $t_{0.01(n)}$ C267=100*C266/C261		3.9722	3.9722
270	Стандартний відхил σ C269=0.2684*LN(C265)+2.4839		7.08	9.98
271	Коефіцієнт кореляції <i>r</i> C266=СТАНДОТКЛОН.В(C2:C257)		0.10749	
272	Кут повороту осей α , рад C270=СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C257)		-0.14906	
273	Головний стандартний відхил σ_{xy}		10.03	9.92
274	Координати центра головних осей		60.1	40.6
275	Величина головної осі еліпса		23.3	23.1
276	Задана точка у координатах O'UV		75.0	40.0
277	Координати заданих значень в головних осях (<i>OXY</i>)		14.7906	1.5802
278	Значення x/σ_x та y/σ_y		1.4740	0.1593
279	Функція Лапласа для вибірок		0.1346	0.3939
280	Функція Лапласа загальна		0.0530	

$$C272=0.5*ATAN((2*C271*C270*D270)/(C270^2-D270^2))$$

$$C273=((C270^2+D270^2+((C270^2-D270^2)^2+ \\ +(2*C271*C270*D270)^2)^{0.5})/2)^{0.5}$$

$$C277=(C276-C274)*COS(C272)+(D276-D274)*SIN(C272)$$

Для обох складових вибірки визначається стандартних відхил σ стичною функцією ПА **MS Excel** **СТАНДОТКЛОН.Г**. Далі знаходимо лінійну

кореляційну залежність (кореляція Пірсона) між складовими вибірок визначається застосуванням функції **MS Excel КОРРЕЛ**.

Далі за виразом (4.40) знаходимо α – кут повороту системи координатних осей $O'X'Y'$ відносно OUV і у новій системі координат $O'X'Y'$ за виразом (4.39) визначаємо координати x'_0 , y'_0 центру розсіювання в системі $O'X'Y'$ (рис. 4.5).

При визначенні величини і напрямку кута повороту слід керуватися рекомендаціями табл. 4.7.

За виразами (4.43) знаходимо σ_x і σ_y – головні стандартні відхили випадкових величин.

Після цього за виразом (4.46) визначаємо зміну значень X і Y після перенесення початку координат у точку центру розсіювання (x'_0, y'_0) , тобто координати заданих значень x і y осей нової координатної системи OXY .

На основі прийнятого рівня значущості α з використанням функції нормального розподілу (статистична функція ПА **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР**) знаходимо величини головних осей еліпса.

Розраховуємо значення x/σ_x та y/σ_y , тобто відповідні відношення координат заданих значень x і y осей нової координатної системи OXY до головних стандартних відхилів випадкових величин σ_x і σ_y .

Значення функції розподілу кожного результату знаходиться за допомогою табл. В.1 чи обчислюється за статистичною функцією ПА **MS Excel НОРМ.СТ.РАСП(____;ЛОЖЬ)**.

Кінцевий результат визначення показника двовимірного нормального розподілу є добутком отриманих вище величин.

4.4.3. Попадання в площинну область при двовимірному нормальному розподілі

4.4.3.1. Імовірність влучення в еліпс рівних ймовірностей і круг

Рівняння еліпса в основній системі координат OXY (рис. 4.5 на с. 201) представлено виразом (4.48).

Вірогідність влучення випадкової точки в довільну область еліпсу можна обчислити інтегруванням щільності розподілу по цій області. Таким чином вірогідність попадання випадкової точки певний шар еліпсу визначається виразом

$$P = 1 - e^{-\mu^2/2}. \quad (4.55)$$

З огляду на вираз (4.48) маємо вірогідність непопадання у межі еліпсу

$$P = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2} \right)}. \quad (4.56)$$

Імовірність попадання в одиничний еліпс з півосями $a = \sigma_x$ і $b = \sigma_y$ дорівнює $P = 0.3935$. Еліпс півосями $a = 3\sigma_x$ і $b = 3\sigma_y$ називається **повним еліпсом розсіювання**, в нього потрапляють практично всі реалізації випадкових величин $P = 0.9889$. Це означає, що інтегрування за “всіма можливими значеннями” можна вести в межах повного еліпса розсіювання.

Імовірність попадання в одиничний еліпс з півосями $a = 2\sigma_x$ і $b = 2\sigma_y$ становить $P = 0.8647$ [90].

Зокрема, якщо розподіл круговий, тобто $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$, область — круг радіуса R з центром в центрі розсіювання (див. с. 203), то $\mu = R/\sigma$.

При круговому нормальному розсіюванні промах $R < \sqrt{X^2 + Y^2}$ при відсутності систематичної похибки відповідає закону Релея.

Через параметр σ закон Релея для $r > 0$ записується у вигляді (4.57) [90] (див. далі підрозділ **3.2.10 Розподіл Релея**)

$$f(R) = \frac{R}{\sigma^2} e^{-\frac{R^2}{2\sigma^2}}. \quad (4.57)$$

4.4.3.2. Імовірність попадання у нескінченну прямолінійну смугу, довільно розташовану щодо головних осей розсіювання

Нехай кут між великою віссю еліпсів рівних ймовірностей і перпендикуляром OC до меж смуги S дорівнює α відстані від центру розсіювання до меж смуги KL і MN рівні $d_1 \geq d_2$ і відповідно (рис. 4.8) [30].

У цьому разі маємо (верхній знак при розташуванні смуги під кутом по одну, другий — по обидві сторони центру розсіювання (4.58))

$$P\{N \in S\} = \Phi_0\left(\frac{d_1}{\sigma_\alpha}\right) \mp \Phi_0\left(\frac{d_2}{\sigma_\alpha}\right), \quad (4.58)$$

де σ_α — стандартне відхилення у напрямку, перпендикулярному межам смуги

$$\sigma_{\alpha} = \sqrt{\sigma_x^2 \cos^2 \alpha + \sigma_y^2 \sin^2 \alpha}. \quad (4.59)$$




Рисунок 4.8. Імовірність попадання у нескінченну прямолінійну смугу:

- а – межі смуги лежать під кутом по одну сторону від центру розсіювання;
 б – межі смуги лежать під кутом по обидві сторони від центру розсіювання.

Якщо одна з меж, наприклад KL , віддаляється на нескінченність і смуга перетворюється в напівплощина, то маємо (4.60)

$$P\{N \in S\} = \frac{1}{2} \mp \Phi_0 \left(\frac{d_2}{\sigma_{\alpha}} \right). \quad (4.60)$$

Так як і для виразу (4.58) для виразу (4.60) верхній знак використовується при розташуванні необмеженої смуги по одну, нижній — по обидві сторони центру розсіювання.

Якщо межі смуги симетричні щодо центру розсіювання, тобто $d_1 = d_2 = d$, то маємо

$$P\{N \in S\} = 2\Phi_0 \left(\frac{d}{\sigma_{\alpha}} \right). \quad (4.61)$$

Якщо межі смуги паралельні великій осі еліпсів рівних ймовірностей, тобто $\alpha = \pi/2$, чи паралельні малій осі еліпсів рівних ймовірностей, тобто $\alpha = 0$, то стандартне відхилення у напрямку, перпендикулярному межах смуги для формул (4.58)–(4.60) відповідно становить $\sigma_{\alpha} = \sigma_y$ і $\sigma_{\alpha} = \sigma_x$ [30].

4.5. РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ НА ПЛОЩИНІ

Система двох випадкових величин називається рівномірно розподіленою на площині, якщо її щільність ймовірності постійна $f(x,y)=C=\text{const}$ всередині деякої області і дорівнює нулю поза нею. Нехай дана область – прямокутник виду $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ [87].

Тоді

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{s} = \frac{1}{(b-a)(d-c)} & \text{усередині прямокутника} \\ 0. & \text{поза прямокутником} \end{cases} \quad (4.62)$$

Дійсно, з формули (4.13) маємо:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = C \int_a^b \int_c^d dx dy = C(b-a)(d-c) = 1, \quad (4.63)$$

Звідки

$$C = \frac{1}{(b-a)(d-c)}, \quad (4.64)$$

Знайдемо двовимірну функцію розподілу при $a < x < b, c < y < d$

$$F(x,y) = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \int_a^b \int_c^d dx dy = \frac{x-a}{b-a} \cdot \frac{y-c}{d-c}, \quad (4.65)$$

$F(x,y) = 0$ при $x \leq a$ чи $y \leq c$,

$F(x,y) = 1$ при $x \geq b$ чи $y \geq d$.

Функції розподілу складових, обчислені відповідно властивостей, представлених у формулах (4.3) і (4.4), мають вигляд [87]

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}; \quad (4.66)$$

$$F(y) = \frac{y-c}{d-c}. \quad (4.67)$$

4.6. ФУНКЦІЇ ВІД НОРМАЛЬНО РОЗПОДІЛЕНИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

Розглянемо загальний випадок: лінійну функцію від нормально розподілених аргументів. Нехай дано n -мірний нормально розподілений випадковий вектор (X_1, X_2, \dots, X_n) , величина Y являє собою лінійну функцію від цих величин [89]

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i + b. \quad (4.68)$$

Випадкова величина Y також розподілена нормально з параметрами

$$m_Y = \sum_{i=1}^n a_i m_i + b; \quad (4.69)$$

$$\sigma_Y^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \cdot \sigma_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_i \cdot a_j \cdot r_{ij} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_j. \quad (4.70)$$

де m_i – математичне сподівання випадкової величини X_i ;

σ_i^2 – дисперсія випадкової величини X_i ;

r_{ij} – коефіцієнт кореляції між X_i і X_j .

Тоді шукана функція розподілу випадкової величини Y має вигляд

$$f(Y) = \frac{1}{\sigma_Y \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-m_Y)^2}{2\sigma_Y^2}}. \quad (4.71)$$

Приклад. Записати щільність розподілу випадкової величини $Y = X_1 + 2X_2 + 3$, якщо випадкові величини X_1 і X_2 мають нормальний розподіл з параметрами $m_1 = 23$, $m_2 = 31$, $\sigma_1 = 5$, $\sigma_2 = 7$, $r_{12} = 0.67$.

Рішення. За виразами (4.69) і (4.70) маємо

$$m_Y = 23 + 2 \cdot 31 + 3 = 88 \quad \text{і} \quad \sigma_Y^2 = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 0.67 \cdot 5 \cdot 7 = 106.8.$$

Тоді шукана функція розподілу випадкової величини Y має вигляд

$$f(Y) = \frac{1}{106.8 \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-88)^2}{2 \cdot 106.8}}.$$

5. УРАХУВАННЯ ПОХИБОК ПРИ ВИМІРЮВАННЯХ

5.1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ

Прямі вимірювання — це вимірювання, при яких шукане значення фізичної величини знаходять безпосередньо за допомогою спеціальних технічних засобів. Наприклад, вимірювання довжини за допомогою лінійки, вимірювання маси за допомогою ваг та ін. [91].

Непрямі вимірювання — це вимірювання, при яких шукане значення величини обчислюють за формулою, яка зв'язує цю величину з величинами, отриманими прямим вимірюванням. Наприклад, обчислення об'єму тіла за прямими вимірюваннями його геометричних розмірів; обчислення швидкості рівномірного руху за прямими вимірюваннями довжини пройденого шляху у відповідний проміжок часу т.п. [8].

Спільні вимірювання — це вимірювання, що складаються з вимірювань декількох величин в змінних умовах і подальшого перерахунку залежності між цими величинами. Причому, вимірювання цих величин можуть бути як прямими, так і непрямыми. Наприклад, визначення температурної залежності електричного опору провідника шляхом його вимірювання при різних значеннях температур.

Одноразове вимірювання — вимірювання, виконане один раз. До даного виду вимірювань можна віднести: вимірювання маси деталі, визначення струму або напруги на ділянках електричного ланцюга, вимірювання проміжку часу і т. п.

Багаторазові вимірювання — вимірювання, що складаються з серії одноразових вимірювань.

5.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА СПОСТЕРЕЖЕНЬ (ОБСЯГУ ВИБІРКИ)

При постановці дослідів велику практичну важливість представляє питання про кількість n необхідних спостережень, так як велика кількість спостережень пов'язано зі значними витратами коштів і часу, а в багатьох випадках і зовсім неможливо. Але при невеликому числі спостережень результати досвіду можуть виявитися малонадійними або навіть недостовірними. Щоб при випробуваннях отримати оцінку характеристики об'єкта випробувань з необхідною точністю і достовірністю, обсяг випробувань (обсяг вибірки) повинен бути не менше деякої величини, яка подається виразами, наведеними в [34, 38, 50].

Якщо випробування проводять для оцінки математичного сподівання, то при нормальному розподілі характеристики мінімально необхідний обсяг випробувань можна знайти із співвідношення [59]

$$n = \left(\frac{V \cdot z_{1-\alpha/2}}{\Delta_{\mu}} \right)^2, \quad (5.1)$$

де V – генеральний коефіцієнт варіації (див. формулу (1.99));
 $z_{1-\alpha/2}$ – квантиль стандартного нормального розподілу, див. с. 64;
 Δ_{μ} – максимальна похибка (допуск) при оцінці математичного сподівання у його частках.
Також використовується формула [59]

$$n = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}}{\delta_{\mu}} \right)^2, \quad (5.2)$$

де δ_{μ} – максимальна похибка (допуск) при оцінці математичного сподівання у частках стандартного відхилення (СВ) генеральної сукупності.

Показник достовірності $z_{1-\alpha/2}$ приймається за табл. Г.1, дані якої обернені до табл. 1.3 [2].

Показник достовірності t розраховується за допомогою статистичної функції пакету **Excel** [25] для двобічного інтервалу **НОРМ.СТ.ОБР(1/2+P/2)**.

Допуск вибирають в залежності від необхідної точності [59]:

- низька точність: $\Delta_{\mu} = V$, $\delta_{\mu} = 1$;
- середня точність: $\Delta_{\mu} = (0.4 \dots 0.5)V$, $\delta_{\mu} = 0.4 \dots 0.5$;
- висока точність: $\Delta_{\mu} = (0.2 \dots 0.3)V$, $\delta_{\mu} = 0.2 \dots 0.3$.

Найчастіше генеральний коефіцієнт варіації невідомий, і його замінюють заданим допустимим коефіцієнтом варіації вибірки V (див. формулу (1.100)). Тому, вже розробляючи програму вибіркового спостереження, відразу задають величину допустимого коефіцієнта варіації V , показник достовірності $t_{\alpha(v)}$ (його визначення наведено на с. 67) і показник необхідної точності $\Delta_{\bar{x}}$ для середнього \bar{x} [2]

$$n = \left(\frac{V \cdot t_{\alpha(v)}}{\Delta_{\bar{x}}} \right)^2. \quad (5.3)$$

Величина коефіцієнта варіації V зазвичай встановлюється на підставі попередніх досліджень. Якщо такі дані відсутні, то в перших дослідах його призначають із загальних міркувань чи вимог, а потім уточнюють на основі отриманих результатів.

Точність призначається залежно від досліджуваного властивості і категорії випробувань (див. с. 63) [2].

Якщо випробування проводять для оцінки генерального стандартного відхилення σ (або генеральної дисперсії σ^2) характеристики, то мінімально необхідний обсяг випробувань (обсяг вибірки) знаходять за формулою [59]

$$(1 - \Delta_{\sigma}) = \frac{\chi_{\alpha/2, \nu}^2}{\chi_{0.5, \nu}^2}, \quad (5.4)$$

де Δ_{σ} – максимальна похибка (допуск) при оцінці СКВ у його частках;
 $\chi_{\alpha/2, \nu}^2$, $\chi_{0.5, \nu}^2$ – квантилі розподілу Пірсона (або χ^2 -квадрат розподілу, які знаходяться за статистичною функцією **MS Excel** **ХИ2.ОБР** (див. Додаток А).

Допуск вибирають в залежності від вимог точності [59]:

- при низькій точності $\Delta_{\sigma} = 0.4 \dots 0.5$;
- при середньої точності $\Delta_{\sigma} = 0.25 \dots 0.35$;
- при високій точності $\Delta_{\sigma} = 0.1 \dots 0.2$.

Для визначення мінімального обсягу випробувань підбирають $\chi_{\alpha/2, \nu}^2$ і $\chi_{0.5, \nu}^2$ з таким числом ступенів свободи ν при прийнятому α , щоб виконувалося рівність (5.17) і за знайденим числом ступенів свободи знаходять обсяг випробувань.

Збільшуючи кількість вимірювань n навіть при незмінній їх точності, можна збільшити надійність довірчих оцінок (1.80) і (1.86) або звужити довірчий інтервал для істинного значення вимірюваної величини. Необхідна кількість вимірювань для досягнення необхідної точності $\Delta_{\bar{x}}$ необхідної надійності p можна визначити заздалегідь тільки в тому випадку, коли відома середній квадратичний відхил вимірювань (вимірювання передбачаються рівноточними і незалежними).

У цьому випадку кількість вимірювань n для отримання довірчої оцінки точності $\Delta_{\bar{x}}$ заданим рівнем значущості знаходиться за допомогою формули (1.80), звідки [31]

$$n \geq \left(\frac{t_{\alpha} \sigma}{\Delta_{\bar{x}}} \right)^2. \quad (5.5)$$

Значення t_{α} знаходиться із заданим двостороннім рівнем значущості α за умови $2\Phi(t_{\alpha}) = \alpha$ [31].

Якщо середня квадратична похибки вимірювань заздалегідь невідома,

але відомий хоча б її порядок, то необхідну кількість вимірювань можна визначити в залежності від рівня значущості α і від відношення $q = \Delta_{\bar{x}}/s$, де s – майбутній емпіричний стандарт похибки. Для визначення кількості n у залежності від α і q застосовується табл. Г.2 [31].

За табл. Г.2 щоб гарантувати отримання довірчої оцінки з рівнем значущості $\alpha=0.01$ і точністю до $0,1s$, слід виконати 668 вимірювань. На практиці часто можна обмежитися меншою кількістю вимірювань, виконавши наступний прийом. Спочатку потрібно зробити невелику кількість вимірювань (у 3–4 рази менше зазначеного у табл. Г.2) і за їх результатами розраховується довірчий інтервал. Потім уточняється необхідна кількість вимірювань з тих міркувань, що зменшення довірчого інтервалу в k разів забезпечується збільшенням кількості вимірювань в k^2 разу [31]

Також зручно для практичного використання ця залежність викладена в табл. Г.3, де представлений взаємозв'язок необхідного числа повторності вимірів із заданою надійністю та відносною похибкою [12]

5.3. Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії

Надалі передбачається, що похибки вимірювання є випадковими і розподілені за нормальним законом. Як показник точності вимірювань (точності приладу) тут оцінюється дисперсією цього закону σ^2 або стандартним відхилом σ . Вимірювання передбачаються незалежними і *рівноточними* (з однією і тією ж дисперсією).

1. Якщо проводяться *вимірювання відомої величини a* (еталона), то у якості ефективної оцінки дисперсії застосовують СКВ s_{\bullet}^2 результатів вимірювань x_1, x_2, \dots, x_n від значення a на основі виразу (1.47) маємо (5.6)

$$\sigma^2 \approx s_{\bullet}^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (5.6)$$

2. Якщо вимірюють *невідому величину*, то в якості оцінки дисперсії застосовують СКВ s результатів вимірювань x_1, x_2, \dots, x_n від значення середнього значення \bar{x} (1.22), тобто емпіричну дисперсію, розраховану за виразом (1.48) отримується (5.7)

$$\sigma^2 \approx s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (5.7)$$

Її оцінка є незміщеною і спроможною, але не ефективною (вона є лише асимптотично ефективною, тобто її розсіювання прямує до мінімального при необмеженому збільшенні числа вимірювань n).

3. Якщо одним і тим же приладом виконується m серій вимірювань різних величин, то в якості оцінки дисперсії застосовують зважене середнє з емпіричних дисперсій (5.8)

$$\sigma^2 \approx s^2 = \sum_{i=1}^m (n_i - 1) \cdot s_i^2 / \left(\sum_{i=1}^m n_i - m \right), \quad (5.8)$$

де n_i – кількості вимірювань у відповідній серії;
 s_i – відповідні емпіричні відповідної серії вимірювань.

Оцінка (5.8) має ті ж властивості, що й оцінка (1.48), але практично дозволяє використовувати більшу кількість інформації, що робить її більш надійною.

Якщо число вимірів постійне у кожній серії, тобто $n_i = n$, вираз (5.8) виглядатиме (5.9)

$$\sigma^2 \approx s^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m s_i^2, \quad (5.9)$$

тобто у якості оцінки дисперсії приймається середнє арифметичне значення емпіричних дисперсій.

4. Якщо для m серій вимірювань однієї і тієї ж величини відомі тільки кількості вимірювань n_i і середні арифметичні результати \bar{x}_i у кожній серії, то в якості оцінки дисперсії застосовують емпіричну дисперсію з середніх

$$\sigma^2 \approx \tilde{s}^2 = \frac{1}{m-1} \cdot \sum_{i=1}^m n_i \cdot (x_i - \bar{x})^2, \quad (5.10)$$

де $\bar{x} = \sum_{i=1}^m n_i \bar{x}_i / \sum_{i=1}^m n_i$, власне $N = \sum_{i=1}^m n_i$.

Ця оцінка є незміщеною і спроможною, а також асимптотично ефективною при $m \rightarrow \infty$ [31].

5. Для інтервального ряду даних (для групованих даних, див. **2.3 Обчислення показників для інтервального ряду даних**) величина σ^2 є зміщеною оцінкою дисперсії, причому її зміщення залежить від довжини інтервалу λ . Якщо довжина інтервалу λ досить мала (становить не більше де-

сятої частки всього діапазону результатів вимірювань), то в якості оцінки дисперсії застосовують *виправлену* емпіричну дисперсію (1.61) з поправкою Шеппарда $\lambda^2/12$ з якою оцінку можна вважати практично незміщеною [31].

У всіх зазначених вище випадках емпіричний стандарт s (емпірична середня квадратична похибка дає зміщену (декілька зменшену) оцінку середньоквадратичної похибки σ . Її зміщення залежить від числа вимірювань n і зменшується з його збільшенням.

Число ступенів вільності ν дорівнює числу оброблюваних результатів вимірювань, зменшеному на число пов'язань їх лінійних співвідношень. Тобто воно залежить не тільки від числа вимірів, але і від виду емпіричного стандарту, що застосовується для оцінки σ

Для випадків, розглянутих вище, число ступенів свободи відповідає: $1 - \nu = n$; $2 - \nu = n - 1$; $3 - \nu = N - m$; $4 - \nu = m - 1$; $5 - \nu = n - 1$ [31].

5.4. ДОВІРЧІ ОЦІНКИ СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОЇ ПОХИБКИ

При великому числі вимірювань довірчу оцінку середньоквадратичного відхилення σ записують у вигляді оцінки відносного відхилення оцінюваного значення від відповідного емпіричного стандарту s (див. підрозділ **5.3 Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії**). Така оцінка має вигляд (5.11)

$$|(\sigma - s)/s| < q_{\alpha(\nu)} \quad \text{або} \quad s(1 - q_{\alpha(\nu)}) < \sigma < s(1 + q_{\alpha(\nu)}). \quad (5.11)$$

Тут значення коефіцієнта $q = q_{\alpha(\nu)}$ знаходиться за табл. Г.4 у залежності від прийнятого рівня значущості α (надійності оцінки) і від числа ступенів вільності ν .

Зауважимо ще, що при досить великому числі ступенів вільності ν можна користуватися і правилом трьох сигм, яке в даному випадку описується залежністю (5.12)

$$s \left(1 - \frac{s}{\sqrt{2\nu}} \right) < \sigma < s \left(1 + \frac{s}{\sqrt{2\nu}} \right). \quad (5.12)$$

Надійність такої довірчої оцінки перевершує

$P = 0.99$ при $\nu > 47$,

$P = 0.992$ при $\nu > 100$,

$P = 0.995$ при $\nu > 200$.

При малому числі вимірювань симетрична оцінка виду (5.11) призводить до не виправдано великих довірчим інтервалам в силу різкої асиметрії розподілу емпіричного стандарту (див. рис. 5.1).

Тому при малому числі вимірювань застосовують асиметричні довірчі оцінки виду (5.13)

$$s z_1 < \sigma < s z_2. \quad (5.13)$$

Значення коефіцієнтів z_1 і z_2 знаходяться за табл. Г.5 у залежності від прийнятого рівня значущості α (надійності оцінки) і від числа ступенів вільності ν . Ці коефіцієнти z_1 і z_2 розраховані таким чином, щоб ймовірності нерівностей $\sigma < s z_1$ і $s z_2 < \sigma$ були рівні між собою, тобто рівень значущості кожного з цих нерівностей становив $\alpha/2$ (див. рис. 5.1).

Порівняння довірчі інтервали, отримані за оцінками (5.12) і (5.13), проілюструємо на прикладі довірчої оцінки σ з рівнем значущості $\alpha=0.01$ при числі ступенів свободи $\nu=18$. За табл. Г.4 для даних значень α і ν знаходимо $q_{0.01(18)}=0.602$, що за виразом (5.11) дає величину довірчого інтервалу

$$s(1 + q_{0.01(18)}) - s(1 - q_{0.01(18)}) = 2 \cdot s \cdot q_{0.01(18)} = 1.204 \cdot s.$$

За табл. Г.5 для тих же значень α і ν знаходимо $z_1=0,696$, $z_2=1,695$, що дає довірчий інтервал довжини

$$s(z_2 - z_1) = 0.999 \cdot s,$$

тобто на 20% менше.

Приклад 1. Десять вимірювань для визначення точності вимірювань дали результати $\bar{x} = 36.06$ і $\sigma^2 = 0.0624$. Оцінити середню квадратичну помилку вимірювань з рівнем значущості $\alpha = 0.01$.

Рішення. Розглянемо спочатку більш простий випадок (випадок 1 підрозділу 5.3 Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії), коли істинне значення вимірюваної величини відомо і становить $a=36$. Тоді для дисперсії треба застосувати оцінку s_\bullet^2 , яка розрахується за формулами (5.6) і (1.49)




Рис. 5.1. Асиметрія розподілу емпіричного стандарту

$$\sigma^2 \approx s_{\bullet}^2 = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - c)^2 = \sigma^2 + (\bar{x} - c)^2. \quad (5.14)$$

Звідси отримуємо наближене рівність $\sigma \approx s_{\bullet}^2 = 0.2569$.

За табл. Г.5 для тих же значень $\alpha = 0.01$ і $\nu = n = 10$ знаходимо $z_1 = 0.630$ і $z_2 = 2.154$, що дає довірчий інтервал довжини (0.162; 0.554).

Якщо істинне значення вимірюваної величини невідомо, то оцінка дисперсії виконується за допомогою емпіричної дисперсії відповідно формули (5.7) (випадок 2 підрозділу **5.3 Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії**)

$$\sigma^2 \approx \frac{n}{n-1} \cdot s^2 = 0.0624 \cdot 10 / (10-1) = 0.0693.$$

Звідси отримуємо наближене рівність $\sigma = 0.263$.

Для оцінки цього наближеного рівності з рівнем значущості $\alpha = 0.01$ скористаємося знову табл. Г.5, але тепер вже при значенні $\nu = n-1$, тобто $\nu = 9$. Це дає $z_1 = 0.618$ і $z_2 = 2.277$, отже, довірчу оцінку

$$0.163 = 0.263 \cdot 0.618 < \sigma < 0.263 \cdot 2.277 = 0.599.$$

Відзначимо, що тут помилка в визначенні σ може досягати 128 %.

Приклад 2. Нехай одним і тим же вимірювальним приладом виконано $m = 20$ серій вимірювань по $n = 10$ вимірювань в кожній. Емпірична дисперсія в i -ій серії вимірювань дорівнює s_i^2 . Потрібно оцінити СКВ вимірювального приладу з рівнем значущості $\alpha = 0.01$.

Рішення. Так як число вимірювань в кожній серії одне і те ж, то застосуємо оцінку (5.9) для дисперсій (випадок 3 підрозділу **5.3 Оцінки точності вимірювань. Точкові оцінки дисперсії**).

Довірча оцінка цього наближеної рівності виконується тут при числі ступенів свободи $\lambda = m \cdot n - m = 180$. Тому при $\alpha = 0.01$ за табл. Г.4 знаходимо $q_{0.01(180)} = 0.143$ (що дає відносну помилку у визначенні σ тільки 14 %).

Довірча оцінка середньоквадратичної похибки має вигляд

$$0.857S < \sigma < 1.143S$$

з довірчою ймовірністю 0,99.

5.5. Види ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ

В науковій документації [92] зараз розрізняють поняття “результат спостереження” і “результат вимірювання”.

Результат вимірювання фізичної величини — це значення величини, отримане шляхом її вимірювання. Слід зазначити, що в сучасних міжнародних документах [93] для результату вимірювання прийнято узагальнююче поняття — “результат вимірювання (випробування, контролю або аналізу)”.

Результат спостереження всього лише відлік показань і фіксація значення величини або числа на засобі вимірювання в заданий момент часу. Це операції, що проводяться при замірах з метою своєчасної і правильної їх фіксації. Таким чином, отриманий результат містить в собі всі види похибок, властиві вимірювальній процедурі.

Згідно нормативних документів **результатом вимірювання** є середньоарифметичне значення результатів спостережень (або їх інший функціонал, якщо результати спостережень не розподілені нормально) і похибка, що характеризує це середнє (або функціонал).

Проте, при замірах можуть виникати **промахи** (грубі помилки) — похибки, яка істотно перевершують дані, очікувані при заданих умовах.

Загалом обробку отриманих результатів рекомендується починати з перевірки даних на наявність промахів. Існує багато критеріїв виявлення і відкидання промахів, але жоден з них не є універсальним (див. підрозділ **5.12.1 Параметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань і виключення помилкових значень**). Вибір критерію залежить від мети вимірювань, але рішення відкинути якісь дані, в кінцевому рахунку, завжди суб’єктивно.

Ніяке вимірювання не може бути виконане абсолютно точно, так як ми завжди отримується значення величини з деякою похибкою. Тому в завдання вимірювань входить не тільки знаходження значення величини, але також і оцінка допущеної при цьому похибки [91].

Похибкою вимірювання називається відхилення виміряного значення від істинного значення вимірюваної величини. При цьому розрізняють абсолютну Δ_x , відносну ϵ_x і приведену γ похибку [55].

Похибка результату вимірювання — це число, яке вказує на можливі межі невизначеності значення вимірюваної величини. Виміряна величина x завжди відрізняється від її істинного значення, так як будь-яке вимірювання проводиться з відповідним ступенем точності і результат записується у вигляді $\bar{x} \pm \Delta_x$, де Δ_x — абсолютна похибка вимірювання, тобто відхилення виміряного значення величини від її істинного значення. Оскільки причини виникнення похибок можуть бути самими різними, необхідно класифікувати похибки, що виникають в ході експериментів.

Абсолютна похибка вимірювання Δ_x — різниця між вимірним \bar{x} і істинним x_{ic} значеннями величини, в одиницях вимірюваної величини

$$\Delta_x = |\bar{x} - x_{ic}| \quad (5.15)$$

Відносна похибка вимірювання ϵ_x — це відсоткове відношення абсолютної похибки Δ_x до істинного значення x_{ic} вимірюваної величини [55]

$$\epsilon_x = 100 \cdot \Delta_x / x_{ic} \quad (5.16)$$

Іноді користуються поняттям точності, яка характеризує близькість вимірюного значення до істинного значення вимірюваної величини. Кількісно точність t_x дорівнює зворотній величині модуля відносної похибки, вираженої в частках

$$t_x = 1 / |\epsilon_x| = |x_{ic} / \Delta_x| \quad (5.17)$$

Якщо відносна похибка становить $\epsilon_x = 1\%$, в частках це буде $\epsilon_x = 0.01$, то точність $t_x = 10^2$.

Оскільки істинне значення x_{ic} вимірюваної величини невідомо, то для отримання хоча б наближених відомостей про похибки вимірювання доводиться у формулах (5.16) і (5.17) замість істинного значення x_{ic} найчастіше використовувати вимірне середнє значення \bar{x} величини.

Вимірювання також супроводжуються **інструментальними похибками** — тобто похибками самих засобів вимірювань (приладів), **методичними похибками**, обумовленими недосконалістю методу вимірювань та **додатковими похибками** — що виникають через фактори, які не враховані в моделі об'єкта вимірювання.

Похибки поділяються на систематичні та випадкові.

Систематична похибка є складовою похибки вимірювання, що залишається постійною або закономірно мінливою при повторних вимірюваннях однієї і тієї ж величини. Вона обумовлюється постійно діючими факторами. Наприклад, зміщення початкової точки відліку, вплив нагрівання тіл на їх подовження, знос ріжучого леза, несправність вимірювальних приладів, неточність їх регулювання, недотримання умов їх експлуатації, невідповідність методики вимірювань і т.п. Мірою систематичної похибки є середнє.

Такі похибки не відносяться до розряду приладових, які характеризують цілком справні і правильно експлуатовані інструменти.

Залежно від причин виникнення розрізняють чотири види систематичних похибок:

а) **похибки методу**, що походять від помилковості або недостатньої розробленості прийнятої теорії методу вимірювання, наприклад: при вимірюванні діаметру не враховується температурне розширення деталі, оброб-

люваної на верстаті; тонке кільце деформується зайвим зусиллям при вимірюванні його діаметра штангенциркулем і т. п.;

б) **інструментальні похибки (похибки приладу)**, які залежать від похибок застосовуваних засобів вимірювань;

в) **похибки, зумовлені неправильною установкою і взаємним розташуванням засобів вимірювання**, наприклад: терези не виставлені по рівню; паралакс при відліку за шкалою і т.п.;

г) **особисті похибки**, зумовлені індивідуальними особливостями спостерігача, наприклад: запізнювання або випередження при реєстрації мінливого у часі показання приладу і т. п. [91].

Систематичні похибки виявляють при відповідному таруванню приладів і тому вони можуть бути враховані при обробці результатів вимірювань. В першу чергу це стосується абсолютної і відносної похибки вимірювань. Якщо a_{ic} — точне (істинне) значення деякої величини, а x — відоме наближення до нього, то абсолютною похибкою наближення x числа a_{ic} називають деяку величину Δ_x таку, що $|a_{ic} - x| \leq \Delta_x$.

Відотною похибкою, зазвичай виражається у відсотках, називають величину ε_x таку, що

$$\left| \frac{x - a_{ic}}{x} \right| \leq \varepsilon_x. \quad (5.18)$$

Всі похибки за походженням діляться на **випадкові і систематичні**.

Випадкові похибки — похибки, значення яких непередбачено змінюються при повторному вимірюванні однієї і тієї ж величини. Вони обумовлені великим числом випадкових причин, дія яких при кожному вимірюванні різна і не може бути заздалегідь врахована (коливання повітря, вібрація будівлі, тертя в осях при зважуванні, зміна уваги оператора і т.д.). Хоч виключити випадкові похибки окремих вимірювань неможливо, математична теорія випадкових явищ дозволяє істотно зменшити їхній вплив на остаточний результат та оцінити їхнє значення.

Для опису випадкових похибок використовується теорія ймовірностей. Мірою випадкової похибки є дисперсія.

До цієї ж групи належать **грубі помилки**, які істотно перевищують очікувані значення похибок (різка зміна напруги в мережі), а також **промахи** — похибки, які залежать від спостерігача і пов'язані з неправильним поводженням із засобами вимірювань, невірним відліком показань або помилками при записі результатів. Грубі помилки і промахи виявляють статистичними методами і зазвичай виключають з розгляду.

Виділяють також **похибки приладів**, які можуть мати як систематичний, так і випадковий характер. Вони пов'язані з деякими випадковими чинниками, що впливають на точність вимірювань і можуть залежати від умов, в яких проводиться експеримент, специфіки вимірюваної величини.

Основним способом зменшення випадкових похибок є багатократне вимірювання однієї і тієї ж фізичної величини. Але максимально можлива точність вимірювання визначається приладами, які використовуються в експерименті, тому зменшення випадкової похибки шляхом збільшення числа дослідів має сенс доки її величина не стане явно менше величини похибки приладу. Таким чином **щоб досягти бажаної надійності вибіркового спостереження генеральній сукупності, доцільно збільшувати точність приладу, а не кількість вимірювань** [12].

Якщо табличні або експериментальні числа наводяться без вказівки на похибку то за абсолютну похибку числа слід вважати половину одиниці розряду останньої його цифри. Наприклад, дано масу вантажу 325 г без вказівки на похибку — маємо (325.0 ± 0.5) г.

Значущими цифрами числа називають усі цифри в його записі, починаючи з першої ненульової зліва.

У даних довідкових таблиць всі наведені цифри значущі.

Значущу цифру називають вірною, якщо абсолютна похибка числа не перевищує **половини** одиниці розряду, відповідного цій цифрі.

Приклад. $a = 9348$; $\Delta_{(a)} = 15$; $3210 = 9 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$.

Маємо $\Delta_{(a)} = 15 > 5$ і $\Delta_{(a)} = 15 < 50$; отже, вірні цифри 9, 3 і 4.

Загалом

$$\Delta_x \leq \frac{1}{2 \cdot 10^{m-n+1}}, \quad (5.19)$$

де m – порядок старшої цифри;

n – число вірних значущих цифр.

Відносна похибка пов'язана з кількістю вірних цифр наближеного числа виразом

$$\varepsilon_x \leq \frac{\Delta_x}{\alpha_m} \cdot 10^{-m} \leq \frac{10^{m-n-1}}{10^m \cdot \alpha_m} \leq \frac{1}{10^{n-1}}, \quad (5.20)$$

де α_m – старша значуща цифра.

Інформацію про те, що x є наближеним значенням числа a_{ic} з абсолютною похибкою Δ_x , прийнято записувати у вигляді

$$a_{ic} = a \pm \Delta_a, \quad (5.21)$$

причому числа a і $\Delta_{(a)}$ записуються з однаковою кількістю знаків після коми.

Наприклад, $a_{ic} = 1.125 \pm 0.005$ або $a_{ic} = 1.125 \pm 5 \cdot 10^{-3}$, означає, що $1.125 - 0.005 \leq A \leq 1.125 + 0.005$.

Інформацію про те, що x є наближеним значенням числа a_{ic} з відносною похибкою δ_x , записують у вигляді

$$a_{ic} = x[1 \pm \delta_{(x)}]. \quad (5.22)$$

Наприклад, запис $a_{ic} = 4.125 \cdot (1 \pm 0.005)$, або $a_{ic} = 4.125 \cdot (1 \pm 5 \cdot 10^{-3})$, або $a_{ic} = 4.125 \cdot (1 \pm 5 \%)$ означає, що $(1 - 0.005) \cdot 4.125 \leq a_{ic} \leq (1 + 0.005) \cdot 4.125$.

Похибка часткового $y = a_1/a_2$; $d(y) = \delta_{a_1} + \delta_{a_2}$; $\Delta y = |y| \cdot d(y)$.

Таким чином, гранична абсолютна похибка суми або різниці приблизних чисел дорівнює сумі граничних абсолютних похибок доданків [94].

При відніманні слід формули перетворювати так, щоб малі різниці двох величин розраховувалися безпосередньо, без обчислення їх самих, так як відносна похибка різниці у стільки разів більше за відносні похибки заданих чисел, у скільки разів сама різниця менше кожного з них [95].

Відносна похибка суми доданків одного знаку лежить між найменшою і найбільшою їх похибками.

При множенні чи діленні наближених чисел його відносна похибка дорівнює сумі відносних похибок співмножників чи діленого і дільника [94].

Гранична відносна похибка добутку або частки дорівнює сумі граничних відносних похибок.

Приклад. Знайти суму чисел $a_1 = 5.23$, $\delta_{(a_1)} = 0.04$; $a_2 = 1.015$, $\delta_{a_2} = 0.002$; $a_3 = 9.4$, $\delta_{a_1} = 0.1$ і визначити абсолютну похибку результату.

Маємо:

$$\begin{array}{r} 5.23 \pm 0.04 \\ +1.015 \pm 0.002 \\ +9.4 \pm 0.1 \\ \hline 15.645 \pm 0.142. \end{array}$$

Оскільки абсолютна похибка перевищує 0.1, в результаті зберігаємо тільки вірні значущі цифри $|15.645 - 15.6| = 0.045$.

Абсолютна похибка результату складає $0.142 + 0.045 = 0.187$.

Округляючи отриманий результат до другого десяткового знаку, отримуємо $\Delta_{(y)} = 0.19$. Таким чином маємо $y = 15.6 \pm 0.19$.

Якщо число доданків велике (наприклад, $n > 10$), то оцінка похибки здійснюється за формулою Чеботарьова

$$\Delta_a = \frac{\Delta_{a_1} + \Delta_{a_2} + \dots + \Delta_{a_n}}{\sqrt{3n}}, \quad (5.23)$$

де Δ_a — похибка доданків.

Приклад. Знайти добуток числа $a_1 = 1.45 \pm 0.01$, $a_2 = 2.28 \pm 0.02$ і $a_3 = 1.12 \pm 0.01$ і оцінити абсолютну і відносну похибки результату $0.01:1.4 + 0.02:2.28 + 0.01:1.12 \approx 0.015$.

Отже, добуток $y = 1.45 \cdot 2.28 \cdot 1.12 \approx 3.71$ обчислено з похибкою $\Delta_{(y)} \leq 1.5 \%$.

Таким чином $\Delta_{(y)} = \Delta_{(3.71)} = 0.018 \cdot 3.71 < 0.06$ [96].

5.6. НОРМАЛЬНИЙ ЗАКОН РОЗПОДІЛУ ВИПАДКОВИХ ПОХИБОК

Як закон розподілу випадкових похибок вимірювання найчастіше приймається нормальний закон розподілу (закон Гауса). Щільність нормального розподілу (3.16) є першою похідною (за умови, що вона існує) функції розподілу (3.17).

Ймовірність потрапляння випадкової похибки в симетричний інтервал $(-z_1, z_2)$ при нормальному розподілі обчислюється за формулою (5.24)

$$F(-z_1 < z < z_1) = F(|z| < z_1) = 2\Phi(z_1/\sigma), \quad (5.24)$$

де $\Phi(x)$ – функція Лапласа, яка розраховується за виразом (3.25).

Ймовірність влучення випадкової помилки в будь-який інтервал (z_1, z_2) в разі нормального розподілу обчислюється за формулою і (3.28).

$$F(x_1 < x < x_2) = \Phi(x_2/\sigma) - \Phi(x_1/\sigma). \quad (5.25)$$

Нарешті, ймовірність того, що випадкова похибка вийде за межі $\pm t\sigma$ ($t > 0$), дорівнює (5.26)

$$F(|x| > t\sigma) = 1 - 2\Phi(t). \quad (5.26)$$

При великих значеннях t ймовірність (5.26) дуже мала.

Якщо випадкові похибка z мають нормальний закон розподілу з щільністю (3.16), то розподіл результатів вимірювання $x = a + z$ має щільність [31]

$$\varphi_{a;\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad (5.27)$$

яка лише зміщена на величину a відрізняється від щільності (3.16). Цей закон розподілу називається загальним нормальним законом з центром a .

Щільність (3.16) може бути записана, як $\varphi_{a,\sigma}(z)$. Для випадкових похибок завжди передбачається, що центр їх розподілу дорівнює нулю [31].

5.7. ПОКАЗНИКИ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ

Показниками точності вимірювання СВ σ і СКВ s , відповідно (1.55) і (1.56). Крім цього іноді застосовуються і інші показники точності вимірювань. Співвідношення між різними показниками точності в разі нормального розподілу помилок такі.

Імовірна похибка (5.28)

$$\rho = 0.6745\sigma, \quad 2\Phi(\rho) = 0.5. \quad (5.28)$$

Середня абсолютна похибка

$$\theta = \int_{-\infty}^{\infty} |z| p(z) dz = \sigma \cdot \frac{\sqrt{2}}{\pi}. \quad (5.29)$$

Міра точності

$$h = \frac{1}{\sigma\sqrt{2}}. \quad (5.30)$$

5.8. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПОХИБКИ І СПОСОБИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Вимірювання виконуються за допомогою технічних засобів, які називаються *засобами вимірювань*. Засоби вимірювання включають в себе *міри*, *вимірювальні прилади* і *вимірювальні перетворювачі*.

Мірою (вимірювальним інструментом) називають засіб вимірювань, призначений для відтворення фізичної величини даного розміру, наприклад: міліметрова лінійка, набір важків для зважування, магазин опорів.

Вимірювальний прилад — засіб вимірювань, призначений для отримання сигналу у формі, доступній для сприйняття спостерігачем, наприклад, вольтметр, амперметр, термометр, манометр.

Вимірювальний перетворювач — засіб вимірювання, який видає сигнал у формі, прийнятній для передачі, подальшого перетворення і/або зберігання, але не призначений для сприйняття спостерігачем. Прикладами вимірювальних перетворювачів є термопара, набір опорів, дільник напруги [91].

Основними характеристиками вимірювальних приладів чи вимірювальних інструментів, що впливають на похибку виконуваних з їх допомогою вимірювань, є межа виміру і ціна поділки.

Межа вимірювання — максимальне значення величини, яке може бути виміряне за допомогою даної шкали приладу. Якщо межа вимірювання не вказана окремо, то його визначають за шкалою приладу [55].

Ціна поділки — значення вимірюваної величини, що відповідає самій меншій поділці шкали.

Похибка приладу — його визначена властивість, пов'язана з недосконалістю самого вимірювального інструменту. У залежності від виду вимірювального інструменту його абсолютна інструментальна похибка $\Delta_{\text{ин}}$ визначається одним із нижче перерахованих способів.

1. Точність виміру (ціна поділки) вказана безпосередньо на вимірювальному інструменті. Тоді його абсолютна похибка $\Delta_{\text{ин}}$ дорівнює точності (ціні поділки). Це інструменти, які мають ноніус [55].

Штангенциркуль, який використовується для вимірювання лінійних величин і має ціну найменшої поділки ноніуса 0.05 чи 0.1 мм (рис. 5.2). Його інструментальна похибка рівна точності ноніуса і становить $\Delta_{\text{ин}}=0.1$ мм [91].

2. Якщо на приладі не вказані ні точність вимірювання, а ні клас точності, то в залежності від характеру роботи приладу можливі два способи визначення параметра рівномірного розподілу:

а) Показчик значення вимірюваної величини може займати певні дискретні положення, відповідні поділкам шкали, наприклад, цифрові вимірювачі (годинники, секундоміри, цифрові вимірювачі напруги, лічильники імпульсів тощо). Такі прилади є приладами дискретної дії, і їх абсолютна похибка дорівнює **ціні поділки приладу** [91]. Наприклад, електронний цифровий омметр показує значення: 2.86 Ом. Ціна поділки приладу дорівнює 0.01 Ом і відповідно інструментальна похибка приладу становить $\Delta_{\text{ин}}=0.01$ Ом (рис. 5.3) [55].




Рис. 5.2. Штангенциркуль.

Проте, за [91, 97] інструментальними похибками цифрових приладів, коли вони не вказані на шкалі і не приведені в його паспорті, вважають *рівними половині останнього розряду цифрового індикатора* (рис. 5.3).

б) Показчик значення вимірюваної величини може займати будь-яке положення на шкалі приладу (лінійки, рулетки, мікрометри, стрілочних ваг, термометра і т. п.). У цьому випадку абсолютна похибка приладу дорівнює половині ціни поділки шкали. Отже, абсолютна похибка приладу *рівна половині величини найменшої поділки шкали* приладу чи інструменту [55]. За умови зняття відліку по лівому і правому краю вимірюваного об'єкта похибка відповідно (1.69) збільшується у $\sqrt{2}$ рази [98].

Наприклад, для металевої лінійки, яка застосовується для вимірювання лінійних величин (рис. 5.4) абсолютна похибка приладу є половина ціни найменшої поділки шкали, ціна якої становить 1 мм, тому інструментальна похибка $\Delta_{\text{ін}} = 0.5$ мм [91].

Наприклад, точність барабана мікрометра (рис. 5.5) становить 0.01 мм, тоді його інструментальна похибка дорівнює $\Delta_{\text{ін}} = 0.01$ мм [91].

Також за абсолютну похибку приладу приймається, як правило, половина ціни поділки шкали якщо стрілка приладу переміщається стрибком.

Наприклад, ціна найменшої поділки механічного секундоміра для секунд для десятих секунди 0.1 с. Таким чином інструментальна похибка секундоміра дорівнює $\Delta_{\text{ін}} = 0.1$ с [91].

3. Якщо табличні або експериментальні дані наводяться без вказівки похибки, то вважається, що ця похибка становить $\pm 0,5$ останньої значущої цифри [91]. Також якщо будь яка величина не вимірюється в даному досліді, а відомо лише її значення, то вона є заданим параметром. Його похибка приймається рівною половині одиниці останнього розряду числа, яким встановлено значення цього параметра [55].




Рис. 5.3. Цифровий омметр




Рис. 5.4. Металева лінійка




Рис. 5.5. Мікрометр

Наприклад, радіус дроту задано з точністю до сотих часток міліметра, тоді інструментальна похибка дорівнює $\Delta_{\text{ин}} = 0.005$ мм.

4. У деяких експериментах параметр рівномірного розподілу необхідно визначати дослідним шляхом. Тоді його величина може бути в кілька разів більше ціни поділки використовуваного приладу.

Наприклад, при вимірюванні великих відстаней малою мірою (лінійкою) для отримання одного значення прилад прикладається кілька разів.

При кожному застосуванні інструменту присутня похибка дорівнює ціні його поділки. Тоді похибка при таких вимірюваннях у стільки разів більше ціни поділки інструменту, скільки разів його доводилося прикладати, щоб виміряти одне відстань [55].

5.9. ПОХИБКИ ПРИЛАДІВ

Клас точності визначає гарантовані межі основних та додаткових похибок. Проте, використовувати цю характеристику для всіх приладів без винятку не можна. Треба ще знати форму смуги похибок приладів. Від цього залежить засіб нормування похибки даного приладу.

За формою смуги похибок розрізняють три типи приладів: прилади з *адитивною*, *мультиплікативною* та *комбінованою* смугами похибок.

5.9.1. Прилади з адитивною смугою похибок

Якщо смуга абсолютних похибок приладів обмежена двома паралельними лініями, тобто має сталу ширину Δ_0 , то такі прилади є приладами з *адитивною смугою похибок* (утвореною шляхом додавання) або похибкою нуля (рис. 5.6).

Головна особливістю адитивних приладів полягає у тому що *абсолютна похибка для будь-якого вимірювання у даному діапазоні залишається сталою*, змінюється тільки відносна похибка.

Це майже всі прилади зі стрілкою (навіть коли прилад має електронне устаткування). У цих приладах нормувати абсолютне значення Δ_0 незручно, тому що воно різне для різних ді-



Рис. 5.6. Адитивна смуга похибок

апазонів приладів з багатьма шкалами. При цьому нормують не абсолютне, а приведенне значення цієї похибки

$$\gamma_0 = \frac{\Delta_0}{x_m}, \quad (5.31)$$

де x_m – межа вимірювання (кінцеве значення шкали приладу).

Саме значення приведеної похибки, представлене у відсотках, використовується для визначення класу точності адитивних приладів.

Для електровимірювальних приладів клас точності приладу нормується у вигляді приведеної або відносної похибок і має градацію (у відсотках): 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 — **прецизійні** та 1.0, 1.8, 2.5, 4.0 — **технічні** прилади. Значення класу точності поміщається на лицьовій стороні приладу [97].

Але вважати, що наприклад, вольтметр класу точності 2.0 дає результати з похибкою 2 % є грубою помилкою. Насправді поточне значення відносної похибки

$\gamma_x = \frac{\Delta_0}{x}$ дорівнюєведеному значенню (5.31), тобто класу точності, тільки у кінці діапазону (див. рис. 5.7).

Оскільки $\Delta_0 = \text{const}$, то γ_x змінюється за гіперболою. Якщо позначити Δ_0 та x_m , то D – довжина діапазону вимірювань, а D_p – робоча частина. Таким чином не можна рекомендувати вимірювання на початкових ділянках шкали, де похибка дуже велика, точність приладу гірша. Далі по шкалі точність збільшується на 20–30 %.

Остання третина шкали саме і рекомендована для вимірювань (правило однієї третини). Штрихова зона на рис. 5.7, відповідно між значеннями 0–1 шкали рис. 5.8) взагалі заборонена для вимірювань.

Дуже часто Δ_0 дорівнює відстані між поділками шкали. У цьому випадку частки відстані між поділками не дають належної інформації про вимірювану величину.

Клас **адитивного приладу** (а їх більшість) вказується у вигляді **одного числа без описаного кола**, наприклад, 1.0, яке представляє собою приведенне значення похибки γ_0 [91], або у вигляді $\frac{2.0}{\sim}$ (рис. 5.8) при **нерівномірній шкалі** [55].




Рис. 5.7. Рекомендований діапазон вимірювань



Рис. 5.8. Мікровольтметр

Абсолютна похибка Δ_0 у одиницях вимірювання і відносна похибка $\gamma_{(x)}$ результату x у % становлять

$$\Delta_0 = \frac{\gamma_0 \cdot x_m}{100}; \quad (5.32)$$

$$\gamma_{(x)} = \frac{\gamma_0 \cdot x_m}{x}. \quad (5.33)$$

З огляду на це рекомендується у записах результатів вимірювань фіксувати діапазони приладу.

Наприклад, вимірювання напруги мікровольтметром, який має односторонню шкалу з межами вимірювання від 0 до 5 мкВ і ціну поділок 0.2 мкВ дало значення $U = 4.8$ мкВ (рис. 5.8). Таким чином нормуючим значенням є кінцеве значення шкали $U_{\text{норм}} = U_{\text{к}} = 5$ мкВ. На шкалі приладу позначено клас точності $\frac{2.0}{\%}$. Отже, заданий клас точності приладу визначає його наведену похибка $\gamma = 2\%$.

Інструментальна похибка відповідно до виразу (5.41) становить

$$\Delta_{\text{ін}} = \frac{\gamma \cdot x_{\text{норм}}}{100} = 2.0 \cdot 5 / 100 = 0.1 \text{ мкВ}.$$

Відносна похибка визначається для конкретного виміряного значення напруги U становить

$$\varepsilon_{\text{ін}} = \frac{100 \cdot \Delta_{\text{ін}}}{U} = 100 \cdot 0.1 / 4.8 = 2.08 \%.$$

Головна особливість адитивних приладів полягає у тому що зі зміною діапазону змінюється числове значення абсолютної похибки, але в межах діапазону вона знов таки залишається сталою.

5.9.2. Прилади з мультиплікативною смугою похибок

Існують прилади, смуга похибок яких має вигляд ділянки між двома розбіжними прямими лініями (рис. 5.10).

При цьому ширина смуги $\Delta_x = \alpha x$ збільшується із збільшенням вимірюваної величини x , де Δ_x – ширина смуги; α – клас точності приладу. Це прилади з мультиплікативною смугою похибок, тобто такою, що утворюється шляхом множення.

Для нормування похибок таких приладів використовують відносну похибку $\gamma_x = \frac{\Delta_x}{x}$, яка через те, що $\Delta_x = \alpha x$ залишається сталою $\gamma_x = \alpha = \gamma_s$.

Значення α у відсотках записують до паспорту як клас точності приладу, а відносну похибку позначену індексом γ_s називають похибкою чутливості.

Клас *мультиплікативного приладу* вказано у вигляді одного числа γ_s , представленого у відсотках і вписаного в коло, наприклад ②.5, яке вказує *відносну похибку* у відсотках [91]. Таким чином, відносна похибка становить $\gamma_x = \gamma_s$, а абсолютна похибка у одиницях вимірювання дорівнює $\Delta_x = \gamma_s \cdot x / 100$.

Це найзручніший, з погляду обробки результатів вимірювань, клас приладів. До нього відносяться: подільники напруги, шунти, вимірювальні трансформатори струму та напруги.

Абсолютна похибка Δ_x вимірювання за допомогою мультиплікативного приладу визначається множенням поточного значення вимірюваної величини x на клас точності приладу α




Рис. 5.9. Мультиплікативна смуга похибок

$$\Delta_x = \pm x \alpha \quad (5.34)$$

(не забуваючи, що значення класу точності α , вказаний у відсотках). Втім, не існує приладів, які не мають адитивної смуги похибок. Тому межі справедливості γ_s визначають додатково.

Приклад. Сила струму, виміряна амперметром з межею вимірювання $I_K = 1$ А, становить $I = 0.38$ А. На шкалі позначений клас точності ②.5. Це свідчить про те, що задається відносна похибка у відсотках $\epsilon_{in} = 2.5$ %.

Абсолютна інструментальна похибка Δ_{in} може бути визначена з формули (5.42) для конкретного виміряного значення сили струму

$$\Delta_{in} = \epsilon_{in} \cdot I / 100 = 2.5 \cdot 0.38 / 100 = 0.0095 \text{ А} = 9.5 \text{ мкА}.$$

5.9.3. Прилади з комбінованою смугою похибок

Існує велика кількість приладів з **комбінованою смугою** похибок (рис. 5.10). Така смуга включає як адитивну, так і мультиплікативну складові і на графіку має трапецієподібну форму. Ширина смуги випадку дорівнює $\Delta_x = \Delta_0 + \gamma_s x$, де Δ_0 адитивна і γ_s – мультиплікативна складові абсолютної похибки. Частіше цю формулу наводять у вигляді $\Delta_x = \Delta_0 + \alpha x$.

Комбіновану смугу похибок мають складні радіотехнічні прилади, наприклад, лампові та цифрові вольтметри, вимірювальні генератори, аналізатори спектру та інші.

Позначення класу точності таких приладів виконується

не одним числом, а двома у вигляді дробу γ_k/γ_n , де у чисельнику дробу у відсотках вказуються приведені похибки приладу у кінці діапазону γ_k і у знаменнику на початку діапазону γ_n [91]. При цьому зазвичай $\gamma_k = \gamma_n + \gamma_s$, тобто $\gamma_k = \gamma_n + \alpha$.

Для нормування похибки таких приладів існує два методи нормування: **адитивний** та **мультиплікативний**.




Рис. 5.10. Комбінована смуга похибок

5.9.3.1. Адитивний метод нормування

Представимо приведену похибка виразом, виконавши ділення абсолютної похибки Δ_x на величину межі вимірювання x_m як для адитивних приладів

$$\underline{\underline{\gamma_{ад}}} = \frac{\Delta_x}{x_m} = \frac{\Delta_0 + x\alpha}{x_m} = \frac{\Delta_0}{x_m} + \frac{x\alpha}{x_m}. \quad (5.35)$$

Підкреслена частина могла б використати як точність приладу, але виникає протиріччя: у розгорнутому виразі похибки є поточне значення x , яке вимірює споживач. Завод не може гарантувати дії споживача.

5.9.3.2. Мультиплікативний метод нормування

Виконаємо ділення абсолютної похибки Δ_x на поточне значення x вимірюваної величини (як у випадку з мультиплікативними приладами)

$$\underline{\underline{\gamma_{\text{мульт}}}} = \frac{\Delta_x}{x} = \frac{\Delta_0}{x} + \alpha. \quad (5.36)$$

У цьому виразі є також поточне значення вимірюваної величини x .

Тому зупиняються все ж на адитивному варіанті (5.35). Тут перша складова представляє собою вираз (5.31) і є приведеною похибкою на початку діапазону у відсотках. Вона визначається як адитивна похибка при підставленні $x=0$ до рівняння (5.35)

$$\gamma_{\text{п}} = \gamma_{\text{ад}, x=0} = \frac{\Delta_0}{x_m}. \quad (5.37)$$

Друга складова — наведена у відсотковому значенні приведена похибка у кінці діапазону, яка отримується при підставленні $x=x_m$ до (5.35)

$$\gamma_{\text{к}} = \gamma_{\text{ад}, x=x_m} = \frac{\Delta_0}{x_m} + \alpha = \gamma_{\text{п}} + \alpha. \quad (5.38)$$

Таким чином, поточне значення вимірюваної величини x відсутнє в обох рівняннях (5.37) і (5.38).

Значення абсолютної похибки приладу з комбінованою смугою похибок визначається за виразом, що зветься двочленною формулою $\Delta_x = \Delta_0 + x\alpha$, причому значення Δ_0 та α визначаються з рівнянь (5.37) і (5.38).

Часто до паспорту приладу (або до інструкції) заноситься видозмінена двочленна формула. Рівняння (5.37) і (5.38) вирішуються сумісно, щоб отримати не абсолютну а відносну похибку результату, яка у % становить

$$\gamma_x = \gamma_{\text{к}} + \gamma_{\text{п}} \left(\frac{x_m}{x} - 1 \right). \quad (5.39)$$

Абсолютна похибка у одиницях вимірювання дорівнює

$$\Delta_x = \frac{\gamma_x x}{100}. \quad (5.40)$$

Наприклад, при вимірюванні напруги вольтметром зі шкалою розрахованою на 300 В на якій написано 0.04/0.02 отримано результат 200 В.

За виразом (5.39) маємо $\gamma_x = 0.04 + 0.02 \cdot (300/200 - 1) = 0.05 \%$.

За виразом (5.40) отримуємо $\Delta_x = 0.05 \cdot 200/100 = 0.1$ В.

Оскільки комбіновані прилади містять адитивну складову похибки, то вони потребують фіксації у записах діапазону вимірювань, бо зі зміною діапазону змінюється значення абсолютної похибки.

Взагалі, щоб не помилитися рекомендується обов'язково записувати діапазони вимірювання приладу незважаючи на тип його смуги похибок.

Наприклад, магазин опорів МСР-60М дозволяє встановлювати значення опорів від $R = 0,01$ Ом до $R_K = 9999,99$ Ом. Ціна найменшої поділки становить 0,01 Ом. Магазин опорів має клас точності $0.2/2 \cdot 10^{-5}$, що виражає відносну похибку.

Відносна похибка приладу за формулою (5.43) визначається виразом

$$\varepsilon_{\text{ин}} = \left[c + d \left(\frac{R_K}{\bar{R}} - 1 \right) \right] \%,$$

де $c = 0.2$; $d = 2 \cdot 10^{-5}$;

R_K – нормуючий (кінцевий) опір;

\bar{R} – встановлене значення опорів.

Якщо на магазині встановлено значення опору $\bar{R} = 2000$ Ом, то відносна інструментальна похибка цього значення буде дорівнює

$$\varepsilon_{iR} = \left[0.02 + 2 \times 10^{-5} \times \left(\frac{9999.99}{2000} - 1 \right) \right] = 20 \%.$$

Абсолютну похибку визначимо за формулою

$$\Delta_{iR} = \varepsilon_{iR} \cdot \bar{R} / 100 = 0.20 \cdot 2000 / 100 = 4 \text{ Ом [91].}$$

5.10. СПОСОБИ НОРМУВАННЯ ПОХИБОК ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Як бачимо, похибка приладу — його визначена властивість, пов'язана з недосконалістю самого вимірювального інструменту і її не можна зменшити статистичною обробкою отриманих даних [91, 97].

Особливу роль відіграє оцінка похибок, що виникають при використанні електровимірювальних приладів. У цьому випадку вимірювання кожної величини проводиться, як правило, тільки один раз, і точність результату визначається похибкою використовуваного приладу.

При електричних вимірюваннях крім абсолютної похибки приладу $\Delta_{\text{ін}}$, рівній різниці між показанням приладу і дійсним значенням вимірюваної величини (вираз (5.15), і відносної похибки $\left| \frac{\Delta_{\text{ін}}}{\bar{x}} \right|$ (вираз (5.16), оцінюється та-

кож приведена похибка γ , яка дорівнює відношенню абсолютної похибки до граничного значення величини (вираз (5.37), тобто найбільшому її значенні, яке можна виміряти за шкалою приладу $|x_m|$. Найбільше значення приведеної похибки, відповідне максимально абсолютній похибці, яка допускається даними приладом, називається класом точності.

Відповідно до ГОСТ 13600–68 нормується (визначається) граничне значення інструментальної похибки засобу вимірювання, тобто інструментальна похибка задається з ймовірністю $P=1$ при нормальних умовах експлуатації.

Межі основної похибки засобів вимірювань встановлюються у вигляді **абсолютних $\Delta_{\text{ін}}$, приведених γ або відносних $\epsilon_{\text{ін}}$** похибок, або у вигляді певного числа поділок шкали. Значення похибок вказуються у вигляді умовних позначень на шкалі приладу, або у його паспорті. Якщо умови експлуатації приладу відрізняються від нормальних, то може виникати додаткова похибка.

Абсолютна похибка засобу вимірювання виражається:

а) одним значенням

$$\Delta_{\text{ін}} = a,$$

де a – постійна величина;

б) у вигляді залежності межі допустимої похибки від виміряного значення величини

$$\Delta_{\text{ін}} = a + b \cdot \bar{x},$$

де a, b – постійні величини.

Приведена похибка γ використовується для нормування похибки приладів зі шкалами, що **мають постійну абсолютну інструментальну похибку $\Delta_{\text{ін}}$** по всій шкалі приладу. Вона виражена у відсотках від так званого нормуючого значення $x_{\text{норм}}$

$$\gamma = \frac{100 \cdot \Delta_{\text{ін}}}{x_{\text{норм}}} = c, \quad (5.41)$$

де c – число, вказане на шкалі приладу.

Абсолютна похибка обчислюється із формули (5.41)

$$\Delta_{\text{ін}} = \frac{\gamma \cdot x_{\text{норм}}}{100}. \quad (5.42)$$

Відносна інструментальна похибка $\varepsilon_{\text{ін}}$ використовується для нормування (визначення) похибки засобів вимірювань, у яких відносна похибка залишається постійною у всьому діапазоні вимірювань або залежить від значення вимірюваної величини. Вона виражається однією з формул (5.43)–(5.45) [91]:

$$\varepsilon_{\text{ін}} = 100 \cdot \left| \frac{\Delta_{\text{ін}}}{\bar{x}} \right| = c, \quad (5.43)$$

де c – число, вказане на шкалі приладу у вигляді ⑤;

$$\varepsilon_{\text{ін}} = \left[c + d \left(\left| \frac{x_m}{\bar{x}} \right| - 1 \right) \right], \quad (5.44)$$

де c, d – постійні величини, зазначені на шкалі приладу у вигляді відношення c/d ;

x_m – межа вимірювання приладу, тобто найбільше значення, яке може вимірювати прилад;

$$\varepsilon_{\text{ін}} = \left[c + d \left(\left| \frac{x_0}{\bar{x}} \right| - 1 \right) \right], \quad (5.45)$$

де x_0 – значення вимірюваної величини, при якому $\varepsilon_{\text{ін}}$ має мінімальне значення [91].

Відносна похибка приладу $\varepsilon_{\text{ін}}$, виражена однією з формул (5.43)–(5.45), використовується для визначення межі основної допустимої похибки стрілочних і цифрових електровимірювальних приладів, магазинів опорів і ємностей [91].

Цифровий прилад електровимірювання ЦАВОМ В7-16 призначений для вимірювання сили струму I , напруги U , електричного опору R . Формули для розрахунку відносних похибок приладу при вимірюванні вказаних величин наведені в описі приладу. Наприклад, відносна похибка вимірюваної напруги U представлено виразом

$$\varepsilon_{iU} = \left(0.05 + 0.05 \cdot \frac{U_m}{U} \right) \%, \quad (5.46)$$

де U_m – межа вимірювань.

Припустимо, на вольтметрі встановлений межа вимірювання (діапазон) $U_k = 1$ В. При вимірі отримано значення напруги $\bar{U} = 0.250$ В. Тоді відносна інструментальна похибка приладу за формулою (5.46) дорівнює

$$\varepsilon_{\text{ін}} = \left(0.05 + 0.05 \times \frac{1}{250} \right) = 0.25 \, \%.$$

Абсолютну похибку визначимо за формулою (5.43)

$$\Delta_{\text{ін}} = \varepsilon_{\text{ін}} \cdot \bar{U} / 100 = 0.25 \cdot 0.250 / 100 = 0.65 \cdot 10^{-3} \text{ В.}$$

5.11. ПОХИБКИ ПРИ ВИМІРЮВАННЯХ

5.11.1. Похибка одноразового вимірювання при рівномірному розподілі випадкових величин

Прямі одноразові вимірювання є основним видом технічних вимірювань і проводяться в тому випадку, коли очікується нехтувано мала (у порівнянні з інструментальною) випадкова похибка.

При однократних вимірюваннях за виміряне значення величини приймається результат одного вимірювання [91]

$$\bar{x} = x_1.$$

За інструментальну похибку $\Delta_{\text{ін}}$ засоби вимірювання слід прийняти абсолютну похибку вимірювання

$$\Delta_x = \Delta_{\text{ін}}.$$

Відносну похибку обчислити за формулою (5.43) [91]

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta_x}{\bar{x}} \cdot 100\% . \quad (5.47)$$

Так як при одноразових вимірюваннях випадкова величина підпорядковується закону рівномірної щільності (див. підрозділ **3.2 Безперервні розподіли**), значення випадкової величини з'являються з однаковою ймовірністю.

Дисперсія для закону рівномірної щільності і стандартний відхил визначаються відповідно залежностей, поданих на с. 132

$$s^2 = \frac{\Delta_{\text{ин}}^2}{3}; \quad (5.48)$$

$$s = \frac{\Delta_{\text{ин}}}{\sqrt{3}}, \quad (5.49)$$

де $\Delta_{\text{ин}}$ – абсолютна інструментальна похибка приладу.

Таким чином ймовірність P того, що вимірювана величина x лежить в інтервалі $(\bar{x} \pm \sigma)$ становить 57.74 % (див. с. 132). Отже, щоб знайти довірчий інтервал для рівномірно розподіленої випадкової величини, досить помножити величину довірчої ймовірності P на параметр рівномірного розподілу, тобто абсолютну похибку $\Delta_{\bar{x}_{\Pi}}$ приладу. Довірчий інтервал такої величини позначають $\Delta_{\bar{x}_{0.5}}$ і називають *похибкою одноразових вимірювань*. Тоді при рівні значущості $\alpha=0.05$ маємо $\Delta_{\bar{x}_{0.5}} = 0.95\Delta_{\bar{x}_{\Pi}}$.

Так як найбільш часто похибка одноразових вимірювань пов'язана з точністю використовуваних вимірювальних приладів, параметр рівномірного розподілу також називають *похибкою приладу*.

Використовуючи правила подання результатів вимірювання (див. підрозділ 5.16 Правила подання результатів вимірювань), слід визначити кількість значущих цифр у абсолютній і відносній похибці, і у значенні вимірюваної величини.

Результат вимірювань для довірчої ймовірності $P=1$ слід представляти у вигляді [91]

$$x = (\bar{x} \pm \Delta_{\bar{x}_{0.5}}); \epsilon_x = c \% ; P = 1. \quad (5.50)$$

5.11.2. Довірчі інтервали випадкової похибки

При відсутності в результатах спостережень систематичних похибок або за умови, що відношення невиключної систематичної похибки θ до оцінки середньоквадратичного відхилу результату $s_{\bar{x}}$ вимірювання відповідає умові

$$\frac{\theta}{s_{\bar{x}}} < 0.8, \quad (5.51)$$

за похибку результату вимірювання приймається її випадкова складова [91]

$$\Delta_x = \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}. \quad (5.52)$$

Величину $t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}$ зручніше визначати статистичною функцією пакету аналізу **MS Excel** **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ** (див. с. 63).

Коефіцієнт довіри показує, у скільки разів потрібно збільшити СКВ середнього, щоб при заданому числі вимірювань отримати задану надійність їх результату. При розрахунку випадкової похибки задається надійність вимірювань P , яка у залежності від цілей вимірювань і вимог до них приймають рівною 0,9; 0,95; 0,96; 0,98; 0,99; 0,997; 0,999, тобто при розрахунку випадкової похибки задаються рівнем значущості α 0.1, 0.05, 0.04, 0.02, 0.01, 0.003 і 0.0001 [97]. Відповідно до ГОСТ 8.207–76 рекомендується приймати $\alpha=0.05$.

Такий рівень значущості береться при виконанні технічних вимірювань, а також при контролі параметрів технологічного процесу, наприклад, у харчовій та автомобільній промисловості.

При неможливості повторного вимірювання рекомендується приймати $\alpha=0.01$. В особливих випадках, коли результати вимірювання мають велике значення для здоров'я людей, допускається приймати більш високу довірчу ймовірність.

Зі зменшенням α квантиль Стьюдента t_{α} зменшується, ступінь довіри до результату вимірювання підвищується, і тому можуть бути використані більш вузькі межі заданих інтервалів, в яких очікується поява даного результату.

Існує ряд рекомендацій з вибору коефіцієнта t_{α} [19, 99]:

а) при нормальному законі розподілу випадкової величини коефіцієнт t_{α} вибирається з квантилів Стьюдента при прийнятому рівні значущості α і числі ступенів вільності $v = n - 1$;

б) для розподілів виду Лапласа з ексцесом $Ex=6$, нормального розподілу з ексцесом $Ex=3$, рівномірного розподілу з ексцесом $Ex=1.8$ трапецеїдального з ексцесом $Ex=2$ і похибкою, що не перевищує 4 % і при довірчого рівня значущості $0.01 \leq \alpha \leq 0.10$, коефіцієнт визначається за формулою

$$t_{\alpha} = 1.62 \left[3.8 \cdot (\varepsilon - 1.6)^{2/3} \right]^{\lg \lg \left(\frac{1}{\alpha} \right)}; \quad (5.53)$$

в) для кругловершинних двомодальних розподілів з ексцесом $1 \leq Ex \leq 3$ і рівні значущості $0.001 \leq \alpha \leq 0.800$ і похибкою не менше 10 %

$$t_{\alpha} = 1.6 \{ 3.6 [1 + tg(\varepsilon - 1)] \}^{\lg \lg \left(\frac{1}{\alpha} \right)}; \quad (5.54)$$

г) для розподілу типу Шапо з ексцесом $1.8 \leq Ex \leq 6.0$ з похибкою до 8 %

$$t_{\alpha} = 1.56 \left[1.12 + \frac{(\varepsilon - 1)^{0.58}}{\sqrt{10}} \right] \lg \left(\frac{0.1}{\alpha} \right); \quad (5.55)$$

д) для гостровершинних двомодальних розподілів з ексцесом $1.8 \leq Ex \leq 6.0$ при $0.001 \leq \alpha \leq 0.800$ з похибкою 5 % відповідно залежності

$$t_{\alpha} = 1.23 \left[1 + \sqrt{\frac{\varepsilon - 1}{2.5}} \lg \left(\frac{0.175}{\alpha} \right) \right]; \quad (5.56)$$

е) для законів розподілу від Лапласа до рівномірного та деяких двомодальних з похибкою до 10 % за виразом

$$t_{0.10} = 1.6, \quad t_{0.05} = 1.8. \quad (5.57)$$

5.11.3. Визначення меж невиключної систематичної похибки результату вимірювань

Якщо невиключні систематичні похибки θ у 8 і більше разів перевищують середньоквадратичні відхили результату $s_{\bar{x}}$ вимірювання [91]

$$\theta / s_{\bar{x}} > 8, \quad (5.58)$$

то за похибку результату вимірювання приймається систематична похибка [100].

Згідно [92] за невиключну систематичну похибку приймають складову похибки результату вимірювань, обумовлену похибками обчислення і введення поправок на вплив систематичних похибок або систематичну похибку, поправка, на дію якої не введена внаслідок її малості.

Межі невиключної систематичної похибки θ при числі доданків $n \leq 3$ обчислюють за формулою

$$\Delta_x = \theta = \pm \sum_{i=1}^n |\theta_i|. \quad (5.59)$$

При числі невиключних систематичних похибок $n \geq 4$ розрахунки виконуються за формулою

$$\Delta_x = \theta = K \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n \theta_i^2}. \quad (5.60)$$

де θ – межа i -ої невиключної систематичної похибки;
 K – коефіцієнт залежності окремих невиключних систематичних похибок від обраного довірчого рівня статистичної значущості α при їх рівномірному розподілі (при $\alpha=0.01$; $K \approx 1.4$).

Значення коефіцієнта для інших випадків представлені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 – Коефіцієнт K систематичної похибки

Рівень значущості	Число складових похибки n					Середня
	2	3	4	5	...	
$\alpha=0.1$	0.97	0.95	0.95	0.95	...	0.95
$\alpha=0.05$	1.10	1.12	1.12	1.12	...	1.11
$\alpha=0.01$	1.27	1.37	1.41	1.42	...	1.40

Невиключна систематична похибка θ розглядається в даному випадку як довірна квазівипадкової похибки.

Довірча межа θ_i для i -ої складової похибки може бути знайдена з урахуванням значень квантилів t_α рівномірного закону розподілу, використовуючи принцип геометричного підсумовування.

Слід зазначити, що межі невиключної систематичної похибки обчислюються шляхом побудови композицій невиключних похибок засобів і методів вимірювань та похибок, викликаних іншими факторами (умови вимірювання, перекалібрування приладів та ін.) При підсумовуванні похибок за формулами (5.59), (5.60) передбачається їх рівномірний розподіл у встановлених межах.

Таблиця 5.2 – Квантили законів розподілу			
Закон розподілу	Значення α		
	0.90	0.95	0.99
Нормальний	1.645	1.96	2.576
Рівномірний	1.55	1.64	1.71
Трикутний	1.67	1.90	2.20

Для деяких законів розподілу квантили t_α представлені в табл. 5.2.

Якщо відношення невиключних систематичних складових похибки до середньоквадратичних відхилів результату $s_{\bar{x}}$ вимірювання має межі

$$0.8 \leq \frac{\theta}{s_{\bar{x}}} \leq 8, \quad (5.61)$$

то за похибка результату вимірювання без урахування знаку беруть композицію випадкової Δx_i і систематичної складових θ похибки

$$\Delta_{x_{\Sigma}} = k(\Delta_{x_i} - \theta), \quad (5.62)$$

де k – коефіцієнт, що залежить від співвідношення $\theta/s_{\bar{x}}$, його значення наведені у табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Значення коефіцієнта k

$\theta/s_{\bar{x}}$	0.5	0.75	1	2	3	4	5	6	7	8
$\alpha = 0.05$	0.81	0.77	0.74	0.71	0.73	0.76	0.78	0.79	0.8	0.81
$\alpha = 0.01$	0.87	0.85	0.82	0.80	0.81	0.82	0.83	0.83	0.84	0.85

5.12. ВИКЛЮЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ З ГРУБИМИ ПОХИБКАМИ

Анормальним називається результат спостереження, який з причин випадкового порушення нормальних умов або грубих помилок (промахів) вимірювання різко відхиляється від групи результатів спостережень, які називаються **нормальними**. Природно виникає підозра, що допущена груба помилка. У цьому випадку необхідно відразу ж перевірити, чи не порушені основні умови вимірювання. При цьому слід мати на увазі, що цей результат міг належати тій же генеральній сукупності, що і інші результати спостережень, але ймовірність його появи мала. В цьому випадку виключення такого результату призведе до помилки розрахунків.

Грубі помилки (промахи) змінюються випадковим чином при повторних спостереженнях, істотно перевищуючи значення, виправдане об'єктивними умовами вимірювання [101]. Тому з точки зору теорії ймовірності поява промаху мало ймовірно.

Причинами промахів бути неконтрольовані зміни умов вимірювань, несправність, помилки оператора та ін.

Для виключення грубих помилок застосовують апарат перевірки статистичних гіпотез, наприклад, про вид невідомого розподілу, або про параметри відомих розподілів.

Приклади статистичних гіпотез:

1) розглянута вибірка (або її окремих результат) належить генеральній сукупності;

2) генеральна сукупність розподілена по нормальному закону. Тому спочатку слід оцінити можливість прийняття гіпотези нормального розподілу;

3) дисперсії двох нормальних сукупностей рівні між собою.

По-перше, у двох гіпотезах зроблено припущення про вид невідомого розподілу та належність окремих (сумнівних) результатів даному виду розподілу, а в третій — про параметри двох відомих розподілів. Поряд з висунутою гіпотезою розглядають і альтернативну. Нульовою (основною вважається висунута гіпотеза. А альтернативною є та, що суперечить нульовий.

Нульова гіпотеза підтверджує приналежність сумнівного результату вимірювання (спостереження) даній групі вимірювань. Формальним критерієм аномальності результату спостережень, тобто підставою для прийняття конкуруючої гіпотези що сумнівний результат x_c (зазвичай крайній елемент варіаційного ряду — x_{\min} чи x_{\max}) не належить даній групі вимірів, служить межа, віднесена від центру розподілу на величину $t \cdot s$, тобто умова

$$|x_c - \bar{x}| \geq t_{\alpha(v)} \cdot s. \quad (5.63)$$

Таким чином, межі похибки залежать від виду розподілу, обсягу вибірки та обраної довірчої ймовірності.

У деяких критеріях порівняння виконуються не з середнім, а із суміжними значенням.

Максимальне або мінімальне спостереження вважається викидом, якщо значення відповідної статистики перевищить критичне: $t \geq t_{\alpha}$, де α — заданий рівень значимості.

При обробці вже наявних результатів спостережень доволіно відкидати окремі результати не слід, так як це може привести до фіктивного підвищення точності результату вимірювань. Група вимірів (вибірка) може містити кілька грубих похибок і їх виключення виконують послідовно.

Всі методи виключення грубих похибок (промахів) можуть бути розділені на два основних типи:

1) обчислення виконується за всією вибіркою;

2) перед обчисленням з неї виключають сумнівні результати.

Після виключення промахів операції з визначення оцінок центру розподілу і СКВ результатів спостережень і вимірювань необхідно повторити.

Оскільки критеріальні вимоги (коефіцієнти), що визначають межу, за якою знаходяться промахи у різних авторів різні, то перевірку слід виконувати відразу за кількома критеріями (не менше трьох) і остаточний висновок про приналежність сумнівних результатів аналізованої сукупності спостережень слід робити за декількома критеріями. Причому при змозі використання параметричних критеріїв застосовувати і непараметричні.

Загалом при застосуванні критеріїв визначення викидів у вибірці при заданому рівні значущості вибірку ранжують за зростанням і перевіряють крайні значення (максимум і мінімум вибірки) на викид за таблицями критичних значень.

Слід звернути увагу, що у польових та виробничих умовах є велика шумове поле – похибка експерименту тут завжди значно більше, ніж в лабораторіях [51].

5.12.1. Параметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань і виключення помилкових значень

5.12.1.1. Метод виключення при відомому σ

Для перевірки аномальності значення x_c у вибірці x_1, x_2, \dots, x_n , тобто, обсягом n за виразом (1.22) знаходиться середнє арифметичне значення \bar{x} для вибірки без її сумнівного значення (*неповної вибірки*) і виконується розрахунок згідно формули (5.64)

$$t = \frac{|x_c - \bar{x}|}{\sigma} \cdot \sqrt{\frac{n-1}{n}} \quad (5.64)$$

підрахуємо емпіричний двобічний рівень значущості використовуючи статистичну функцію **2-2*НОРМ.СТ.РАСП(_;истина)** MS Excel.

Це дає можливість того, що відношення випадково прийме значення не менше ніж t , за умови, що значення x_c не містить грубої помилки (що помилка результату x_c тільки випадкова). Якщо підрахована таким чином ймовірність виявиться дуже мала, то перевірене значення містить грубу помилку і його слід виключити з подальшої обробки результатів вимірювань [31].

При обраному рівні α малих ймовірностей вважають, що аномальне значення x_c містить грубу помилку, якщо для відповідного відношення t (5.64) ймовірність $p < \alpha$.

Щоб підкреслити імовірнісний характер цього висновку, указується, що значення x_c містить грубу помилку з критичним рівнем значущості α .

Підкреслимо, що зазначений прийом застосовується тільки тоді, коли величина про СВ відома заздалегідь.

Розгляд застосування формули (5.64) та інших для оцінки сумнівного значення 54.00 при $\sigma = 11.7$ наведено в табл. 5.4.

З результатів бачимо, що розрахунковий рівень значущості p менше прийнятого α , тобто, $p = 0.0211 < \alpha = 0.05$, таким чином значення 54.00 є грубою помилкою.

5.12.1.2. Метод виключення при невідомому s

Якщо величина СКВ s заздалегідь невідома, то вона оцінюється за формулою (1.56).

При цьому абсолютну величину різниці $|x_c - \bar{x}|$ між аномальним значенням x_c і середнім \bar{x} значенням решти (прийнятних) результатів ділять на СКВ s (5.65) (обидва показники для *неповної вибірки*) і отримане відношення порівнюють з критичними значеннями $t_{\alpha(n)}$, взятим з табл. Д.2.

Таблиця 5.5. Оцінка сумнівних даних методом виключення при невідомому s		
	А	В
1		Значення заміру
2	B8=СЧЁТ(B2:B7)	18.66
3	B9=СРЗНАЧ(B2:B6)	21.40
4	B10=ABS(B7-B9)	23.60
5		28.06
6		30.53
7		54.00
8	Обсяг вибірки n	6
9	Середнє $\bar{x}_{\text{ср}}$	24.45
10	Різниця Δx	29.55
11	Ср.кв.др.від. s	4.84
12	Коефіцієнт t	6.11
13	Прийн.рівень α	0.05
14	Критич.знач. $t_{\text{кр}}$	2.78

B11=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B6)

54.00 є грубою помилкою.

Таблиця 5.4. Оцінка сумнівних даних методом виключення при відомому σ

	А	В
1		Значення заміру
2	B8=СЧЁТ(B2:B7)	18.66
3	B9=СРЗНАЧ(B2:B6)	21.40
4	B10=ABS(B7-B9)	23.60
5		28.06
6		30.53
7		54.00
8	Обсяг вибірки n	6
9	Середнє $\bar{x}_{\text{ср}}$	24.45
10	Різниця Δx	29.55
11	Станд. відхил σ	11.7
12	Коефіцієнт t	2.31
13	Рів.значущ. p	0.0211

B12=B10*((B8-1)/B8)^0.5/B11

B13=2*(1-НОРМ.СТ.РАСП(B12;ИСТИНА))

Умова за якою розрахунковий коефіцієнт при даному числі прийнятних результатів n (*неповної вибірки*) і рівні значущості α нижче критичного, тобто $t < t_{\text{кр}}$, свідчить не про відсутність грубої помилки, а лише про відсутність достатніх підстав для виключення аномального значення.

$$t = \frac{|x_c - \bar{x}|}{s} \quad (5.65)$$

Розгляд застосування формули (5.65) та інших для оцінки сумнівного значення 54.00 наведено в табл. 5.5. За табл. Д.2 на с. 1072 для $n=6$ і $\alpha=0.05$ маємо $t_{\text{кр}}=2.87$.

З результатів бачимо, що розрахунковий коефіцієнт нижче критичного, тобто $t = 6.11 < t_{\text{кр}} = 2.78$, таким чином значення

5.12.1.3. Оцінка за t -критерієм Стюдента

Таблиця 5.6. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Стюдента

	А	В	С
1		Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2	B22=СЧЁТ(B2:B21)	*=A3	
3	B23=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B21)	38	
4	B25=СТЮДРАСПОБР(D25;(D23-1))	39	
5	B26=МИН(B2:B21)	44	
6	B27=СРЗНАЧ(B2:B21)	52	
7	B28=МАКС(B2:B21)	33	
8	B29=(B27-B26)/B23	46	
9	B30=(B28-B27)/B23	28	
10		50	
11		36	
12		28	
13		42	
14		49	
15		36	
16		40	
17		40	
18		*=A19	
19		45	
20		36	
21		36	
22	Обсяг вибірки	18	
23	СКВ	6.91	
24	Задана значущість	0.05	
25	Теоретичний t -критерій	2.110	
26	Мінімальне значення	28	
27	Середнє значення	39.89	
28	Максимальне значення	52	
29	Емпіричний критерій меншого	1.72	Без викидів
30	Емпіричний критерій більшого	1.75	Без викидів

C29=ЕСЛИ((B25-B29)>0;"Без викидів";"Викид меншого")
C30=ЕСЛИ((B25-B30)>0;"Без викидів";"Викид більшого")

Принцип вирішення питання про аномальну полягає в тому, що за результатами вимірювань розраховується певна функція від випадкової величини, для якої відомо розподіл ймовірностей. Обчислене за вибірковими даними значення цієї функції порівнюється з її граничним значенням, відповідним заздалегідь прийнятому рівню значущості [102].

Якщо відомо, аномальне (сумнівне значення x_c) є крайнім членом варіаційного ряду. Цей критерій ґрунтується на обчисленні і оцінці частки від ділення різниці між середнім значенням \bar{x} і сумнівним x_c , тобто максимальним x_{\max} чи мінімальним x_{\min} значенням вибірки на СКВ *повної вибірки* s . Критерій Стюдента є параметричним і вимагає наявності нормального розподілу оцінюваної сукупності, тобто не менше восьми даних [74] щоб при вилученні аномальної величини лишилося сім значень, які можна вважати розподіленими за нормальним законом [58]⁷⁾.

Критерій Стюдента табульований для вибірок обсягом від двох до ∞ (табл. В.5) [15, 12]. Також для $n \leq 3$ застосовується достовірний рівень значущості $\alpha = 0.1$, а для $n \geq 4$ — $\alpha = 0.05$, хоч за рекомендаціями [57, 77, 78] цей метод застосовується для вибірок при $n \geq 5$.

Нормальність досліджуваного розподілу підтверджена у підрозділі 6.7 Перевірка нормальності розподілу за складеним критерієм d.

⁷⁾ Чи не є це основою приказки “Семеро одного не ждуть”?

$$t = \frac{|\bar{x} - x_c|}{s}. \quad (5.66)$$

У *першу* чергу сумнівними є мінімальні і максимальні значення. При розрахунках за формулою (5.66) фактичні значення t –критерію Стьюдента при ступені вільності $\nu=n-1$ (чарунки **B29** і **B30**) які порівнюються з $t_{\alpha(\nu)}$ – з його критичним значенням (чарунка **B25**), знайденим за функцією **Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** при відповідному рівні значущості α і ступенях вільності ν).

Отримані емпіричні значення t порівнюють з критичним $t_{\alpha(\nu)}$ і за умови $t \geq t_{\alpha(\nu)}$ результат x_c вважають грубою помилкою і виключаються із розгляду.

Якщо є n вимірювань x_1, x_2, \dots, x_n і потрібно встановити оцінку довірчу межу для деякого майбутнього $(n+1)$ вимірювання, сумісного з іншими вимірами. Для цього визначається \bar{x} і s , користуючись n вимірами, а довірча межа для вимірювання x_{n+1} , сумісного з іншими n значеннями x , знайдемо з виразу

$$x_{n+1} - \bar{x} = t_{\alpha(\nu)} \cdot s \cdot \sqrt{\frac{n+1}{n}}, \quad (5.67)$$

для відповідного рівня значущості α і ступені вільності $\nu = n - 1$ [103].

Застосування цього методу розглянуто у табл. 5.6 за формулами, наведеними на її полі, на прикладі експериментальних даних, викладених у табл. 2.5, с. 349. За її результатами всі мінімальні і максимальні значення повторень знаходяться у межах достовірності з прийнятим рівнем значущості.

5.12.1.4. Оцінка за r –критерієм з використанням стандартного відхилу

Запропонований критерій [103] є параметричним і відповідно вимагає наявності нормального розподілу оцінюваної сукупності, тобто не менше восьми даних [74]. Проте, він табульований для вибірок обсягом від 3 до 25 (табл. Д.3 на с. 1073), а роботі [103] він використаний для вибірок обсягом від 4, а згідно [104] навіть від 3 повторень.

Цей критерій ґрунтується на обчисленні і оцінці частки від ділення різниці між середнім значенням \bar{x} і сумнівним x_c , тобто максимальним x_{\max} чи мінімальним x_{\min} значенням вибірки на СВ *повної вибірки* σ (5.68).

Отримані за виразом (5.68) емпіричні значення r_{\min} і r_{\max} порівнюють з критичним $r_{\alpha(n)}$ і за умови $t \geq r_{\alpha(n)}$ результат x_c вважають грубою помилкою і виключаються із розгляду.

Застосування цього методу розглянуто у табл. 5.7 за формулами, наведеними на її полі, на прикладі експериментальних даних, викладених у табл. 2.5, с. 349. За її результатами всі мінімальні і максимальні значення повторень знаходяться у межах достовірності з прийнятим рівнем значущості.

$$r = \frac{|\bar{x} - x_c|}{\sigma} \quad (5.68)$$

Таблиця 5.7. Результати оцінки сумнівних даних за r -критерієм

	А	В	С
1		Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2		22	
3	B22=СЧЁТ(B2:B21)	38	
4	B23=СТАНДОТКЛОН.Г(B2:B21)		
5	B24=МИН(B2:B21)	44	
6	B25=СРЗНАЧ(B2:B21)	52	
7	B26=МАКС(B2:B21)	33	
8	B28=(B25-B24)/B23	46	
9	B29=(B26-B25)/B23	28	
10		50	
11		36	
12		28	
13		42	
14		49	
15		36	
16		40	
17		40	
18		18	
19		45	
20		36	
21		36	
22	Обсяг вибірки n	20	
23	Стандартний відхил σ	8.75	
24	Мінімальне значення x_{\min}	18	
25	Середнє значення x_{mid}	37.90	
26	Максимальне значення x_{\max}	52	
27	Заданий рівень значущості α	0.05	
28	Коефіцієнт мінімального викиду r^{\min}	2.274	Без викидів
29	Коефіцієнт максимумного викиду r^{\max}	1.611	Без викидів
30	Критичне значення $r_{\alpha(n)}$	2.701	

C28=ЕСЛИ((B30-B28)>0;"Без викидів";"Викид меншого")
C29=ЕСЛИ((B30-B29)>0;"Без викидів";"Викид більшого")

5.12.1.5. Критерій Смирнова–Граббса при відомій генеральній дисперсії

При застосуванні параметричного критерію М. В. Смирнова (інші назви — критерій Граббса, критерій Смирнова (Граббса) треба мати на увазі, що він придатний лише для нормального розподілу вимірюваної величини ⁸⁾ [59].

Слід зазначити, що міжнародний стандарт ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002 [105] та ГОСТ Р 8-736-2011 [21] рекомендують використовувати для аналізу вибірок на грубі помилки при одному сумнівному значенні в вибірці критерій Граббса. Однак в таблицях процентних точок критерію Граббса, наведених у цих стандартах, рівні значущості завищені в два рази (див. табл. Д.5 на с. 1075 і Д.7 на с. 1076), а якщо зменшити їх відповідним чином, то критерій Граббса зводиться до критерію Н. В. Смирнова [59].

Щоб оцінити сумнівне значення x_c , тобто, приналежність x_{\min} чи x_{\max} до даної сукупності і прийняти рішення про їхнє виключення або залишення, при відомій генеральній дисперсії σ^2 (наприклад, коли генеральна дисперсія досить точно відома за поточними вимірами) використовують статистику критерію t_α .

Для оцінки сумнівно значення x_c обчислюють критерій t за формулою

$$t = \frac{|\bar{x} - x_c|}{\sigma}. \quad (5.69)$$

Отримане емпіричне значення $t_{\text{емп}}$ порівнюють з табличним t_α , наведеними в табл. Д.4 на с. 1074. За умови $t \geq t_\alpha$ результат x_c вважають грубою помилкою і відкидають.

Для більш точного отримання значення t_α окрім табл. Д.4 можна знаходити їх за формулами табл. 5.8. Крім того їх використання дає змогу автоматизувати розрахунки критерію.

Таблиця 5.8. Рівняння для розрахунку критичного значення t_α для $n > 25$	
Рівень значущості α	Критичне значення t_α
0.10	$0.3053 \cdot \ln(n) + 1.6513$
0.05	$0.2849 \cdot \ln(n) + 1.9517$
0.01	$0.2648 \cdot \ln(n) + 2.4839$

⁸⁾ Вперше правильне рішення задачі щодо оцінки аномалії результатів спостережень було дано Н. В. Смирновим у 1941 р. У 1950 р. Ф. Е. Граббс повторив результати Н. В. Смирнова без посилання на нього.

5.12.1.6. Оцінки сумнівних даних за критерієм Смирнова

При нормальному розподілі досліджуваного параметра і обсязі випробувань не більше 25 використовують статистику критерію М. В. Смирнова U_α (якщо обсяг випробувань більше 25, вибіркове СКВ досить близьке до генерального СВ, і можна використовувати статистику t_α) [59].

Як і у виразі (5.69) для сумнівного значення x_c , яким є x_{\min} чи x_{\max} обчислюють критерій $U_{\text{емп}}$ за формулою (5.70) [59, 102].

Практично формула (5.70) повністю співпадає з формулою (5.66).

$$U = \frac{|\bar{x} - x_c|}{s}. \quad (5.70)$$

Розрахункове значення порівнюють з табличним U_α , наведеними в табл. Д.5, яку М. В. Смирнов отримав при дослідженні розподілу статистик (5.70) для процентних точок $U_{\alpha,n}$ (квантілі порядку $P=1-\alpha$) для $\alpha=0.01; 0.05; 0.01$ при $3 \leq n \leq 20(25)$.

При обраному рівні значущості α і кількості дослідів n критична область для критерію Смирнова будується за умови $U \geq U_\alpha$, тут U_α – табличні значення (див. табл. Д.5).

Результат порівнюють з величиною U_α , взятою з табл. Д.5 для даного обсягу вибірки і прийнятого рівня значущості α .

Якщо $U \geq U_\alpha$, то підозрюваний в аномальності результат спостереження є аномальним і може бути виключений з вибірки, інакше він вважається нормальним.

У разі якщо виконується одна з умов (статистика потрапляє в критичну область), то нульова гіпотеза відхиляється, тобто промах x_{\min} чи x_{\max} випадковий і не характерний для розглянутої сукупності даних, а визначається умовами, що змінилися або грубими помилками при проведенні дослідів. Тоді значення x_{\min} чи x_{\max} виключають із розгляду, а знайдені раніше оцінки піддаються коректуванню з урахуванням відкинутого результату.

Також у залежності від обчислюваних відносних відхилень спостереження ділять на три групи:

- 1) $t < t_\alpha$ чи $U < U_\alpha$ – сумнівне спостереження x_c не порушує однорідність вибірки і не вилучається ні в якому разі;
- 2) $t \geq t_\alpha$ чи $U \geq U_\alpha$ – спостереження x_c значимо відхиляється від \bar{x} , а значить, є грубою похибкою і вилучаються як нетипове;
- 3) $t_{10\%} < t \leq t_{25\%}$ чи $U_{10\%} < U \leq U_{25\%}$ – потрібні додаткові аргументи на користь відсіву спостереження [116].

Застосування критерію Смирнова подано у табл. 5.9 за формулами, наведеними на її полі, на прикладі аналізу експериментальних даних, поданих 2.5, с. 349.

Таблиця 5.9. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Смирнова

— при використанні СВ			— при використанні СКВ		
	А	В		А	В
1	B22=СЧЁТ(В2:В21) B23=СТАНДОТКЛОН.Г(В2:В21) B25=0.2849*LN(B22)+1.9517 B26=МИН(В2:В21) B27=СРЗНАЧ(В2:В21) B28=МАКС(В2:В21) B29=(B27-B26)/B23 B30=(B28-B27)/B23	Кількість стручків на центральної гілці, шт.	1		Кількість стручків на центральної гілці, шт.
2		22	2	B22=СЧЁТ(В2:В21)	22
3		38	3	B23=СТАНДОТКЛОН.В(В2:В21)	38
4		39	4	B26=МИН(В2:В21)	39
5		44	5	B27=СРЗНАЧ(В2:В21)	44
6		52	6	B28=МАКС(В2:В21)	52
7		33	7	B29=(B27-B26)/B23	33
8		46	8	B30=(B28-B27)/B23	46
9		28	9		28
10		50	10		50
11		36	11		36
12		28	12		28
13		42	13		42
14		49	14		49
15		36	15		36
16		40	16		40
17		40	17		40
18		18	18		18
19		45	19		45
20		36	20		36
21		36	21		36
22	Обсяг вибірки	20	22	Обсяг вибірки	20
23	Середньостатистич. відхил СВ	8.75	23	СКВ	8.98
24	Задана значущість	0.05	24	Задана значущість	0.05
25	Теоретичний критерій t_{α}	2.730	25	Теоретичний критерій U_{α}	2.805
26	Мінімальне значення	18	26	Мінімальне значення	18
27	Середнє значення	37.90	27	Середнє значення	37.90
28	Максимальне значення	52	28	Максимальне значення	52
29	Емпіричний критерій меншого	2.27	29	Емпіричний критерій меншого	2.22
30	Емпіричний критерій більшого	1.61	30	Емпіричний критерій більшого	1.57

В чарунку **B25** занесені значення t_{α} , розраховане за виразом, поданим у табл. 5.8 для $\alpha = 0.05$ та U_{α} взяте з табл. Д.5 для $\alpha = 0.05$.

5.12.1.7. Критерій Шарльс

Критерій Шарльс [20] використовується для оцінки на грубі похибки сумнівних значень нормально розподіленої вибірки при $n \leq 20$ ($5 \leq n \leq 100$). Згідно з ним сумнівне значення оцінюється за формулою (5.71), яка повністю співпадає з формулами (5.66) чи (5.70), тобто відповідає розрахунковій формулі для критерію Стюдента і Смирнова–Грabbса

$$K_{ш} = \frac{|\bar{x} - x_c|}{s}. \quad (5.71)$$

Критичні значення $K_{шт}$ критерію Шарльє наведені в табл. Д.6 на с. 1075.

Користуючись критерієм Шарльє, відкидають результат, для значення якого в ряду з n спостережень виключається значення для якого емпіричне значення більше за критичне, тобто $K_{ш} > K_{шт}$.

Однак, якщо порівняти критичні значення критерію Стьюдента чи Смирнова–Граббса (табл. Д.5) і критерію Шарльє (табл. Д.6), то видно, що рівні значущості для табличних значень критерію Шарльє явно вищі. Це означає високу ймовірність того, що прийнятне максимальне або мінімальне значення вибірки буде прийнято за грубу похибку. Такі рівні значущості на-вряд чи прийнятні. Тому використання критерію Шарльє слід визнати недо-цільним [59].

5.12.1.8. Критерій Граббса

5.12.1.8.1. Критерій Граббса для одного викиду

Критерій Граббса ґрунтується на порівнянні сум квадратів відхилень від середнього вихідної і скороченої (без крайнього, тобто мінімального чи максимального елемента) вибірок.

За варіаційним рядом x_1, x_2, \dots, x_n отримують оцінки \bar{x} , \bar{x}_n і \bar{x}_1 , де \bar{x} середнє розраховується за всією ранжованою вибіркою відповідно виразу (1.22), \bar{x}_n – середнє, визначене за вибіркою без останнього x_n члена (5.72) і \bar{x}_1 – середнє, визначене за вибіркою без першого x_1 (5.73)

$$\bar{x}_n = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} x_i; \quad (5.72)$$

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=2}^n x_i \quad (5.73)$$

Далі перевіряються критерії G_1 для мінімального x_1 і G_n для максимального x_n значень ряду

$$G_1 = \frac{\sum_{i=2}^n (x_i - \bar{x}_1)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad G_n = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (x_i - \bar{x}_n)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (5.74)$$

Якщо значення статистик G_1 або G_n менше критичного значення U_α , то відповідно спостереження x_1 або x_n є грубими помилками. Критичні значення U_α для $n \leq 25$ наведені в табл. Д.5. Для критерію Граббса спостереження повинно бути вилючене за умов, наведених у підрозділі 5.12.1.5 **Критерій Смирнова–Граббса**.

Після відсіву спостережень, визнаних нетиповими, перевірку на грубі помилки повторюють для скороченою вибірки.

Таблиця 5.10. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Граббса для одного викиду

	А	В	С	Д	Е
1	B28=СУММКВ(С3:С21)/СУММКВ(Д2:Д21) B29=СУММКВ(Е2:Е20)/СУММКВ(Д2:Д21) C28=ЕСЛИ((B24-B28)>0;"Без викидів";"Викид меншого") C29=ЕСЛИ((B24-B29)>0;"Без викидів";"Викид більшого")	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Різниця з середнім без x_1	Різниця з середнім \bar{x}	Різниця з середнім без x_n
2		18		19.9	19.2
3		22	16.9	15.9	15.2
4		28	10.9	9.9	9.2
5		28	10.9	9.9	9.2
6		33	5.9	4.9	4.2
7		36	2.9	1.9	1.2
8		36	2.9	1.9	1.2
9		36	2.9	1.9	1.2
10		36	2.9	1.9	1.2
11		38	0.9	-0.1	-0.8
12		39	-0.1	-1.1	-1.8
13		40	-1.1	-2.1	-2.8
14		40	-1.1	-2.1	-2.8
15		42	-3.1	-4.1	-4.8
16		44	-5.1	-6.1	-6.8
17		45	-6.1	-7.1	-7.8
18		46	-7.1	-8.1	-8.8
19		49	-10.1	-11.1	-11.8
20		50	-11.1	-12.1	-12.8
21		52	-13.1	-14.1	
22	Обсяг вибірки	20	B22=СЧЁТ(В2:В21) B25=СУММ(В3:В21)/(B22-1) B26=СРЗНАЧ(В2:В21) B27=СУММ(В2:В20)/(B22-1) C3=\$B\$25-B3 D2=\$B\$26-B2 E2=\$B\$27-B2		
23	Задана значущість	0.05			
24	Теоретичний критерій U_α	2.709			
25	Середнє значення без x_1	38.95			
26	Середнє значення \bar{x}	37.90			
27	Середнє значення без x_n	37.16			
28	Емпіричний критерій меншого	0.73	Без викидів		
29	Емпіричний критерій більшого	0.86	Без викидів		

Застосування цього методу розглянуто у табл. 5.10. У чарунку **В24** занесене значення U_α взяте за табл. Д.7 для одного викиду при $\alpha = 0.05$.

За результатами табл. 5.10 всі мінімальні і максимальні значення повторень знаходяться у межах достовірності з прийнятим рівнем значущості.

5.12.1.8.2. Перевірка за критерієм Граббса на два викиди

Критерій Граббса ґрунтується на порівнянні сум квадратів відхилень від середнього вихідної і скороченої (без двох крайніх мінімального і наступного та максимального і попереднього значень) вибірок.

За варіаційним рядом x_1, x_2, \dots, x_n отримують оцінки \bar{x} , $\bar{x}_{1,2}$ і $\bar{x}_{n-1,n}$, де \bar{x} середнє розраховується за всією ранжованою вибіркою відповідно виразу (1.22), $\bar{x}_{1,2}$ – середнє, визначене за вибіркою без останнього x_n і передостаннього x_{n-1} члена (5.72) і $\bar{x}_{n-1,n}$ – середнє, визначене за вибіркою без першого x_1 і наступного x_2 члена (5.73)

$$\bar{x}_{1-n,n} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-2} x_i; \quad (5.75)$$

$$\bar{x}_{1,2} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=3}^n x_i. \quad (5.76)$$

Далі перевіряються критерії $G_{1,2}$ для першого x_1 і наступного x_2 члена та $G_{n-1,n}$ для останнього x_n і передостаннього x_{n-1} значень ряду

$$G_{1,2} = \sum_{i=3}^n (x_i - \bar{x}_{1,2})^2 / \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2; \quad (5.77)$$

$$G_{n-1,n} = \sum_{i=1}^{n-2} (x_i - \bar{x}_{n-1,n})^2 / \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (5.78)$$

Якщо значення статистик $G_{1,2}$ або $G_{n-1,n}$ виявляться менше критичного значення U_α , то відповідні спостереження $x_{1,2}$ або $x_{n-1,n}$ відносять до грубих помилок. Критичні значення U_α для $n \leq 25$ наведені в табл. Д.7. Для критерію Граббса спостереження повинно бути вилучене за умов, наведених у підрозділі **5.12.1.5 Критерій Смирнова–Граббса** на с. 254.

Після відсіву спостережень, визнаних нетиповими, перевірку на грубі помилки повторюють для скороченою вибірки.

Перевірка за критерієм Граббса на два викиди розглянуто у табл. 5.11, за формулами, наведеними на її полі.

Таблиця 5.11. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Граббса для двох викидах

— початок розрахунку

— кінцевий етап розрахунку

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	B28=СУММКВ(C4:C21)/СУММКВ(D2:D21) B29=СУММКВ(E2:E19)/СУММКВ(D2:D21) C28=ЕСЛИ((B24-B28)>0;"Без викидів";"Викид меншого") C29=ЕСЛИ((B24-B29)>0;"Без викидів";"Викид більшого")	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Різниця з середнім без $x_{1,2}$	Різниця з середнім x	Різниця з середнім без $x_{n-1,n}$	1	B28=СУММКВ(C12:C13)/СУММКВ(D10:D13) C29=СУММКВ(E10:E11)/СУММКВ(D10:D13) C28=ЕСЛИ((B24-B28)>0;"Без викидів";"Викид меншого") C29=ЕСЛИ((B24-B29)>0;"Без викидів";"Викид більшого")	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Різниця з середнім без $x_{1...8}$	Різниця з середнім x	Різниця з середнім без $x_{n-9...n}$
2		18		19.9	18.4	2					
3		22		15.9	14.4	3					
4		28	11.9	9.9	8.4	4					
5		28	11.9	9.9	8.4	5					
6		33	6.9	4.9	3.4	6					
7		36	3.9	1.9	0.4	7					
8		36	3.9	1.9	0.4	8					
9		36	3.9	1.9	0.4	9					
10		36	3.9	1.9	0.4	10		36		2.3	1.0
11		38	1.9	-0.1	-1.6	11		38		0.3	-1.0
12		39	0.9	-1.1	-2.6	12		39	0.5	-0.8	
13		40	-0.1	-2.1	-3.6	13		40	-0.5	-1.8	
14		40	-0.1	-2.1	-3.6	14					
15		42	-2.1	-4.1	-5.6	15					
16		44	-4.1	-6.1	-7.6	16					
17		45	-5.1	-7.1	-8.6	17					
18		46	-6.1	-8.1	-9.6	18					
19		49	-9.1	-11.1	-12.6	19					
20		50	-10.1	-12.1		20					
21		52	-12.1	-14.1		21					
22	Обсяг вибірки	20	B22=СЧЁТ(B2:B21) B25=СРЗНАЧ(B4:B21) B26=СРЗНАЧ(B2:B21) B27=СРЗНАЧ(B2:B19) C4=\$B\$25-B4 D2=\$B\$26-B2 E2=\$B\$27-B2			22	Обсяг вибірки	4	B22=СЧЁТ(B10:B13) B25=СРЗНАЧ(B12:B13) B26=СРЗНАЧ(B10:B13) B27=СРЗНАЧ(B10:B11) C12=\$B\$25-B12 D10=\$B\$26-B10 F10=\$B\$27-B10		
23	Задана значущість	0.05				23	Задана значущість	0.05			
24	Теоретичний критерій U_α	0.4391				24	Теоретичний критерій U_α	0.0002			
25	Середнє значення без $x_{1,2}$	39.89				25	Середнє значення без $x_{1...8}$	39.50			
26	Середнє значення x	37.90				26	Середнє значення x	38.25			
27	Середнє значення без $x_{n-1,n}$	36.44				27	Середнє значення без $x_{n-9...n}$	37.00			
28	Емпіричний критерій менших	0.53	Викиди менших			28	Емпіричний критерій менших	0.06	Викиди менших		
29	Емпіричний критерій більших	0.75	Викиди більших			29	Емпіричний критерій більших	0.23	Викиди більших		

Прикладом служать експериментальні дані, подані у табл. 2.5, с. 349. У чарунку **B24** занесене значення U_{α} взяте за табл. Д.7 для двох викидів при $\alpha = 0.05$.

За результатами табл. 5.11 отримано, що викидами є як два найменші, так і два найбільші значення вибірки. Викиди слід вилучити з вибірки і продовжити розрахунки далі.

У результаті такої перевірки виявилось що всі значення вибірки є викидами, тобто спосіб виявився для даного випадку непридатним головним чином через завищення рівнів значущості завищені у два рази [59].

5.12.1.9. Застосування критерію v

Таблица 5.12. Результаты оценки сомнительных данных за критерием v		
	А	В
1		Кількість стручків на центральной гілці, шт.
2	B22=СЧЁТ(B2:B21)	22
3	B23=СТАНДОТКЛОН.Г(B2:B21)	38
4	B26=МИН(B2:B21)	39
5	B27=СРЗНАЧ(B2:B21)	44
6	B28=МАКС(B2:B21)	52
7	B29=(B27-B26)/B23	33
8	B30=(B28-B27)/B23	46
9		28
10		50
11		36
12		28
13		42
14		49
15		36
16		40
17		40
18		18
19		45
20		36
21		36
22	Обсяг вибірки	20
23	СКВ	8.75
24	Задана значущість	0.05
25	Теоретичний критерій v	2.623
26	Мінімальне значення	18
27	Середнє значення	37.90
28	Максимальне значення	52
29	Емпіричний критерій меншого	2.27
30	Емпіричний критерій більшого	1.61

Цей параметричний критерій перевірки вибірки на наявність однієї грубої помилки використовується при умові $3 \leq n \leq 52$ і ґрунтується на обчисленні і оцінці частки від ділення різниці між середнім \bar{x} і сумнівним значенням x_c максимальним x_{\max} чи мінімальним x_{\min} значенням вибірки на стандартний відхил *повної вибірки* σ (5.79)

$$v = \frac{|\bar{x} - x_c|}{\sigma}, \quad (5.79)$$

де σ – стандартний відхил, розрахований за формулою (1.55).

Власне, ця формула відповідає формулі (5.69).

Отримані значення розрахунків порівнюються з критичними значеннями $v_{кр}$, наведеними у табл. Д.8 [8] та Д.9 [100, 106]. Якщо вони попадають в критичну область критерію при обраному рівні значущості α і кількості дос-

лідів n , тобто має місце $v^{\min} \geq v_{\alpha,n}$ або $v^{\max} \geq v_{\alpha,n}$, тут $v_{\alpha,n}$ – табличні (критичні)

значення, то x_{\min} або x_{\max} є нехарактерним для даної сукупності і із заданим рівнем ймовірності оцінюється як випадкові та виключають із розгляду, а вибірка корегується з урахуванням відкинутого результату [8].

Перевірка за критерієм v розглянуто у табл. 5.12 за формулами, наведеними на її полі, на прикладі експериментальних даних, поданих у табл. 2.5, с. 349.

У її чарунку **B25** занесене значення $v_{\alpha,n} = 2.623$, взяте з табл. Д.8 для $n=20$ і $\alpha=0.05$.

5.12.1.10. Критерій 3s. Критерій Райта (4s)

Обидва критерії застосовуються коли СКВ s визначається на підставі досить великого (понад 20–50) числа вимірювань [49, 102].

Відповідно до цього критерію мають бути відкинуті всі результати вимірювань, випадкові похибки Δx_i яких перевищують $3s$ — правило трьох сигм (для критерію Райта навіть $4s$). Причому стандартний відхил розраховується для всієї вибірки, включаючи чи результат, що містить грубу похибку).

Слід зауважити, що вилучення аномальних результатів за критерієм трьох сигм сприяє перетворення вибірки у нормально розподілену (див. с. 304).

Відповідно цих критеріїв повинна виконуватися умова (5.80)

Таблиця 5.13. Результати оцінки сумнівних даних за критеріями $3s$ і Райта ($4s$)

	А	В	С
1		Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2		22	
3	B22=СЧЁТ(В2:В21)	38	
4	B23=СТАНДОТКЛОН.В(В2:В21)	39	
5	B26=МИН(В2:В21)	44	
6	B27=СРЗНАЧ(В2:В21)	52	
7	B28=МАКС(В2:В21)	33	
8	B29=(В27-В26)/В23	46	
9	B30=(В28-В27)/В23	28	
10		50	
11		36	
12		28	
13		42	
14		49	
15		36	
16		40	
17		40	
18		18	
19		45	
20		36	
21		36	
22	Обсяг вибірки	20	
23	СКВ	8.98	
24	Задана значущість	0.05	
25	Теоретичний критерій 3σ	3	
26	Мінімальне значення	18	
27	Середнє значення	37.90	
28	Максимальне значення	52	
29	Емпіричний критерій меншого	2.22	Без викидів
30	Емпіричний критерій більшого	1.57	Без викидів

C29=ЕСЛИ((В25-В29)>0;"Без викидів";"Викид меншого")
C30=ЕСЛИ((В25-В30)>0;"Без викидів";"Викид більшого")

$$\frac{|\bar{x} - x_c|}{s} < 3(4), \quad (5.80)$$

якщо ні, то аналізований результат є грубою похибкою.

Результати оцінки експериментальних даних, поданих у табл. 2.5, с. 349 за критеріями $3s$ і Райта згідно виразу (5.80), представлені табл. 5.13.

5.12.1.11. Рекомендації Г. А. Аганекяна

Для виключення промахів Г. А. Аганекян рекомендує додержання умови (5.81).

Стандартний відхил розраховується для вибірки з включенням сумнівних результатів.

$$\frac{|\bar{x} - x_{\min, \max}|}{s} < \begin{cases} 4.0 \text{ при } 6 < n \leq 100 \\ 4.5 \text{ при } 100 < n \leq 1000 \\ 5.0 \text{ при } 1000 < n \leq 10000 \end{cases} . \quad (5.81)$$

Якщо виявляється, що дані не є промахами, їх включають до розрахунку оцінки \bar{x} і s і все заново перераховується [107].

5.12.1.12. Критерій В. І. Романовського

Критерій В. І. Романовського ґрунтується на розподілі Стюдента і застосовується для оцінки на грубу помилку одного сумнівного значення вибірки нормального розподілу при малому числі вимірів ($n < 20$) [102].

Виходячи зі ступеня достовірності, яка повинна бути забезпечена, заданим рівнем значущості α , частка від ділення різниці між сумнівним значенням вибірки і її середнім арифметичним $|\bar{x} - x_c|$ на СКВ s , тобто (5.82)

$$\beta = \frac{|\bar{x} - x_c|}{s} \quad (5.82)$$

повинна не перевищувати деякого табличного значення β_{α, n_T} , представлено-го для різних значень рівня значущості α числі вимірів n *без урахування сумнівної значення*. При цьому рекомендується застосовувати критерій Романовського при обсягах вибірки не більше 20 в табл. Д.10 чи Д.11. Тобто повинно бути $\beta \leq \beta_{\alpha, n_T}$.

Критерій Романовського при автоматизованій обробці краще розрахувати за рівняннями, наведених в табл. Д.13.

Якщо дана умова не виконується, то аналізований результат є грубою помилкою. При цьому коефіцієнт β і середньоквадратичний відхил s обчислюється *за усиченою вибіркою і з виключенням сумнівних результатів*.

У табл. Д.12 наведено процентні точки для максимального значення вибірки, а також при деяких обсягах вибірок — для мінімального значення. У більшості випадків вони не однакові [59].

Перевірка вибірки на викиди за критерієм Романовського розглянуто у табл. 5.14 за формулами, наведеними на її полі, на прикладі експериментальних даних, поданих у табл. 2.5, с. 349.

У її чарунку **B26** занесене значення β_T , розраховане за формулою табл. Д.13 для $n = 19$ (усиченої вибірки) і $\alpha = 0.05$.

Таблиця 5.14. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Романовського			
	A	B	C
1	B22=СЧЁТ(B2:B21)-1 B27=МИН(B2:B21) B28=СРЗНАЧ(B3:B21) B29=СРЗНАЧ(B2:B20) B30=МАКС(B2:B21) B31=(B28-B27)/B23 B32=(B30-B29)/B24 B23=СТАНДОТКЛОН.В(B3:B21) B24=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B20)	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	S31=ЕСЛИ((B26-B31)>0;"Без викидів";"Викид меншого") S32=ЕСЛИ((B26-B32)>0;"Без викидів";"Викид більшого") B26=(1.688*B22^2-0.2988*B22^1-1.5-0.737*B22^1-1+0.4096*B22^1-0.5+0.18422)^-0.8
2		18	
3		22	
4		28	
5		28	
6		33	
7		36	
8		36	
9		36	
10		36	
11		38	
12		39	
13		40	
14		40	
15		42	
16		44	
17		45	
18		46	
19		49	
20		50	
21		52	
22	Обсяг усиченої вибірки	19	Без викидів Без викидів
23	СКВ перевірки мінімуму	7.87	
24	СКВ перевірки максимуму	8.57	
25	Задана значущість	0.05	
26	Теоретичний критерій β_T	3.13	
27	Мінімальне значення	18	
28	Середнє значення мінімуму	38.95	
29	Середнє значення максимуму	37.16	
30	Максимальне значення	52	
31	Емпіричний критерій меншого	2.66	
32	Емпіричний критерій більшого	1.73	

5.12.1.13. Критерій Ірвіна

При нормальному розподілі досліджуваного показника для оцінки елементів вибірки на грубі помилки (аномальні значення) часто використовують критерій Ірвіна (іноді вказують, що критерій Ірвіна, запропонований у 1925 році може застосовуватися при будь-якому розподілі або просто не враховують вид розподілу [49].

У варіаційному ряду значень вибірки оцінюють сумнівне значення на одному з кінців варіаційного ряду. Для цього обчислюють розрахункове значення критерію Ірвіна (5.83) [59]

$$\eta = \frac{x_k - x_{k-1}}{s}, \quad (5.83)$$

де x_k, x_{k-1} – сумнівне та попереднє значення варіаційного ряду;
 k – кількість значень варіаційного ряду (обсяг вибірки від 2 до 1000).

При цьому обчислення СКВ s проводиться за *усім обсягом вибірки*, можливе також використання в розрахунках генерального СВ, якщо воно відоме з високою точністю [59].

Отримане розрахункове значення критерію Ірвіна порівнюють з табличним і η_T , значення якого зазвичай подано в табл. Д.14 [108] і більш точні дані в табл. Д.16 [59].

Якщо $\eta_{\text{емп}} \geq \eta_T$, то розглядається значення відкидають і перевіряють наступне. Перевірку продовжують, поки не отримають $\eta < \eta_T$.

Якщо крайнє значення ряду не є за критерієм Ірвіна грубою помилкою, у разі сумніву у наступних, чи попередніх значеннях, слід перевірити. Однак для автоматизованої обробки даних зручно розраховувати η_T з прийнятною точністю за залежностями, наведеними з прийнятною точністю для вибірок обсягом від 3 до 1000 у табл. 5.15 та 5.16 [59]. І якщо вони є викидами, то крім них вилучається також і відповідне крайнє значення.

Таблиця 5.15. Розрахунок табличного значення критерію Ірвіна η_T	
Рівень значущості α	Розрахункова формула
0.10	$2/\sqrt{n} + 0.6$
0.05	$2.5/\sqrt{n} + 0.75$
0.01	$3/\sqrt{n} + 1.15$

Таблиця 5.16. Розрахунок табличного значення критерію Ірвіна η_T

α	Розрахункова формула
0.10	$-132.78n^{-3} + 224.24n^{-2.5} - 165.27n^{-2} + 68.614n^{-1.5} - 16.109n^{-1} + 3.693n^{-0.5} + 0.549$
0.05	$-229.21n^{-3} + 422.39n^{-2.5} - 320.96n^{-2} + 124.594n^{-1.5} - 26.15n^{-1} + 4.799n^{-0.5} + 0.7029$
0.01	$-205.06n^{-3} + 424.26n^{-2.5} - 352.483n^{-2} + 43.747n^{-1.5} - 33.401n^{-1} + 6.381n^{-0.5} + 1.049$

У табл. Д.17 наведені розраховані автором [59] табличні значення критерію Ірвіна для других значень варіаційного ряду за умови, що перші значення не визначаються як груба помилка і враховуються при розрахунку.

Однак для автоматизованої обробки даних зручно розраховувати η_T з прийнятною точністю за залежностями, наведеними з прийнятною точністю для вибірок обсягом від 3 до 1000 у табл. 5.15 та 5.16 [59].

Результати розрахунків η_T , виконаних за табл. 5.15, наведені в табл. Д.15.

Порівнюючи табл. Д.14 і Д.15, бачимо що починаючи з $k=3$ їхні дані практично співпадають.

Але автоматизований розрахунок η_T не виключає великої ручної роботи при перевірці промахів із застосуванням критерію Ірвіна.

Застосування критерію Ірвіна розглянуто у табл. 5.17. Тут у чарунку **B25** занесене значення $\eta_T=1.267$, розраховане за формулою, взятою з табл. 5.16, що відповідає значенню табл. Д.16 для рівня значущості $\alpha=0.05$.

Особливістю розрахунку емпіричних критеріїв у чарунках **B27** і **B28** є використання статистичних функцій **MS Excel** **НАИМЕНЬШИЙ** і **НАИБОЛЬШИЙ**, які дозволяють знаходити величину за місцем, яке вона займала б у ранжованій вибірці (див. Додаток А).

За результатами оцінки бачимо що всі сумнівні як мінімальні, так і максимальні значення експериментальних даних за критерієм Ірвіна знаходяться у межах достовірності з прийнятим рівнем значущості.

Таблиця 5.17. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Ірвіна			
	А	В	С
1	B22=СЧЁТ(B2:B21) B23=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B21) B25=-,229,21*B22^,3+422,39*B22^,2,5-320,96*B22^,2+124,594*B22^,1,5-26,15*B22^,1+4,799*B22^,0,5+0,7029 B27=(НАИМЕНЬШИЙ(B2:B21;2)-МИН(B2:B21))/B23 B28=(МАКС(B2:B21)-НАИБОЛЬШИЙ(B2:B21;2))/B23 C27=ЕСЛИ((B25-B27)>0;"Без викидів";"Викид меньшого") C28=ЕСЛИ((B25-B28)>0;"Без викидів";"Викид більшого")	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2		18	
3		22	
4		28	
5		28	
6		33	
7		36	
8		36	
9		36	
10		36	
11		38	
12		39	
13		40	
14		40	
15		42	
16		44	
17		45	
18		46	
19		49	
20		50	
21		52	
22	Обсяг вибірки	20	
23	СКВ	8.98	
24	Задана значущість	0.05	
25	Теоретичний критерій η_T	1.267	
26	Середнє значення	37.90	
27	Емпіричний критерій меньшого	0.45	Без викидів
28	Емпіричний критерій більшого	0.22	Без викидів

5.12.2. Критерій Шовене

5.12.2.1. Загальноприйнятий критерій Шовене

Критерій Шовене використовується при числі вимірів ($n < 10$) і розраховується за формулою (5.84), яка є аналогом а виразу (5.70), що застосовується для отриманні даних при визначенні критерію Н. В. Смирнова (табл. 5.9) [49]. Тобто з отриманого ряду обсягом n вибирається аномальне (мінімальне та максимальне значення) і обчислюється модуль його відхилення від середнього арифметичного у частках вибіркового середнього квадратичного відхилення (5.84)

$$Z_{\min} = \frac{\bar{x} - x_{\min}}{s} \quad \text{чи} \quad Z_{\max} = \frac{x_{\max} - \bar{x}}{s}. \quad (5.84)$$

З табл. 5.9 бачимо, що при розгляді сумнівних мінімальних і максимальних значень повторів, для їх виключення як помилкових значень, за виразом (5.84) відповідно було б отримані максимальні показники 0.92 і 1.10.

Потім обчислюється ймовірність цього відхилення, а також очікуване число n вимірювань, які дадуть значення, що мають відхилення Z не менше ніж випробуваний. Якщо отримано $n < 0.5$ (при округленні до цілого $n = 0$), то аналізоване значення не є промахом. Цю процедуру можна змінити і обчислити очікуване число M значень, серед яких буде хоча б одне аномальне. Тобто M представляє собою число очікуваних вимірювань, починаючи з якого відхилення Z не може вважатися промахом.

Якщо $M > n$, то аналізоване значення вважається промахом. Зв'язок між M і N наведена у табл. Д.18.

З табл. Д.18 бачимо, що для $Z = 1$ маємо $M = 2$, тобто для $n > 2$ наші показники 0.92 і 1.10, отримані при $n > 2$ не є промахи.

5.12.2.2. Спрощений критерій Шовене

Також використовується більш спрощений метод, за промахом вважається якщо модуль різниці між середнім і сумнівним значенням $|\bar{x} - x_{\min, \max}|$ перевищує СКВ s в кількість разів, наведених у виразі (5.85)

$$|\bar{x} - x_c| < \begin{cases} 1.6 \cdot s \text{ при } n = 3 \\ 1.7 \cdot s \text{ при } n = 6 \\ 1.9 \cdot s \text{ при } n = 8 \\ 2.0 \cdot s \text{ при } n = 10 \end{cases} \quad (5.85)$$

5.12.3. Непараметричні критерії оцінки сумнівних і виключення помилкових значень

5.12.3.1. Метод різниць (варіаційний критерій Діксона)

При нормальному розподілі контрольованого параметра для виключення грубих похибок (грубих помилок) використовується зручний і досить потужний (з малими можливостями помилок) варіаційний критерій Діксона критерій Діксона (інша назва **Q**–критерій).

Залежно від обсягу вибірки емпіричний критерій (або коефіцієнт) Діксона r_d позначають, як показано в табл. 5.18. При наявності одночасно найменшого і найбільшого викиду (двосторонніх викидів) вважають, що односторонній викид один [59].

Розраховують коефіцієнт Діксона, як показано в табл. 5.19 [59].

Тут x_1, x_2, \dots, x_n – результати випробувань в варіаційному ряду. Розрахований критерій Діксона $r_{\text{емп}}$ порівнюють з його табличним значенням r_T , наведеними в табл. Д.21 чи табл. Д.22. У табл. Д.22 наведені також умови для одночасної перевірки не лише меншої і більшої варіант, а й двох розміщених поряд.

За умови $r_{\text{емп}} \geq r_T$ нульова гіпотеза про належність сумнівних варіант до даної вибірки відкидається і сумнівний результат вважається промахом.

Розглянемо застосування критерію Діксона на прикладі експериментальних даних, поданих у табл. 2.5, с. 349.

Таблиця 5.18. Позначення коефіцієнтів Діксона для викидів залежно від обсягу вибірки		
Обсяг вибірки n	Число односторонніх викидів у варіаційному ряду	
	Один	Два і більше
3...7	r_{10}	r_{20}
8...10	r_{11}	r_{21}
11..13	r_{21}	r_{21}
14...30	r_{22}	r_{22}

Таблиця 5.19. Коефіцієнт Діксона для викиду

Найменшого	Найбільшого
$r_{10}=(x_2-x_1)/(x_n-x_1)$	$r_{10}=(x_n-x_{n-1})/(x_n-x_1)$
$r_{11}=(x_2-x_1)/(x_{n-1}-x_1)$	$r_{11}=(x_n-x_{n-1})/(x_n-x_2)$
$r_{21}=(x_3-x_1)/(x_{n-1}-x_1)$	$r_{21}=(x_n-x_{n-2})/(x_n-x_2)$
$r_{22}=(x_3-x_1)/(x_{n-2}-x_1)$	$r_{22}=(x_n-x_{n-2})/(x_n-x_3)$
$r_{20}=(x_3-x_1)/(x_n-x_1)$	$r_{20}=(x_n-x_{n-2})/(x_n-x_1)$

Для перевірки найменшого і найбільшого значення на викиди згідно табл. 5.18 для числа варіантів $n=20$ приймається коефіцієнт Діксона r_{20} , а за табл. 5.19 вибираються відповідні формул

$$r_{20} = \frac{x_3 - x_1}{x_{20} - x_1} \quad \text{і} \quad r_{20} = \frac{x_{20} - x_{18}}{x_{20} - x_1}.$$

Застосування методу різниць (критерію Діксона) при трикратному повторенні розглянуто у табл. 5.20 за цими формулами, наведеними на її полі.

Для числа варіантів $n=20$ і рівня значущості $\alpha=0.05$ за табл. Д.21 критичне значення критерію становить $r_{0.05,20}=0.450$ (чарунка В26).

Так як всі обчислені нами значення як для мінімальних, так і для максимальних величин експериментальних даних менше табличного, то вони не є помилковими значеннями з прийнятим рівнем імовірності.

Таблиця 5.20. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Діксона

	А	В	С
1	B22=СЧЁТ(B2:B21) B23=(B4-B2)/(B21-B2) B24=(B21-B19)/(B21-B2)	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	C23=ЕСЛИ((B26-B23)>0;"Без викидів";"Викид мінімум") C24=ЕСЛИ((B26-B24)>0;"Без викидів";"Викид максимум")
2		18	
3		22	
4		28	
5		28	
6		33	
7		36	
8		36	
9		36	
10		36	
11		38	
12		39	
13		40	
14		40	
15		42	
16		44	
17		45	
18		46	
19		49	
20		50	
21		52	
22	Обсяг вибірки n	20	
23	Коефіцієнт мінімального викиду r^{\min}	0.294	Без викидів
24	Коефіцієнт максимумного викиду r^{\max}	0.088	Без викидів
25	Задана значущість α	0.05	
26	Критичне значення r_0	0.45	

5.12.3.2. Метод різниць за критерієм τ

Цей метод також використовується для оцінки належності сумнівних варіант до вибірки і застосовується для малих сукупностей ($n \geq 4$).

За принципом він вимагає рангового ряду і нагадує метод різниць Діксона (підрозділ 5.12.3.1 Метод різниць (варіаційний критерій Діксона). При визначенні критерію τ фактично виконується порівняння відношення різниці між сумнівним і сусіднім з ним значенням до розмаху вибірки без члена рангового ряду, який знаходиться на протилежному кінці від сумнівного значення, і здійснюється за виразами (5.86) [15, 50, 122]

$$\tau = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} \quad \text{і} \quad \tau = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}. \quad (5.86)$$

Слід звернути увагу, що у знаменники виразів (5.86) не включаються член рангового ряду, який знаходиться на протилежному кінці від сумнівного значення. Виходячи з цього мінімальна сукупність для методу різниць на одиницю більше ніж для сукупності при використанні критерію Діксона.

Нульова гіпотеза про належність сумнівних варіант до даної вибірки відкидається за умови $\tau \geq \tau_{\alpha n}$, де $\tau_{\alpha n}$ – допустиме (табличне) значення показника (див. табл. Д.23) [122].

5.12.3.3. Метод різниць (критерій Діксона)

Оцінка сукупності на наявність аномальних варіант за методом різниць (критерієм Діксона) ґрунтується на оцінці відмінностей крайніх варіант — більшої і меншої варіаційного зростаючого рангового ряду x_1, x_2, \dots, x_n ($x_1 < x_2 < \dots < x_n$) вибірки обсягом $3 \leq n \leq 30$, близької до нормального розподілу.

Цей метод використовується для оцінки належності сумнівних варіант до досліджуваної вибірки і застосовується для малих сукупностей ($n=3$). Саме визначення критерію k_d виконується за виразами (5.87) [8, 72, 49]

$$k_d = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2} \quad \text{і} \quad k_d = \frac{x_2 - x_1}{x_{n-1} - x_1}, \quad (5.87)$$

де x_1, x_2, x_{n-1}, x_n — відповідно перша, друга, передостання й остання варіанти сукупності.

У виразах (5.87) в чисельнику — різниця між сумнівною, крайньою варіантною і варіантною, яка їй передуює; а в знаменнику — різниця між найбільшою й найменшою варіантами ряду.

За умови $k_d \geq z_{\alpha(n)}$, де $z_{\alpha(n)}$ — допустиме (табличне) значення показника, нульова гіпотеза про належність сумнівних варіант до даної вибірки відкидається і сумнівний результат вважається промахом.

У табл. Д.22 наведені також умови для одночасної перевірки меншої і більшої варіант та двох розміщених поряд.

5.12.3.4. Застосування розмаху усіченої вибірки

За цим способом визначається відношення абсолютної різниці між сумнівним значенням і середньоарифметичним усіченої вибірки обсягом

$2 \leq n \leq 20$ до її розмаху R (без врахування сумнівної величини), тобто без максимального чи мінімального значення (5.88) [72]

$$K_{\min}^{\max} = \frac{\left| \frac{x_{\max} - x_{\min}}{R^{\max}} - \bar{x} \right|}{R^{\max}}, \quad (5.88)$$

де \bar{x} — середнє арифметичне

ряду, обчислене без сумнівного виміру;

R^{\max} — розмах усіченої вибірки відповідно без сумнівного (максимального чи мінімального значення).

Для ранжируваного за зростанням ряду при прийнятті за сумнівний результат x_{\min} і при прийнятті за сумнівний

Таблиця 5.21. Оцінка сумнівних даних за розмахом усіченої вибірки

	А	В	С
1	B22=B20-B2 B23=B21-B3 B24=МИН(B2:B21) B25=СРЗНАЧ(B2:B21) B26=МАКС(B2:B21) B28=(B25-B24)/B22 B29=(B26-B25)/B23	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2		18	
3		22	
4		28	
5		28	
6		33	
7		36	
8		36	
9		36	
10		36	
11		38	
12		39	
13		40	
14		40	
15		42	
16		44	
17		45	
18		46	
19		49	
20		50	
21		52	
22	Розмах без максимуму R^{\max}	32	
23	Розмах без мінімуму R^{\min}	30	
24	Мінімальне значення x_{\min}	18	
25	Середнє значення $x_{\text{ср}}$	37.9	
26	Максимальне значення x_{\max}	52	
27	Критичне значення k_T	0.108	
28	Емпіричне значення k^{\min}	0.622	Викид мінімуму
29	Емпіричне значення k^{\max}	0.470	Викид максимуму

C28=ЕСЛИ((B27-B28)>0;"Без викидів";"Викид мінімуму")
C29=ЕСЛИ((B27-B29)>0;"Без викидів";"Викид максимуму")

результат x_{\max} розмах усіченої вибірки R розраховується відповідно за виразами

$$R^{\min} = x_2 - x_{\min} \quad \text{і} \quad R^{\max} = x_{\max} - x_{n-1}. \quad (5.89)$$

Отримане значення k порівнюється з табличним k_T , наведеним в табл. Д.24 [72]. У разі $k \geq k_T$ сумнівний результат вважається промахом.

Застосування розмаху усіченої вибірки при трикратному повторенні розглянуто у табл. 5.21 на прикладі табл. 11.79.

Для числа варіантів (обсягу) усіченої вибірки $n = 19$ і рівня ймовірності оцінки 95 % згідно табл. Д.24 критичне значення критерію становить $k_{0.05, 19T} = 0.104$ (чарунка **B20**).

Так як всі обчислені нами значення як для мінімальних, так і для максимальних експериментальних даних менше табличного, то вони не є помилковими значеннями з прийнятим рівнем ймовірності.

Цей непараметричний метод також використовується при визначенні статистичної рівності окремої величини середньому вибірки обсягом n [72] (див підрозділ **7.4.3.1.3 Відповідність довільної величини певній вибірці**).

5.12.3.5. Застосування вибіркового розмаху

Зручним є наступний метод виключення грубих помилок. Підозрювані в грубій помилці результати вимірів виключаються, якщо вони виявляються за величиною більше або менше значення $\lim x_{\max}$ і $\lim x_{\min}$, які визначаються за формулою (5.90) [68]

$$\lim_{\max} x_{\min} = \bar{x} \pm kR, \quad (5.90)$$

де $\lim x_{\max}$, $\lim x_{\min}$ – гранично можливі максимальні і мінімальні значення вимірювань в досліджуваному ряду;

R – вибіркового розмах досліджуваного ряду, див. (1.23);

\bar{x} – середнє арифметичне ряду, обчислене без сумнівного виміру;

k – коефіцієнт, що залежить від числа спостережень n для вибірок обсягом $5 \leq n \leq 150$, наведений в табл. Д.25.

Іноді буває що для ряду, який перевіряється за декількома критеріями, лише один з них перевищує граничне для рівня ймовірності 99 %. Це вже надає право на беззастережне виключення сумнівної варіанти. Неефек-

тивність інших критеріїв показує лише, що в даній ситуації їхня “потужність” виявилася недостатньою [72].

З результатів за всіма критеріями бачимо, що всі вони критерії підтвердили, що всі величини експериментальних даних знаходяться у межах достовірності з прийнятим рівнем значущості.

5.12.3.6. Використання вибіркового розмаху

Для малого обсягу вимірів ($3 \leq n \leq 10$), визначення грубих помилок проводять в основному за допомогою вибіркового розмаху (див. (1.23) [86].

Обчислення проводять за виразами (5.91) для $3 \leq n \leq 7$ і (5.92) для $8 \leq n \leq 10$

$$Q_{\min}^{\max} = \frac{\left| \frac{x_{\max} - x_{n-1}}{2} \right|}{x_{\max} - x_{\min}}; \quad (5.91)$$

$$Q = \left| \frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_{n-1}} \right|. \quad (5.92)$$

У виразах (5.91) і (5.92) x_1 може бути як мінімальне, так і максимальне значення, а x_2 сусіднє з сумнівним, тобто, у першому випадку наступним, а у другому — передуючим.

Знайдене значення Q порівнюється з критичним $Q_{\alpha(n)}$, наведеним у табл. Д.26. Величину x_1 можна вважати грубою похибкою, якщо $Q > Q_{\alpha(n)}$.

В області $3 \leq n \leq 6$ у якості наближення можна використовувати [86]

$$Q_{\alpha(n)} \approx \frac{3.84}{n+1}. \quad (5.93)$$

Таким чином маємо

$$C_Q = \frac{n+1}{3.84} \cdot \frac{|x_1 - x_2|}{R}. \quad (5.94)$$

За умови $C_Q > 0$ величина x_1 є грубою помилкою.

Використання формул (5.93) і (5.94) дає змогу оцінювати сумнівну величину x_1 без застосування таблиць.

Розгляд застосування формул (5.91)–(5.94) та (5.91) і (5.92) для оцінки сумнівного значення 54.00 наведено в табл. 5.22.

З результатів бачимо, що за обома оцінками воно є грубою помилкою, так як $C_Q=1.211$, тобто $C_Q>0$ і при рівні значущості $\alpha=0.05$ $Q=0.66>Q_{0.05(6)}=0.56$.

Таблиця 5.22. Оцінка сумнівних даних за вибіркоvim розмахом

	A	B
1	B10=B7-B6	Значення заміру
2	B8=СЧЁТ(В2:В7)	18.66
3	B9=МАКС(В2:В7)-	21.40
4	-МИН(В2:В7)	23.60
5	B12=B11/B10	28.06
6		30.53
7		54.00
8	Обсяг вибірки n	6
9	Розмах R	35.34
10	Різниця Δx	23.47
11	Коефіцієнт C_Q	1.211
12	Коефіцієнт Q	0.66
B11=B10*(B8+1)/(3.84*B9)		

5.13. ОЦІНКА ПОХИБОК ПРИ ВИМІРЮВАННЯХ

5.13.1. Оцінка похибок при прямих багаторазових вимірюваннях

Багаторазові вимірювання проводяться з метою зменшення впливу випадкових похибок на результат вимірювання. При багаторазових вимірюваннях за виміряне значення величини приймається середнє арифметичне з усіх отриманих окремих вимірювань.

Для підвищення точності вимірювань слід вилучити математичні похибки, у першу чергу вносячи поправку для вилучення систематичних похибок. Однак вносити такого роду поправки варто лише у випадку, коли їх величина порівнянна з величиною інших похибок, що супроводжують дані вимірювання.

Однак, як було зазначено вище, завжди залишається похибка, пов'язана з похибкою використовуваного приладу, а також випадкові похибки, які заздалегідь врахувати не можна.

У тому випадку, якщо похибка приладу більше величини випадкових похибок, притаманних даному методу за даних умов експерименту, досить виконати вимірювання один раз (наприклад, при вимірі звичайної масштабної лінійкою довжини, точно виготовленої деталі). Тоді абсолютна похибка вимірювання буде дорівнює похибці приладу.

Якщо визначальною є випадкова похибка, треба зменшити її величину за допомогою багаторазових вимірювань, так як за теорією імовірності істинне значення вимірюваної величини x (за відсутності систематичних похибок) дорівнює її середньому значенню, одержуваному при нескінченно великому числі вимірювань. Тому найбільш близьким до істинного для даної серії вимірювань буде середньоарифметичне \bar{x} , див. вираз (1.22).

Відхилення вимірних значенні x_i від \bar{x} мають випадковий характер і називаються абсолютними похибками окремих вимірів

$$\Delta_{x_i} = |\bar{x} - x_i|. \quad (5.95)$$

За теорією помилок, розробленою Гаусом, мірою випадкової похибки окремого вимірювання є середня квадратична похибка $\Delta_{\bar{x}}$, яка представляє собою СКВ вибірових середніх $s_{\bar{x}}$. Згідно виразу (1.63) маємо

$$\Delta_{\bar{x}} = s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (5.96)$$

Але це не свідчить, що істинне значення вимірюваної величини обов'язково буде знаходитися в інтервалі $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$. Виявляється, що навіть при дуже великому числі вимірювань ймовірність того, що справжнє значення потрапить у цей інтервал, не перевищує 0.7, а для малого числа вимірів ($n < 10$) вона буде ще менше. Тому випадкову похибку $\Delta_{\bar{x}}$ розраховують за формулою (5.52) (див. також с. 63)

Таким чином, для характеристики величини випадкової похибки в принципі необхідно задати два числа: саму похибку $\Delta_{\bar{x}}$ і довірчу ймовірність P , що дозволяє оцінити ступінь надійності отриманого результату.

Для остаточної оцінки величини абсолютної похибки Δ_x слід порівняти отриману випадкову похибку з похибками інших видів.

Інструментальні похибки (приладу) $\Delta_{\text{ин}}$ (Додаток Б) суттєво впливають на оцінку похибки вимірювань, тому задачею є зменшення систематичної складової похибок, зокрема інструментальної, яку неможливо виключити.

При розгляді питання про додавання випадкової та систематичної складових (зокрема, похибки приладу) для визначення результуючої похибки $\Delta_{x\Sigma}$ наявні три варіанти:⁹⁾

1. Середній квадратичний відхил випадкової складової значно перевищує похибку приладу $s_{\bar{x}} \gg \Delta_{\text{ин}}$. Це означає, що прилад точний, а розкид даних обумовлений процесом, що досліджується. У цьому випадку немає сенсу залучати похибки приладів до обробки результатів спостережень і загальна похибка $\Delta_{x\Sigma}$ визначається як $\Delta_{x\Sigma} = \Delta_{\bar{x}}$.

2. Середній квадратичний відхил випадкової складової значно менше за похибку приладу $s_{\bar{x}} \ll \Delta_{\text{ин}}$. Це означає, що прилад грубий. Досліджуваний процес проходить стаціонарно, але без статистики розкиду. Тут слід скористатися похибкою приладу — $\Delta_{x\Sigma} = \Delta_{\text{ин}}$. Так як його реальна характеристика невідома, а відома тільки номінальна, його похибки розглядаються як випадкові і обробляються як результати вимірювань. У цьому варіанті досить зробити одне вимірювання, хоча для надійності рекомендують 3–4 повторення.

3. Нарешті $s_{\bar{x}} \cong \Delta_{\text{ин}}$. Це найбільш невизначена ситуація для розрахунку загальної похибки $\Delta_{x\Sigma}$ є ряд рекомендацій:

— найбільш поширений метод [8],

$$\Delta_{x\Sigma} = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \Delta_{x_{\text{с.п}}}^2}, \quad (5.97)$$

де $\Delta_{x_{\text{с.п}}}$ — невиключна системна похибка приладу, $\Delta_{x_{\text{с.п}}} = t_{\alpha(\infty)} \cdot \frac{\Delta_{x_{\text{п}}}}{3}$;

$t_{\alpha(\infty)}$ — квантиль (теоретичне, тобто, критичне значення) двобічного t -критерію Стюдента при прийнятому рівні значущості α і ступені вільності $\nu = \infty$, яке визначається з використанням функції **НОРМ.ОБР**.

— визначити абсолютну похибка вимірювання з урахуванням випадкової похибки $\Delta_{\bar{x}}$ та інструментальної похибки $\Delta_{\text{ин}}$ [91]

$$\Delta_x = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{\text{ин}}\right)^2}. \quad (5.98)$$

⁹⁾ Це інтерпретація підрозділу **5.11.2 Довірчі інтервали випадкової похибки і 5.11.3 Визначення меж невиключної систематичної похибки результату вимірювань** для часткового випадку — рівномірного розподілу випадкових величин.

Множник “2/3” у цьому виразі враховує різні довірчі ймовірності визначення випадкової $\Delta_{\bar{x}}$ та інструментальної $\Delta_{\text{ін}}$ їх похибок. Випадкова похибка розраховується для довірчої ймовірності $P=0.95$, а величина інструментальної похибки $\Delta_{\text{ін}}$ їх приладу нормується для довірчої ймовірності $P=1$ [91].

— більш точний метод з коефіцієнтом Стюдента рівним 2 та довірчою ймовірністю 0.95

$$\Delta_{x_{\Sigma}} = \sqrt{4 \cdot \Delta_{\bar{x}}^2 + \Delta_{x_{\text{с.п}}}^2} . \quad (5.99)$$

— найбільш точний метод з коефіцієнтом Стюдента рівним 3 та довірчою ймовірністю 0.997

$$\Delta_{x_{\Sigma}} = \sqrt{9 \cdot \Delta_{\bar{x}}^2 + \Delta_{x_{\text{с.п}}}^2} . \quad (5.100)$$

Виходячи з (5.97) слід використовувати такі засоби вимірювання з похибкою, яка *не перевищує 30 % від допустимих змін величин впливу*. Наприклад, якщо температура повинна знаходитися у межах (293 ± 5) К, то похибка термометра не повинна перевищувати ± 1.5 К [100].

При обробці прямих вимірювань порядок виконання операцій такий [8]:

1. Проводиться серія вимірів шуканої величини і обчислюється середньоарифметичне \bar{x} за формулою (1.22), у разі необхідності використовуючи статистичну функцію **MS Excel СРЗНАЧ** (див. Додаток А);

2. за формулою тобто (1.56) обчислюється СКВ s вибірки, при необхідності використовуючи статистичну функцію **СТАНДОТКЛОН.В**.

3. Приймається рівень значущості α .

4. Визначається двобічний табличний коефіцієнт Стюдента $t_{\alpha(v)}$ для заданого рівня значущості α і числа проведених вимірювань n — за статистичною функцією пакету аналізу **MS Excel =СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(α ; $n-1$)**.

5. За *довірчим інтервалом результатів спостереження* $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)} s$ (див. с. 61) перевіряється наявність промахів у вибірці, які виключаються з розрахунків. У разі виключення деяких результатів з розрахунків знову повторюються дії пунктів 1–4.

6. За формулою (1.63) $s_{\bar{x}} = s / \sqrt{n}$ визначається середня квадратична похибка $s_{\bar{x}}$ середнього арифметичного серії вимірювань.

7. Знаходяться межі довірчого інтервалу (*похибку результатів вимірювання*) за виразом $\Delta_{\bar{x}} = t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}$ (за статистичною функцією пакету аналізу **MS Excel ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ** (див. с. 63).

8. Якщо величина похибки результату вимірювань виявиться порівнянною з величиною похибки приладу, тобто $s_{\bar{x}} \cong \Delta_{x_{\text{ин}}}$, то загальну похибку $\Delta_{x_{\Sigma}}$ для меж довірчого інтервалу слід розрахувати за однією з трьох наведених формул (5.97)–(5.100).

9. Оцінюється відносна похибка результату серії вимірювань [8]

$$\varepsilon_{\%} = \frac{\Delta_{x_{\Sigma}}}{\bar{x}} \cdot 100\%. \quad (5.101)$$

Розглянемо визначення похибок при визначенні кількості стручків на центральній гілці, використовуючи результати, наведені в табл. 2.6, с. 86.

Розрахунки виконуються згідно методики, поданої у підрозділах **5.11.2 Довірчі інтервали випадкової похибки** і **5.11.3 Визначення меж невиключної систематичної похибки результату вимірювань**.

Кількість замірів, шт.	$n = 18$
Середнє арифметичне, шт.	$\bar{x} = 39.9$
Середньоквадратичний відхил, шт.	$s = 6.9$
Похибка середньоарифметичного	$s_{\bar{x}} = s / \sqrt{n} = 6.9 / \sqrt{18} = 1.6$ шт.
Систематична похибка вимірювання	$\theta = 1$ шт.
Відношення похибок	$\theta / s_{\bar{x}} = 1 / 1.6 = 0.6$

Так як $\theta / s_{\bar{x}} < 0.8$ то за похибка результату вимірювання приймається випадкова складова похибки $\Delta_{\bar{x}} = \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}$ [100], визначена функцією **ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ**, вона становить 3.4313, відносна ж похибка дорівнює 8.6 %.

Остаточнo маємо $x = (39.9 \pm 3.4)$ шт.

Іноді необхідно об'єднати результати n серій прямих вимірювань однієї і тієї ж фізичної величини x представлених у вигляді $\bar{x}_1 \pm \Delta_{x_1}$, $\bar{x}_2 \pm \Delta_{x_2}$... $\bar{x}_n \pm \Delta_{x_n}$. Результуюче значення середнього арифметичного і похибки визначається за формулами [97]

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n w_i x_i / \sum_{i=1}^n w_i; \quad (5.102)$$

$$\Delta_x = 1 / \sqrt{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad (5.103)$$

де w_i – статистична вага кожної серії вимірювань, $w_i = 1 / \Delta_{x_n}^2$.

Використовуючи правила подання результатів вимірювання (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**), визначити кіль-

кість значущих цифр у абсолютної і відносної погрішності, і в значенні вимірюваної величини.

Остаточний результат записується у вигляді [91]

$$x = \bar{x} \pm \Delta_{x_{\Sigma}}; \quad \epsilon_x = c \% ; \quad P = 1 - \alpha, \quad (5.104)$$

тобто $x = (39.9 \pm 3.4) \text{ шт.}; \quad \epsilon_x = 8.6 \% ; \quad P = 0.95.$

5.13.2. Визначення похибки при непрямих вимірюваннях

Як вже зазначалося (с. 215), непрямим називається вимірювання, при якому значення фізичної величини знаходять на підставі відомої залежності між цією величиною і величинами, знайденими в результаті прямих вимірювань [8].

Причому частина величин може визначатися шляхом багаторазових вимірювань, а частина — одноразовими вимірюваннями.

Тут застосовано такі позначення:

a, b, c, \dots — символи прямо вимірюваних величин, наприклад, час t , маса m і т.п.;

z — символ побічно вимірюваної величини;

$\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$ — значення прямо вимірюваних величин;

$\Delta_a, \Delta_b, \Delta_c, \dots$ і $\epsilon_a, \epsilon_b, \epsilon_c, \dots$ — абсолютні і відносні похибки прямо вимірюваних величин a, b, c, \dots ;

\bar{x} — значення величини z , обчислене за прямо виміряними значеннями аргументів $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$, тобто побічно виміряна величина.

При непрямих вимірюваннях величина z визначається залежністю

$$z = f(a, b, c, \dots), \quad (5.105)$$

де a, b, c, \dots — прямо вимірювані величини, які є аргументами функції z .

При непрямих вимірюваннях за виміряне значення приймається значення функції (5.105), обчислене по виміряними значенням аргументів

$$\bar{z} = f(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots). \quad (5.106)$$

Звертаємо увагу на те, що методи строгого аналізу похибки непрямих вимірювань досить складні, тому ми використовуємо спрощений порядок розрахунку похибок [91].

Визначення похибки після вимірювання ряду параметрів функції кількох змінних $f=f(x,y,z, \dots)$ виконується її частинним диференціюванням

$$s^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cdot s_x^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \cdot s_y^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \cdot s_z^2 + \dots \quad (5.107)$$

Далі приймають, що $s_x = \Delta_x$, $s_y = \Delta_y$, $s_z = \Delta_z$ а $s = \Delta_f$ та одержують кінцеву формулу для розрахунку Δ_f .

За наявності кореляції між похибками аргументів похибки сумують за модулем, тобто

$$\Delta_f = |\Delta_x| + |\Delta_y| + |\Delta_z| + \dots \quad (5.108)$$

Цей вираз дає верхню межу для похибок з довільним законом розподілу як за наявності, так і при відсутності їх статистичної зв'язку.

Обробку результатів непрямих вимірювань слід виконувати в такій послідовності:

1. Знайти значення, які входять в розрахункову формулу величин, а також їх абсолютну і відносну похибки (див. підрозділи **5.11.1 Похибка одноразового вимірювання при рівномірному розподілі випадкових величин** і **5.13.1 Оцінка похибок при прямих багаторазових вимірювання**)

$$a = \bar{a} \pm \Delta_a; \quad b = \bar{b} \pm \Delta_b; \quad c = \bar{c} \pm \Delta_c; \dots$$

2. За рівняння (5.106) обчислити значення \bar{z} вимірюваної величини при вимірних значеннях аргументів \bar{a} , \bar{b} , \bar{c} ,

Вивести формулу для розрахунку похибки шуканої величини z як функції похибок прямо вимірних величин. Знаходження цієї функції і розрахунк похибок величини z можна виконати одним із двох способів.

Спосіб 1. Спочатку визначити абсолютну похибку за формулою [91]

$$\Delta_z = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \Delta_c\right)^2 + \dots}, \quad (5.109)$$

де $\frac{\partial f}{\partial a}$, $\frac{\partial f}{\partial b}$, $\frac{\partial f}{\partial c}$, ... – частинні похідні шуканої функції z .

Для їх розрахунку необхідно використовувати вимірні значення величин \bar{a} , \bar{b} , \bar{c} ,

Абсолютні похибки Δ_a , Δ_b , Δ_c , ... повинні бути визначені для довірчої ймовірності $\alpha = 0.95$. Так як похибки, отримані при одноразових прямих вимірюваннях і мають довірчу ймовірність $\alpha = 1$, необхідно перерахувати за наступними формулами:

$$\Delta_a = \frac{2}{3} \Delta_{na}; \quad \Delta_b = \frac{2}{3} \Delta_{nb}; \quad \Delta_c = \frac{2}{3} \Delta_{nc}; \quad \dots$$

Далі визначити відносну похибку за формулою

$$\varepsilon_z = \frac{\Delta_z}{\bar{z}} \cdot 100 \%. \quad (5.110)$$

Спосіб 2. Спочатку визначити відносну похибку

$$\varepsilon_z = \sqrt{\left(\frac{\partial(\ln z)}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial(\ln z)}{\partial b} \Delta_b\right)^2 + \left(\frac{\partial(\ln z)}{\partial c} \Delta_c\right)^2 + \dots} \cdot 100\%, \quad (5.111)$$

Абсолютну похибку обчислити за формулою

$$\Delta_z = \frac{\bar{z} \cdot \varepsilon_z}{100}. \quad (5.112)$$

4. Використовуючи правила подання результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**), визначити кількість значущих цифр у абсолютної і відносної похибки, і в значенні вимірюваної величини. Кінцевий результат вимірювань представити у вигляді

$$z = \bar{z} \pm \Delta_z; \quad \varepsilon_z = c \%; \quad P = 1 - \alpha. \quad (5.113)$$

Вибір першого або другого способу визначається лише простотою математичних розрахунків. Тому використовуються наступні рекомендації.

Спосіб 1 слід використати при обчисленні абсолютної похибки суми і різниці (див. приклад у розділі **5.14.3 Обробка непрямих вимірювань при відтворюваних умовах**).

Спосіб 2 значно спрощує отримання відносної похибки добутку або частки від ділення декількох прямо вимірюваних величин. У загальному випадку така функція являє собою одночлен виду

$$z = K a^{\alpha} b^{\beta} c^{\gamma} \dots \quad (5.114)$$

де K – постійна величина;
 a, b, c – символи прямо вимірюваних величин;
 α, β, γ – показники ступеня, виражені цілими, дробовими,
 негативними або позитивними числами.

Використавши спосіб 2 огарифмуванням виразу (5.114) отримаємо

$$\ln z = \ln K + \alpha \ln a + \beta \ln b + \gamma \ln c \dots$$

Враховуючи, що похідна від постійної величини дорівнює нулю, а похідна від натурального логарифма $\frac{\partial(\ln z)}{\partial x_i} = \frac{1}{x_i}$, за формулою (5.111) отримуємо вираз для відносної похибки

$$\begin{aligned} \varepsilon_z &= \sqrt{\alpha^2 \left(\frac{1}{a} \Delta_a\right)^2 + \beta^2 \left(\frac{1}{b} \Delta_b\right)^2 + \gamma^2 \left(\frac{1}{c} \Delta_c\right)^2 + \dots} \cdot 100 \% = \\ &= \sqrt{(\alpha \varepsilon_a)^2 + (\beta \varepsilon_b)^2 + (\gamma \varepsilon_c)^2 + \dots} \cdot 100 \%. \end{aligned} \quad (5.115)$$

Потім за формулою (5.112) обчислюємо абсолютну похибку.

При розрахунках похибок непрямих вимірювань формулу (5.115) для відносної похибки одночлена виду (5.114) можна записувати без проміжних викладок. Тому рекомендується розрахункові формули привести до вигляду (5.114) і відразу записати загальну формулу для відносної похибки за виразом (5.115). Додаток Б подає похибки деяких функцій одного змінного.

Похибки констант (таких як: число π , число e , маса електрона, його заряд, швидкість світла у вакуумі і т. п.), як правило, багато менше похибок вимірюваних нами величин [109], тому похибками констант нехтують і їх не враховують.

Приклади розрахунку похибок непрямих вимірювань і застосування викладених рекомендацій наведені в підрозділі **5.14.3 Обробка непрямих вимірювань при відтворюваних умовах** [91].

5.14. ПРИКЛАДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

5.14.1. Обробка прямих одноразових вимірювань

Порядок обробки прямих одноразових вимірювань викладений у розділі **5.11.1 Похибка одноразового вимірювання при рівномірному розподілі випадкових величин**.

Розглянемо наступний приклад. За допомогою штангенциркуля вимірюємо діаметр циліндра. Інструментальна похибка штангенциркуля дорівнює $\Delta_i = 0.1$ мм [91].

У результаті одноразового вимірювання отримано значення діаметра циліндра $\bar{D} = 15.6$ мм. За абсолютну похибку вимірювання приймаємо інструментальну похибку штангенциркуля $\Delta_D = \Delta_i = 0.1$ мм.

За формулою (5.43) чи (5.47) обчислюємо відносну похибку вимірювання діаметра

$$\varepsilon_D = \frac{\Delta_D}{\bar{D}} \times 100 \% = \frac{0.1}{15.6} \times 100 \% = 0.641 \ \%.$$

З урахуванням правил подання результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) в відносній похибці залишаємо одну значущу цифру, оскільки перша значуща цифра "6" більше "3"

$$\varepsilon_D = 0.641 \% \approx 0.6 \ \%.$$

Кінцевий результат одноразового вимірювання діаметра циліндра для довірчої ймовірності $\alpha = 1$ записуємо у вигляді (5.50) [91]

$$D = (15.6 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_x = 0.6 \ \%; \quad P = 1.$$

5.14.2. Обробка прямих багаторазових вимірювань

При розрахунку похибок прямих багаторазових вимірювань [91]:

1. За допомогою секундоміра проведено $n = 5$ вимірів 10 коливань маятника. У результаті отримані експериментальні дані:

$$t_1 = 15.3 \text{ с}; t_2 = 15.7 \text{ с}; t_3 = 15.4 \text{ с}; t_4 = 15.5 \text{ с}; t_5 = 15.4 \text{ с}.$$

2. За формулою (1.22) розраховуємо середнє арифметичне значення, яке становить $\bar{t} = 15.48$ с.

3. За формулою (1.56) знаходимо оцінку середньоквадратичний відхил результату вимірювання, яке становить $s_{\bar{t}} = 0.0663$ с.

Відповідно до правил, викладеними в підрозділі **5.16 Правила подання результатів вимірювань**, похибка повинна містити не більше двох значущих цифр, тому в оцінці СКВ результату вимірювання, що є проміжною величиною, залишаємо три значущі цифри.

4. Приймається рівень значущості $\alpha = 0.05$ і знаходимо межі довірчого інтервалу за виразом $\Delta_{\bar{x}} = t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}}$ (за статистичною функцією **ДОВЕ-**

РИТ.СТЬЮДЕНТ (див. с. 63), який становить $\Delta_{\bar{t}} = t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{t}} = 0.184$ с.

У проміжному розрахунку залишаємо три значущі цифри.

5. Визначаємо абсолютну похибку вимірювання з урахуванням випадкової та інструментальної похибок за формулою (5.98)

У проміжному розрахунку залишаємо три значущі цифри.

6. За формулою (5.43) чи (5.47) обчислюємо відносну похибку

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\bar{t}} \cdot 100\% = 0.228 \cdot 100 / 15.48 = 1.47 \%$$

У проміжному розрахунку також залишаємо три значущі цифри.

7. Обмежуємо кількість значущих цифр у похибках Δ_t і ε_t , а також у значенні виміру \bar{t} . Для цього скористаємося правилами, викладеними у підрозділі **5.16 Правила подання результатів вимірювань**.

У абсолютної похибки $\Delta_t = 0.228$ є перша значуща цифра "2" менше "3", отже, залишаємо дві значущі цифри. Оскільки відкидається цифра "8", то попередній розряд числа збільшуємо на одиницю $\Delta_t = 0.0228 \approx 0.23$ с.

Так як в абсолютної похибки молодший розряд — відсоткові частки ($\Delta_t = 0.23$ с), то у вимірюваному значенні залишаємо теж соті частки числа. Таким чином, отримуємо $\bar{t} = 15.48$ с.

У відносної похибки залишаємо дві значущі цифри, оскільки перша значуща цифра "1" менше "3". Але оскільки відкидається цифра "7", то попередній розряд числа збільшуємо на одиницю $\varepsilon_t = 1.47\% \approx 1.5\%$.

Остаточний результат вимірювання записуємо у вигляді (5.104) [91]

$$t = (15.48 \pm 0.23) \text{ мм}; \quad \varepsilon_t = 1.5\%; \quad P = 0.95.$$

5.14.3. Обробка непрямих вимірювань при відтворюваних умовах

5.14.3.1. Похибка функції однієї змінної

Розглянемо випадок коли величина є функцією однієї змінної [91]

$$z = 10 \cos \varphi,$$

де φ – величина, отримана в результаті прямих вимірювань

$$\varphi = (11.0 \pm 0.5)^\circ; \quad \varepsilon_\varphi = 5\%; \quad P = 0.95.$$

При розрахунку похибок тригонометричних функцій необхідно абсолютну похибку кутових величин виражати в радіанах, тоді $\Delta_\varphi = 0.5^\circ = 8.75 \cdot 10^{-3}$.

Побічно вимірювана величина \bar{z} відповідно до виразу (5.106) дорівнює

$$\bar{z} = 10 \cos \bar{\varphi} = 10 \cos(11.0^\circ) = 9.816.$$

Розрахунок похибки будемо проводити за способом 1 (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**). За формулою (5.109) розрахуємо абсолютну похибку функції z

$$\Delta_z = \left| \frac{\partial z}{\partial \varphi} \Delta_\varphi \right| = 10 \cdot \Delta_\varphi \cdot \cos \varphi = 10 \cdot 8.75 \cdot 10^{-3} \cdot \cos(11.0^\circ) = 0.0167.$$

Відносну похибку ε_z визначаємо за формулою (5.110)

$$\varepsilon_z = \frac{\Delta_z}{\bar{z}} \cdot 100\% = 0.0167 \cdot 100 / 9.816 = 0.170\%.$$

Результат представлення записуємо у вигляді [91]

$$z = (9.816 \pm 0.017) \text{ мм}; \quad \varepsilon_x = 0.17\%; \quad P = 0.95.$$

5.14.3.2. Похибка суми двох величин

Припустимо, що деяка функція l є результатом підсумовування двох величин, отриманих одноразовими вимірюваннями

$$l = a + b$$

де a, b – прямо виміряні величини

$$a = (35.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_a = 0.29\%; \quad P = 1;$$

$$b = (15.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_b = 0.7\%; \quad P = 1.$$

Значення вимірюваної величини відповідно до виразу (5.106)

$$\bar{l} = \bar{a} + \bar{b} = 35.0 + 15.0 = 50.0 \text{ мм}.$$

Для розрахунку похибок функції l скористаємося способом 1 (див. під-розділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**)

За формулою (5.109) отримуємо вираз для абсолютної похибки

$$\Delta_l = \sqrt{\left(\frac{\partial l}{\partial a} \Delta_a \right)^2 + \left(\frac{\partial l}{\partial b} \Delta_b \right)^2} = \Delta_l = \sqrt{\Delta_a^2 + \Delta_b^2}$$

Перерахуємо абсолютні похибки величин a, b до довірчої ймовірності $\alpha = 0.95$:

$$\Delta_a = \frac{2}{3} \Delta_{ia} = 2 \cdot 0.1 / 3 = 0.067 \text{ мм}; \quad \Delta_b = \frac{2}{3} \Delta_{ib} = 2 \cdot 0.1 / 3 = 0.067 \text{ мм}.$$

Таким чином, абсолютна похибка дорівнюватиме

$$\Delta_l = \sqrt{\Delta_a^2 + \Delta_b^2} = \sqrt{0.067^2 + 0.067^2} = 0.095 \text{ мм}.$$

Відносну похибку ε_l визначаємо за формулою (5.110)

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta_l}{\bar{l}} \cdot 100\% = 0.095 \cdot 100 / 50.0 = 0.19\%.$$

Результат вимірювання з урахуванням правил представлення результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) записуємо у вигляді [91]

$$l = (50.00 \pm 0.10) \text{ мм}; \quad \epsilon_x = 0.19 \%; \quad P = 0.95.$$

5.14.3.3. Похибка різниці двох величин

Функція l має вигляд

$$l = a - b$$

де a, b – прямо виміряні величини.

Використовуємо для розрахунку похибки результати прямих вимірювань величин a, b з попереднього прикладу

$$a = (35.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \epsilon_a = 0.29 \%; \quad P = 1;$$

$$b = (15.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \epsilon_b = 0.7 \%; \quad P = 1.$$

Значення вимірюваної величини відповідно до виразу (5.106)

$$\bar{l} = \bar{a} - \bar{b} = 35.0 - 15.0 = 20.0 \text{ мм}.$$

Для розрахунку похибок функції l скористаємося способом 1 (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**). За формулою (5.109) отримуємо вираз для абсолютної похибки

$$\Delta_l = \sqrt{\left(\frac{\partial l}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial l}{\partial b} \Delta_b\right)^2} = \Delta_l = \sqrt{\Delta_a^2 + \Delta_b^2}$$

Перерахуємо абсолютні похибки величин a, b до довірчої ймовірності $\alpha = 0.95$:

$$\Delta_a = \frac{2}{3} \Delta_{ia} = 2 \cdot 0.1 / 3 = 0.067 \text{ мм}; \quad \Delta_b = \frac{2}{3} \Delta_{ib} = 2 \cdot 0.1 / 3 = 0.067 \text{ мм}.$$

Таким чином, абсолютна похибка дорівнюватиме

$$\Delta_l = \sqrt{\Delta_a^2 + \Delta_b^2} = \sqrt{0.067^2 + 0.067^2} = 0.095 \text{ мм}.$$

Відносну похибку ϵ_l визначаємо за формулою (5.110)

$$\epsilon_l = \frac{\Delta_l}{\bar{l}} \cdot 100\% = 0.095 \cdot 100 / 20.0 = 0.475 \%.$$

Результат вимірювання з урахуванням правил представлення результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) записуємо у вигляді

$$l = (20.00 \pm 0.10) \text{ мм}; \quad \epsilon_x = 0.5 \%; \quad P = 0.95.$$

Слід звернути увагу, що при одних і тих же значеннях абсолютних похибок Δa і Δb (при близьких значеннях a і b) відносна похибка різниці значно більше відносної похибки суми, отриманої в попередньому прикладі [91].

5.14.3.4. Похибка добутку двох величин

Функція F має вигляд

$$F = a \cdot b, \quad (5.116)$$

де a, b – прямо виміряні величини.

Використовуємо для розрахунку похибки результати прямих вимірювань величин a, b з попереднього прикладу

$$a = (35.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_a = 0.29 \% ; \quad P = 1;$$

$$b = (15.0 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_b = 0.7 \% ; \quad P = 1.$$

Значення вимірюваної величини відповідно до виразу (5.106)

$$\bar{F} = \bar{a} \cdot \bar{b} = 35.0 \cdot 15.0 = 52050 \text{ мм}^2.$$

Відповідно до рекомендацій (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**), розрахунок похибки непрямих вимірювань будемо проводити за способом 2.

Попередньо логарифмуємо вираз (5.116)

$$\ln F = \ln a + \ln b.$$

Потім за формулою (5.111) отримуємо розрахункове співвідношення для відносної похибки

$$\Delta_F = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln F}{\partial a} \Delta_a\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln F}{\partial b} \Delta_b\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_b}{b}\right)^2} = \sqrt{\varepsilon_a^2 + \varepsilon_b^2}.$$

Перерахуємо відносні похибки величин a, b до довірчої ймовірності $\alpha = 0.95$:

$$\varepsilon_a = \frac{2}{3} \varepsilon_{na} = 2 \cdot 0.29 / 3 = 0.193 \% ; \quad \varepsilon_b = \frac{2}{3} \varepsilon_{nb} = 2 \cdot 0.7 / 3 = 0.467 \% .$$

Таким чином, відносна похибка площі буде дорівнює

$$\varepsilon_S = \sqrt{\varepsilon_a^2 + \varepsilon_b^2} \cdot 100 \% = \sqrt{0.193^2 + 0.467^2} \cdot 100 \% = 0.505 \% .$$

Абсолютну похибку площі визначаємо за формулою (5.112)

$$\Delta_F = \frac{\bar{F} \cdot \varepsilon_F}{100} = 525.0 \cdot 0.505 / 100 = 2.65 \text{ мм}^2$$

Результат вимірювання з урахуванням правил представлення результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) записуємо у вигляді [91]

$$F = (525.0 \pm 2.6) \text{ мм}; \quad \varepsilon_F = 0.5 \% ; \quad P = 0.95.$$

5.14.3.5. Похибка частки двох величин

Потрібно визначити щільність матеріалу за прямо виміряним значенням маси m і об'єму V зразка

$$\rho = m/V. \quad (5.117)$$

Маса зразка отримана зважуванням на вагах з інструментальною похибкою $\Delta_m = \Delta_{im} = 0.1$ г

$$m = (81.9 \pm 0.1) \text{ г}; \quad \varepsilon_m = 0.12 \%; \quad P = 1.$$

Об'єм зразка отриманий прямим виміром за допомогою мензурки з інструментальною похибкою $\Delta_V = \Delta_{iV} = 0.2$ см³

$$V = (10.5 \pm 0.2) \text{ см}^3; \quad \varepsilon_V = 1.9 \%; \quad P = 1.$$

За формулою (5.117) визначаємо щільність матеріалу

$$\bar{\rho} = \frac{\bar{m}}{\bar{V}} = 81.9 \cdot 10^{-3} / 10.5 \cdot 10^{-6} = 7800 \text{ кг/м}^3.$$

Для визначення похибок вимірювання об'єму скористаємося способом 2 (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямим вимірюваннях**). Попередньо логарифмуємо вираз (5.117) маємо $\ln \rho = \ln m - \ln V$.

За формулою (5.111) отримуємо розрахункове співвідношення для відносної похибки вимірювання щільності

$$\Delta_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} \Delta_m\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial V} \Delta_V\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_V}{V}\right)^2} = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_V^2}.$$

Перерахуємо відносні похибки величин m , V до довірчої ймовірності $P = 0.95$:

$$\varepsilon_m = \frac{2}{3} \varepsilon_{im} = 2 \cdot 0.12 / 3 = 0.08 \%; \quad \varepsilon_V = \frac{2}{3} \varepsilon_{iV} = 2 \cdot 1.9 / 3 = 1.27 \%.$$

Таким чином, відносна похибка вимірювання щільності дорівнює

$$\varepsilon_\rho = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_V^2} \cdot 100 \% = \sqrt{0.08^2 + 1.27^2} \cdot 100 \% = 1.27 \%.$$

Абсолютну похибку щільності визначаємо за формулою (5.112)

$$\Delta_\rho = \frac{\bar{\rho} \cdot \varepsilon_\rho}{100} = 7800 \cdot 1.27 / 100 = 101.4 \text{ кг/м}^3 = 0.1014 \text{ т/м}^3.$$

Результат вимірювання з урахуванням правил представлення результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) записуємо у вигляді [91].

$$\rho = (7.80 \pm 0.10) \text{ т/м}^3; \quad \varepsilon_\rho = 0.13 \%; \quad P = 0.95.$$

5.14.3.6. Похибка при складних обчисленнях

За приклад розглянемо розрахунок енергоємності (у кДж/кг) виробництва паливних брикетів в дослідженнях [110], яка визначалося непрямым вимірюванням за формулою $E = N \cdot t / M$, де M – маса брикетів у кг, отриманих за час експозиції t (с); N – потужність приводу, кВт.

Прямыми вимірюваннями при постійній експозиції, тобто $t = \text{const}$, отримано $\bar{M} \pm \Delta_{(M)}$ та $\bar{N} \pm \Delta_{(N)}$, тобто згідно табл. 5.23 [110] вони з урахуванням систематичної похибки приладу відповідно становили (12.96 ± 0.77) кг і (4.07 ± 0.32) кВт.

Наведемо формулу (5.107) для функції $E = N \cdot t / M$

$$s_E^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial M} \right)_{N=\text{const}}^2 \cdot s_M^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial N} \right)_{M=\text{const}}^2 \cdot s_N^2. \quad (5.118)$$

Знайдемо частинні похідні цієї функції

$$\left(\frac{\partial E}{\partial M} \right)_{N=\text{const}} = -\frac{N \cdot t}{M^2} \quad \text{і} \quad \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{M=\text{const}} = \frac{t}{M}. \quad (5.119)$$

Таблиця 5.23. Показники виробництва паливних брикетів

Показник	Потужність N, кВт	Маса брикетів M, кг	Експозиція t, с	Продуктивність Q, кг/с	Енергомемність E, Дж/кг
	3.46	12.96	180.0	0.0720	48.06
	3.58	11.68	180.0	0.0649	55.17
	4.55	14.37	180.0	0.0798	56.99
	3.33	12.22	180.0	0.0750	52.17
	4.94	14.43	180.0	0.0802	61.60
	3.69	11.99	180.0	0.0666	55.39
	4.49	13.45	180.0	0.0747	60.08
Середнє значення	4.069	12.956	180.0	0.07198	56.477
Кількість замірів	14	14	14	14	14
Стандартне відхилення	0.6	1.5	0.0	0.0	4.7
Рівень значущості	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Довірчий інтервал результату	0.319	0.768	-	0.004	2.443
Точність вимірювання, %	7.9	5.9	-	5.9	4.3

Підставимо ці значення до початкової формули (5.118) з винесенням за дужки виразу, який піддавався частинному диференціюванню:

$$s_E^2 = \frac{t^2}{M^2} \cdot s_N^2 + \frac{N^2 \cdot t^2}{M^4} \cdot s_M^2 = \frac{N^2 \cdot t^2}{M^2} \left[\frac{s_N^2}{N^2} + \frac{s_M^2}{M^2} \right]. \quad (5.120)$$

Далі маємо

$$s_E^2 = \left(\frac{N \cdot t}{M} \right)^2 \cdot \left[\frac{s_N^2}{N^2} + \frac{s_M^2}{M^2} \right] = \bar{E}^2 \left[\frac{s_N^2}{N^2} + \frac{s_M^2}{M^2} \right]. \quad (5.121)$$

Звідки

$$s_E = \bar{E} \sqrt{\frac{s_N^2}{N^2} + \frac{s_M^2}{M^2}} \Rightarrow \Delta E = \bar{E} \sqrt{\frac{s_N^2}{N^2} + \frac{s_M^2}{M^2}}. \quad (5.122)$$

Підставивши значення маємо $\Delta E = 56.477 \sqrt{\frac{0.319^2}{4.069^2} + \frac{0.768^2}{12.956^2}} = 5.556$, звідки енергоємність виробництва паливних брикетів становить (56.5 ± 5.6) кДж/кг у той час, як за прямими розрахунками (табл. 5.23) вона дещо інша (56.5 ± 2.4) кДж/кг.

5.14.3.7. Непряме вимірювання щільності матеріалу деталі складної форми

На закінчення розглянемо приклад непрямого вимірювання щільності матеріалу деталі складної форми, зображеної на рис. 5.11. Довга сторона L деталі має нерівні краї [91].

Розрахунок щільності матеріалу проводимо за формулою

$$\rho = \frac{m}{a \left(L \cdot h - \frac{\pi \cdot D^2}{4} \right)}, \quad (5.123)$$

де m – маса;
 a – товщина;
 L – довжина;
 h – ширина;
 D – діаметр отвору.

Проведемо вимірювання всіх величин m , a , L , h і D , що входять до розрахункову формулу (5.123), і визначимо їх абсолютні та відносні похибки.

Лінійні розміри L , h деталі і діаметр отвору D вимірюємо за допомогою штангенциркуля з інструментальною похибкою $\Delta_i = 0.1$ мм; товщину a деталі — мікрометром з інструментальною похибкою $\Delta_i = 0.01$ мм; масу m деталі визначаємо зважуванням на технічних вагах з інструментальною похибкою $\Delta_i = 50$ мг.




Рис. 5.11. Деталь складної форми

Через те, що довга сторона деталі має нерівні краї, ширину h з метою зменшення випадкової похибки вимірюємо п'ять разів. В результаті отримуємо експериментальні дані:

$$h_1 = 59.5 \text{ мм}; \quad h_2 = 60.1 \text{ мм}; \quad h_3 = 58.9 \text{ мм}; \quad h_4 = 60.5 \text{ мм}; \quad h_5 = 60.0 \text{ мм}.$$

Розрахунок похибок вимірювання величини до слід проводити за методикою, описаною в підрозділі **5.13.1 Оцінка похибок при прямих багаторазових вимірюваннях**.

За формулою (1.22) розрахуємо середнє арифметичне значення

$$\bar{h} = (59.5 + 60.1 + 58.9 + 60.5 + 60.0) / 5 = 59.76 \text{ мм}.$$

У середньому арифметичному залишаємо менший розряд — соті.

За допомогою формули (1.56) знайдемо оцінку середнього квадратичного відхилення результату вимірювання $s_{\bar{h}} = 0.289$ мм.

В оцінці СКВ результату вимірювання залишаємо три значущі цифри, тобто на одну більше, ніж може містити абсолютна похибка.

Приймаємо рівень значущості $\alpha = 0.05$ і розраховуємо за виразом (5.52) довірчий інтервал випадкової похибки, розрахований при $t_{0.05(4)}$, визначене двобічного статистичною функцією **MS Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**

$$\Delta_{\bar{h}} = 2.78 \cdot 0.289 = 0.8038 \approx 0.804 \text{ мм}.$$

Визначаємо абсолютну похибку результату вимірювання з урахуванням випадкової та інструментальної похибок за формулою (5.98)

$$\Delta_h = \sqrt{\Delta_{\bar{h}}^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \Delta_{nh}\right)^2} = \sqrt{0.804^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot 0.1\right)^2} = 0.8067 \approx 0.807 \text{ мм}.$$

У проміжному розрахунку залишаємо трьох значущі цифри. За формулою (5.43) чи (5.47) обчислюємо відносну похибку

$$\varepsilon_h = \frac{\Delta_h}{\bar{h}} \cdot 100\% = 0.807 \cdot 100 / 59.76 = 1.35\%.$$

У проміжному розрахунку також залишаємо три значущі цифри.

Обмежуємо кількості значущих цифр у похибках Δ_h і ε_h та значенні \bar{h} за правилами підрозділу **5.16 Правила подання результатів вимірювань**.

У абсолютної похибки $\Delta_h = 0.807$ мм перша значуща цифра "8" більше "3", отже, залишаємо одну значущу цифру $\Delta_h = 0.8$ мм.

Так як молодший розряд в абсолютної похибки становить десяті частки ($\Delta_h = 0.8$ мм), то у виміряному значенні залишаємо теж десяті частки числа. Таким чином, отримуємо $\bar{h} = 59.8$ мм.

У відносній похибці залишаємо дві значущі цифри, оскільки перша значуща цифра "1" менше "3". Але оскільки відкидається одна цифра "5", то попередній розряд числа збільшуємо на одиницю, щоб цифра цього розряду була парній є $\bar{h} = 1.35\% \approx 1.4\%$.

Остаточний результат вимірювання висоти записуємо у вигляді

$$h = (59,8 \pm 0.8) \text{ мм}; \quad \varepsilon_h = 1.4\%; \quad P = 0.95.$$

У результаті однократного вимірювання довжини L деталі штангенциркулем отримано значення $\bar{L} = 81.6$ мм з абсолютною похибкою $\Delta_L = \Delta_{\text{ин}L} = 0.1$ мм (див. підрозділ **5.11.1 Похибка одноразового вимірювання при рівномірному розподілі випадкових величин**). Відносну похибку визначаємо за формулою (5.47)

$$\varepsilon_L = \frac{\Delta_L}{\bar{L}} \cdot 100\% = 0.1 \cdot 100 / 81.6 = 0.123\%.$$

Остаточний результат вимірювання довжини для довірчої ймовірності $P = 1$ записуємо у вигляді (5.50)

$$L = (81.6 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_L = 0.12\%; \quad \alpha = 1.$$

При одноразовому вимірюванні діаметру отвору D штангенциркулем отримано значення $\bar{D} = 50.2$ мм, з абсолютною похибкою $\Delta_D = \Delta_{\text{ин}D} = 0.1$ мм. Відносну похибку визначаємо за формулою (5.47)

$$\varepsilon_D = \frac{\Delta_D}{\bar{D}} \cdot 100\% = 0.1 \cdot 100 / 50.2 = 0.199\%.$$

Остаточний результат вимірювання діаметра для довірчої ймовірності $P = 1$ записуємо у вигляді (5.50)

$$D = (52.2 \pm 0.1) \text{ мм}; \quad \varepsilon_D = 0.20\%; \quad P = 1.$$

Для вимірювання товщини a деталі з метою зменшення відносної похибки використовувався мікрометр. У результаті однократного вимірювання товщини a штангенциркулем отримано значення $\bar{a} = 0.50$ мм з абсолютною похибкою $\Delta_a = \Delta_{\text{ин}a} = 0.01$ мм. Відносну похибку визначаємо за формулою (5.47)

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{\bar{a}} \cdot 100\% = 0.1 \cdot 100 / 0.50 = 2.0\%.$$

Остаточний результат вимірювання товщини для довірчої ймовірності $\alpha = 1$ записуємо у вигляді (5.50)

$$a = (0.50 \pm 0.01) \text{ мм}; \quad \varepsilon_a = 2.0 \% ; \quad P = 1.$$

Маса зразка $m = 3.84$ г отримана зважуванням на технічних вагах з інструментальною похибкою $\Delta_m = \Delta_{\text{ін}m} = 50$ мг. За формулою (5.47) розраховуємо відносну похибку вимірювання маси

$$\varepsilon_m = \frac{\Delta_m}{\bar{m}} \cdot 100\% = 50 \cdot 10^{-3} \cdot 100 / 3.84 = 1.30 \%$$

Остаточний результат вимірювання маси зразка для довірчої ймовірності $P = 1$ записуємо у вигляді (5.50)

$$m = (3.84 \pm 0.05) \text{ мм}; \quad \varepsilon_m = 2.0 \% ; \quad P = 1.$$

Для зручності проведення подальших розрахунків представимо отримані результати прямих вимірювань в табл. 5.24

Таблиця 5.24. Результати прямих вимірювань

Вимірювана величина	Значення вимірюваної величини	Абсолютна похибка		Відносна похибка	
		$\alpha = 1$	$\alpha = 0.95$	$\alpha = 1$	$\alpha = 0.95$
h	59.7 мм	-	0.8 мм	-	1.3
L	81.6 мм	0.1 мм	0.07 мм	0.12	0.08
D	50.2 мм	0.1 мм	0.07 мм	0.20	0.13
a	0.50 мм	0.01 мм	0.007 мм	2.0	1.34
m	3.84 г	50 мг	33 мг	1.3	0.9

Щільність матеріалу зразка згідно з формулою (5.123) дорівнює

$$\bar{\rho} = \frac{\bar{m}}{\bar{a} \left(\bar{L} \cdot \bar{h} - \frac{\pi \cdot \bar{D}^2}{4} \right)} = \frac{3.84 \cdot 10^{-3}}{0.5 \cdot 10^{-3} \left(81.6 \cdot 10^{-3} \cdot 59.7 \cdot 10^{-3} - \frac{\pi \cdot (50.2 \cdot 10^{-3})^2}{4} \right)} =$$

$$= 26655 \text{ кг/м}^3.$$

Для отримання розрахункового співвідношення відносної похибки вимірювання щільності скористаємося способом 2 (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**), попередньо представивши формулу (5.123) у вигляді одночлена

$$\rho = \frac{m}{a \cdot S} = m^{+1} \cdot a^{-1} \cdot S^{-1}, \quad (5.124)$$

де

$$S = L \cdot h + \frac{\pi D^2}{4}. \quad (5.125)$$

Тоді відповідно до виразів (5.114) і (5.115) отримуємо

$$\varepsilon_p = \sqrt{(+1 \cdot \varepsilon_m)^2 + (-1 \cdot \Delta_a)^2 + (-1 \cdot \Delta_S)^2} = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_a^2 + \varepsilon_V^2} \quad (5.126)$$

Похибки величини S визначимо за способом 1, нехтуючи похибкою числа π (див. підрозділ **5.13.2 Визначення похибки при непрямих вимірюваннях**). Відповідно до формули абсолютна похибка величини S дорівнює

$$\begin{aligned} \Delta_S &= \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial L} \Delta_L\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial h} \Delta_h\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial D} \Delta_D\right)^2} = \\ &= \sqrt{(h \Delta_L)^2 + (L \Delta_h)^2 + \left(-\frac{2\pi D}{4} \Delta_D\right)^2}. \end{aligned} \quad (5.127)$$

У формулу (5.127) з табл. 5.24 підставляємо похибки прямих вимірювань, перелічені для довірчої ймовірності $\alpha = 0.95$ і визначаємо

$$\Delta_S = \sqrt{(59.7 \cdot 0.07)^2 + (81.6 \cdot 0.8)^2 + \left(\frac{2\pi \cdot 50.2 \cdot 0.07}{4}\right)^2} = 65.6 \text{ мм}^2.$$

Відносну похибку величини S визначаємо за формулою (5.110)

$$\varepsilon_S = \frac{\Delta_S}{L \cdot h - \pi \cdot D^2 / 4} \cdot 100\% = \frac{65.6 \cdot 10^{-3}}{\left(81.6 \cdot 10^{-3} \cdot 59.7 \cdot 10^{-3} - \frac{\pi \cdot (50.3 \cdot 10^{-3})^2}{4}\right)} =$$

$$= 100\% = 2.27\%.$$

Відносну похибку щільності ρ визначаємо за формулою (5.126)

$$\varepsilon_p = \sqrt{\varepsilon_m^2 + \varepsilon_a^2 + \varepsilon_V^2} = \sqrt{0.9^2 + 1.34^2 + 2.27^2} = 2.81\%.$$

Абсолютна похибка вимірювання щільності дорівнює

$$\Delta\rho = \frac{\bar{\rho} \cdot \varepsilon_p}{100} = 2.81 \cdot 2655 / 100 = 74.6 \text{ кг/м}^3.$$

Остаточний результат вимірювання записуємо у вигляді [91]

$$\rho = (2.66 \pm 0.07) \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3; \quad \varepsilon_p = 2.8\%; \quad P = 0.95.$$

5.14.4. Обробка непрямих вимірювань у невідтворюваних умовах

Особливим видом непрямих вимірювань є непрямі у невідтворюваних умовах, тобто при систематичній зміні одного або декількох параметрів. У цьому випадку значення побічно вимірюваної величини обчислюється для кожного окремого вимірювання, а отримані результати обробляються спільно, як прямі багаторазові вимірювання (див. підрозділи **5.11.1 Похибка одноразового вимірювання при рівномірному розподілі випадкових величин** і **5.14.2 Обробка прямих багаторазових вимірювань**). Така обробка результатів дозволяє враховувати лише випадкові похибки вимірювань.

У якості прикладу розглянемо вимірювання швидкості польоту кулі за допомогою балістичного маятника.

У досліді проводимо вимірювання висоти h підйому маятника після попадання кулі (табл. 5.25).

Розрахунок величини швидкості польоту кулі проводимо за формулою

$$V = \frac{m_{\text{м}}}{m_{\text{п}}} \sqrt{2gh}, \quad (5.128)$$

де $m_{\text{м}}, m_{\text{п}}$ – маси маятника і кулі, відповідно, $m_{\text{м}}=10.0$ кг, $m_{\text{п}}=10.0$ г;

h – висота підйому маятника;

g – прискорення вільного падіння, $g=9.81$ м/с.

При першому вимірі висоти отримано значення $h_1=29.8$ мм, за формулою (5.128) розраховуємо значення швидкості кулі

$$V = \frac{10}{10 \cdot 10^{-3}} \sqrt{2 \cdot 9.81 \cdot 29.8 \cdot 10^{-3}} = 76.4 \text{ м/с.}$$

Результати вимірювань висоти h та розрахунку швидкості V кулі представлені в табл. 5.25.

Отримані результати обробляємо як прямі багаторазові вимірювання за методикою, описаною в

Таблиця 5.25. Результати вимірювань									
h , мм	29.8	28.7	28.5	29.1	30.2	29.7	29.6	29.3	29.1
V , м/с	764	750	747	755	769	763	762	759	755

підрозділі **5.13.1 Оцінка похибок при прямих багаторазових вимірювання**, (див. також підрозділ **5.14.3 Обробка непрямих вимірювань при відтворюваних умовах**).

1. За формулою (1.22) розраховуємо середнє арифметичне значення швидкості кулі $\bar{V}=758.4$ м/с.

2. За допомогою формули (1.56) знаходимо оцінку СКВ результату вимірювання $S_{\bar{V}}=2.12$ м/с.

3. Приймаємо рівень значущості $\alpha=0.05$ і знаходимо довірчий інтервал випадкової похибки $\Delta_{\bar{V}}=4.79$ м/с.

4. За формулою (5.47) розраховуємо відносну похибку

$$\varepsilon_{\bar{V}} = \frac{\Delta_{\bar{V}}}{\bar{V}} \cdot 100\% = 5 \cdot 100 / 758.4 = 0.659 \text{ м/с.}$$

Результат вимірювання з урахуванням правил представлення результатів вимірювань (див. підрозділ **5.16 Правила подання результатів вимірювань**) записуємо у вигляді

$$V = (758 \pm 5) \text{ м/с}; \quad \varepsilon_V = 0.7 \%; \quad P = 0.95.$$

У непрямих вимірюваннях при невідтворюваних умовах враховуються тільки випадкові похибки [91].

5.14.5. Загальний порядок розрахунків при непрямих вимірюваннях

При обробці непрямих вимірювань слід дотримуватися такого порядку операцій:

1. Для кожної серії вимірювань величин, що входять у визначення відшуканої величини, проводиться обробка, як і для прямих вимірювань. При цьому для всіх вимірювань задають одне і те ж значення надійності α .

2. Знаходиться вираз для абсолютної і відносної похибок шуканої величини відповідно з конкретним видом функціональної залежності (див. табл. Б.4 і Б.5).

3. Оцінюються межі довірчого інтервалу для результату непрямих вимірювань $\Delta_{(f)} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \cdot \Delta_{(x)}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \cdot \Delta_{(y)}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2 \cdot \Delta_{(z)}^2 + \dots}$ за виразом (5.107), де похідні $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial f}{\partial z}$, ... обчислюються при $x = \bar{x}$, $y = \bar{y}$, $z = \bar{z}$, ...

4. Остаточний результат записується у вигляді $f(x_1, x_2, \dots) = f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots) \pm \Delta_f$.

5. Величина абсолютної похибки сама по собі дає мало інформації про дійсну точність вимірювання, якщо не зіставляти її зі значенням вимірюваної величини, тому часто використовується відносна похибка вимірювання. Для цього визначається відносна похибка результату серії непрямих вимірювань у частках одиниці $\varepsilon = \frac{\Delta_f}{f}$ або у відсотках $\varepsilon_{\%} = \frac{\Delta_f}{f} \cdot 100\%$.

Варто звернути увагу, що точність дозування і змішування визначається за коефіцієнтом варіації V [62, 63], у той час як показники інших машин


технологічних ліній, наприклад, кормоцеху, оцінюються за відхилами від середнього, тобто відсотковою відносною похибкою δ_x (див. с. 225).

Тому при загальній оцінці технологічної лінії слід урахувати, що між коефіцієнтом варіації V і відносною похибкою δ_x , власне відносним відхилом середнього, представленим у відсотках $100 \cdot t_{\alpha(v)} \cdot \frac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}$ (для змішувачів

— 15–20 проб [62]) і $100 \cdot z_{\alpha} \cdot \frac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}$ (для дозаторів — 30 проб [63]) існує залежність

$$\frac{V}{\delta_x} = \frac{\sqrt{n}}{t_{\alpha(n-1)}}. \quad (5.129)$$

Для різних α і кількості проб n для $100 \cdot t_{\alpha(v)} \cdot \frac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}$ (непарні номери ліній) і $100 \cdot z_{\alpha} \cdot \frac{s_{\bar{x}}}{\bar{x}}$ (парні номери ліній) ця залежність наведена на рис. 5.12.



5.15. ОБРОБКА СПІЛЬНИХ ВИМІРІВ. МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Метою спільних вимірів є знаходження залежності між декількома прямо або побічно вимірними величинами.

Надійним і науково обґрунтованим способом визначення коефіцієнтів експериментальних залежностей є метод найменших квадратів (МНК). Суть його полягає в підборі таких значень коефіцієнтів, при яких сума квадратів відхилень, виміряних в досліді значень $y_i (i=1, 2, \dots, n)$ від розрахованих була б мінімальною. МНК дозволяє не тільки знайти коефіцієнти функціональної залежності, але і провести оцінку похибок знайдених коефіцієнтів.

МНК розглянемо у варіанті, коли прийняті насту-

Таблиця 5.26. Залежність швидкості при рівноприскореному русі											
t, c	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$V, m/c$	3.3	3.6	5.1	6.6	6.5	8.2	9.0	9.6	11.6	11.4	13.0

пні допущення:

- між змінними існує залежність виду $y = a + bx$;
- похибки величини x малі.

Приклад. Досліджується залежність швидкості $V(t)$ при рівноприскореному русі, (табл. 5.26) яка задовольняє рівнянню прямий

$$V = V_0 + gt.$$

Розрахунок коефіцієнтів a і b варто виконувати за допомогою ППП Statistica, як це показано у підрозділах **11.4.1.2 Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії за допомогою ППП Statistica**, **11.5.1 Отримання коефіцієнтів рівняння однофакторної нелінійної залежності з використання ППП Statistica**, **11.13 Побудова двовимірних поверхонь**.

Далі за похибку розрахованої величини y при довільному значенні аргументу x розраховують для довірчої ймовірності $P = 0.95$ як похибка опосередкованих вимірювань

$$\Delta_y = \sqrt{(2 \cdot s_a)^2 + 2 \cdot s_b)^2}. \quad (5.130)$$

Таблиця 5.27. Результати розрахунку параметрів лінійного рівняння						
Model is: v2=a0+a1*v1 (Spreadsheet1)						
Dep. Var. : V						
Level of confidence: 95.0% (alpha=0.050)						
	Estimate	Standard error	t-value df = 9	p-value	Lo. Conf Limit	Up. Conf Limit
a0	2.116364	0.284420	7.44097	0.000039	1.472960	2.759767
a1	0.979091	0.041935	23.34755	0.000000	0.884226	1.073956

Результати застосування ППП **Statistica** наведено в табл. 5.27.

Згідно з її даними маємо $a = 2.116364$, $b = 0.979091$, $s_a = 0.284420$, $s_b = 0.041935$.

Для довірчої ймовірності $P = 0.95$ знаходимо межі довірчих інтервалів коефіцієнтів за формулою (5.130)

$$\Delta_a = 2 \cdot s_a = 2 \cdot 0.280 = 0.560 \text{ м/с} = 0.6 \text{ м/с};$$

$$\Delta_b = 2 \cdot s_b = 2 \cdot 4.12 \cdot 10^{-2} = 82.4 \cdot 10^{-3} = 0.08 \text{ м/с}^2.$$

Результат вимірювання записуємо у вигляді

$$V_0 = a = (2.1 \pm 0.6) \text{ м/с}; \quad g = b = (0.98 \pm 0.08) \text{ м/с}^2.$$

А шукане рівняння виглядає наступним чином

$$V = 2.1 + 0.98t.$$

Слід зазначити, що через порівняно великий обсяг обчислень застосування методу найменших квадратів доцільно проводити за допомогою комп'ютера або калькулятора [91].

5.16. ПРАВИЛА ПОДАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ

5.16.1. Обмеження числа значущих цифр і округлення похибки

У розрахунках та при поданні результатів вимірювання слід потрібно використовувати основні, похідні чи позасистемні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць (SI) згідно з [109, 111, 112]. Дані про властивості речовин і матеріалів треба подавати згідно з [113].

Якщо вимірювання виконано в інших одиницях, то викладаючи найважливіші результати роботи, треба подати в дужках одержані числові значення в одиницях SI [114].

Усяке число складається з цифр, що означають кількість одиниць в різних розрядах числа. Наприклад, в числі 1726.34 є шість цифр. Число містить одну тисячу, сім сотень, два десятка, шість одиниць, три десятих, чотири сотих. Старший розряд у числі — тисячі (1000), менший — соті (4 сотих).

Цифри числа можуть бути значущими і ні. Значущими цифрами числа є всі цифри даного числа, крім нулів, що стоять зліва. Нулі, що стоять в середині або в кінці числа (праворуч) є значущими цифрами, оскільки позначають відсутність одиниць у відповідному розряді. При цьому цифри множника 10 не враховуються. Приклади визначення кількості значущих цифр у числах представлені в табл. 5.28.

Таблиця 5.28. Визначення кількості значущих цифр	
Число	Кількість значущих цифр
12	2
12.0	3
12.4	3
120	3
124	3
$1.24 \cdot 10^{-3}$	3
0,1240	4
0,1046	4
$0.526 \cdot 10^6$	3
$0.206 \cdot 10^{-3}$	3
$0.200 \cdot 10^{-3}$	3
$0.020 \cdot 10^{-3}$	2

У процесі вимірювань отримують виміряне значення величини \bar{x} , його абсолютну Δ_x і відносну ϵ_x похибки. Щоб не створювати помилкового враження про точність проведених вимірювань, в похибках Δ_x і ϵ_x слід обмежувати число значущих цифр. Згідно з правилами наближених обчислень середнє арифметичне значення повинно мати **на один розряд більше**, ніж вихідні дані. Тому залишаємо \bar{x} і відсоткові частки.

Похибки вимірювання повинні містити не більше двох (тобто одну або дві) значущих цифри. Для цього слід використовувати наступні правила і порядок обмеження числа значущих цифр.

Якщо перша значуща цифра в абсолютної похибки Δ_x "1", "2", "3", то в похибки залишаємо дві значущі цифри. Якщо перша значуща цифра в похибки "4", "5", "6", "7", "8", "9", то в похибки залишаємо одну значущу цифру (див. табл. 5.29).

Таблиця 5.29. Приклади обмеження числа значущих цифр і округлення похибки

Приклад	Пояснення
$0.154 \approx 0.153$ $1.967 \approx 2.0$ $19.37 \approx 19$ $144.1 \approx 0.14 \cdot 10^3$	Перша значуща цифра похибки "1", тому залишаємо дві значущі цифри. При необхідності число записують з множителем 10^n , де n – показник ступеня.
$0.394 \approx 0.39$ $3.94 \approx 3.9$	Перша значуща цифра похибки "3", тому залишаємо дві значущі цифри.
$0.397 \approx 0.4$ $3.97 \approx 4$	Перша значуща цифра похибки "3", тому залишаємо дві значущі цифри, але так як при округленні цифра "3" перетворюється на цифру "4", то залишаємо тільки одну значущу цифру.
$0.461 \approx 0.5$ $4.78 \approx 5$ $41.1 \approx 4 \cdot 10$ $4123 \approx 4 \cdot 10^3$	Перша значуща цифра похибки "4", тому залишаємо одну значущу цифру.
$0.917 \approx 0.9$ $9.17 \approx 9$ $91.7 \approx 9 \cdot 10$ $9123 \approx 9 \cdot 10^3$	Перша значуща цифра похибки "9", тому залишаємо одну значущу цифру.
$0.0977 \approx 0.10$ $0.956 \approx 1.0$ $956 \approx 1.0 \cdot 10^3$	Перша значуща цифра похибки "9", тому залишаємо одну значущу цифру, але так як при округленні цифра "9" перетворюється на число "10", тобто перша значуща цифра "1", то залишаємо дві значущі цифри.
$2.45 \approx 2.4$ $2.35 \approx 2.4$	Перша значуща цифра похибки "2" – залишаємо дві значущі цифри. Відкидається тільки одна цифра "5", а за нею немає значущих цифр, тому округлення виробляємо до найближчого парного числа.
$2.451 \approx 2.5$ $2.351 \approx 2.4$	Перша значуща цифра похибки "2" – залишаємо дві значущі цифри. Перша з відкидаються цифр "5", але відкидаються дві цифри, тому попередній розряд числа збільшуємо на одиницю

Вимірне значення \bar{x} повинно закінчуватися тим же молодшим розрядом, що і абсолютна похибка Δ_x . Наприклад, якщо в абсолютній похибці Δ_x залишений молодший розряд — одиниці, то і у значенні виміру повинен бути залишений молодший розряд — одиниці (див. табл. 5.30).

Якщо завжди притримуватися цього правила округлення, похибки будуть різних знаків (з перевищенням або з нестачею) і при виконанні арифметичних дій частково компенсуватимуть одна одну [94].

При поданні результатів слід користуватися такими правилами [20].

Похибку результатів вимірювань зазвичай представляють з кількістю значущих цифр, як у середньоарифметичного. При числі вимірювань менше ніж 100 — на одну значущу цифру більше. У відносній похибки число значущих цифр обмежуємо за тими ж правилами, що і в абсолютній похибки (див. табл. 5.29). Результат вимірювання округлюється до того ж десяткового

знаку, яким кінчається округлене значення абсолютної похибки. Незначущі нулі відкидаються до розряду числового значення похибки.

Таблиця 5.30. Приклади обмеження кількості значущих цифр у значенні виміру і його похибки

Приклад	Пояснення
$43.234 \pm 0.0417 \approx 43.23 \pm 0.04$ $32.3754 \pm 0.0917 \approx 32.38 \pm 0.09$	У похибки залишаємо одну значущу цифру, молодший розряд – соті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – соті.
$4.3234 \pm 0.0397 \approx 4.32 \pm 0.04$ $3.2364 \pm 0.0522 \approx 3.24 \pm 0.05$ $432.37 \pm 0.0917 \approx 432.37 \pm 0.09$	У похибки залишаємо одну значущу цифру, молодший розряд – соті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – соті.
$432.37 \pm 0.956 \approx 432.4 \pm 1.0$ $432.3477 \pm 2.45 \approx 432.3 \pm 2.4$ $432.134 \pm 2.86 \approx 432.1 \pm 2.9$ $43.234 \pm 3.94 \approx 43.2 \pm 3.9$	У похибки залишаємо дві значущі цифри, останній розряд – десяті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – десяті.
$43.234 \pm 0.297 \approx 43.2 \pm 3.0$ $432.345 \pm 1.441 \approx 432.34 \pm 1.4$	У похибки залишаємо дві значущі цифри, молодший розряд – десяті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – десяті.
$43.234 \pm 3.97 \approx 43 \pm 4$ $432.364 \pm 5.55 \approx 432 \pm 6$ $432.34 \pm 39.4 \approx 432 \pm 39$ $432.34 \pm 19.37 \approx 432 \pm 19$	У похибки залишаємо одну значущу цифру, молодший розряд – одиниці, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – одиниці.
$432.34 \pm 49.1 \approx (43 \pm 5) \cdot 10$ $432.34 \pm 41.1 \approx (43 \pm 4) \cdot 10$	У похибки залишаємо одну значущу цифру. Так як за дужки виносимо загальний множник "10", то молодший розряд – одиниці, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – одиниці.
$432.34 \pm 39.7 \approx (4.3 \pm 0.4) \cdot 10^2$ $432.34 \pm 59.7 \approx (4.4 \pm 0.6) \cdot 10^2$	У похибки залишаємо одну значущу цифру. Так як за дужки виносимо загальний множник "10 ² ", то молодший розряд – десяті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – десяті.
$432.34 \pm 211 \approx (4.33 \pm 0.21) \cdot 10^3$ $432.34 \pm 219 \approx (4.32 \pm 0.22) \cdot 10^3$	У похибки залишаємо дві значущі цифри. Так як за дужки виносимо загальний множник "10 ³ ", то молодший розряд – соті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – соті.
$0.0004623 \pm 0.00017 \approx (4.6 \pm 1.7) \cdot 10^{-4}$	У похибки залишаємо дві значущі цифри. Так як за дужки виносимо загальний множник "10 ⁻⁴ ", то молодший розряд – десяті, у значенні виміру залишаємо також молодший розряд – десяті.

У числовому вигляді ці записи можуть подаватися у вигляді: (13.62 ± 0.06) мм, або 13.62 мм ± 0.06 мм.

При округленні числа, що виражає абсолютну чи відносну похибку, при $n \leq 10$ слід подавати одну значущу цифру, якщо перша із них менше за $\sqrt{10} \approx 3$; і дві цифри якщо перша цифра числа більша чи дорівнює трьом.

При обмеженні числа значущих цифр використовуємо операцію округлення. Округлення числа являє собою відкидання значущих цифр праворуч після певного розряду з можливою зміною цифри цього розряду.

Існують наступні правила округлення.

Якщо перша з відкидаються цифр менше ніж “5”, то цифра попереднього розряду не змінюється. Якщо цифра старшого з відкинутих розрядів менше або дорівнює чотирьом, то цифра залишеного розряду не змінюється. Зайві цифри з правою сторони в цілих числах замінюються нулями, а в десятикових дробах відкидаються.

Якщо перша з відкидаються цифр більше ніж “5”, то цифра попереднього розряду збільшується на одиницю. Якщо відкидаються кілька цифр і перша з відкидаються цифр “5”, то цифра попереднього розряду збільшується на одиницю.

Якщо відкинута цифра дорівнює п’яти, а наступні за нею цифри невідомі або нулі, то останню залишену цифру числа не змінюють, якщо вона парна, і збільшують на одиницю, якщо вона непарна. В пакеті аналізу **MS Excel** ця умова не виконується.

Якщо відкидається тільки одна цифра “5”, а за нею немає цифр, то округлення проводиться до найближчого парного числа, тобто цифра попереднього розряду залишається незмінною, якщо вона парна, і збільшується на одиницю, якщо вона непарна.

Округлення слід виконувати відразу до бажаного числа значущих цифр, а не по етапах розрахунків, що може призвести до помилок. Його слід проводиться *лише в текстовому матеріалі до кількості знаків рівній кількості знаків у вихідних даних*. При розрахунках на ЕОМ проміжні і кінцеві результати не округляються, наприклад, в **MS Excel** функцією **ОКРУГЛ** (див. Додаток А), змінюються лише їх візуальне представлення [20].

Приклади обмеження числа значущих цифр у похибки і у вимірній величині представлені в табл. 5.29 та 5.30.

При виконанні арифметичних дій з наближеними числами загалом дотримуються таких правил.

При додаванні, відніманні, множенні і діленні кількість значущих цифр результату відповідає найменшій числу значущих цифр у задіяних величин.

При піднесенні до ступеня і добуванні кореня результат повинен мати стільки значущих цифр як у основи (при піднесенні до ступеня) або у числа під коренем.

При логарифмуванні число значущих цифр у мантисі результату має дорівнювати числу значущих цифр логарифмованого числа.

Так як значення середнього квадратичного чи стандартного відхилення знаходиться шляхом добування кореню квадратного із дисперсії, то її вели-

чина має бути розрахована з такою точністю, щоб число її значущих цифр було на два більше, ніж число значущих цифр у СКВ чи СВ (практично у середнього арифметичного).

Як сказано вище (див. с. 281) при використанні констант (число π , g , число e , маса та заряд електрона, швидкість світла у вакуумі і т. п.) у розрахунках використовують їх наближені (округлені) значення з таким числом значущих цифр, щоб кінцеве значення обчислювальної величини не виходила за попередньо установлені межі (див. табл. 5.29 та 5.30) [115].

При потребі результати проміжних обчислень в текстовому матеріалі наводяться з одним–двома зайвими знаками, причому похибки повинні бути виражені не більше ніж трьома значущими цифрами [20].

5.16.2. Запис результату вимірювань при прямих вимірюваннях

При симетричній довірчій похибці результати вимірювань для груп рівноточних рядів записують у вигляді

$$\bar{x}; \pm\Delta_x; \alpha; n \quad \text{або} \quad \bar{x} \pm \Delta_x; \alpha,$$

тут \bar{x} – середньоарифметичне; Δ_x – межа; α – прийнята довірна ймовірність; n – кількість спостережень.

Якщо виконано вимірювання нерівноточних рядів, то за результат приймають оцінку *середньозваженого значення* для груп спостережень і тоді остаточно пишуть

$$\bar{x} \pm \Delta_x; \alpha; m_1; m_2; n,$$

де m_1, m_2 – кількість спостережень у i -й групі (серії) нерівноточних вимірювань;

n – загальна кількість спостережень.

За несиметричної похибки вимірювань результати наводяться у формі

$$\bar{x}; \Delta R \text{ від } \Delta_{x_H} \text{ до } \Delta_{x_B}; \alpha; n,$$

де $\Delta_{x_H}, \Delta_{x_B}$ – значення нижньої і верхньої меж похибки вимірювань.

При відсутності дані про функції розподілу складових похибки, результати вимірювань подається у вигляді $\bar{x}; s_{\bar{x}}; n; \theta; \alpha$.

6. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ОЦІНЮВАНИХ ВИБІРОК

6.1. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ

При перевірці статистичної гіпотези H_0 вибір між двома класами статистичних методів — параметричними й непараметричними, залежить від виду розподілу й типу досліджуваної ознаки.

Параметричні методи, а відповідно і **параметричні критерії** ґрунтуються на припущенні, що розподіл ознаки, наведений у метричній (кількісній) сукупності, підпорядкований нормальному розподілу.

До таких критеріїв відносяться, зокрема, критерії Ст'юдента й Фішера (t і F), застосування яких вимагає обчислення оцінок параметрів розподілу.

Непараметричні методи, а відповідно і **непараметричні критерії** використовуються для перевірки непараметричних гіпотез. Їхнє використання вимагає попереднього обчислення оцінок невідомих параметрів розподілу й навіть наближеного значення закону розподілу ознаки. Вони можуть застосовуватися для будь якої метричної (кількісної) сукупності й для неметричних (якісних, категоріальних) — номінативних (класифікації, найменування) та порядкових (рангових), а також до кількісних ознаками незалежно від виду їхнього розподілу (в тому числі й до нормально розподіленим).

Непараметричні критерії менш ефективні за параметричні, тому їх доцільно використовувати лише при попередніх дослідженнях [34].

Наприклад, непараметричними альтернативами t -тесту є критерії серій **Вальда–Вольфовиця** (див підрозділ 7.4.2.4 Критерій серій Вальда–Вольфовиця), **U -тест Манна–Уїтні** (підрозділ 7.4.2.1 Визначення U -критерію Манна–Уїтні за допомогою ППП Statistica), **двовибірковий критерій Колмогорова–Смирнова** (підрозділ 7.4.2.3 Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова для оцінки розбіжності між емпіричними сукупностями). Непараметричні методи прийнятні при малому обсязі вибірки (до 100 даних). Крім того, якщо обсяг вибірки малий (10 і менше), то рівні значущості для тих непараметричних критеріїв, які використовують нормальне наближення, слід розглядати лише як грубі оцінки [53]. За [98] при $n < 10$ перевірити гіпотезу про вигляд розподілу взагалі неможливо, а при $10 < n < 50$ важко судити про вигляд розподілу.

Для статистичного аналізу даних необхідно пам'ятати дві головні умови, що визначають вибір параметричних або непараметричних критеріїв: обсяг вибірки і нормальність розподілу:

а) якщо обсяг вибірки $n \geq 30$ і розподіл значень відповідає нормальному вигляду, то приймається рішення про вибір параметричних критеріїв;

б) якщо обсяг вибірки $n \geq 30$, а розподіл значень у допустимих межах не відповідає нормальному, то застосовуються непараметричні критерії;

в) якщо обсяг вибірки $n < 30$, то можна не перевіряючи розподіл на нормальність, переходити до використання непараметричних критеріїв.

Порівняння вибірок за критерієм їх обсягу все ж досить формальне. З метою економії часу і коштів жодне емпіричне дослідження не проводиться на генеральній сукупності — для цього і формується вибірка, відповідна основних властивостей генеральної сукупності. Для максимального зниження ймовірності статистичної помилки рекомендуємо формувати вибірку значно більшого обсягу, ніж $n=30$, не забуваючи при цьому перевіряти її на нормальність. Прийняття ж рішення про максимальні межі обсягу вибірки найчастіше залежить від можливостей самого дослідника або дослідницької групи.

Реально ні в одній вибірці не може бути строго нормального розподілу ознаки (див. с. 37). Однак необхідно встановити *чи відібрана ця вибірка з генеральної сукупності з нормальним розподілом досліджуваної ознаки*. У подальшому, приймаючи нульову гіпотезу, будемо вважати, що вид розподілу ознаки в генеральній сукупності встановлений за вибіркою.

6.2. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ ВАРІАЦІЇ, СИМЕТРИЧНІСТЮ, ЧИСЕЛ ВЕСТЕРГАРДА

Перевірку гіпотези нормальності починають з обчислення коефіцієнта варіації (1.100). Якщо його значення перевищує 33 %, то гіпотеза про нормальність розподілу даних вибірки не підтверджується. Подальшу перевірку при цьому не проводять, так як такі розподілу повинні перетворюватися з метою зменшення коефіцієнта варіації. При зворотному співвідношенні перевірку продовжують за іншими критеріям [116].

Відповідність нормальному статистичному розподілу можна перевірити виконанням наступних умов додатково до наведених на с. 137:

- функція нормального розподілу парна $f(x) = f(-x)$;
- середнє арифметичне \bar{x} , медіана Me й мода Mo співпадають, тобто $\bar{x} = Me = Mo$, середньоквадратичний відхил дорівнює $s = \bar{x} / 2$;
- не менше 99.7 % відхилення від середньоарифметичного менше $3s$;
- 68.3 % відхилень менше ніж s ;
- половина відхилень менше ніж $0.625s$ [5, 25].

За правилом трьох сигм — всі значення вибірки розташовані у межах $\bar{x} \pm 3\sigma$ [78].

Придатність нормального розподілу може бути перевірена за використанням чисел Вестергарда: якщо в область $\bar{x} \pm 0.3s$ входить 25 %, $\bar{x} \pm 0.7s$ — 50 %, $\bar{x} \pm 1.1s$ — 75 % і $\bar{x} \pm 3s$ — 99.8 % всієї сукупності, застосування розподілу Гауса виправдано [2].

Існують більш суворі критерії цієї перевірки, але вони для впевнених висновків вимагають не менше 50–100 значень.

6.3. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ВІЗУАЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ Й ПОБУДОВОЮ ГІСТОГРАМ. ЗАСТОСУВАННЯ КРИТЕРІЮ ШАПІРО-УІЛКА

Візуально оцінити близькість розподілу даної ознаки до нормального можна за виглядом гістограм розподілу ознаки (див. рис. 15.20, с. 979), тобто наближенням до лінії щільності нормального розподілу та представленням зображення розподілу досліджуваного параметра на нормальному й півнормальному імовірнісному папері (2.31 і 2.32, с. 125) — при нормальному розподілі всі точки на графіку розташовуються на прямій лінії [1, 5].

Зараз перевірка вибірки на відповідність нормальному статистичному розподілу згідно міжнародного стандарту ІСО 3479–97 для вибірок чисельності від 8 до 50 повинна виконуватися за непараметричним критерієм Шапіро–Уїлка [74], який разом із непараметричним критерієм Колмогорова–Смирнова наводиться ППП **Statistica** при побудові гістограм (рис. 2.10 на с. 107, 2.11 на с. 108, 2.17 на с. 115, 6.4 на с. 319, 15.15 на с. 970).

Критерій Шапіро–Уїлка є найбільш ефективним, так як він більш потужний у порівнянні з іншими. Практично його при застосуванні відповідних пакетів програм використовують для вибірок обсягом від 3 і до 5000.

Нульова гіпотеза H_0 тесту Шапіро–Уїлка полягає у тому, що випадкова величина x вибірки розподілена за нормальним законом, тобто, H_0 : “*випадкова величина x розподілена нормально*”. Альтернативна гіпотеза H_A — *закон розподілу не є нормальним*.

Найменш трудомісткою є перевірка вибірки на нормальність розподілу є побудова суміщених гістограм яка супроводжуються текстом з результатами критеріїв Шапіро–Уїлка, Колмогорова–Смирнова і Лілліфорса, описана у підрозділі **15.5.2 Представлення суміщених гістограм**, чи одинарних гістограм, з результатами критеріїв Шапіро–Уїлка, Колмогорова–Смирнова і Лілліфорса, представленими таблично (табл. 15.5 на с. 976) у підрозділі **15.5.4 Побудова й аналіз одинарних гістограм**. Дані обох варіантів можуть бути вставлені у текстовий матеріал.

Результати критерію Шапіро–Уїлка представляються значенням статистики тесту $SW-W$ чи W і рівнем значущості p для отриманого значення статистики. При цьому чим ближче значення W до одиниці, тим більша відповідність досліджуваної вибірки нормальному розподілу. Критичні значення критерію Шапіро–Уїлка W_T для довірчого статистичного рівня значущості $\alpha = 0.01$ і 0.05 представлені в табл. E.26 на с. 1111. Нульова гіпотеза приймається якщо значення статистики більше табличного, тобто, $W > W_T$ чи $p \geq \alpha$.

Проте, національний стандарт РФ ГОСТ Р 8.736-2011[21] хоч і був створений, як сказано, на основі міжнародного ГОСТ Р ІСО 5725-1-2002 [93], для оцінки вибірок на відповідність нормальному розподілу використовує статистичні критерії: χ^2 -квадрат Пірсона, критерій ω^2 Мізеса–Смирнова, складовою критерій (d -критерій), як це було раніше в ГОСТ 8.207-76.

6.4. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗА СЕРЕДНІМ АБСОЛЮТНИМ ВІДХИЛЕННЯМ

Для не дуже великих вибірок ($n \leq 120$) для перевірки на нормальність використовують середній абсолютний відхил \bar{d} , який визначається за виразом (1.41).

Перевірка ґрунтується на тому, що для теоретичного нормального розподілу відношення (1.43) і для вибірки, що має приблизно нормальний закон розподілу, має виконуватися співвідношення

У зв'язку із цим можна скористатися спрощеною перевіркою, наприклад, перевіривши виконання наступної умови [25]:

$$\left| \frac{\bar{d}}{s} - \sqrt{\frac{2}{\pi}} \right| < \frac{0.4}{\sqrt{n}}. \quad (6.1)$$

Перевірка гіпотези про відповідність вибірки нормальному закону статистичного розподілу кількості стручків на центральній гілці в 2004 і 2005 р., взяті згідно табл. 2.11 на с. 96, за умовою (6.1), представлена на табл. 6.1.

У чарунках **B143** і **C143** використано логічну функцію умови **ЕСЛИ** (див. Додаток А), яка оцінює нормальності аналізованого розподілу — при нормальному розподілі — **Нормальн.**, при ненормальному — **Ні**.

Таблиця 6.1 – Перевірка нормальності статистичного розподілу кількості стручків на гілці

	А	В	С
1	№ п.п.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	
2		2004 р.	2005 р.
3	1	30.35	37.90
4	2	30.05	39.00
102	100	23.40	42.80
103	101	30.60	47.80
104	102		35.00
105	103		34.20
141	139		22.13
142	140		39.25
143	Результат	Нормальн.	Нормальн.

C144=ЕСЛИ((ABS(СРОТКЛ((C4:C143)))/(СТАНДОТКЛОН.В(C4:C143))-0.7979)-0.4/(СЧЁТ(C4:C143))^0.5)<0;"Нормальн."; "Ні")

З результатів перевірки видно, що статистичні розподіли кількості стручків на центральній гілці в 2004–2004 рр. є нормальними.

6.5. Використання χ^2 –критерію згоди Пірсона

6.5.1. Використання χ^2 –критерію для оцінювання дисперсій

Критерій згоди Пірсона χ^2 (*Chi-square* або *хі-квадрат*) використовується, якщо дані представлено в номінативній шкалі і мають дві і більше градації. Однак, це не означає, що якщо дані подано в інших шкалах, то цей метод використовувати не можна.

При зіставленні кількох градацій найчастіше перевіряють гіпотезу про те, чи розрізняються за чисельністю відповідні частки сукупності.

Таким чином, при виявленні достовірних відмінностей, можна зробити висновок про те, що розподіл переваг є нерівномірним. Однак, при використанні більше двох градацій, не можна стверджувати про те, що в якійсь конкретній чарунці таблиці спостережень більше, а в якійсь менше. Для того, щоб виявити де спостережень більше, а де менше, необхідно скористатися додатковою статистичною перевіркою.

Це стосується не тільки даного методу порівняння. При використанні будь-яких методів множинних порівнянь для конкретизації отриманих результатів (підтвердилася гіпотеза про не тотожні результатів) необхідно використовувати парні порівняння величин.

Розподіл можливих значень випадкової величини χ^2 безперервний і асиметричний. Він залежить від числа ступенів вільності і наближається до нормального розподілу зі збільшенням числа спостережень (див. підрозділ **3.2.7 Хі-квадрат розподіл (χ^2 –розподіл Пірсона)**). Тому застосування критерію χ^2 до оцінки дискретних розподілів пов'язане з деякими похибками, які позначаються на його величині, особливо при нечисленних вибірках. Для отримання більш точних оцінок вибірка, що розподіляється в варіаційний ряд, повинна мати не менше 50 варіант [9], а величина інтервалу 5–10. Принаймні мінімальна очікувана частота повинна бути більше одиниці [85].

Загалом критерій Пірсона можна використовувати можна при дотриманні наступних умов:

- у вибірці повинно бути не менше 50 одиниць спостереження ($n > 50$);
- теоретичні частоти повинні відповідати $n_{i_T} > 5$, — якщо ця умова не

дотримується, то слід об'єднати інтервали.

Критерій згоди Пірсона χ^2 застосовується у випадках, коли треба визначити відповідність між собою двох порівнюваних рядів розподілу — емпіричного і теоретичного або двох емпіричних. При цьому часто в якості теоретичного значення дисперсії на практиці використовуються значення, регламентовані нормативними документами: державними стандартами, технічними умовами чи паспортом, тощо. Символ χ^2 не є квадратом якогось числа, а виражає лише величину, визначувану виразом.

Найчастіше критерій χ^2 використовується для оцінки відповідності емпіричних даних певній теоретичній передумові, зокрема, нульовій гіпотезі

H_0 , коли треба переконатися у тому, що виявлене відхилення є закономірним, чи лежить у межах можливих випадкових коливань. Нульова гіпотеза полягає в тому, що дані значення дисперсій статистично не відрізняються, тобто $H_0: s^2 = \sigma^2$, де s^2 – експериментально отримане значення дисперсії по вибірці об'єму n ; σ^2 – теоретичне значення дисперсії генеральної сукупності.

При цьому альтернативна гіпотеза полягає в тому, що:

- 1) $H_A: s^2 \neq \sigma^2$ — експериментальне і теоретичне значення дисперсій статистично помітні — двобічна критична область;
- 2) $H_A: s^2 < \sigma^2$ — теоретичне значення дисперсії перевищує експериментальне — лівобічна критична область;
- 3) $H_A: s^2 > \sigma^2$ — теоретично значення дисперсії менше експериментального — правобічна критична область.

Спостережуване значення χ^2 критерію згоди Пірсона визначається за формулою (6.2) [33]:

$$\chi^2 = v \cdot \frac{s^2}{\sigma^2}. \quad (6.2)$$

Критична точка визначається як критичне значення χ^2 розподілу Пірсона при заданому рівні значущості α (для двобічної критичної області $-\alpha/2$) з числом ступенів вільності $v = n - 1$, тобто $\chi^2_{\alpha(n-1)}$.

Все сказане укладається в наступне позначення:

Нульова гіпотеза підтверджується, якщо:

- 1) двобічна критична область $|\chi^2| < \chi^2_{\alpha/2(n-1)}$;
- 2) лівобічна критична область $\chi^2 > \chi^2_{\alpha(n-1)}$;
- 3) правобічна критична область $\chi^2 < \chi^2_{\alpha(n-1)}$ [33].

Для прикладу розглянемо порівняння фактичної дисперсії кількості стручків для співпадаючих ділянок даними 2004 р. (табл. 2.12, с. 96) з дисперсією, розрахованою за всіма ділянками (табл. 2.11, с. 96), яка становить $\sigma^2 = 22.97$. Розрахунок виконуємо за

Таблиця 6.2 – Оцінка за χ^2 -критерієм згоди Пірсона

	A	B
1	O98=CP3HACH(O2:O97)	Кількість стручків-2004
2	O99=СЧЁТ(O2:O97)	30.4
3	O100=ДИСП.В(O2:O97)	30.1
4	O101=100*O100^0.5/B98	32.2
5	O102=(20*B98/100)^2	33.5
93	O104=(O99-1)*O100/O102	24.5
94	O105=ХИ2.ОБР.ПХ(O103;O99-1)	26.3
95	O106=ХИ2.РАСП.ПХ(O104;O99-1)	23.3
96		20.8
97		30.6
98	Середнє значення \bar{x}	26.4
99	Кількість замірів n	96
100	Дисперсія фактична s^2	23.56
101	Коефіцієнт варіації V	18.4
102	Дисперсія задана σ^2	22.97
103	Прийнятий рівень значущості α	0.05
104	Розрахунковий χ^2_p	79.456
105	Табличний χ^2_t	118.752
106	Рівень значущості p	0.411007

формулами (1.100) і (1.56).

Так як альтернативою є $H_A: s^2 > \sigma^2$, розглядаємо правобічну критичну область $\chi^2 < \chi_{\alpha(n-1)}^2$ з визначенням критичного значення χ^2 із пакету **Excel** оберненою статистичною функцією *правобічної ймовірності* **ХИ2.ОБР.ПХ** (див. Додаток А). Розрахунки, наведені на полі табл. 6.2 показують, що нульова гіпотеза підтверджується так, як маємо $\chi^2 < \chi_{\alpha(n-1)}^2$.

Рівень значущості p отриманого значення χ^2 знаходиться за допомогою статистичної правобічної функції **ХИ2.РАСП.ПХ** (див. Додаток А). Як результат маємо $p > \alpha$, що також підтверджує нульову гіпотезу.

6.5.2. Оцінка дисперсії нормально розподіленої випадкової величини. Оцінка дисперсії відтворюваності

Дисперсію генеральної сукупності σ^2 нормально розподіленої випадкової величини можна оцінити, якщо відомо розподіл її оцінки — вибіркової дисперсії s^2 [84].

Розподіл вибіркової дисперсії можна отримати за допомогою розподілу Пірсона або χ^2 -розподілу. Якщо є вибірка n незалежних спостережень з нормальним розподілом випадкової величиною, то сума

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^2. \quad (6.3)$$

має розподіл χ^2 с $\nu = n - 1$ ступенями вільності.

Таким чином довірчі двосторонні межі для генеральної дисперсії σ^2 визначаються виразом

$$\frac{\nu \cdot s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{\nu \cdot s^2}{\chi_{\alpha/2}^2}. \quad (6.4)$$

Аналогічно отримуються односторонні довірчі оцінки [84]

$$\sigma^2 \leq \frac{\nu \cdot s^2}{\chi_{\alpha}^2}; \quad (6.5)$$

$$\sigma^2 \geq \frac{\nu \cdot s^2}{\chi_{1-\alpha}^2}. \quad (6.6)$$

Таблиця 6.3. Оцінка дисперсії відтворюваності

	A	B	C
1	C103=СЧЁТ(C2:C102) C104=ДИСП.В(C2:C102)		Кількість стручків-2004
2			30.4
3			30.1
4			32.2
5			30.5
6	C105=СТАНДОТКЛОН.В(C2:C102) C107=ХИ2.ОБР.ПХ(C106/2;C103-1) C108=ХИ2.ОБР(C106/2;C103-1) C109=(C104*(C103-1)/C107)^0.5 C110=(C104*(C103-1)/C108)^0.5 C111=ХИ2.ОБР.ПХ(C106;C103-1) C112=ХИ2.ОБР(C106;C103-1) C113=(C104*(C103-1)/C111)^0.5 C114=(C104*(C103-1)/C112)^0.5 C115=НОРМ.СТ.ОБР(1-C106) C116=C105*(1-1/(2*(C103-1)))^0.5 C117=C105*(1+1/(2*(C103-1)))^0.5		
100			28.6
101			23.4
102			30.4
103	Кількість замірів n		101
104	Дисперсія вибіркова s^2		22.95
105	Середньоквадратичний відхил s		4.79
106	Прийнятий рівень значущості α		0.05
107	Двобічні межі	Табличний $\chi^2_{\alpha(v)}$	129.561
108		Табличний $\chi^2_{1-\alpha(v)}$	74.222
109		Нижня межа σ	4.21
110		Верхня межа σ	5.56
111	Однобічні межі	Табличний $\chi^2_{\alpha(v)}$	124.342
112		Табличний $\chi^2_{1-\alpha(v)}$	77.929
113		Нижня межа σ	4.30
114		Верхня межа σ	5.43
115	Межі нормальн. розподілу	Квантиль $z_{1-\alpha/2}$	1.645
116		Нижня межа σ	4.45
117		Верхня межа σ	5.13

(табл. 6.3).

Добуваючи з усіх частин виразів (6.4)–(6.6) квадратний корінь, одержимо оцінку для похибки відтворюваності [84].

Значення табличного χ^2 -критерію Пірсона визначається за табл. В.10, чи статистичною функцією MS Excel для лівобічної межі **ХИ2.ОБР.ПХ** і правобічної межі **ХИ2.ОБР**, причому для двобічної критичної області $\alpha/2$.

З ростом числа ступенів свободи асиметрія кривих розподілу зменшується, відповідно зменшується і асиметрія довірчих меж. Тому при $n \geq 30$ вибірковими й стандарт s розподілений приблизно нормально з математичним очікуванням $\mu = \sigma$ і середньоквадратичної похибкою. Таким чином невідомий генеральний стандарт в вираженні при $n \geq 30$ замінюють вибірковим [84]

$$\sigma = \frac{s}{\sqrt{2\nu}}. \quad (6.7)$$

Відповідно до (1.78) довірчі межі для генерального стандарту визначаються нерівністю (6.8).

Розглянемо оцінку дисперсії відтворюваності кількості стручків визначених за всіма ділянками (табл. 2.11, с. 96. Для цього використовуємо формули відповідні статистичні формули та вирази (6.4)–(6.6)

$$s - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{2\nu}} \leq \sigma \leq s + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{2\nu}}. \quad (6.8)$$

Довірчі межі, отримані з використанням нормального розподілу мало відрізняються від отриманих з використанням χ^2 -критерію Пірсона.

6.5.3. Оцінювання відповідності між експериментальними й теоретичними даними за χ^2 -критерієм Пірсона

Хоч застосування χ^2 -критерію вимагає частоти груп не менше 5 [50], у ряді робіт з вивчення потужності критерію Пірсона, говориться, що за уні-модального розподілу допускається зменшення очікуваних частот попадання спостережень для одного або двох інтервалів до одного і навіть нижче [117].

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^K \frac{(f_i - f_i')^2}{f_i'} \quad (6.9)$$

де f_i, f_i' – відповідно емпіричні і теоретичні частоти розподілу;
 K – число інтервалів (груп).

Якщо фактичні й теоретично очікувані частоти повністю співпадають, то $\chi^2=0$, при неповному збігу χ^2 буде відмінний від нуля й тим більше, чим більше розбіжність між ними. Граничні значення χ^2 , при яких нульова гіпотеза приймається, береться з табл. В.10 або розраховується за допомогою статистичних функцій **ХИ2.ОБР.ПХ** і **ХИ2.РАСП.ПХ** ПА MS Excel (див. Додаток А). Гіпотеза відхиляється якщо $\chi^2 \geq \chi^2_{\text{т}}$ і не відхиляється при $\chi^2 < \chi^2_{\text{т}}$.

Число ступенів вільності ν для $\chi^2_{\text{т}}$ при перевірці відповідності вибірки прийнятому розподілу визначається різницею між числом груп K і умовами, які характеризують розподіл. Так як нормальний закон розподілу пов'язується трьома умовами: обсягом вибірки $n = 101$, середнім арифметичним значенням ознаки $\bar{x} = 26.4907$ і СКВ $s = 4.7922$ (табл. 2.11 на с.96), маємо $\nu = K - 3$.

Для визначення відповідності появ кількості стручків на центральній гілці за даними 2004 р. (табл. 6.7, с. 318 з групуванням $a < x \leq b$ і табл. 15.6 на

Таблиця 6.4. Перевірка нормальності статистичного розподілу

— групування $a < x \leq b$, табл. 6.7, с. 318

Наблюдаемые и Ожидаемые частоты (Биометрия-П) Хи-квадрат = 4.076652 ss = 7 p = .770907				
Набл.	Наблюд. Пер5	Ожидаем. Пер6	Н - О	(Н-О)**2 /О
5.00000<x<=10.0000	0.0000	0.0293	-0.02925	0.029251
10.00000<x<=15.0000	2.0000	0.8037	1.19629	1.780637
15.00000<x<=20.0000	5.0000	8.0348	-3.03483	1.146286
20.00000<x<=25.0000	32.0000	29.2977	2.70234	0.249257
25.00000<x<=30.0000	38.0000	39.4032	-1.40324	0.049973
30.00000<x<=35.0000	19.0000	19.6040	-0.60398	0.018608
35.00000<x<=40.0000	5.0000	3.5841	1.41593	0.559382
40.00000<x<=45.0000	0.0000	0.2433	-0.24326	0.243257
Сумма	101.0000	101.0000	-0.00000	4.076652

— групування $a \leq x < b$, табл. 15.6, с. 977

Наблюдаемые и Ожидаемые частоты (Биометрия-П) Хи-квадрат = 2.642519 ss = 7 p = .915988 ВНИМАНИЕ: Неравные суммы наблюдаемых и ожидаемых частот				
Набл.	Наблюд. Пер3	Ожидаем. Пер4	Н - О	(Н-О)**2 /О
5.00000<=x<10.000	0.0000	0.0289	-0.02888	0.028882
10.00000<=x<15.000	1.0000	0.8037	0.19629	0.047941
15.00000<=x<20.000	5.0000	8.0348	-3.03483	1.146286
20.00000<=x<25.000	33.0000	29.2977	3.70234	0.467864
25.00000<=x<30.000	37.0000	39.4032	-2.40324	0.146576
30.00000<=x<35.000	20.0000	19.6040	0.39602	0.008000
35.00000<=x<40.000	5.0000	3.5841	1.41593	0.559382
40.00000<=x<45.000	0.0000	0.2376	-0.23759	0.237587
Сумма	101.0000	100.9940	0.00604	2.642519

с. 977 з групування $a \leq x < b$) нормальному статистичному розподілу за допомогою ППП **Statistica**, експериментальні дані (граф 1) та дані нормального розподілу (граф 2) вставляють у таблицю назвавши їх **Фактичний** та **Нормальний розподіл** (рис. 6.1).

У меню **Statistics** / **Анализ** (1) задіємо модуль **Nonparametrics** / **Непараметрическая статистика** (2) і далі на панелі **Nonparametric Statistics:** / **Непараметрическая статистика** вибираємо опцію **Observed versus expected X?** / **Сравнение наблюдаемых и ожидаемых частот** (3) і натискаємо кнопку **OK** (4).




Рис. 6.1. Оцінювання розподілу за критерієм χ^2 опцію

Observed versus expected X? / **Сравнение наблюдаемых и ожидаемых частот**

На відкритій панелі процедур і установок **Select variables with observed and e** / **Наблюдаемые и ожидаемые частоты** натискаємо **Variables** / **Переменные** (5) і на панелі вибору змінних **Select variables with observed and expected frequencies** / **Выберите переменные с наблюдаемыми и ожидаемыми частотами** у якості **Observed frequencies** /

Наблюдаемые частоты факторів указуємо **Фактичний розподіл (6)** і в якості **Expected frequencies: / Ожидаемые частоты** — **Нормальний розподіл (7)**.

Натискуємо **ОК (8)** і далі на панелі **Select variables with observed and ex / Наблюдаемые и ожидаемые частоты** натискуємо кнопку вибору процедур **Summary / ОК (9)** або **Summary: Obs. vs. exp. frequencies / Наблюдаемые и ожидаемые частоты (9)**.

З табл. 6.4 видно, що для обох таблиць $\chi^2 < \chi^2_{05(7)}$ і $p > \alpha$, тому нульова гіпотеза про рівність розподілів не відхиляється — розподіл вибірки відповідає очікуваному (нормальному).

Тут слід звернути увагу, що на результат оцінки за χ^2 -критерієм Пірсона впливає не лише число K — встановлених інтервалів (груп) розбивки, а навіть і прийняття меж групуванням $a < x \leq b$ чи $a \leq x < b$.

Більш прийнятним є групуванням $a < x \leq b$.

6.5.4. Використання χ^2 -критерію для перевірки нормальності статистичного розподілу (підгонка розподілу)

6.5.4.1. Розрахунковий метод перевірки за χ^2 -критерієм

Розглянемо побудову нормальної кривої за фактичною частотою і відповідність їх нормальному розподілу для групуваних за класами показників висоти штамбу табл. 6.5 (взято з [50], с. 68).

Криву нормального розподілу, де Y_0 — очікувана частота для величини x , можна побудувати використовуючи залежність [50]

$$Y_0 = \frac{\lambda \cdot N}{s} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot z^2}, \quad (6.10)$$

де λ — величина групового інтервалу;

N — сумарна частота прояву;

z — нормований відхил, $z = (x - \bar{x})/s$, див вираз (3.21).

Визначається χ^2 функцією **НОРМ.СТ.РАСП**, оцінка розподілу — функціями **ХИ2.ОБР.ПХ** і **ХИ2.РАСП.ПХ**.

За даними табл. 6.5 бачимо, що розподіл відповідає нормальному, так як $\chi^2 = 13.7 < \chi^2_{05(497)} = 549.97$ і $p = 1$, тобто $p > \alpha$.

Вихідна гістограма і графік функції нормального розподілу представлені на рис. 6.2, с. 315. Особливістю кривої нормального розподілу є зміщення ординат до центру групового інтервалу.

Таблиця 6.5. Розрахунок теоретичних частот за рівнем нормального розподілу

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Показник	Верхня межа групи, шт.	Частота фактична f , шт.	$(h-h_{cp}) \cdot f$	$(h-h_{cp})^2 \cdot f$	Нормований відхил z	Частота теоретична F , шт.	$(f-F)^2/F$
2		8	2	-20	200	-2.725	2.61	0.14
3	C13=СУММ(C2:C12)	10	17	-136	1088	-2.188	9.76	5.37
4	H18=СУММ(H2:H12)	12	25	-150	900	-1.652	27.34	0.20
5	H19=ХИ2.ОБР.ПХ(H17;C13-1)	14	58	-232	928	-1.116	57.42	0.01
6	H20=ХИ2.РАСП.ПХ(H18;C13-3)	16	76	-152	304	-0.579	90.46	2.31
7		18	113	0	0	-0.043	106.88	0.35
8		20	89	178	356	0.493	94.72	0.35
9		22	79	316	1264	1.030	62.96	4.09
10		24	28	168	1008	1.566	31.39	0.37
11		26	11	88	704	2.102	11.74	0.05
12		28	2	20	200	2.639	3.29	0.51
13	Сума		500	80	6952		498.57	
14	Середнє значення h_{cp}	18.16						
15	Середньоквадратичний відхил s	3.729						
16	Груповий інтервал λ	2						
17	Прийнятий рівень значущості α							0.05
18	Розрахунковий χ^2_p							13.7
19	Табличний χ^2_T							549.970
20	Рівень значущості p							1.000E+00

Теоретична частота визначається шляхом множення $\lambda \cdot N/s$ на коефіцієнт, знайдений за табл. В.1 для значення z , чи розрахований статистичною функцією Excel **НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значенням **ЛОЖЬ** (див. рис. 3.7 та Додаток А) для цього ж значення, чи за аналогію з виразом (15.1) шляхом множення $\lambda \cdot N$ на значення статистичної функції Excel **НОРМ.РАСП**($x; \bar{x}; \sigma; \text{ЛОЖЬ}$). У цьому разі значення z не розраховується.




Рис. 6.2. Гістограма і крива функції нормального розподілу

Порядок розрахунків наведено на полі табл. 6.5.

Особливістю розрахунку середньоквадратичного відхилення тут є використання формули [50]

$$s = \sqrt{\left(\sum f \cdot x^2 - \frac{(\sum f \cdot x)^2}{N} \right) / (N - 1)}. \quad (6.11)$$

Для прикладу розглянемо перевірки нормальності статистичного розподілу χ^2 – критерієм для кількості стручків за даними 2004 р. розрахованою за всіма ділянками (табл. 2.19, с. 113).

Данні з неї (боковик, тобто групи і частота) вставлені в табл. 6.6, сюди ж занесене середнє значення кількості стручків і їх СКВ, взяті з табл. 2.11, с. 96.

Порядок розрахунків наведено на полі табл. 6.6. Тут на відміну від табл. 6.5 для визначення χ^2 замість статистичної функції Excel **НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значенням **ЛОЖЬ** застосована функція **НОРМ.РАСП**($x; \bar{x}$

Таблиця 6.6 – Розрахунок теоретичних частот за рівнем нормального розподілу

	A	B	C	D	E	F
1	Показник	Інтервал групи, см	Середес інтервалу групи, см	Частота фактична f , шт.	Частота теоретична F , шт.	$(f-F)^2/F$
2	C11=C4-C3	10-15	12.5	2	0.59	3.34
3	D8=СУММ(D2:D7)	15-20	17.5	5	7.23	0.69
4	F2=(D2-E2)^2/E2	20-25	22.5	32	29.72	0.17
5	F13=СУММ(F2:F7)	25-30	27.5	38	41.12	0.24
6		30-35	32.5	19	19.15	0.00
7		35-40	37.5	5	3.00	1.33
8	Сума			101	101	
9	Середнє значення		26.49			
10	Середньоквадратичний відхил s		4.79			
11	Груповий інтервал λ		5			
12	Прийнятий рівень значущості α					0.05
13	Розрахунковий χ^2_p					F14=ХИ2.ОБР.ПХ(F12;СЧЁТ(С2:С7)-3) 5.77
14	Табличний χ^2_t					F15=ХИ2.РАСП.ПХ(F13;СЧЁТ(С2:С7)-3) 7.81
15	Рівень значущості p					0.123
	E2=\$D\$8*\$C\$11*НОРМ.РАСП(C2;\$C\$9;\$C\$10;ЛОЖЬ)					

;σ;ложь), що виключає розрахунки нормованого відхилення.

Проте, результати розрахунків теоретичної частоти різняться з відповідними даними табл. 2.19, с. 113.

Хоч висновки про відповідність досліджуваної вибірки нормальному розподілу відповідають висновкам, зробленим за гістограмами рис. 2.17 на с. 115 і рис. 6.4 на с. 319, проте числові результати відрізняються. Тому краще перевірку нормальності статистичного розподілу χ^2 -критерієм виконувати за допомогою ППП Statistica.

6.5.4.2. Перевірка нормальності розподілу χ^2 -критерієм за допомогою ППП Statistica

Основною перевагою критерію χ^2 є його гнучкість. Його можна застосовувати для перевірки допущення про будь які розподіли, навіть не знаючи їх параметрів.

На відміну від перевірки пропорцій, критерій χ^2 зазвичай дуже погано працює в при перевірці розподілу на нормальність. Ймовірність помилки другого роду дуже велика для досить широкого класу альтернативних розподілів. Основними ж його недоліками є нечутливість до виявлення адекватності моделі, коли число спостережень невелике, і групування даних за довільним інтервалам може вплинути на результат перевірки [61]. У зв'язку з цим, використовувати його не рекомендується.

При використанні критерію χ^2 для перевірки нормальності статистичного розподілу даних кількості стручків на гілці у 2004 р. у меню **Statistics/Анализ** (1) у модулі **DistributionFitting/Подгонка распределений** (2) відкриваємо панель **Distribution Fitting/Подгонка распределений** (рис. 6.3).

Тут у вкладці **Quick / Быстрый** (3) приймаємо **Continuous Distributions / Непрерывные распределения** (4), указуємо застосування нормального статистичного розподілу **Normal/Нормальное** (5) і натискаємо **OK** (6), чим переходимо на панель **Fitting Continuous Distributions/Подгонка непрерывных распределений**.

На вкладці за допомогою кнопки **Variables/Переменные** (7) для аналізу вибираємо колонку **Кількість стручків на гілці–2004** і переходимо на вкладку **Options/Опции** (8), де відмічаємо опції виведення тесту Колмогорова–Смирнова у відповідності з (рис. 6.3) (9) і (10).

Далі переходимо на вкладку **Parameters/Параметры** (11), де задаємо параметри групування (12) у відповідності табл. 2.19 на с. 113. Натиснувши **OK** (13) на цій вкладці, або на вкладці **Options/Опции**, чи запустивши процедуру **Summary Obs. vs. exp. frequencies/Наблюдаемые и ожидаемые частоты** (13) на вкладці **Quick/Быстрый** отримуємо табл. 6.7. Кольорами на ній відмічені статистичні показники, спільні з табл. 2.19, с. 113.










Рис. 6.3. Вибір параметрів для перевірки нормальності статистичного розподілу ознаки *Кількість стручків на гілці-2004* оцінкою / Нормальное

У перших чотирьох колонках табл. 6.7 наведені дослідні дані: у першій — частота появ у відповідному інтервалі, у другій — сумарна частота появ, у двох наступних — показники попередніх колонок у відсотковому вираженні. Вони відповідають першим чотирьом колонкам табл. 2.19. З п'ятої по

восьму колонку табл. 6.7 подані показники аналогічні першій–четвертій, але для функції нормального статистичного розподілу. У свою чергу вони відповідають останнім чотирьом колонкам табл. 2.19. Остання колонка містить різницю між експериментальними й розрахунковими значеннями. На ній також кольорами відмічені статистичні показники, спільні з табл. 2.19, с. 113.

Щоб отримати гістограми (рис. 6.4) на панелі  **Fitting Continuous Distributions** /  **Подгонка непрерывных распределений** запускаємо процедуру  **Plot of observed and expected distribution** /  **График наблюдаемого и ожидаемого распределения** (14).



Таблиця 6.7. Інтервали групування сортозразків за ознакою **Кількість стручків на гілці–2004** і щільність нормального статистичного розподілу оцінкою  **Normal** /  **Нормальное**

Перемен.: Кількість стручків-2004, Распред.: Нормальное (Биометрия-П) Хи-квадрат = 0.70644, cc = 1 (скорр.) , p = 0.40063									
Верхняя Граница	Наблюд. Частота	Кумул. Наблюд.	Процент Наблюд.	Кумул. % Наблюд.	Ожидаем. Частота	Кумул. Ожидаем.	Процент Ожидаем.	Кумул. % Ожидаем.	Наблюд.- Ожидаем.
<= 10.00000	0	0	0.00000	0.0000	0.02925	0.0293	0.02896	0.0290	-0.02925
15.00000	2	2	1.98020	1.9802	0.80371	0.8330	0.79575	0.8247	1.19629
20.00000	5	7	4.95050	6.9307	8.03483	8.8678	7.95528	8.7800	-3.03483
25.00000	32	39	31.68317	38.6139	29.29766	38.1655	29.00758	37.7876	2.70234
30.00000	38	77	37.62376	76.2376	39.40324	77.5687	39.01311	76.8007	-1.40324
35.00000	19	96	18.81188	95.0495	19.60398	97.1727	19.40988	96.2106	-0.60398
40.00000	5	101	4.95050	100.0000	3.58407	100.7567	3.54858	99.7592	1.41593
< бесконеч.	0	101	0.00000	100.0000	0.24326	101.0000	0.24085	100.0000	-0.24326

З табл. 6.7 і рис. 6.4 видно, $p = 0.40063 > \alpha = 0.05$ Тому нульова гіпотеза про рівність розподілів не відхиляється — фактичний розподіл вибірки **Кількість стручків на гілці–2004** відповідає очікуваному (нормальному) з указаним рівнем значущості.

На рис. 6.4 наведено також результат тесту Колмогорова–Смирнова, аналіз отриманої величини викладено у підрозділі **6.6 Одновибірковий тест Колмогорова для перевірки виду статистичного розподілу**.

При цьому слід відмітити, що у ППП **Statistica** несуттєва значущість p -критерію Колмогорова–Смирнова позначається як **n.s** (рис. 15.15, с. 970). Критерій Колмогорова–Смирнова може позначатися як великою літерою **D** (рис. 15.15, табл. 6.4) так і малою **d** — рис. 2.9, с. 105; 2.10, с. 107; 2.17, с. 115 та 6.4, с. 319 і табл. 2.19, с. 113 і 6.7, с. 318.

Якщо зразу після вибору колонки **Кількість стручків на гілці–2004** на  **Plot of observed and expected distribution** /  **График наблюдаемого и ожидаемого распределения** (14) отримуємо гістограму, одержану безпосередньо підгонкою розподілу (рис. 6.5) з дещо іншими даними критерію χ^2 , що викликано іншими межами розбиття вибірки на класи.

При порівнянні даних табл. 6.7 і табл. 6.4 та рис. 6.4, 2.17 (с. 115) і 15.15, (с. 970) бачимо, що їх значення характерні для суміщених гістограм, межі груп яких представляються умовою $a < x \leq b$. Таким чином, для заповнення табл. 15.3 дані варто брати безпосередньо з табл. 6.7.




Рис. 6.4. Гістограма розподілу за ознакою *Кількість стручків на гілці–2004* та її нормальний статистичний розподіл.




Рис. 6.5. Гістограма розподілу за ознакою *Кількість стручків на гілці–2004* та її нормальний статистичний розподіл.

6.6. ОДНОВИБІРКОВИЙ ТЕСТ КОЛМОГОРОВА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИДУ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ

Тест А. М. Колмогорова (у ППП **Statistica** (див. рис. 2.15, с. 113) він називається тестом Колмогорова–Смирнова, хоч Колмогорова–Смирнова використовується для порівняння двох спостережуваних вибірок (див. підрозділ **7.4.2.3 Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова для оцінки розбіжності між емпіричними сукупностями**) використовується для порівняння спостережуваного й теоретичного статистичного розподілу, наприклад, нормального, рівномірного, Пуассона та інших. Він більш потужний і простий за χ^2 [118] і може бути застосований для вибірок з обсягом менше мінімально припустимого для коректного використання χ^2 (див. с. 472).

Тест застосовується при аналізі гістограм і ґрунтується на визначенні максимального розходження між накопичуваними частотами і частками емпіричних і теоретичних розходжень

Емпіричне значення критерію λ розрахований за формулою

$$\lambda = \delta_{\max} \cdot \sqrt{n}, \quad (6.12)$$

де δ_{\max} – максимальна відносна різниця між накопичуваними частками;
 n – обсяг вибірки.

Відповідно

$$\delta_{\max} = \frac{|D_{\max}|}{n} = \frac{\max |f_o(x) - f_n(x)|}{n}. \quad (6.13)$$

Якщо не була функція розподілу $F(x)$ безперервної випадкової величини X , при необмеженому збільшенні числа спостережень ($n \rightarrow \infty$) ймовірність нерівності $P(\delta \sqrt{n} \geq \lambda)$ прямує до межі.

$$P(\lambda) = 1 - \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k \exp(-2k^2 \lambda^2). \quad (6.14)$$

Значення ймовірності $P(\lambda_\alpha)$, розраховане за виразом (6.14), наведено у табл. Е.9 [118]. Практично вже при $P(\lambda_\alpha) \geq 0.6$ розходження між емпіричним і теоретичним нормальним розподілом можна вважати незначним [2]. Таким чином задаючи рівень значимості α , зі співвідношення $P(\lambda_\alpha) = \alpha$ можна знайти відповідне критичне значення λ [33].

Знайдене значення δ_{\max} слід порівняти із критичним значенням, поданим у табл. Е.10.

Значення λ порівнюється з критичним значенням λ_{α} , яке представляється таблично, чи розраховується для прийнятого рівня статистичної значущості α за виразом [50]

$$\lambda_{\alpha} = \sqrt{\frac{1}{2} \ln \frac{2}{\alpha}}. \quad (6.15)$$

Таким чином, на 1 %-му, 5 %-му й 10 %-му рівні вони відповідно становлять $\lambda_{01}=1.628$, $\lambda_{05}=1.358$ і $\lambda_{10}=1.224$.

При перевірці нульової гіпотези про те, що генеральна сукупність має дану функцію розподілу ймовірностей (безперервну) обирається рівень значущості α , за яким використовуючи формулу (6.15) знаходиться значення λ_{α} . Потім за виразом (6.13) визначається максимум δ_{\max} і в тому випадку, коли для даної вибірки обсягом n отримуємо $\delta_{\max} < \lambda_{\alpha} \cdot \sqrt{n}$ нульова гіпотеза H_0 приймається, а коли виявиться, що $\delta_{\max} \geq \lambda_{\alpha} \cdot \sqrt{n}$ — відхиляється [119].

Також емпіричне значення λ порівнюють з критичним λ_{α} для різних рівнів значимості, незалежно від числа спостережень. Нульова гіпотеза H_0 також приймається при розрахунковому значенні менше критичного $\lambda \leq \lambda_{\alpha}$ [50]. Якщо $\lambda > \lambda_{\alpha}$, то нульова гіпотеза H_0 має заданий закон розподілу відхиляється на рівні значущості α [33].

Проаналізуємо відповідність розподілу кількості стручків на центральній гілці нормальному (табл. 6.8). Дані колонок **A3:A10** і **B3:B10** табл. 6.8, взяті з боковика і першої колонки табл. 6.7, с. 318. Середнє арифметичне і середньоквадратичний відхил (**C12** і **C13** табл. 6.8) прийняті за табл. 2.11, с. 96 (**S145** і **S149**). У чарунці **C15** табл. 6.8 представлений критичний критерій λ , розраховане за формулою (6.15) для рівня значущості α , поданого у чарунці **C14**.

Колонка **C3:C10** табл. 6.8 представляє собою накопичені питомі суми значень колонки **B3:B10**, а відповідні значення колонки **D3:D10** розраховуються за статистичною *інтегральною* функцією розподілу **НОРМ.РАСП** пакету аналізу **MS Excel** (див. Додаток А).

Визначений критерій λ порівнюється з даними, наведеними у табл. Е.9. Так для $\lambda = 0.1859$ за нею маємо $P(\lambda) = 1.000$, тобто ймовірність відповідності досліджуваного розподілу до нормального близька до одиниці.

З табл. 6.8 максимальну розбіжність накопичених спостережуваних і теоретичних частот, яка становить $\delta_{\max} = 0.01849$ порівнюємо табличними $\delta_{\alpha;n}$, представленими у табл. Е.10, або розрахованим за наведеними в ній залежностями. У даному випадку маємо $\delta_{05;101} = 1.36 / \sqrt{101} = 0.1353$, тобто $\delta_{\max} <$

$< \delta_{0.5;101}$ — емпіричне значення критерію менше критичного, тому можна зробити той же висновок, що гіпотеза нормальності статистичного розподілу вимірюваного параметру приймається з імовірністю 95 %.

Таблиця 6.8. Перевірка нормальності статистичного розподілу
одновибірковим тестом Колмогорова

1	A	B	C	D	E
2	Верхня межа	Фактичний розподіл	Відносна накопичена сума фактичний розподіл	нормальний розподіл	Різниця δ
3	10	0	0.000	0.0003	0.0003
4	15	2	0.020	0.0082	0.0116
5	20	5	0.069	0.0878	0.0185
6	25	32	0.386	0.3779	0.0083
7	30	38	0.762	0.7680	0.0056
8	35	19	0.950	0.9621	0.0116
9	40	5	1.000	0.9976	0.0024
10	45	0	1.000	0.9999	0.0000
11	Сума	101		$\delta_{\max} = 0.01849$	
12	Середнє значення		26.4907	$\lambda = 0.18585$	
13	Стандартне відхилення		4.7922		
14	$\alpha = 0.05$			$B11 = \text{СУММ}(B3:B10)$	
15	$\lambda_{0.5} = 1.3581$			$C15 = (0.5 * \text{LN}(2/C14))^{\wedge} 0.5$	

$C3=B3/B\$11$
 $C4=C3+B4/B\$11$
 $\dots\dots\dots$
 $C10=C9+B10/B\$11$
 $D3=\text{НОРМ.РАСП}(A3;\$C\$12;\$C\$13;\text{ИСТИНА})$
 $\dots\dots\dots$
 $D10=\text{НОРМ.РАСП}(A10;\$C\$12;\$C\$13;\text{ИСТИНА})$
 $E3=\text{ABS}(C3-D3)$
 $\dots\dots\dots$
 $E10=\text{ABS}(C10-D10)$
 $E11=\text{МАКС}(E4:E9)$
 $E12=E11*B11^{\wedge}0.5$

Про це свідчить також і те, що отримане розрахункове значення критерію становить $\lambda = 0.1859$, тобто воно менше табличного $\lambda_{0.5} = 1.3581$.

Порівнюючи табл. 6.8 і 6.7 (с. 318) бачимо повну тотожність висновків за їх результатів, до того ж в ній наведено результат тесту Колмогорова, який представлено також на рис. 6.4 на с. 319.

Наведений у цьому підрозділі розрахунковий спосіб досить громіздкий і поданий більше для ілюстрації, ніж для практичного використання. При потребі перевірити виду статистичного розподілу саме за тестом Колмогорова краще одержати табл. 6.7 чи гістограму, представлену на рис. 6.4 (с. 319). До того ж у табл. 6.8 Дані колонок **A3:A10** і **B3:B10** взяті з боковика і першої колонки табл. 6.7, а **C3:C10** і **D3:D10** представляють колонки четверту і восьму колонки табл. 6.7 не у відсотковому, а у відносному вираженні.

Варто звернути увагу на те, що незважаючи на тотожність табл. 6.7 і табл. 2.19 (с. 113) та рис. 6.4 і 2.17 (с. 115), значення тесту Колмогорова у них різне. Це пояснюється різним формуванням груп — у табл. 2.19 від 10 до 40 мм, а у табл. 6.7 від менше 10 і до більше 40 мм.

При представленні результатів текстом або таблицею наводиться назва критерію, кількість досліджуваних одиниць n і класів розбивки K вибірки, значення середнього арифметичного \bar{x} і середнього квадратичного відхилення s та межі емпіричної величини рівня значущості p .

6.7. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ ЗА СКЛАДЕНИМ КРИТЕРІЄМ d

При малих обсягах вибірки $10 \leq n < 50$ для перевірки згоди досвідченого розподілу з нормальним застосовується складений критерій d , рекомендований ГОСТ Р 8.736–2011[21]. При перевірці задаються рівнем значущості α_I (для критерію I) і α_{II} (для критерію II). Рівень значущості складеного критерію повинні задовольняти умові [21, 49]

$$q \leq q_I + q_{II} \cdot (\alpha \leq \alpha_I + \alpha_{II}). \quad (6.16)$$

Гіпотеза про узгодженість досвідченого розподілу з теоретичним нормальним перевіряється наступним чином:

Перевірка виконання критерію I. Для цього за формулою (6.17) розраховується значення \bar{d}

$$\bar{d} = \frac{1}{n \cdot \sigma} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|. \quad (6.17)$$

Тут σ визначається за відомою формулою (1.55).

Нульова гіпотеза про приналежність емпіричного розподілу нормальному справедлива, якщо виконується умова наведена виразом (6.18)

$$\bar{d}_{1-\alpha_I/2} < \bar{d} \leq \bar{d}_{\alpha_I/2}. \quad (6.18)$$

де $\bar{d}_{1-\alpha_I/2}$ і $\bar{d}_{\alpha_I/2}$ – квантилі розподілу \bar{d} .

Отримані для $1-\alpha/2$ і $\alpha/2$ за обсягом n ці квантилі наведені в табл. Е.16.

Перевірка виконання критерію II. Гіпотеза про нормальність розподілу підтверджується, якщо не більше m абсолютних різниць $|x_i - \bar{x}|$ перевершують значення добутку $z_{\alpha/2} \cdot s$, тобто відповідають умові

$$z_{(1-P)/2} \cdot s \leq |x_i - \bar{x}|. \quad (6.19)$$

Тут s визначається за відомою формулою (1.56).

Верхня квантиль інтегральної функції нормованого розподілу Лапласа, що відповідає ймовірності $\alpha/2$ визначається за статистичною функцією **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР** при аргументі $(1-\alpha/2)$ чи $(1+P)/2$, тобто $z_{(1-\alpha/2)}$ чи $z_{(1-P)/2}$.

Задаються рівнем значущості α_2 і для відомого n з табл. Е.17 знаходять

значення P і m .

Результуючий рівень значущості складеного критерію

$$\alpha \leq \alpha_1 + \alpha_2. \quad (6.20)$$

Якщо виявиться, що хоча б один з критеріїв не виконується, то вважають, що розподіл досліджуваної сукупності результатів вимірів не відповідає нормальному закону.

Розглянемо приклад оцінки закону розподілу за допомогою складеного критерію d для результатів вимірювань кількості стручків на центральній гілці у 2004 р., викладених у табл. 2.5, с. 349..

Потрібно перевірити згоду дослідного розподілу з нормальним за допомогою складеного критерію d при рівні значущості $\alpha_I = \alpha_{II} = 0.02$ ($\alpha \leq \alpha_I + \alpha_{II} = 0.04$).

Розрахунки проілюстровано в табл. 6.9.

Перевірка згоди за критерієм I.

За статистичними функціями MS Excel обчислюємо обсяг вибірки n , середнє арифметичне \bar{x} , стандартний відхил σ і середньоквадратичний відхил s . Визначаємо абсолютні різниці певного значення з середнім, знаходимо їх максимальну величину d_{\max} та за формулою (6.17) розрахункову різницю \bar{d} .

Таблиця 6.9. Перевірка нормальності розподілу кількості стручків на гілці складеним критерієм d

	A	B	C
1	C2=ABS(B2-\$B\$23) B22=C4ЁТ(B2:B21) B23=CPЗНАЧ(B2:B21) B24=СТАНДОТКЛОН.Г(B2:B21) B25=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B21) C27=СУММ(C2:C21)/(B22*B24) B31=НОРМ.СТ.ОБР((1+B30)/2) B32=МАКС(C2:C21) B33=B25*B31	Кількість стручків на центральній гілці-04	Абсолютна різниця d_i
2		22	15.9
3		38	0.1
4		39	1.1
5		44	6.1
6		52	14.1
7		33	4.9
8		46	8.1
9		28	9.9
10		50	12.1
11		36	1.9
12		28	9.9
13		42	4.1
14		49	11.1
15		36	1.9
16		40	2.1
17		40	2.1
18		18	19.9
19		45	7.1
20		36	1.9
21		36	1.9
22	Обсяг вибірки n	20	
23	Середнє	37.9	
24	Стандартний відхил σ	8.7516	
25	Середньоквадр. відхил s	8.9789	
26	Верхня межа $d_{0.01, 20}$		0.9028
27	Розрахункова різниця d		0.77815
28	Нижня межа $d_{0.99, 20}$		0.7484
29	Допустима кількість різниць m	1	
30	Імовірність P	0.99	
31	Квантиль функції Лапласа $z_{\alpha/2}$	2.5758	
32	Максимальна різниця d_{\max}	19.9	
33	Допустима різниця $d_{\text{доп}}$	23.13	

За табл. Е.16 за допомогою лінійної інтерполяції знаходимо $\bar{d}_{1-\alpha_1/2}$ і $\bar{d}_{\alpha_1/2}$ – квантилі розподілу \bar{d} . З отриманих даних бачимо, що умова наведе-

на виразом (6.18) виконується, таким чином гіпотеза про нормальність розподілу за критерієм I, при обраному рівні значущості підтверджується.

Після цього *перевіряється згода за критерієм II*. За табл. Е.17 для $n=20$ і $\alpha=0.02$ знаходимо значення $m=1$; $P=0,99$ і статистичною функцією **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР** при аргументі $(1+P)/2$ знаходимо верхню квантиль інтегральної функції нормованого розподілу Лапласа $z_{(1-P)/2}$ та її добуток з s , тобто $z_{(1-P)/2} \cdot s$. Цей добуток порівнюється з максимальним відхиленням за умови виконання.

У даному випадку має місце явище $d_{\max} < z_{(1-P)/2} \cdot s$, тобто у вибірці немає жодної різниці, що перевищує значення $z_{(1-P)/2} \cdot s$. З цього витікає, що гіпотеза про нормальність розподілу за критерієм II справедлива.

Таким чином, гіпотеза про нормальність закону дослідного розподілу за обома критеріями підтверджується при прийнятому рівні значущості $\alpha \leq 0.04$.

6.8. КРИТЕРІЙ ОМЕГА–КВАДРАТ

Критерій омега–квадрат (ω^2 , інакше — критерій Крамера–Мізеса–Смирнова) досить надійний при $n \geq 15$ для перевірки гіпотези чи підпорядковується випадкова величина деяким законом розподілу, якщо відомі (передбачаються відомими) його параметри. Така гіпотеза називається простою.

Перевірка може проводитися для будь-якого виду розподілу. Критерій ґрунтується на розрахунку суми квадратів різниць між накопиченої частковості (емпіричної функцією розподілу) і теоретичної функцією розподілу.

Результати розташовують у варіаційному ряду. Статистика критерію розраховується за виразом [59]

$$\omega^2 = \left(\frac{1}{12n} + \sum_{i=1}^n (F(x_i) - W_i)^2 - \frac{0.4}{n} + \frac{0.6}{n^2} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right), \quad (6.21)$$

де $F(x_i)$ – значення передбачуваної теоретичної функції розподілу;

W_i – накопичена частковість (емпірична функція розподілу),

$W_i = (2i-1)/(2n)$;

i – номер елемента в варіаційному ряду.

Розрахункове значення порівнюють з табличним ω_T^2 , значення якого наведені в табл. Е.18.

Якщо $\omega^2 \leq \omega_T^2$, нульову гіпотезу не відкидають, тобто розподіл вважають відповідним теоретичному з функцією розподілу $F(x_i)$ з відомими па-

раметрами при обраному рівні значущості α .

Якщо параметри передбачуваного розподілу заздалегідь невідомі, критерій, званий при цьому “критерій типу омега–квадрат”, може застосовуватися тільки для деяких видів розподілів.

Замість параметрів використовують їх вибіркові оцінки. При цьому визначається, чи належить розподіл випадкової величини деякого сімейства розподілів, наприклад, нормальних, рівномірних та ін. (складна гіпотеза). При цьому розрахунки проводять в наступному порядку. Значення вибірки ранжують за зростанням, тобто записують в варіаційний ряд. Статистику критерію для нормального розподілу розраховується за виразом [59]:

$$\omega^2 = \left(\frac{1}{12n} + \sum_{i=1}^n (F(x_i) - W)^2 \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right), \quad (6.22)$$

де $F(x_i)$ – значення передбачуваної теоретичної функції розподілу.

Таблиця 6.10. Перевірка нормальності розподілу кількості стручків на гілці критерієм ω^2					
	A	B	C	D	E
1	№ п.п.	Накопичувана частота W	Кількість стручків на центральній гілці-04	Імовірність $F(x)$	$[W-F(x)]^2$
2	1	0.0050	13.7	0.004	0.000001
3	2	0.0149	15.0	0.008	0.000044
4	3	0.0248	17.4	0.029	0.000019
5	4	0.0347	17.5	0.030	0.000019
$B2=(A2-0.5)/C\$2:C\102 $E2=(B2-D2)^2$ $D2 = \text{НОРМ.РАСП}(C2:C\$104:C\$105:\text{ИСТИНА})$ $C103 = \text{СЧЁТ}(C2:C102)$ $C104 = \text{СРЗНАЧ}(C2:C102)$ $C105 = \text{СТАНДОТКЛОН.В}(C2:C102)$ $E103 = \text{СУММ}(E2:E102)$ $E104 = E103*(1+1/C103)+1/(12*C103)$					
99	98	0.9653	35.9	0.975	0.000088
100	99	0.9752	36.2	0.979	0.000014
101	100	0.9851	37.1	0.987	0.000002
102	101	0.9950	39.9	0.997	0.000006
103	Обсяг		101	Сума	0.031
104	Середнє		26.49	ω^2	0.032
105	СКВ		4.79	ω_T^2	0.126

стручків на центральній гілці у 2004 р. (див. табл. 2.9 на с. 94).

Порядок розрахунку представлено на полі табл. 6.10.

Так як $\omega^2=0,032 \leq \omega_T^2=0,126$ (за табл. Е.19), нульову гіпотезу не відкидаємо на рівні значущості $\alpha=0.05$.

$F(x_i)$ розраховується за допомогою статистичної функції **MS Excel НОРМ.РАСП** з параметрами \bar{x} , s та **Істина**.

Розрахункове значення порівнюють з табличним ω_T^2 . Значення ω_T^2 залежать від виду розподілу. Для нормальних розподілів вони вказані в табл. Е.19.

Якщо $\omega^2 \leq \omega_T^2$, нульову гіпотезу не відкидають, тобто розподіл вважають відповідним передбачуваному при обраному рівні значущості α [59].

Для прикладу розглянемо оцінку кількості

6.9. КРИТЕРІЙ АНДЕРСОНА–ДАРЛІНГА

Критерій Андерсона–Дарлінга застосовують для перевірки гіпотези чи підпорядковується випадкова величина деякому теоретичному розподілу. Методична він схожий з критерієм омега–квадрат.

Критерій прийнятний при обсязі вибірки $n \geq 25$. Перевірку можна проводити для будь–якого виду розподілу, якщо параметри розподілу передбачаються відомими. Така перевіряється гіпотеза називається простий [59].

При простій гіпотезі за критерієм Андерсона–Дарлінга розраховують статистику

$$A = -n - 2 \sum_{i=1}^n \{W_i \cdot \ln[F(x_i)] + (1 - W_i) \cdot \ln[1 - F(x_i)]\}, \quad (6.23)$$

де $F(x_i)$ – значення передбачуваної теоретичної функції розподілу;

W_i – накопичена частковість (емпірична функція розподілу),

$$W_i = (2i-1)/(2n);$$

i – номер елемента в варіаційному ряду.

Розрахункове значення порівнюють з табличним A_T . Табличні значення можна знайти в табл. Е.20.

При $A_{\text{емп}} \leq A_T$ немає підстав для відкидання гіпотези перевірки, і емпіричний розподіл відповідає теоретичному з функцією розподілу $F(x)$ з відомими параметрами, при обраному рівні значущості α .

Якщо параметри теоретичного (гіпотетичного) розподілу заздалегідь невідомі, оцінюють, чи належить емпіричне розподіл того чи іншого сімейства теоретичних розподілів, наприклад, нормальних, експонентних, логістичних або інших (перевіряється складна гіпотеза).

Часто просто констатують: “відповідність певному розподілу”. При перевірці складної гіпотези критерій іноді називають “критерій типу Андерсона–Дарлінга”. Замість параметрів в розрахунках використовують їх оцінки, які визначаються за даними вибірки. Табличні значення критерію, як і для інших критеріїв згоди при складній гіпотезі, різні для різних сімейств розподілів.

При складній гіпотезі розрахунки проводять в наступному порядку. Значення вибірки ранжують за зростанням, тобто записують в варіаційний ряд. Знаходять $A_{\text{емп}}$ за формулою (6.23). При цьому $F(x_i)$ – значення інтегральної функції теоретичного розподілу від значень вибірки з оцінками параметрів, розрахованими по вибірці. Наприклад, для нормального розподілу оцінками параметрів є параметрами \bar{x} і s . У цьому випадку $F(x_i)$ знаходять по статистичній функції за допомогою статистичної функції **MS Excel НОРМ.РАСП** з параметром **истина**.

Отримане $A_{\text{емп}}$ порівнюють з табличним A_T . Якщо $A_{\text{емп}} \leq A_T$, емпіричний розподіл з прийнятною точністю належить розглянутого сімейства теоретичних розподілів, або, як зазвичай кажуть, випадкова величина, з якої взята вибірка, має нормальний розподіл.

Табличні значення критерію при складній гіпотезі для нормального розподілу наведені в табл. Е.21, для експонентного розподілу — в табл. Е.22. Для інших видів розподілів табличні значення можна знайти у відповідних джерелах.

Для прикладу розглянемо оцінку кількості стручків на центральній гілці у 2004 р. (див. табл. 2.9 на с. 94).

Порядок розрахунку представлено на полі табл. 6.13.

Так як $A_{\text{екс}}=0,179 \leq A_T=0,750$ (за табл. Е.21), нульову гіпотезу не відкидаємо на рівні значущості $\alpha=0,05$.

Таблиця 6.11. Перевірка нормальності розподілу кількості стручків на гілці критерієм Андерсона–Дарлінга

	A	B	C	D	E
1	№ п.п.	Накопичувана частота W	Кількість стручків на центральній гілці-04	Імовірність $F(x)$	$W_i \ln[F(x_i)] + (1-W_i) \cdot \ln[1-F(x_i)]$
2	1	0.0050	13.7	0.004	-0.031358
3	2	0.0149	15.0	0.008	-0.079421
4	3	0.0248	17.4	0.029	-0.116355
5	4	0.0347	17.5	0.030	-0.150871
$B3=(A3-0.5)/\$C\104 $E105=-C104-2*N104$ $D3=\text{НОРМ.РАСП}(C3;\$C\$105;\$C\$106;\text{ИСТИНА})$ $E3=B3*LN(D3)+(1-B3)*LN(1-D3)$ $C104=\text{СЧЁТ}(C3:C103)$ $C105=\text{СРЗНАЧ}(C3:C103)$ $C106=\text{СТАНДОТКЛОН.В}(C3:C103)$ $E104=B103*LN(D103)+(1-B103)*LN(1-D103)$					
99	98	0.9653	35.9	0.975	-0.152171
100	99	0.9752	36.2	0.979	-0.116332
101	100	0.9851	37.1	0.987	-0.077339
102	101	0.9950	39.9	0.997	-0.032094
103	Обсяг		101	Сума	-50.595
104	Середнє		26.49	$A_{\text{емп}}$	0.197
105	СКВ		4.79	A_T	0.750

6.10. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИБІРКИ НОРМАЛЬНОМУ РОЗПОДІЛУ ЗА В. І. РОМАНОВСЬКИМ

Оцінку відповідності вибірки нормальному розподілу можна виконати за формулою В. І. Романовського, використовуючи розрахунки χ^2 , виконані за формулою (8.31) [3, 33].

Умовою відповідності емпіричного розподілу нормальному є умова

$$R = \frac{\chi^2 - v}{\sqrt{2v}}, \quad (6.24)$$

де ν – число ступенів вільності, $\nu = K - 3$;
 K – число інтервалів (груп) розбивки.

Відношення Романовського ґрунтується на тому, що математичне очікування χ^2 дорівнює числу ступенів свободи ν , а дисперсія — подвоєному числу ступенів свободи, тобто 2ν . У цьому випадку ймовірність відхилення величини χ^2 на $3\sigma = 3\sqrt{2\nu}$ близька до одиниці [33].

У цьому випадку, якщо $R < 3$, то розбіжність між емпіричним і теоретичним розподілами вважається несуттєвим, і прийнятий закон розподілу можна прийняти в якості моделі емпіричного розподілу. Якщо ж $R > 3$, то розбіжність між розподілами істотна.

Варто зауважити, що [2] формулу В. І. Романовського подає у вигляді

$$R = \frac{\chi^2 - K}{\sqrt{2K}}. \quad (6.25)$$

Розглянемо приклад, використаний в підрозділі **6.5.3 Оцінювання відповідності між експериментальними й теоретичними даними за χ^2 -критерієм Пірсона**. З отриманої табл. 6.4 на с. 311 маємо $\chi^2 = 4.076652$ і $K = 8$, тобто $\nu = 5$. Таким чином результат розрахунків за формулою (6.24) становить -0.292, тобто він менше трьох, що свідчить про відповідності емпіричного розподілу нормальному.

6.11. ПЕРЕВІРКА НОРМАЛЬНОСТІ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ АСИМЕТРІЇ Й ЕКСЦЕСУ

Гіпотезу про відповідність вибірки об'ємом $8 \leq n \leq 5000$ нормальному закону статистичного розподілу можна перевірити за допомогою показників асиметрії As і ексцесу Ex , власне коефіцієнту ексцесу γ . При цьому перевіряються нульові гіпотези $H_0: As = 0$ і $H_0: \gamma = 0$ проти альтернативних $H_A: As \neq 0$ і $H_A: \gamma \neq 0$. При нормальному статистичному розподілі вони обидва дорівнюють нулю. У дійсності така рівність майже не спостерігається.

Вибіркові показники As і Ex , визначені за виразами (1.118) і (1.119) та (1.120), а ще краще As — за статистичною функцією ПА MS Excel **СКОС**, а коефіцієнт ексцесу γ — функцією **ЕКСЦЕСС** (див. Додаток А).

Як відомо, вони є випадковими величинами і супроводжуються похибками. У якості критерію нормальності статистичного розподілу служать t_{As} і t_{Ex} , які є відношенням вибірових значень As і γ до похибок репрезентативності s_{As} і s_{Ex} , що представлені на с. 80 відповідно виразами (1.123) і (1.129).

Зручніше виконувати перевірку нормальності статистичного розподілу за значеннями цих коефіцієнтів із застосуванням критичних значень, наведених у табл. Е.1 і Е.2. У них представлені критичні точки відповідно As_T і Ex_T для різних рівнів значущості α і обсягів вибірки n . Якщо розрахункові коефіцієнти As і Ex перевершують критичні точки, гіпотеза про нормальність статистичного розподілу відхиляється [15].

Для прикладу розглянемо дані із статистичної характеристики розподілу кількості стручків на центральній гілці сортотразків у 2004–2005 рр., (табл. 2.18, с. 112), представлені в табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Перевірка нормальності розподілу кількості стручків на гілці				
Показник	2004 р.		2005 р.	
	розрахункове	критичне	розрахункове	критичне
Асиметрія	0.066	0.389	-0.146	0.333
Коефіцієнт ексцесу (куртозис)	0.258	0.826	0.239	0.823
Обсяг вибірки, шт.	101		140	
Рівень значущості α	0.05			
Оцінка асиметрії G_{As}	0.067	-	-0.148	-
Оцінка ексцесу G_{Ex}	0.333	-	0.292	-

З неї видно, що за даними обох років розрахункові коефіцієнти As і Ex не перевищують критичні значення точок, що свідчить про узгодженість фактичних розподілів даних із нормальним статистичним розподілом.

Незміщені оцінки G_{As} і G_{Ex} відповідно для As і Ex розраховуються як

$$G_{As} = \frac{\sqrt{n(n-1)}}{n-2} \cdot As; \quad (6.26) \quad G_{Ex} = \frac{(n-1)[(n+1)Ex + 6]}{(n-1)(n-3)}. \quad (6.27)$$

За умови $G_{As} \leq 3S_{As}$ і $G_{Ex} \leq 5S_{Ex}$ для досліджуваної вибірки може бути прийнята гіпотеза про відповідність нормованому розподілу [116].

З результатів розрахунків за формулами (6.26) і (6.27), поданих в табл. 6.12, бачимо, що для досліджуваних вибірок може бути прийнята гіпотеза про відповідність нормованому розподілу.

Більш зручний спосіб перевірки нормальності статистичного розподілу за допомогою коефіцієнтів асиметрії й ексцесу за t -критерієм Стюдента з використанням формул (1.123)–(1.130), представлений в табл. 6.13.

Таблиця 6.13. Перевірка нормальності розподілу кількості стручків на гілці					
	A	B	C	D	E
1	Показник	Асиметрія		Ексцес	
2		2004 р.	2005 р.	2004 р.	2005 р.
3	Розраховане значення	0.066	-0.146	0.254	0.239
4	Обсяг вибірки, шт.	101	140	101	140
5	Похибка	0.240	0.205	0.476	0.407
6	Середньоквадратична похибка	0.477	0.405	0.944	0.805
7	Критерій Стюдента емпіричний t_p	0.275	0.713	0.535	0.588
8	Критерій Стюдента табличний t_T	1.984	1.977	1.984	1.977
9	Рівень значущості α	0.05			
10	Рівень значущості p	0.784	0.477	0.594	0.558

$$\begin{aligned}
 B5 &= (6 \cdot B4 \cdot (B4 - 1) / ((B4 - 2) \cdot (B4 + 1) \cdot (B4 + 3)))^{0.5} \\
 D5 &= (24 \cdot D4 \cdot ((D4 - 1)^2 / ((D4 - 3) \cdot (D4 - 2) \cdot (D4 + 3) \cdot (D4 + 5))))^{0.5} \\
 B6 &= B5 \cdot B8 & E6 &= E5 \cdot E8 \\
 B7 &= \text{ABS}(B3 / B5) & E7 &= \text{ABS}(E3 / E5) \\
 B8 &= \text{СТЮДЕНТ.ОБР.} 2X(B9; B4 - 1) \\
 B10 &= \text{СТЮДЕНТ.РАСП.} 2X(B7; B4 - 1)
 \end{aligned}$$

За результатами розрахунків, представлених в ній, емпіричний рівень t -критерію не перевищує табличний як для асиметрії так і для ексцесу для обох вибірок, що свідчить про узгодженість фактичних розподілів даних із нормальним статистичним розподілом. Це підтверджується також $p > \alpha$. Крім того цей спосіб дає змогу наводити отримані результати відповідно вимог останнього часу — з їх похибками.

Проте, простіше виконувати таку перевірку використовуючи дані табл. 2.17 на с. 111, отриманої за допомогою ППП **Statistica**. З розрахунків за її даними для 2004 р. маємо $t_{As}=0.249$ і $t_{Ex}=0.540$ при $t_{05(100)}=1.984$ і для 2005 р. $t_{As}=0.712$ і $t_{Ex}=0.5860$ при $t_{05(139)}=1.977$, тобто у обох випадках $t < t_T$.

Значення результатів асиметрії і ексцесу у тексті чи таблицях записуються разом з їх абсолютними похибками відповідно у вигляді $As \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{As}$ і $Ex \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{Ex}$ з наведенням обсягу вибірки та довірчого рівня значущості α .

Варто відмітити, що дослідник практично ніколи не вдається до оцінки ступеня відхилення від нормальності обчисленням асиметрії і ексцесу [51].

6.12. Оцінка виду розподілу графічним способом

Використання критеріїв згоди і критеріїв нормальності для оцінки виду функції розподілу неперервної випадкової величини не завжди зручно, тому що вимагає значних обчислень, а у деяких випадках великого обсягу випробувань. Тому вид функції розподілу іноді оцінюють наближеним методом — графічним.

При цьому результати випробувань подають у вигляді варіаційного ряду і для кожного результату x_i знаходять накопичену частинність [59]

Таблиця 6.14. Розрахунок для графічної оцінки нормальності розподілу

	A	B	C	D
1	№ п.п.	Накопичувана частота W	Імовірність (z)	Кількість стручків на центральній гілці-04 (x)
2	1	0.0098	-2.3338	13.7
3	2	0.0196	-2.0619	15.0
4	3	0.0294	-1.8895	17.4
5	4	0.0392	-1.7599	17.5
B2=A2/(C4ЁТ(\$B\$2:\$B\$102)+1)				
C2=НОРМ.СТ.ОБР(B2)				
99	98	0.9608	1.7599	35.9
100	99	0.9706	1.8895	36.2
101	100	0.9804	2.0619	37.1
102	101	0.9902	2.3338	39.9

$$W = i/(n - 1), \quad (6.28)$$

де i — номер результату в ряду;
 n — обсяг випробувань.

За розрахованими значеннями накопичених частот знаходять квантілі очікуваного розподілу (табл. 6.14).

Наприклад, якщо передбачається нормальний розподіл, за допомогою формули **MS Excel NORM.СТ.ОБР** знаходять квантілі стандартного нормального розподілу $z(W)$. Далі за наявними даними наносять точки на площину в координатах x – z . Якщо значення x_i є Квантиль розподілу того ж виду, що й $z(W)$ між ними повинна бути залежність, близька до лінійної. Тоді, якщо точки на графіку апроксимуються прямою лінією лише з невеликими відхиленнями від неї, то результати випробувань досить добре описуються обраним теоретичним розподілом. При істотних відхиленнях хоча б деяких точок від прямої, розподіл результатів випробувань не можна вважати відповідним обраному теоретичного [59].

Для прикладу розглянемо оцінку кількості стручків на центральній гілці у 2004 р. (див. табл. 2.9 на с. 94).

Порядок розрахунку представлено на полі табл. 6.14.

На її основі будуюмо точкову діаграму за даними стовпців x і z та додаємо лінійну лінію тренду (рис. 6.6). З графіка на рис. 6.6 видно, що всі точки знаходяться поблизу прямої, тому гіпотеза нормальності не відкидається.




Рис. 6.6. Графічна оцінка нормальності розподілу

Також у модулі **Descriptive statistics** / **Описательные статистики** меню **Statistics** / **Анализ** (див. рис. 2.20, с. 118) представлений спосіб графічної перевірки даних на нормальність розподілу. Він полягає у використанні графіка нормальних ймовірностей, або так званого “ймовірнісної паперу”. Такий графік зображує залежність очікуваних нормальних частот значень ознаки від їх

реальних частот. Очевидно, що якщо між спостережуваним і очікуваним розподілами немає ніякої різниці, точки на цьому графіку вишикуються строго уздовж прямої. Інакше вони утворюють фігуру відмінну від прямої [120].

Побудова графіка такого типу описана на с. 124, а отриманий графік нормальних ймовірностей на рис. 2.31 на с. 125. Точки на ньому щільно вишиковуються уздовж теоретично очікуваної прямої, що ще раз підтверджує нормальність розподілу кількості стручків на центральній гілці у 2004 р.

7. ОЦІНКА СТАТИСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ВИБІРКАМИ

7.1. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РІВНІВ ЗНАЧУЩОСТІ ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ГІПОТЕЗ

Розповсюдження отриманих даних від вибіркової сукупності до генеральної може бути здійснений лише з деякою ймовірністю, тобто судження про властивості генеральної сукупності носить імовірнісний характер і містить певний елемент ризику.

Будь-які судження про властивості генеральної сукупності називаються **статистичними гіпотезами**. Висловлювати припущення (висувати гіпотези) доводиться при статистичному оцінюванні окремих параметрів досліджуваних вибірок, ефективності вибору тієї чи іншої оцінки невідомого параметра їхнього розподілу, оцінці відповідності тому чи іншому закону статистичного розподілу. Також припускається що серед вибірових значень немає грубих помилок. Із ще більшою кількістю різних припущень (гіпотез) доводиться стикатися, коли треба не тільки визначати випадкові величини, але й порівнювати їх між собою, і тим більше, коли за результатами експерименту будується функція відгуку [17].

Перевірка статистичних гіпотез здійснюється за допомогою **статистичних критеріїв**, призначуваних у залежності від формулювання нульової гіпотези H_0 . Всі ці критерії за своєю природою негативні. Якщо значення досліджуваного параметра потрапляє в область “прийняття” гіпотези, то це означає лише, що гіпотеза не суперечить експериментальним (вибіровим) даними і її з ризиком $1-\alpha$ можна визнати **правомірною** (будемо говорити, що “**гіпотеза допущена**” принаймні до тих пір, поки дослідження з розширенням інформації або за допомогою **більш потужних** критеріїв не приведуть до протилежного результату. Крім того, ненегативний результат перевірки H_0 не означає, що ця гіпотеза краща або єдина (властивості несуперечності можуть мати й інші гіпотези), — її слід розглядати лише як одне з правдоподібних (а не абсолютно достовірних) тверджень. [121]

Таким чином, **статистичні критерії** — однозначно певні способи перевірки статистичних гіпотез, застосовуються при необхідності використовувати вибірове спостереження для оцінки прийнятого нами закону розподілу сукупності, для вирішення питання про істотність різниці між вибіровими середніми, для встановлення приналежності варіанти до цієї сукупності й відповідності між фактичними та теоретичними розподілами частот. Таким чином, критерії відмінності дозволяють відповісти на такі питання:

- чи належить варіанта до даної статистичної сукупності, тобто, чи статистично можливе таке її відхилення від центра генеральної сукупності;
- чи відповідає даний емпіричний розподіл тому чи іншому теоретичному розподілу;
- чи належать дані сукупності емпіричних вибірок до одній і тій же генеральній сукупності.

Тут слід вирішувати задачу чи є дані відмінності результатом реально-го явища, чи це випадкове попадання варіант у вибірку, застосовуючи **критерій згоди** (*goodness-of-fit tests*) — статистичний критерій для перевірки гіпотези про згоду (рівність) розподілу випадкової величини досліджуваної сукупності з теоретичним розподілом чи гіпотези про згоду розподілів у двох і більше сукупностях.

Процес прийняття рішення називається перевіркою статистичної гіпотези. Оскільки ми висували гіпотезу, спираючись тільки на випадкові вибіркові значення, наші висновки носитимуть імовірнісний характер, тобто ми не можемо дати точної відповіді: так чи ні. Можна буде лише з деякою часткою впевненості (тобто із деякою ймовірністю) стверджувати, що дані не суперечать (або суперечать) припущенню [122].

Статистичні гіпотези про будь-яке припущення, що стосується невідомого розподілу випадкової величини, можна розділити на такі групи.

1. **Гіпотези про параметри розподілу** представляють собою припущення про значення деяких параметрів розподілу генеральної сукупності, наприклад, гіпотеза про те, що параметри (математичне сподівання, дисперсії) у двох вибірках статистично рівні між собою. Гіпотези про параметри розподілу можна висувати, маючи достатню інформацію про генеральну сукупність або маючи вагомі підстави вважати відомим її закон розподілу.

2. **Гіпотези про вид розподілу** застосовуються в умовах недостатньої інформації про генеральної сукупності. За вибіркою висувається гіпотеза про те, чи відповідають дані, наприклад, нормальному закону статистичного розподілу. Зауважимо, що перевірка гіпотези про нормальність статистичного розподілу може допомогти при подальшій обробці вибірки: якщо випадкову величину досить упевнено можна вважати нормально розподіленою, то до неї застосовні всі теореми для нормальних величин, зокрема, є можливість побудувати довірчі інтервали для параметрів [17].

У цьому разі Приклад зводиться до перевірки **гіпотези про відсутність статистичних відмінностей**, наприклад, між новими сортами чи технологіями та існуючими, і яка називається **нульової гіпотезою** (*null hypothesis*) і має спеціальне позначення H_0 [122]. Ця гіпотеза, що записується як $H_0: x = y$, де x та y відповідно нове й старе явище, підлягає перевірці у ході досліджень. Її, як наприклад, наукову гіпотезу дисертації, висувають і потім перевіряють за допомогою статистичних критеріїв із метою виявлення підстав для її відхилення та прийняття альтернативної гіпотези H_A [17].

Згідно з нульовою гіпотезою H_0 , яка сформульована: **відмінностей немає, а ті, що наявні — випадкові**, тобто, відмінність між значеннями недостатньо велика, щоб прийняти, що ця відмінність викликана не випадковими факторами. Точне формулювання нульової гіпотези залежить від проведеної перевірки, але завжди у варіанті “**відсутність відмінностей**” або “**відсутність зв’язку**”, тобто фактично у варіанті нульової відмінності H_A .

Така нульова гіпотеза загальноприйнята внаслідок її однозначності. Дійсно в цьому випадку $x \cdot y = 0$. Якщо взяти будь-яку іншу нульову гіпотезу

$H_0: x \neq y$, то з'являється ряд додаткових варіантів $x > y$, $x < y$ і наскільки менше чи більше. Проблема статистичної перевірки такої нульової гіпотези стає розмитою й вимагає масу додаткових розрахунків на основі прийняття цілої серії послідовних нових нульових гіпотез [6].

Слід підкреслити, що при перевірці гіпотези її слід ставити в критичні умови, або, як іноді кажуть, в умови великого ризику [51].

Альтернативна гіпотеза H_A (alternative hypothesis) — **гіпотеза про значущість відмінностей** передбачає їх наявність, альтернативна гіпотеза, це кожна допустима гіпотеза, відмінна від нульової. Зазвичай у якості альтернативної гіпотези приймають гіпотезу другу за значущістю після основної. Відповідно до альтернативної гіпотези, відмінності досить значущі й обумовлені впливом не випадкових факторів. **Статистично значуща відмінність** це настільки велика відмінність, що ймовірність її виникнення внаслідок простої випадковості вкрай мала. Альтернативна гіпотеза є, як правило, “робочою” гіпотезою дослідження, оскільки часто мета дослідника полягає у тому, щоб навести докази, які говорили б на користь альтернативної гіпотези й на підставі яких можна було б відхилити нульову гіпотезу.

При дослідженнях нас цікавить саме **генеральна сукупність** з якої були зроблені **вибірки**. Тому в процесі їх статистичного аналізу перевіряємо ті або інші статистичні гіпотези, далі одержуємо певне значення обраного нами критерію разом із досягнутим рівнем значущості й, порівнюючи його із критичним рівнем, ухвалюємо або відкидаємо цю гіпотезу. Однак **завжди ці гіпотези ми формулюємо щодо параметрів генеральної сукупності**.

Перевірка статистичних гіпотез зводиться до порівняння статистичних характеристик параметрів розподілу. Першим кроком перевірки статистичної гіпотези є формулювання припущень. При розв'язанні будь-якої задачі шляхом застосування статистичних методів потрібно прийняти певні припущення відносно даних, наприклад, про спосіб формування вибірки, виду розподілу тощо. Такі припущення називаються **статистичною моделлю**.

Нульова гіпотеза перевіряється, таким чином. Приймавши її, тобто відсутність реальних відмінностей, визначаємо ймовірність того, що через випадковість вибірки розходження може досягти фактично отриманої величини. Якщо ймовірність є дуже малою, то нульова гіпотеза відхиляється, так як мало ймовірно, що розходження випадкові, а не реальні.

Справедливість нульової гіпотези перевіряється обчисленням статистичних критеріїв для певного теоретичного рівня (рівня порогу) значущості α . Всі статистичні критерії є випадковими величинами, що набувають певних значень (таблиці критичних значень).

Областю прийняття гіпотези (областю допустимих значень) називають сукупність значення критерію, за яких гіпотезу приймають.

Критичною називають сукупність значень критерію, за яких нульову гіпотезу відкидають. Область прийняття гіпотези і **критична область** розділені **критичними точками**, у якості яких і виступають табличні (критичні) значення критеріїв.

Мінімальне значення ймовірності, починаючи з якого її можна вважати малою, називається рівнем значущості й позначається α . Відмінність вважається значущою, тобто реальною, якщо ймовірність того, що нульова гіпотеза достовірна, менше рівня значущості. Сам же рівень значущості α показує у якій мірі можна помилитися відкинувши нульову гіпотезу [122].

З точки зору перевірки статистичних гіпотез, рівень значущості — ймовірність того, що спостережуване значення критерію потрапить в критичну область, тобто $P(\Theta > \theta_{\alpha}^{кр}) = \alpha$. Для статистичного рішення про прийняття або відхилення H_0 зазвичай встановлюють $\alpha = 0.05$, а для вибірок великого обсягу (близько 100 і більше) $\alpha = 0.01$.

Якщо у результаті перевірки H_0 відмінності між фактичними й гіпотетичними показниками близькі до нуля або знаходяться в області допустимих значень, то нульова гіпотеза не спростовується, а якщо відмінності опиняються в критичній для цього статистичного критерію області, які при нашій гіпотезі неможливі, а тому несумісні з нею, — спростовується.

Якщо результати статистичного тесту виявляються такими, що дозволять відхилити H_0 , це буде означати, що вірна H_A , тобто висунута робоча гіпотеза підтверджується. Проте, якщо ми не можемо відхилити нульову гіпотезу, це не свідчить, що одержано її підтвердження — *нульова гіпотеза може бути лише перевірена і прийнята з відповідним рівнем значущості і ніколи не може бути абсолютно підтверджена*. У той же час із відхилення нульової гіпотези завжди впливає прийняття альтернативної гіпотези.

Таким чином, при прийнятті нульової гіпотези (точніше, неможливості її відхилити) завжди залишається ймовірність того, що відмінності або зв'язок насправді існують. Це означає лише те, що не виявлені *статистично значущі* відмінності між фактичними й гіпотетичними (теоретичними) або між двома рядами фактичних розподілів.

При неможливості відхилення H_0 не можна декларувати відсутність зв'язку або відмінностей — висновком дослідження буде лише те, що статистично значущі зв'язки або відмінності не виявлені. З іншого боку, при відхиленні нульової гіпотези завжди залишається ймовірність того, що вона вірна. Тому не можна категорично стверджувати, що зв'язок є або що результати доводять його наявність. Більш коректним є твердження *статистично значущого* зв'язку, що свідчить або вказує на *наявність можливого зв'язку* [37].

Таким чином, рівень значущості α характеризує ризик похибки *при відкиданні нульової гіпотези*. Чим менше рівень значущості, тим менше ймовірність її відхилення коли вона вірна, або зробити похибку *першого* роду, але тим більше ймовірність зробити похибку *другого* роду (ймовірність якої позначається β), коли не відкидається H_0 , яка насправді невірна. Рівень значущості α не свідчить про міру ризику, пов'язаного з прийняттям невірної гіпотези (похибки *другого* роду), він контролює лише похибку *першого* роду.

Умовно кажучи, при $\alpha = 0.05$ ризик помилитися (відкинувши нульову гіпотезу, в той час як насправді вона вірна) стає помітним; при $\alpha = 0.01$ цей ризик дуже малий. Щоб звести до мінімуму похибку першого роду, слід використовувати дуже малі значення α . У міру зменшення значення α зростає ймовірність прийняття похибки другого роду β , тобто прийняття нульової гіпотези, яка в дійсності є неправильною. Таким чином, обидві похибки взаємно обернено залежні й однією перевіркою неможливо звести до мінімуму обидві похибки.

В остаточному підсумку це означає, що треба підбирати таке значення α , яке було б балансом між двома похибками. Так як більш критичною вважається похибка *першого* роду, застосовуються низькі значення α (0.05; 0.01; 0.001 і навіть нижче). Зокрема, значення $\alpha = 0.05$ вважається загальноприйнятим показником значущого результату. Воно рекомендоване для невеликих вибірок (при високій ймовірності похибки *другого* роду). Якщо обсяги вибірок $n > 100$, то поріг відхилення краще знизити до $\alpha = 0.01$, тобто ухвалювати рішення щодо наявності зв'язку (відмінностей) при розрахунковому (фактичному) *рівні значущості* p (див. с. 58) за умови $p \leq 0.01$ [29, 123].

Цей розрахунковий показник, називається *емпіричним* (або *експериментальним*) значенням критерію. Знайдене емпіричне значення порівнюється з відомим еталонним числом, іменованим *критичним значенням критерію* [15, 37].

Таким чином p -рівень представляє собою ймовірність похибки, пов'язаної з розширенням спостережуваного результату вибірки на всю генеральну сукупність з розрахунковою (фактичною) довірчою ймовірністю. Більш високий p -рівень зменшує рівень довіри до знайденої залежності між варіантами. Саме, p -рівень являє собою ймовірність похибки, пов'язаної з розширенням спостережуваного результату на всю популяцію з розрахунковою (фактичною) довірчою ймовірністю, яка визначається як $P = 1 - p$ [15, 37].

Часто рівень значущості позначають *SL* від англійського *Significance Level* – *рівень значущості* або просто p -рівень (*p-value*).

При $p < 0.05$ рівень називається значущим, при $p < 0.01$ — високозначущим [5]. *Він представляє собою шанси на користь нульової гіпотези* — відповідності реальності, тобто “репрезентативності вибірки” — *ризик отримання похибки першого роду* (помилкового відхилення нульової гіпотези про відсутність відмінностей — відхилення дійсної нульової гіпотези).

Отриманий довірчий рівень p показує ймовірність справедливості нульової гіпотези, наприклад, що на користь нульовій гіпотезі про *відсутність* відмінностей або переваг нового сорту або нової технології є лише $100 \cdot p$ % шансів, а $100 \cdot (1 - p)$ % — проти, тобто з ймовірністю $100 \cdot (1 - p)$ % таку нульову гіпотезу можна відкидати й стверджувати, що з ймовірністю $100 \cdot (1 - p)$ % новий метод, сорт, технологія істотно відрізняються від попередніх.

Надалі будемо вважати, що якщо рівень значущості p нульової гіпотези менше або дорівнює 0.01, то вона відхиляється; якщо він лежить в межах

від 0.01 до 0.05, то можливість відкинути кульову гіпотезу сумнівна; якщо ж більше 0.05, то нульова гіпотеза приймається. Тобто, висновок про *відхилення нульової гіпотези робиться за умови $p \leq \alpha$* , якщо $p > \alpha$, нульова гіпотеза не відкидається і, отже, новий сорт чи технологія не мають переваг і відмінностей перед старими.

Для пошукових робіт при двосторонніх критеріях можна рекомендувати $\alpha = 0.05$ – 0.10 і навіть до 0.20), а для остаточних рішень $\alpha = 0.01$ – 0.05 . [121]

Корисно знати, що впливає на рівень значимості. Рівень значимості за інших рівних умов вище (значення p –рівня менше), якщо:

- величина зв'язку (відмінності) більше;
- мінливість ознаки (ознак) менше;
- об'єм вибірки (вибірок) більше [9].

Дуже важливо обґрунтовано сформулювати статистичну модель, оскільки вона обумовлює вибір конкретних статистичних процедур, які можуть використовуватися для перевірки статистичної гіпотези. У більшості випадків виконується перевірка гіпотези про відсутність реальної відмінності між фактичними й теоретично очікуваними спостереженнями, тобто нульової гіпотези.

Альтернативна гіпотеза H_A може бути неспрямованою й спрямованою. Якщо метою є показати, що значення досліджуваного параметра за вибіркою лише відрізняється від значення параметра по генеральній сукупності, то альтернативна гіпотеза символічно сформульована за допомогою знаку “ \neq ”, наприклад, $H_A: s \neq 50$ і є неспрямованою альтернативною гіпотезою.

Якщо альтернативна гіпотеза сформульована як спрямована (наприклад, $H_A: s > 50$, тобто s більше п'ятдесяти), то нульова гіпотеза може бути сформульована як $H_0: s \leq 50$. Таким чином, *символ строгої “=” або нестрокої рівності (“ \leq ” чи “ \geq ”) повинен завжди бути присутнім у формулюванні нульової гіпотези й ніколи у формулюванні альтернативної.*

Нульова й альтернативна гіпотези представляють повну групу несумісних подій, відхилення однієї призводить до прийняття іншої. Тому основний принцип перевірки статистичних гіпотез полягає в тому, що висувається нульова гіпотеза H_0 для того, щоб спробувати спростувати її й тим самим підтвердити альтернативну гіпотезу H_A .

Значення застосовуваної для даного критерію статистики, при яких для обраного рівня значущості відкидається нульова гіпотеза, утворюють так звану *критичну область ω* , яка включає всі малоймовірні й рідкі значення вибірових результатів. Таким чином, ця область має властивості: якщо значення застосовуваної статистики належать даній області, то відкидають нульову гіпотезу; в іншому випадку її приймають, тобто одержання при обробці даних значення із цієї області дозволяє відхилити нульову гіпотезу.

Інша область складається з усіх значень вибірових результатів, що є “нерідкими”. Чим менше значення α , тим менше критична область. Питання про прийнятне значення α , тобто, питання про те, при якому рівні можна відхилити H_0 , не має однозначної відповіді.

Розрізняють одnobічні й двобічні критичні області. Різні варіанти областей представлені на рис. 7.1 [17].




Рис. 7.1. Критичні області щільності розподілу:

а – правобічна; б – лівобічна; в – двобічна.

Якщо хочуть переконатися, що одна випадкова величина **строго більше або строго менше іншої**, то використовують **одnobічну критичну область** (рис. 7.1 а), і б) і застосовують **одnobічний критерій**.

Правобічною критичною областю називають критичну область, яка визначається нерівністю $\Theta > \theta_{\text{кр, пр, } \alpha}^{\text{кр}}$, де Θ – позитивне число (див. рис. 7.1, а). Лівобічної критичної областю називають критичну область, яка визначається нерівністю $\Theta < \theta_{\text{кр, лів, } \alpha}^{\text{кр}}$, де Θ – негативне число (див. рис. 7.1, б).

Двобічною критичної областю називають критичну область, яка визначається нерівностями $\Theta > \theta_{\text{кр, пр, } \alpha}^{\text{кр}}$ і $\Theta < \theta_{\text{кр, лів, } \alpha}^{\text{кр}}$, де $\theta_{\text{кр, лів, } \alpha}^{\text{кр}} > \theta_{\text{кр, пр, } \alpha}^{\text{кр}}$ (див. рис. 7.1, в).

Таким чином, для даного випадку $H_0: \Theta = \Theta_0$; $H_1^{(1)}: \Theta = \Theta_0$; $H_1^{(2)}: \Theta = \Theta_0$.

Якщо перевіряють як позитивні, так і негативні розбіжності між отриманими величинами, і дослідника **цікавить відмінність сама по собі** й неважливо більше чи менше значення варіанта у відношенні значення контролю, лише б вони відрізнялись один від одного, то використовують **двобічний критерій**, тобто **двобічні критичні області** (рис. 7.1 в) $H_1^{(1)}: \Theta = \Theta_0$. [17]

Однак, у випадку двобічної критичної області дана умова прийме вид $P(\Theta < \theta_{\text{кр, пр, } \alpha}^{\text{кр}}) + P(\Theta > \theta_{\text{кр, лів, } \alpha}^{\text{кр}}) = \alpha$.

Ясно, що критичні точки в цій ситуації можуть бути обрані незліченним безліччю способів. Однак, як правило, їх стараються вибрати симетрич-

ними щодо нуля. Тоді $P(\Theta > \theta_{\alpha}^{\text{кр}}) = P(\Theta < -\theta_{\alpha}^{\text{кр}})$, і критерій набуде вигляду $P(\Theta > \theta_{\alpha}^{\text{кр}}) = \alpha/2$.

Тобто, якщо при перевірці гіпотези сформульована **неспрямована альтернативна гіпотеза**, то критичні області, відповідно до відхилення нульової гіпотези й прийняття альтернативної, нарівно розподіляються по обом “хвостам”. Тому такі **криві називають двобічними (2-tailed)**. Тоді якщо прийнятий рівень статистичної значущості α , то існують два критичні пороги: $\alpha/2$ — праворуч на кривій розподілу й мінус $\alpha/2$ — ліворуч (рис. 7.2) [17].




Рис. 7.2. Області прийняття та відхилення гіпотези при її перевірці.

Якщо перевіряється **спрямована альтернатива гіпотеза**, то говорять про **однобічний (1-tailed) критерій**. Тоді для однобічних областей вибір критичної точки визначається вимогою $P(\Theta > \theta_{\alpha}^{\text{кр}}) = \alpha$ — при правобічному критерії (рис. 7.1 а) або $P(\Theta < \theta_{\alpha}^{\text{кр}}) = \alpha$ — при лівобічному критерії (рис. 7.1 б).

У більшості випадків спрямованість чи неспрямованість альтернативи залежить від форми теоретичного розподілу. Якщо він **симетричний і включає негативної значення, то застосовуються неспрямована альтернативи**. Це відноситься до таких теоретичним розподілам, як **Z-розподіл** (нормальний розподіл), розподіл **t-Стьюдента** і т.д. Якщо розподіл **асиметричний і може приймати тільки додатні значення, то застосовуються спрямовані альтернативи**, наприклад, при використанні критеріїв χ^2 -Пірсона або **F-Фішера**, хоча зустрічаються і винятки. Важливо відзначити, що вибір альтернативи — спрямованість чи неспрямованість — виключає сваволлю дослідника і зазвичай задається обраним методом перевірки гіпотези.

У цьому разі існує один критичний поріг плюс α праворуч або мінус α — ліворуч залежно від напрямку альтернативи. При двобічній альтернативі нульова гіпотеза відкидається при більших значеннях сили зв'язку (кореляції, відмінностях середніх тощо), ніж при однібічній, тобто, перевірка неспрямованої гіпотези є більш “строгою” за інших рівних умов.

Однібічні критерії слід використовувати, коли спрямованість відмінностей можна з упевненістю передбачити, виходячи з апріорних передумов відомо, яка із порівнюваних вибірок гарантовано переважає за досліджуваним показником і **лише необхідно** обчислити значення p для того, щоб підтвердити статистичну значущість вихідного припущення. Однак у цьому випадку така апріорна гіпотеза повинна бути обґрунтована.

У переважній більшості ситуацій таке обґрунтування неможливо, тому необхідно користуватися двостороннім критерієм статистичної значущості. Даний критерій видає значення p , що перевищує приблизно в 2 рази таке для одностороннього критерію і **якщо існують сумніви при виборі між спрямованою й неспрямованою альтернативою, то завжди слід вибрати неспрямовану альтернативну гіпотезу** [5].

Існує просте співвідношення між p -рівнями для спрямованих і неспрямованих альтернатив: для одного і того ж значення критерію p -рівень для спрямованої альтернативи в два рази менше p -рівня для неспрямованої альтернативи. Критичні значення z для одно- і двобічних критеріїв для деяких розповсюджених значень α наведені в табл. 7.1 та на рис. 7.3 проілюстровано їх визначення за допомогою статистичного калькулятора ППП **Statistica**.

Таблиця 7.1. Критичні значення z для одно- і двобічних критеріїв для значень α

Альфа	Неспрямований критерій	Спрямований критерій
0.10	± 1.644854	± 1.281552
0.05	± 1.959964	± 1.644854
0.01	± 2.575829	± 2.326348
0.001	± 3.290527	± 3.090232

Спрямований критерій нормального розподілу розраховується за статистичною функцією Excel **НОРМ.СТ.ОБР(1- α)**, неспрямований — **НОРМ.СТ.ОБР(1- $\alpha/2$)** [25].


Вид критичної області залежить від виду альтернативної гіпотези. Для простоти уявімо приклад вибору критичної області у вигляді стилізованої таблиці, табл. 7.2 [33].

Таблиця 7.2 Алгоритм вибору виду критичної області


Нульова гіпотеза: $H_0: \bar{x} = a$ Альтернативна гіпотеза:	
Вид гіпотези	Вид критичної області
$H_A: \bar{x} \neq a$	Двобічна (критичні точки відшукуємо при значущості $\alpha/2$, рис. 7.1 в)
$H_A: \bar{x} < a$	Лівобічна (критичні точки відшукуємо при значущості α , рис. 7.1 б)

$H_A: \bar{x} > a$ | Правобічна (критичні точки відшукуємо при значущості α , рис. 7.1 а) |


Загалом про застосування однобічних й двобічних критеріїв перевірки значимості можна сказати: якщо мета досліджень полягає у тому, щоб виявити відмінність параметрів двох генеральних сукупностей (наприклад урожайність порівнюваних сортів), то часто первісно невідомо, і якого із них цих параметрів буде більше, а який менше.



а)



б)



в)

Рис. 7.3. Визначення критичних значень z для одно– і двобічних критеріїв:

а – неспрямований двобічний; б, в – спрямовані лівобічний і правобічний.

У цьому разі, як правило, немає впевненості у знаку відмінності дисперсій або стандартних відхилень результатів, по яких оцінюється варіативність. Тоді нульова гіпотеза полягає в тому, що дисперсії рівні між собою, а метою дослідження є дослідження довести зворотне, тобто наявність відмінності між дисперсіями. При цьому допускається, що відмінність може бути будь-якого знаку. Такі гіпотези називаються **двобічними**.

Але іноді завдання полягає в тому, щоб довести збільшення або зменшення параметра; наприклад, що середня урожайність випробуваного сорту вища, ніж контрольного. При цьому вже не допускається, що відмінність може бути іншого знаку. Такі гіпотези називаються **однобічними**.

Таким чином критерії значимості, що служать для перевірки двобічних гіпотез, називаються **двобічним**, а для однобічних — **однобічними**.

Виникає питання про те, який із критеріїв слід вибирати у тому чи іншому випадку. Відповідь на це питання лежить за межами формальних статистичних методів і повністю залежить від цілей дослідження. Якщо допускається, що відмінність порівнюваних параметрів може бути як додатною, так і негативною, то слід використовувати **двобічний** критерій. Якщо ж є додаткова інформація, наприклад, з попередніх експериментів, на підставі якої можна зробити припущення, що один з параметрів більше або менше іншого, то використовується **однобічний** критерій.

Коли є підстави для застосування однобічного критерію, йому слід надавати перевагу перед двобічним, тому що він повніше використовує інформацію про досліджуване явище і частіше дає правильні результати.

Ризик однобічного критерію в тому, що він може назвати значимою змінну, яка не є значимою насправді. Однобічний критерій — це шанс назвати змінну значимою, коли двобічний критерій не спрацює.

Двобічні тести більш строгі за від однобічні, наприклад, коефіцієнт може бути незначущим при двобічному тесті й значущим при однобічному, тому використання однобічних тестів може виявитися корисним, якщо хочеться мати значущі коефіцієнти.

Якщо однобічний тест не дозволив відкинути нульову гіпотезу, тобто значущість коефіцієнта обґрунтувати не вдалося, то більш строгий двобічний теж не відкине нульову гіпотезу, і коефіцієнт насправді є незначущим [9].

Також на підставі статистично значущого зв'язку не можна робити висновки про наявність причинно-наслідкового зв'язку між явищами (ознаками). Для підтвердження причинно-наслідкового зв'язку необхідне обґрунтування двох додаткових ознак:

- а) одне явище передує іншому в часі;
- б) відсутня загальна причина зміни ознак (явищ).

У цьому випадку теоретична **довірча ймовірність P** , тобто ймовірність того, що довірчий інтервал накриває дійсне значення параметра, що оцінюється за вибірковими даними, а саме ймовірність відмінностей, становить **$P=1-\alpha$** . Якщо $\alpha=0.05$ і прийнята альтернативна гіпотеза, то ймовірність відмінностей буде 0.95, або 95 %. Чим більше емпіричне значення критерію за критичне, тим сильніше різняться характеристики порівнюваних об'єктів. Для більшості статистичних критеріїв діє правило: якщо **емпіричне значення критерію** для даного числа ступенів вільності **нижче за прийнятий критичний рівень**, відповідний до обраного значення α (порогу ймовірності), то H_0 не може вважатися спростованою так як характеристики розподілів

збігаються на прийнятому рівні значущості α і статистично істотна різниця між порівнюваними варіантами відсутня (незначуща).

При викладені матеріалів дослідження слід указувати всі статистичні характеристики, які підтверджують висновки автора. Наприклад, при оцінці розходжень між “нормально розподіленими” вибірками — значення коефіцієнта Стюдента (t) і похибки висновку (p).

При формулюванні висновків за такої статистичної обробки матеріалу пишуть: “... з імовірністю ...% можна стверджувати, що середньоарифметичне знаходиться в інтервалі від ... до ...”, або “... з імовірністю ...% можна стверджувати, що середньоарифметичне не менше ... і не більше...” [6].

Виходячи з того, що вибір критичного рівня статистичної значущості α — довільний акт дослідника, а використовувані статистичні пакети (**Excel**, **Statistica** та ін.) обчислюють точне значення p -рівня, у тексті дисертації, наукових публікаціях та звітах, останнім часом **рекомендується вказувати точне значення ймовірності (похибку статистичного висновку p)** а не описувати результати як статистично значущі або незначущі, указуючи лише інтервал, у якому знаходиться розраховане значення p , тобто $p \leq 0.05$ чи $p > 0.05$. **Значення p прийнято вказувати в тексті статей із точністю до трьох десяткових знаків, і лише в разі, якщо p менше 0.001, подавати у форматі $p < 0.001$, тобто лише інтервалом значень** [5, 36].

Наведені визначення намічають найпростішу форму перевірки статистичних гіпотез. Для того щоб пояснити сутність цього методу, припустимо, що вибіркова величина Θ , що представляє собою незміщену оцінку параметра Θ_0 , має щільність розподілу $f(\Theta)$. Якщо гіпотеза, яка полягає в тому що $\Theta = \Theta_0$, вірна, то функція $f(\Theta)$ повинна потрапляти в середню область, як показано на рис. 7.2.

Імовірність того, що параметр Θ вийде за межі інтервалу $[\Theta_{1-\alpha/2}; \Theta_{\alpha/2}]$, становить α . Тепер зменшимо величину α щоб потрапляння параметра Θ за межі інтервалу $[\Theta_{1-\alpha/2}; \Theta_{\alpha/2}]$ було малоімовірно. Якщо після вилучення вибірки й визначення величини Θ виявиться, що вона виходить за межі інтервалу $[\Theta_{1-\alpha/2}; \Theta_{\alpha/2}]$ і потрапляє в критичну область, то в цьому випадку є серйозні підстави для сумніву у справедливості перевіреної гіпотези $\Theta = \Theta_0$. З іншого боку, якщо параметр Θ потрапляє в інтервал $[\Theta_{1-\alpha/2}; \Theta_{\alpha/2}]$, то в цьому випадку немає серйозних підстав сумніватися у справедливості даної гіпотези, і гіпотезу рівності $\Theta = \Theta_0$ можна прийняти. Як видно з рис. 7.2, помилка першого роду допускається, якщо гіпотеза вірна, а параметр Θ потрапляє в область відхилення гіпотези. Звідси випливає, що ймовірність допустити помилку першого роду дорівнює α , тобто рівню значущості критерію.

Для того щоб знайти, яка ймовірність допустити помилку другого роду, слід задати певну величину відхилення істинного значення від гіпотетичного значення параметра, яке потрібно визначити. Припустимо, наприклад, що справжнє значення параметра в дійсності одне — $\Theta_0 + d$ або $\Theta_0 - d$, як показано на рис. 7.4.

Якщо, за гіпотезою $\Theta = \Theta_0$, а насправді $\Theta = \Theta_0 \pm d$, то ймовірність того, що Θ потрапляє в область її прийняття, тобто в інтервал $[\Theta_{1-\alpha/2}; \Theta_{\alpha/2}]$, становить β . Це означає, що ймовірність допустити помилку другого роду при виявленні відхилення $\pm d$ від гіпотетичного значення Θ дорівнює β .

Очевидно, що при будь-якому обсязі вибірки ймовірність допустити помилку першого роду можна скоротити, зменшивши рівень значущості α .

Однак при цьому збільшується ймовірність допущення помилки другого роду (знижується потужність критерію). Тому у більшості випадків не можна домогтися мінімального значення ймовірностей α і β одночасно. Виконують це таким чином: фіксують ймовірність α помилки першого роду, а потім домагаються мінімуму ймовірності β помилки другого роду. Зменшити β при фіксованому значенні α можна за рахунок правильного вибору критичної області: при заданій альтернативі H_A критичну область вибирають таким чином, щоб значення β (ймовірність прийняти невірну гіпотезу) було найменшим з можливих [17].




Рис. 7.4. Помилки другого роду при перевірці гіпотези.

Потужністю **критерію** π , який визначається як $\pi = 1 - \beta$, називають ймовірність його попадання в критичну область за умови, що справедлива альтернативна гіпотеза вірна альтернативна гіпотеза і нульова гіпотеза повинна бути відкинута. При цьому, якщо ймовірність здійснення помилки **другого роду** дорівнює β . Таким чином, завдання полягає в побудові найбільш потужного π при заданому рівні значущості α .

Загальна процедура перевірки статистичних гіпотез складається з:

- формулювання статистичної моделі (допущення щодо способу формування вибірки, використовуваної шкали, виду розподілу тощо);
- формулювання нульової гіпотези H_0 ;
- вибір однієї з альтернативних гіпотез $H_1^{(1)}$, $H_1^{(2)}$, $H_1^{(3)}$;

$$H_1^{(2)}: \Theta = \Theta_0.$$

— вибору відповідного статистичного критерію, за яким може бути перевірена сформульована нульова гіпотеза H_0 ;

— розрахунок значення статистики, застосовуваної для даного критерію;

— вибору необхідного рівня значущості ($\alpha=0.1; 0.05; 0.01; 0.001$ і т.д.);

— побудова критичної області ω при обраному рівні значущості α ;

— обчислення емпіричного значення критерію;

— порівняння емпіричного значення критерію із критичним значенням;

— прийняття рішення: якщо значення статистики потрапило в критичну область — нульова гіпотеза відкидається, при цьому ймовірність помилки (першого роду) не перевищує обраний рівень значущості; в іншому випадку нульова гіпотеза приймається [17, 37].

Використання концепції довірчих рівнів дозволяє відійти від точкових оцінок вибірок, імовірність яких не відома, до інтервального оцінювання з отриманням імовірнісних оцінок прийнятих рішень. Інтервальне оцінювання дозволяє робити висновки, які можуть сформульовані, наприклад, таким чином: “... новий сорт дає середній урожай 4 т/га, тому із імовірністю 95 % можна стверджувати, що за 10 років досліджень його врожайність буде не нижча, 3.5 т/га, але й не вища 4.5 т/га” [6].

При описі якісних ознак слід указати їхню природу — рангові, порядкові це ознаки, або ж номінальні чи класифікаційні, та привести значення кожної градації, рівня такої ознаки. Якщо у вибірці багато ознак, бажано показати співвідношення окремих підгруп спостережень за ознаками групування. Зазвичай це відображають у таблицях, подаючи значення частки у відсотках для спостережень по кожній підгрупі.

Необхідна точність наведення відсоткових значень залежить від обсягу вибірки.

Малі вибірки (обсягом менше 20 об’єктів) не прийнято описувати відсотками, а вказувати абсолютне значення частот.

При обсязі вибірки від 20 до 100 об’єктів відсотки подаються у вигляді цілих чисел. Якщо обсяг вибірки перевищує 100 об’єктів, то значення відсотків наводиться ре більше, ніж з одним знаком десяткового дробу. [5]

Традиційна інтерпретація рівнів значущості при перевірці нульової гіпотези представлена в табл. 7.3. Вона відображає всі варіанти можливого ставлення до гіпотези: від повної переконаності в її помилковості до визнання того, що ясні висновки проти її взагалі відсутні [123].

Таким чином, статистичні гіпотези завжди носять імовірнісний характер. Це говорить про те, що, ґрунтуючись на тій чи іншій статистиці й приймаючи нульову гіпотезу в якості робочої (чи відкидаючи її й у якості робочої, приймаючи альтернативну), дослідник може зробити помилки. Ситуації, що виникають при перевірці статистичних гіпотез, представлені в табл. 7.4.

1. Гіпотеза H_0 вірна, і вона не відкидається, тобто прийняте рішення відображає справжній стан і приймається вірна гіпотеза.

2. Гіпотеза H_0 вірна, тобто $H_0: x = y$, але вона із-за малої величини вибірки або її неякісності відкидається, і робиться помилковий висновок $x \neq y$, що викликає помилку першого роду. Імовірність зробити помилку першого роду за визначенням дорівнює рівню значущості α . Рівень значущості α — ймовірність помилки першого роду, який задається довільно.

3. Гіпотеза H_0 невірна, і вона відкидається. Знову прийняте рішення відображає справжній стан і відкидається невірна гіпотеза.

4. Гіпотеза H_0 вірна, тобто $H_0: x = y$, але в цьому випадку нульова гіпотеза неправильна й фактично $x \neq y$, проте вона не відкидається. Приймаючи її “губиться” реально існуючу відмінність варіантів дослідів. У цьому випадку допущена помилка другого роду, тобто, помилка прийняття нульової гіпотези, у той час як насправді ця гіпотеза невірна [6, 29].

Таблиця 7.3. Інтерпретація рівнів значущості при перевірці гіпотез

Величина рівня значущості (p -рівень)	Інтерпретація	Рішення
$p > 0.10$	Дані узгоджуються з гіпотезою H_0 , дані не суперечать гіпотезі, статистично значущі відмінності не виявлені	H_0 не може бути відхилена
$p \leq 0.10$	Відмінності виявлені на рівні статистичної тенденції	Невизначеність в істинності H_0
$p \leq 0.05$	Можлива значущість; є деякі сумніви в істинності гіпотези H_0 . Виявлені статистично значущі відмінності	Відхилення H_0
$p \leq 0.02$	Значущість; досить сильний доказ проти гіпотези H_0	
$p \leq 0.01$	Висока значущість; гіпотеза H_0 майже не підтверджується. Відмінності виявлені на високому рівні статистичної значущості	

Таблиця 7.4. Можливі результати при перевірці статистичних гіпотез

Фактична ситуація	H_0 – приймається	H_0 – відкидається
H_0 – вірна	Правильне рішення	Помилка першого роду (α)
H_0 – не вірна	Помилка другого роду (β)	Правильне рішення

В нормативній документації по статистичному контролю якості продукції та в управлінні якістю ймовірність визнати непридатною партію придатних виробів (тобто, зробити помилку першого роду) називають “ризиком виробника”, а ймовірність прийняти непридатну — “ризиком споживача”.

При необхідності одержання великої надійності статистично значущих відмінностей рекомендується використовувати більш глибокі методи статистичного аналізу, такі, як непараметричний дисперсійний аналіз, побудова дихотомічних вирішальних правил і логістичну регресію. Це значно підвищить результативність і надійність одержаних результатів. Отримані дані слід піддавати кількісній оцінці й представляти їх із відповідними показниками похибок виміру й невизначеності (такими як довірчі інтервали). Не слід покладатися лише на статистичну перевірку гіпотез, наприклад, на використання лише значень p , яке не відображає всієї повноти інформації.

Аналізуючи закон розподілу, зокрема, результати перевірки гіпотези про нормальність розподілу, можна обмежитися лише приведенням значення використаних критеріїв перевірки нормальності й значень фактичної ймовірності " $p = \dots$ ", але краще навести ще й графіки. Це може бути або гістограма з лінією очікуваної нормальної функції щільності чи розподілу (рис. 15.17 і 15.20), або ж графік розподілу у ймовірнісних координатах (рис. 2.10 і 2.11).

Перевага надається графіку, оскільки крім відповідності чи невідповідності нормальному статистичному розподілу тут можна спостерігати також можливі угруповання спостережень, аномальні викиди, наявність симетрії й таке інше, що заслуговує подальшого обговорення.

Якщо за результатами перевірки нормальності нульова гіпотеза була відхилена, графік дозволяє припустити, що це півнормальний статистичний розподіл. Після проведення відповідного перетворення можна знову привести аналогічний графік як свідчення правильності такого припущення.

7.2. Типи вимірювальних шкал даних

Типи вимірювальних шкал даних, за якими оцінюють ознаки досліджуваних об'єктів, відрізняють трьома основними атрибутами, наявність або відсутність яких визначає їхню приналежність до тієї або іншої категорії.

Різниця між поняттями "дані" і "ознака" у тому, що *ознака є досліджуваною характеристикою об'єкту*, наприклад, висотою. *Дані представляють собою отриманий у результаті досліджень*, тобто, набір певних результатів вимірювання ознаки, представлених як у метричній шкалі (для висоти, наприклад, у лінійних величинах), так і в неметричних (високі, середні, низькі).

Упорядкованість — позиція шкали, обумовлена числом і відповідно проявом вимірюваної властивості: більше, менше або дорівнює іншій позиції.

Інтервальність — інтервали між позиціями шкали рівні між собою.

Нульова точка (або точка відліку) — набір чисел, відповідних до прояву вимірюваної ознаки, має точку відліку, позначувану "0", яка відповідає *повній відсутності вимірюваного властивості*.

Найбільш загальною класифікацією вимірювальних шкал є поділ на **неметричні шкали** (**якісні шкали**, у яких одиниця виміру відсутня) і **метричні шкали** (**кількісні шкали**, які мають одиницю виміру — кількість у штуках, кілограм, метр, градус тощо) (рис. 7.5) [5] і табл. 7.5 [124].

До неметричних шкал відносять **номінативні**, **порядкові** [5] та **гіперпорядкові** [124] шкали.

У **номінативній шкалі** (*nominal scale*) відсутні всі головні атрибути вимірювальних шкал, а саме впорядкованість, інтервальність, нульова точка. Для позначення такої шкали також використовуються терміни **шкала найменувань**, **шкала класифікації**, **шкала категорій** і **номінальна шкала**.

Номінативна шкала використовується для класифікації або ідентифікації об'єктів (групування за класами, кожному з яких приписується число). Об'єкти групуються таким чином, щоб для всього класу вони були ідентичні за вимірюваними властивостями. Це найпростіша шкала з тих, що можуть розглядатися як вимірювальні, хоча фактично вона не асоціюється з виміром і не пов'язана з поняттями "**величина**", зафіксованого дослідом кількісної чи якісної ознаки об'єкту досліджень, і "**число**". Вона використовується тільки з метою відрізнити один об'єкт від іншого. Її різновидом є **дихотомічною**, тобто **бінарною шкалою** із класифікацією лише за двома альтернативними рівнями оцінки, наприклад, чоловіки—жінки, наявність—відсутність в т.п.

Таблиця 7.5 - Класифікація вимірюваних шкал	
Тип шкали	Назви шкал
Якісна	Найменувань
	Порядку
	Гіперпорядку
Кількісна	Інтервалів
	Різниць
	Відношень
	Абсолютна




Рис. 7.5. Типи вимірюваних шкал

При використанні номінативних шкал цифри, що кодують відповідні категорії, є лише мітками (іменами, наприклад, номер майки спортсмена) і не несуть у собі числового значення.

У **порядковій шкалі** (*ordinal scale*) наявна впорядкованість, але відсутні атрибути інтервальності й нульової точки. Її також називають **ранговою шкалою** чи **шкалою рангів**. Результатом вимірів у порядковій шкалі є впорядкування об'єктів (наприклад, зайняте місце в змаганнях). Шкала показує, більше або менше виражена властивість (вимірювана величина, наприклад, “більше”, “менше”, “дорівнює”), але не наскільки більше, або наскільки чи в скільки разів менше воно менше чи більше виражене.

Можливості статистичного аналізу для даних у порядкових шкалах обмежені, тому впорядкування — єдина математична операція для них, хоч на практиці порядкові ознаки з великою кількістю різних значень (більше 20) прийнято вважати безперервними й використовувати відповідні способи опису й методи аналізу, адекватні виду його розподілу на вибірці.

Гіперпорядкові шкали дозволяють упорядкувати числові виміри — інтервали (відстані) між об'єктами, а також знаходити найближчий і найбільш віддалений об'єкт стосовно даного об'єкта, середню величину вимірюваної властивості (медіана ряду) [124]. Їхнім прикладом може служити кластеризація (див розділ **13 Виконання кластерного аналізу**).

Кількісні дані можуть бути **дискретні**, тобто такими, що не можуть бути виражені дробом (номінативна й порядкова шкали) та суцільні — **інтервальні** й **відносні** (інтервальна й відносна шкали).

Слід зауважити, що межа між безперервними й дискретними кількісними ознаками досить умовна. Уважається, якщо число різних значень дискретного ознаки перевищує 20 розподіл також можна приблизно вважати безперервним і використовувати відповідні способи опису й методи аналізу, адекватні виду його розподілу на вибірці [5].

В **інтервальній шкалі** (*interval scale*) присутні впорядкованість і інтервальність, але немає нульової точки відліку (наприклад, температурні шкали Цельсія й Фаренгейта). У цій шкалі досліджуваному об'єкту привласнюється число одиниць виміру, пропорційне прояву вимірюваного властивості. Відповідні інтервали різних ділянок шкали мають те саме значення, тому виміри в інтервальній шкалі допускають не тільки класифікацію й представлення в ранговими значеннями, але й точне визначення відмінностей між категоріями.

Для інтервальних шкал характерна довільність вибору нульової точки (адже 0°C чи 0°F не відповідає повній відсутності тепла) [37].

У **шкалі різниць** числові виміри містять інформацію про те, на яку величину один об'єкт більше/менше іншого по вимірюваній якості. Перетворення у цій шкалі реалізуються зміною точки відліку при заданій одиниці (масштаб) виміру і можливі лише за умови відображення у відносній шкалі. де реалізуються властивості шкали зберігати різницю і де $x_{\min}=0$. Також мо-

жливе відображення у відносній шкалі, де точкою відліку є мінімальний числовий вимір [124].

У **відносній шкалі** (*ratio scale*) присутні всі атрибути вимірювальних шкал: упорядкованість, інтервальність, нульова точка. Для такої шкали також використовуються терміни **шкала відношень** і **абсолютна шкала**.

Останній термін підкреслює абсолютний характер нульової точки [37]. В **абсолютній шкалі** числові виміри дозволяють кількісно визначати абсолютні величини об'єкта, з якими можливі будь-які алгебраїчні й логічні перетворення [124].

Ця шкала дозволяє оцінювати, у скільки разів властивість одного об'єкта більше або менше аналогічної властивості іншого об'єкта, прийнятого за еталон, одиницю. Вона є найбільш інформативною й характеризується всіма атрибутами інтервальної шкали й, крім того, має фіксовану нульову точку (наприклад, маса, кількість, температурна шкала Кельвіна). У цьому випадку можна судити не тільки про те, наскільки більше або менше виражена властивість, але й у скільки раз більше або менше воно виражене. Для відносної шкали можливе коректне використання будь-яких математико-статистичних операцій і процедур обробки даних [37].

У загальному випадку для обробки даних, одержаних у дискретних шкалах використовуються непараметричні методи (див. підрозділ **7.4 Обчислення непараметричних критеріїв**).

Рекомендацій вибору ряду статистичних критеріїв у відповідності з типом вимірювальних шкал наведено в табл. 7.6 [37] і табл. 7.7 [25].

Таблиця 7.6. Основні критерії статистичної оцінки і об'єкти їхнього застосування

Тип шкали	Одна вибірка	Дві вибірки		Більше 2-х вибірок	
		залежні	незалежні	залежні	незалежні
Номінативна	Одновибірковий χ^2	Тест Мак-Немара	Двовибірковий χ^2	Q -тест Кохрена	Багатовибірковий χ^2
Порядкова	Одновибірковий тест Колмогорова-Смирнова	Тест Уїлкоксона	U-критерій Манна-Уїтні	Критерій χ^2 Фрідмана	Тест Краскела-Уоллеса
			Двовибірковий тест Колмогорова-Смирнова		
		Критерій знаків	Критерій серій Вальда-Вольфовиця		
Метрична	t -критерій Стьюдента	t -тест для залежних вибірок	t -критерій для незалежних вибірок	Дисперсійний аналіз з повторними вимірюваннями	Дисперсійний аналіз
	z -тест		z -тест		

Перелічені шкали варто характеризувати ще й за ознакою їх диференціюючої здатності (потужністю). Щодо цього шкали в міру зростання потужності розташовуються в таким чином: **номінативна, рангова, інтервальна, абсолютна**.

Таким чином, неметричні шкали менш потужні — вони містять менше інформації про відмінність досліджуваних об'єктів за обмірюваною властивістю, і, навпаки, метричні шкали більш потужні, вони краще диференціюють отримані результати. Тому, якщо у дослідника є можливість вибору, слід застосувати більш потужну шкалу.

Однак завжди можна перейти від більш потужної шкали до менш потужної. Так, безперервні змінні можна штучно перетворити в категоріальні, прикладом є позначенням розміру одягу чи взуття.

Таблиця 7.7 – Вибір методу для вирішення задачі про порівняння параметрів розподілу вибірок

Формулювання завдання у прикладній постановці	Формулювання завдання у статистичній постановці	Додаткові умови		Уживаний метод
Порівняння показників контрольної та експериментальної вибірок	Перевірка гіпотези про рівність середніх, тобто центрів розподілу [*] , у двох незалежних вибірках	Нормальний закон статистичного розподілу	Дисперсії вибірок рівні	t -критерій (Ст'юдента) при рівних дисперсіях, п-р. 7.3.7.3.1, 7.3.7.3.2, 7.3.7.11.1, 7.3.7.11.2, 7.3.7.11.4, 7.3.7.12.2
			Дисперсії вибірок не рівні	t -критерій (Ст'юдента) при нерівних дисперсіях, п-р. 7.3.7.4.1, 7.3.7.4.2, 7.3.7.4.4, 7.3.7.4.5, 7.3.7.11.1, 7.3.7.11.2, 7.3.7.11.4, 7.3.7.12.3
			Без припущень про дисперсії (але при однаковому розмірі вибірок)	t -критерій (Ст'юдента) без припущень про дисперсії, п-р. 7.3.7.9
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	Дисперсії вибірок рівні	Тест Вайєра, п-р. 7.3.7.13
				Манна-Уїтні (U -критерій Уїлкоксона-Манна-Уїтні), п-р. 7.4.2.1
			Дисперсії вибірок не рівні	Двовибірковий Уїлкоксона Медіанний тест, п-р. 7.4.3.2

Формулювання завдання у прикладній постановці	Формулювання завдання у статистичній постановці	Додаткові умови	Уживаний метод
Порівняння показників вибірки до і після експерименту	Перевірка гіпотези про рівність середніх у двох залежних вибірках	Нормальний закон статистичного розподілу	t -критерій (Ст'юдента) для пов'язаних вибірок, п-р. 7.3.7.6.2, 7.3.7.6.5, 7.3.7.11.3
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	Знаковий, одновибірковий критерій Уїлкоксона, п-р. 7.4.3.3
Чи можна вважати, що середнє значення показника дорівнює деякому номінальному значенню?	Перевірка гіпотези про рівність середнього константи	Нормальний закон статистичного розподілу	t -критерій (Ст'юдента) п-р. 7.3.7.2.1, 7.3.7.2.2
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	Гупта, знаковий
Порівняння розсіювання показника у двох вибірках	Перевірка гіпотези про рівність дисперсій (про приналежність дисперсій до однієї генеральної сукупності)	Нормальний закон статистичного розподілу	F -критерій (Фішера–Снедекора), п-р. 7.3.3.1, 7.3.3.2, 11.9.4.3
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	t -критерій (Ст'юдента), п-р. 7.3.4
			Критерій Зігеля–Тюкі
			Критерій Мозеса

Формулювання завдання у прикладній постановці	Формулювання завдання у статистичній постановці	Додаткові умови	Уживаний метод
Чи можна вважати, що у кількох вибірках має місце одне й те ж значення показника?	Перевірка гіпотези про рівність середніх (про приналежність середніх до однієї генеральної сукупності)	Нормальний закон статистичного розподілу	Критерій Шеффе, п–р. 10.9.4
			Критерій Діксона, п–р. 5.12.3.1
			Однофакторний дисперсійний аналіз, п–р. 10.4.3.2.1, 10.4.3.2.2
			НІР , п–р. 7.3.7.8, 10.9.2
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	Критерій Краскела–Уоллеса, п–р. 10.11.2.2, 10.11.2.3
			Медіанний тест, п–р. 7.4.3.2
Рангових сум Фрідмана, п–р. 10.11.1.1, 10.11.1.2			
Чи можна вважати, що в кількох вибірках має місце одне й те ж значення розсіювання показника	Перевірка гіпотези про рівність дисперсій (про приналежність дисперсій до однієї генеральної сукупності)	Нормальний закон статистичного розподілу	G -критерій Кохрена при однаковому розмірі вибірок, п–р. 11.9.4.1 ;
		Закон розподілу відмінний від нормального, або дані вимірюються в дискретній шкалі	Критерій Бартлетта, п–р. 11.9.4.2
			Критерій Фрідмана, п–р. 10.11.1
*) У ряді випадків фактично перевіряється гіпотеза про рівність медіан або ж обох мір положення			

7.3. ВИКОРИСТАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ

7.3.1. Загальні положення

Дві чи більше різні вибірки називаються статистично однорідними, якщо вони однаково розподілені. Перевірка “гіпотез однорідності” в математичній статистиці займає особливе місце. Цей факт пов’язаний з тим, що при аналізі отриманих результатів досліджень, як правило, проводиться порівняння двох (і більше) груп спостережень.

Порівнювати отримані вибірки можна абсолютно різними способами: дослідника може цікавити відмінність їхніх *середніх, медіан, дисперсій* при різноманітних припущеннях щодо самих спостережень.

До кількісних ознак належать *безперервні* й *дискретні* (див. рис. 7.5 на с. 351). Дискретні ознаки займають умовно проміжне положення між безперервними і якісними порядковими. Методи аналізу безперервних ознак можуть застосовуватися й для аналізу дискретних ознак за умови, що число можливих значень дискретності ознаки досить велике.

Статистичний аналіз не може відповісти на питання “Чи випадкові відмінності між вибірками”? Ґрунтуючись на нульовій гіпотезі, він може відповісти на близьке питання: “Яка ймовірність помилки, якщо вважати, що вибірки розрізняються, хоча насправді різниця між ними відсутня”?

Останнім часом у дослідженнях використовуються два підходи до порівняння двох груп за кількісною ознакою:

- з використанням довірчих інтервалів (точкове оцінювання);
 - шляхом перевірки статистичних гіпотез (інтервальне оцінювання).
- Вибір відповідного методу порівняння визначається факторами:
- числом зіставляються груп;
 - залежністю або незалежністю вибірок (груп);
 - видом розподілу ознак [5].

При порівнянні вибірок із використанням довірчих інтервалів визначається чи укладаються вибіркові дані в його межі; при перевірці за допомогою перевірки статистичних гіпотез обчислюється значення p — ймовірність того, що нові випадкові вибірки з тих же популяцій будуть різнитися в тій же чи більшою мірою, якщо нульова гіпотеза (про відсутність відмінностей між популяціями) вірна.

Параметричні критерії застосовуються при порівняння двох вибірок за ознакою, вимірюваною в метричній шкалі. При цьому розподіл ознаки в вибірках повинно приблизно відповідати нормальному.

7.3.2. Принципи розрахунку при оцінці вибірок

Порівнювані вибірки нерідко представляють собою ряди попарно зв'язаних варіант, наприклад, урожайність одного сорту за роками досліджень, таким чином, вони є *залежними вибірками*. Також це може бути порівняння із сортом–стандартом, чи середніми значеннями в експерименті (адаптивною нормою).

Вибираючи тип критерію, використовуваного для порівняння залежних або незалежних вибірок, необхідно враховувати умови залежності / незалежності вибірок:

а) можна логічно визначити тип вибірки — наприклад:

— якщо порівнюються представники однієї і тієї ж соціальної, навчальної, професійної і т.п.

— групи, які знаходяться в постійній взаємодії один з одним (дівчатка і хлопчики в класі, працівники з різним стажем роботи в одній установі, подружжя, діти тощо), то вибірки є залежними;

— якщо порівнюються представники різних груп, в обмеженому обсязі взаємодіють один з одним (учні різних класів, вчителі та лікарі, діти з повних і неповних сімей тощо), то вибірки є незалежними;

б) якщо немає можливості однозначно визначити ступінь залежності порівнюваних груп, то слід використовувати методи кореляційного аналізу:

— якщо між порівнюваними вибірками спостерігається пряма кореляція, то вибірки є залежними;

— якщо між порівнюваними вибірками рівень кореляції нижче або дорівнює середньому ($r \leq 0.69$), то вибірки є незалежними.

Умови застосовності методу полягають у тому, що пари об'єктів дослідження повинні бути випадково вибрані з генеральної сукупності чи репрезентативні; різниці значень досліджуваної ознаки пари об'єктів дослідження в генеральній сукупності повинні бути розподілені нормально.

7.3.3. Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій

7.3.3.1. Розрахункове виконання двовибіркового F -тесту за критерієм Фішера–Снедекора

Даний метод дозволяє перевірити гіпотезу про те, що дисперсії 2-х генеральних сукупностей, з яких вилучені порівнювані вибірки, статистично не відрізняються одна від одної. Він може застосовуватися і для перевірки припущення про *гомоскедастичність* тобто статистичну рівність (*гомогенність*) дисперсій перед перевіркою достовірності відмінності середніх за

критерієм Стьюдента для незалежних вибірок різної і однакової чисельності.

Нульова гіпотеза у цьому разі неспрямована, тобто $H_0: s_1^2 = s_2^2$, альтернативна — $H_A: s_1^2 \neq s_2^2$ [33] (більш докладно про критерій Фішера див. розділ 10. Дисперсійний аналіз).

При аналізі за критерієм Фішера–Снедекора обчислюють відношення (3.48). Далі за табл. В.7–В.9 визначається критичні значення розподілу. Оскільки *критична область двобічна*, нульова гіпотеза приймається при подвійному зниженні рівня значущості $\alpha/2$ для критерію Фішера, тобто за умови $F < F_{\alpha/2}(v_1, v_2)$ при даних ступенях вільності. Тут слід звернути увагу на виконання умови **Ф.ОБР.ПХ**($\alpha/2; v_1; v_2$)=**Ф.ОБР**($1-\alpha/2; v_1; v_2$) (див. с. 158).

Для прикладу виконаємо порівняльний аналіз дисперсій кількості стручків на центральній гілці колекції сортозразків із сортом–стандартом у 2004 р., тобто порівняння отриманої вибірки з контрольною (табл. 7.8). Числові дані колекції взято з табл. 2.10, с. 95, чарунки **AR3:AR102**, а сорту–стандарту — з табл. 2.8, чарунки **DD3:DD13**, представленої на с. 93.

При застосуванні **Excel** оцінка рівності дисперсії s_1^2 і s_2^2 вибірок за критерієм Фішера за виразом (3.48) виконується із використанням статистичних **СЧЁТ**, **ДИСП.В**, **Ф.ОБР.ПХ** (див. Додаток А і відповідно с. 45, 51 і 562), наведених на полі табл. 7.8 червоним кольором. Причому, при розрахунку виразом (3.48) значення чисельника завжди більше за знаменник.


Процес розрахунків ясно з виразів на полі табл. 7.8.

Так як для двобічного критерію тобто $F=1.0819 < F_{\alpha/2}(v_1, v_2)=2.1086$, вибірккові дисперсії на прийнятому рівні значущості $\alpha=0.05$ є оцінками однієї генеральної сукупності, статистично рівні між собою, тобто однорідні.

Альтернативою порівняння дисперсій є критерій Левена, який не залежить від припущення про нормальність розподілів, тому не потребує цієї перевірки і застосовується в різних комп'ютерних програмах [123], зокрема в ППП **Statistica** (див. табл. 7.30 і 7.31 на с. 402 та 7.32 і 7.33 на с. 403).

Таблиця 7.8. Результати однорідності декількох дисперсій за критерієм Фішера–Снедекора		
	А	В С
1		Стандарт-2004 Колекція-2004
2		39.9 30.4
3		36.7 30.1
4	B102=ДИСП.В(B2:B101)	23.3 23.3
10	C102=ДИСП.В(C2:C101)	26.3 25.1
11	B103=СЧЁТ(B2:B101)-1	27.1 30.1
12	C103=СЧЁТ(BC:C101)-1	28.4 23.2
13	B105=B102/C102	27.6
14	B106=F.РАСП.ПХ(B105;B103;C103)	10.4
99	B107=F.ОБР.ПХ(B104;B103;C103)	20.8
100	B108=F.ОБР.ПХ(B104/2;B103;C103)	28.6
101		23.4
102	Дисперсія s^2	24.911 23.025
103	Ступінь вільності ν	10 99
104	Рівень значущості α	0.05
105	Розрахунковий критерій Фішера F_Φ	1.0819
106	Рівень значущості критерію Фішера p	0.3834
107	Однобічний критерій Фішера F_{α_T}	1.9277
108	Двобічний критерій Фішера $F_{\alpha/2_T}$	2.1806

7.3.3.2. Визначення гомоскедастичності двовибірковим F -тестом за критерієм Фішера–Снедекора ПА MS Excel



Характеристикою “розмаху” розподілу нормальної моделі є дисперсія. Наприклад, якщо потрібно перевірити гіпотезу про відсутність відмінностей у дисперсіях двох вибірок, не роблячи абсолютно ніяких припущень щодо значень їхніх середніх.

Таке завдання може виникнути, наприклад, при порівнянні точності двох приладів, для яких дисперсія є мірою випадкової похибки, яку прибрати майже ніколи не представляється можливим. У зв’язку з цим виконання перевірки рівності дисперсій (наприклад, при порівнянні еталонного приладу і перевіряється) стає досить актуальною. Саме для її рішення і служить F -тест.

Для проведення двовибіркового F -тесту для дисперсій за критерієм Фішера–Снедекора інструментом Excel [Двухвыборочный F-тест для дисперсии] взяті дані, як і для табл. 7.8, с. 360. Даний інструмент Excel призначений для порівняння дисперсій двох експериментальних вибірок за критерієм згоди Фішера–Снедекора. Відповідно, вікна [Интервал переменной 1] і [Интервал переменной 2] призначені для двох діапазонів даних, розташованих на листі Excel. При цьому під. діапазоном поданнях однієї вибірки розуміються результати, представлені в одному стовбці чи рядку.

Порядок дії й отримані результати наведено на полі рис. 7.6 червоними цифрами. При виконанні тесту слід натиснути [Данные] (1), потім [Анализ данных] (2) (рис. 2.4, с. 100) і на панелі [Анализ данных] з [Инструменты анализа] вибрати [Двухвыборочный F-тест для дисперсии] (3) і натиснути ОК (4).

На відкритій панелі [Двухвыборочный F-тест для дисперсии] у [Входные данные] слід активізувати [Метки] (5) для включення в дані заголовків, задати рівень статистичної значущості (порогові значення) α [Альфа: 0.05] (6) (див. с. 339), указати [Интервал переменной 1:] (7) і [Интервал переменной 2:] (8), у [Параметры вывода] призначити вивід результатів на [Новый рабочий лист:] (9) та натиснути ОК (11).

Відредагована таблиця результатів має вигляд (табл. 7.9).

Так як порівняння при $\alpha=0.05$ виконується лише для правобічних гіпотез (як звичайно для F -критерію), тому нульова гіпотеза спростовується за умови $F \geq F_{\text{критическое одностороннее}}$, тобто $P(F \leq f)_{\text{одностороннее}} \leq \alpha=0.05$. У даному разі нульова гіпотеза не спростовується.

При проведенні оцінки за **двобічним критерієм** приймаємо $\alpha=0.025$. Для цього необхідно у вікні інструменту аналізу — крок (6) на рис. 7.6, встановити рівень значущості α **удвічі менший**.

У результаті розрахунку нульова гіпотеза також не спростовується.

Результати, наведені в табл. 7.9 і 7.8 (с. 360) повністю співпадають.

Таблиця 7.9. Перевірка відмінностей дисперсій інструментом $\alpha=0.05$ — при $\alpha=0.05$		
Показник	Стандарт-2004	Колекція-2004
Среднее	30.60118523	26.44957665
Дисперсия	24.9107206	23.02472056
Наблюдения	11	100
df	10	99
F	1.081911962	
$P(F \leq f)_{\text{одностороннее}}$	0.383391812	
F критическое одностороннее	1.92767929	
— при $\alpha=0.025$		
Показник	Стандарт-2004	Колекція-2004
Среднее	30.60118523	26.44957665
Дисперсия	24.9107206	23.02472056
Наблюдения	11	100
df	10	99
F	1.081911962	
$P(F \leq f)_{\text{одностороннее}}$	0.383391812	
F критическое одностороннее	2.180635868	

7.3.4. Оцінка розбіжності між дисперсіями за t -критерієм Стьюдента

При статистичному аналізі вибірових спостережень часто виникає необхідність оцінити істотність відмінності між дисперсіями, так як застосування ряду критеріїв базується на припущенні про рівність дисперсій порівнюваних розподілів. Відмінності між дисперсіями вибірових спостережень оцінюють також в тих випадках, коли необхідно визначити істотність відмінності в ступені варіювання однієї й тієї ж ознаки в декількох сукупностях або різних ознак в одній і тій же вибірці. Нарешті, на оцінці відмінностей дисперсій побудований важливий статистичний метод, який отримав назву дисперсійного аналізу, або аналізу розсіювання.

Дисперсії вибірок, проведених з однієї і тієї ж генеральної сукупності, є оцінками генеральної дисперсії. Вибіркові дисперсії не тільки характеризують міру коливання ознаки, а й самі схильні до мінливості, джерела якої — особливості вибіркового методу. Похибка вибіркового середнього квадратичного відхилення обчислюється за формулою (1.63).

Коли вибірки досить великі і розподіл має форму, незначно відрізняється від нормальної, **розбіжність між дисперсіями можна вважати**

суттєвим, якщо різниця між дисперсіями перевершує свою похибку в 3 і більше разів, тобто за умови [50]

$$t = \frac{s_1 - s_2}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2}} \cdot \sqrt{\frac{2n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}} > 3. \quad (7.1)$$

За даними, наведеними в табл. 7.8 отримуємо

$$t = \frac{24.912 - 23.025}{\sqrt{24.912^2 + 23.025^2}} \times \sqrt{\frac{2 \times 11 \times 100}{11 + 100}} = 1.102$$

Так як маємо $t = 1.102 < 3$ вибіркві дисперсії є оцінками однієї генеральної сукупності, статистично рівні між собою, тобто однорідні.

7.3.5. Порівняння середніх при відомих дисперсіях

Нехай виконано n_1 незалежних рівноточних вимірювань в першій серії і n_2 у другій, причому заздалегідь відомі дисперсії помилок в першій і в другій серіях (σ_1^2 і σ_2^2 відповідно). Середні значення результатів вимірювань в першій і в другій серіях позначимо відповідно через \bar{x}_1 і \bar{x}_2 . Для вирішення питання про випадковий або не випадковий розбіжності цих середніх значень підраховуємо відношення

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}}. \quad (7.2)$$

Далі задаємо бажаний рівень значущості α і за статистичною функцією MS Excel **=НОРМ.СТ.ОБР($\alpha/2$)** знаходимо відповідне значення t_α .

За умови $t \geq t_\alpha$ розбіжність середніх значень можна вважати не випадковим (значущим) з надійністю рівнем значущості α . У іншому випадку немає підстав вважати розбіжність статистично значимою, тобто їх можна пояснити випадковими відхиленнями.

Якщо дисперсії похибок для обох серій вимірювань статистично однакові, тобто $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, то відношення (7.2) зводиться до виразу [31]

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}. \quad (7.3)$$

7.3.6. Застосування z-критерію для середніх арифметичних

7.3.6.1. Розрахунковий метод z-тесту

Найпростішим параметричним методом перевірки статистичних гіпотез є z-тест (z-критерій). Цей метод може використовуватися при виконанні базових припущень про нормальність розподілу та представленості даних в метричній шкалі.

Розглянемо спочатку випадки однієї вибірки. Як ми вже знаємо, емпіричне значення z-критерію показує, наскільки вибіркове середнє \bar{x} відрізняється від середнього генеральної сукупності μ в одиницях стандартного відхилення σ_x , і визначається за формулою

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_x}. \quad (7.4)$$

Причому сукупності μ може також бути і довільною константою.

У разі формування вибірки методом випадкового повторного відбору обсягом n використовується формула (3.45) у вигляді

Нульову гіпотезу записуємо у неспрямованому вигляді $H_0: \bar{x} = \mu$. При розрахунках емпіричного значення z використовуємо статистичну функцію MS Excel **НОРМ.СТ.РАСП**. Беручи до уваги, що ця функція повертає значення одностороннього критерію і визначає площу функції розподілу від z і до 0 остаточно

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}. \quad (7.5)$$

Таблиця 7.10 – Розрахунок параметрів z-критерію

	A	B	C
1	B142=CP3НАЧ(B2:B141) B143=ДИСП.Г(B2:B141)	Колекція-2004	Колекція-2005
2	B144=СЧЁТ(B2:B141)-1	30.4	37.9
3	B146=(B143/B144+C143/C144)^0.5 B147=ABS(B142-C142)/B146 B148=НОРМ.СТ.ОБР(1-B145/2) B149=2-2*НОРМ.СТ.РАСП(B147;ИСТИНА)		39.0
138			22.1
139			39.3
140			
141			
142	Середнє значення	26.5	36.3
143	Дисперсія σ^2	22.74	44.06
144	Ступінь вільності ν	100	139
145	Рівень значущості α	0.05	
146	Загальний стандартний відхил σ	0.73778	
147	Розрахункове z	13.24021	
148	z критичне двобічне	1.959963985	
149	$P(Z \leq z)$ двобічне	0.000000E+00	

формулу маємо у вигляді **2-2*НОРМ.СТ.РАСП(\bar{x} ; истина)**, яка й використовується для визначення рівня значущості (власне, це формула (1.79).

Якщо вибірки мають порівняно великий розмір (сумарна кількість спостережень у двох вибірках перевищує 100), то розподіл різниць середніх значень $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$ вибірок обсягом n_1 і n_2 буде досить близький до нормального і для встановлення критичних областей можна використовувати криву нормального розподілу. У випадку

двох вибірок емпіричне значення g визначається за формулою

$$z = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sigma_{x_1 - x_2}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\sigma_1^2/(n_1 - 1) + \sigma_2^2/(n_2 - 1)}}. \quad (7.6)$$

Ця формула подібна виразу (7.4) і розраховується аналогічно [37].

Виконаємо порівняльний аналіз експериментальних середніх — кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–2005 рр., тобто порівняння двох вибірок табл. 7.10.

Числові дані колекції взято з табл. 2.11 (с. 96) чарунки **S3:S103** і **W3:W142**. Перевірка виконується за розрахунковими формулами, наведеними на полях табл. 7.10.

Маємо виконання умови $z > z_{\alpha(v)}$ і $t > t_{\alpha(v)}$ (z і t —статистика відповідно більше ніж z і t критичне двобічне), що свідчить про істотну відмінність між досліджуваними вибірками [37, 53].

7.3.6.2. Двовибірковий z -тест для середніх арифметичних

На рис. 7.7 наведено порівняльного аналізу тих же показників, виконаний за допомогою **Двухвыборочный z-тест для средних** пакету аналізу **MS Excel** (червоними цифрами на полі рисунка представлено порядок дій при виконанні розрахунку) за даними табл. 7.14, с. 375.




Рис. 7.7. Порядок застосування інструменту **MS Excel**

Двухвыборочный z-тест для средних

Для розрахунків використовуються ті ж самі дані, що й у двох вищенаведених розділах. Особливістю тесту є необхідність попереднього визначення дисперсій порівнюваних показників. Вони розраховуються як представлено в табл. 7.14, с. 375.

При роботі слід вибрати меню **Данные** (1), вказати **Анализ данных** (2) і на виниклій панелі **Анализ данных** у вкладці **Инструменты анализа** вибрати **Двухвыборочный z-тест для средних** (3) та натиснути **ОК** (4). На відкритій панелі **Двухвыборочный z-тест для средних** у вкладці **Входные данные** слід активізувати ☒ **Метки** (5) для включення в дані заголовків, задати рівень статистичної значущості (порогові значення) **Альфа: 0.05** (6) (див. с. 339).

Далі слід задати **Интервал переменной 1:** (7) **Интервал переменной 2:** (8) змінних, вручну ввести отримані дані дисперсії першої **Дисперсия переменной 1 (известная):** і другої **Дисперсия переменной 2 (известная):** змінної (10), визначені відповідно до рис. 7.16 і табл. 7.37. У **Параметры вывода** призначити вивід результатів на ☒ **Новый рабочий лист:** (9) та натиснути **ОК** (11). За **Гипотетическая средняя разность:** приймається **нуль**, який можна не вводити.

Пакет аналізу **MS Excel** створить таблицю результатів, яка після редагування подана в табл. 7.11.

Критичні значення в ній — $P(Z \leq z)$. Щоб спростувати нульову гіпотезу вони повинні бути нижче, ніж уведене критичне значення **Альфа: 0.05** (6 на рис. 7.7). Тут, як і в t -тестах, якщо середні арифметичні не рівні, використовується $P(Z \leq z)$ **двухстороннее**, $P(T \leq t)$ **одностороннее** приймається при перевірці припущення про те, що одне із них менше, або більше іншого [25].

Таблица 7.11. Проверка відмінностей вибірок застосуванням

Двухвыборочный z-тест для средних

	Колекція-2004	Колекція-2005
Среднее	26.49068168	36.25908415
Известная дисперсия	22.74	44.06
Наблюдения	101	140
Гипотетическая разность средних	0	
z	-13.29480105	
$P(Z \leq z)$ одностороннее	0	
z критическое одностороннее	1.644853627	
$P(Z \leq z)$ двухстороннее	0	
z критическое двухстороннее	1.959963985	

Так як порівнюється лише правобічна гіпотеза, тобто нульова гіпотеза спростовується за умови $z \geq$ **z критическое двухстороннее**, тобто $P(T \leq t)$ **двухстороннее** \leq **Альфа: 0.05**, так як $P(Z \leq z)$ **двухстороннее** $>$ $P(T \leq t)$ **одностороннее** і відповідно **z критическое двухстороннее** $>$ **z критическое одностороннее**.

З даних табл. 7.10 і 7.11 видно, що отримані значення співпадають.

7.3.7. Використання t -критерію Стюдента для середніх арифметичних

7.3.7.1. Вимоги до застосування t -критерію

Одним із звичайних завдань дослідження є порівняння арифметичних середніх двох груп (наприклад, експериментальної та контрольної). Класичним методом, що дозволяє його вирішувати, є t -тест Стюдента, чи просто t -тест. Нульова гіпотеза, яка перевіряється в ході даного тесту, полягає в тому, що обидві порівнювані групи походять з однієї генеральної сукупності; іншими словами, відмінності, що спостерігаються між середніми значеннями порівнюваних вибірок випадкові і не викликані дією досліджуваного фактору, тобто $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$. Тест Стюдента відноситься до групи параметричних методів аналізу, тому його застосування вимагає виконання трьох умов: [120]:

- обидві вибірки повинні підлягати нормальному закону розподілу;
- між дисперсіями вибірок не повинно бути статистично значущої різниці (однорідність дисперсій);
- обидві вибірки повинні бути незалежними, тобто властивості однієї з них ніяк не повинні бути пов'язані з властивостями іншої (кореляція повинна бути нижче $r \leq 0.69$ (див. с. 359).

Таким чином, проведенню t -тесту Стюдента *повинні передувати*:

- перевірка нормальності розподілу вибірок, виконувана за підрозділом **6 Перевірка нормальності статистичного розподілу оцінюваних вибірок**);

- перевірка статистичної рівності дисперсій, викладена в підрозділах

7.3.7.12.2 Виконання двовибіркового t -тесту із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel та 7.3.7.11 Виконання t -тесту Стюдента з використанням ППП Statistica).

- перевірка на відсутність сильної лінійної взаємної кореляції порівнюваних вибірок (див. підрозділ **9.2.1 Лінійна кореляційна залежність**), яка повинна бути не більше ніж 0.69 (див. с. 359).

7.3.7.2. Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стюдента)

7.3.7.2.1. Розрахунковий метод оцінки за одновибірковим t -критерієм Стюдента

Статистичний t -критерій Стюдента використовується для гіпотез, які ґрунтуються на порівнянні за цим розподілом. Найбільш часто його застосування пов'язане з перевіркою рівності середніх значень двох вибірок ¹⁰⁾.

Бувають випадки, коли треба перевірити відхилення середнього \bar{x} від наперед заданого фіксованого числа x_0 , наприклад, відмінність значень параметрів, які характеризують предмет чи процес, від заданого технічними вимогами чи технологічним регламентом оптимального значення [29], а то й навіть, від одиничного вимірювання, отриманого без повторення.

Рішення залежить від того, який розподіл досліджуваної вибірки — нормальний, чи відмінний від нормального або невідомий.

Тоді за *умови нормального розподілу вибірки* нульовою гіпотезою H_0 , яка перевіряється, є рівність середнього арифметичного параметрів із регламентним, тобто умова $H_0: \bar{x} = x_0$ при неспрямованій альтернативі $H_0: \bar{x} \neq x_0$.

Оцінка за допомогою *довірчого інтервалу (інтервальне оцінювання)* для середнього арифметичного застосовується при нормальному розподіленню ознаки. У цьому разі межі довірчого інтервалу для середнього арифметичного становлять від $\bar{x} - t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}}$ і до $\bar{x} + t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}}$. Якщо він включає задане фіксоване числа x_0 , тобто $\bar{x} - t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}} < x_0 < \bar{x} + t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}}$, то з певною часткою впевненості (відповідно прийнятому довірчому коефіцієнту α) можна вважати, що вибірка статистично значуще не відрізняється від генеральної сукупності. У нашому випадку ця умова не виконується.

При оцінці *перевіркою гіпотези (точкове оцінювання)* слід застосувати t -критерій Стюдента. При цьому як завжди перевіряється нульова гіпотеза про відсутність відмінностей середніх.

Розрахункова формула критерію Стюдента представляється виразом

$$t = \frac{|\bar{x} - x_0|}{s/\sqrt{n}} = \frac{|\bar{x} - x_0|}{s_{\bar{x}}}, \quad (7.7)$$

де $s_{\bar{x}}$ — похибка середнього вибірки, див. (1.63) на с. 54.

¹⁰⁾ Також точковою оцінкою є оцінка різниці середніх вибірок з використанням НІР, яка ґрунтується на t -критерію Стюдента (див. 10.9.2 Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми).

Перевірка проводиться зіставленням обчисленого значення t із табличним $t_{\alpha(v)}$ при $v=n$ (див. с. 51). За умови $t \geq t_{\alpha(v)}$ нульова гіпотеза відхиляється.

Як приклад розглянемо порівняння кількості стручків на центральній гілці даних колекції 2004 р.— *Колекція-2004* (чарунки C2–C101) з константою x_0 — середнім вибірки *Стандарт-2004* (чарунка B102, табл. 2.11 на с. 96). Тут у розрахунках, наведених на полі табл. 7.12 середньоквадратичний відхил s знаходиться за статистичною функцією MS Excel **СТАНДОТКЛОН.В**; критичне значення критерію Стьюдента $t_{\alpha(v)}$, — **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**; розрахунковий (фактичний) рівень значущості p — **СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х**; гранична похибка вибіркової середньої $t_{\alpha(v)}s_{\bar{x}}$ — **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ** (Додаток А).

Таблиця 7.12. Оцінка відхилення середнього від фіксованого значення

	А	В	С
1	Показник	Стандарт-2004	Колекція-2004
2	C102=CPЗНАЧ(C2:C101) C103=ДИСП.Г(C2:C101) C104=СЧЁТ(C2:C101) C105=СТАНДОТКЛОН.Г(C2:C101) C108=(C106*C104^0.5)/C105 C106=ABS(B102-C102) C109=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(C107;C104) C110=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(C108;C104) C111=ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(C107;C105;C104) C112=C102-C111 C113=C102+C111		
101			23.4
102	Середнє \bar{x}	30.601	26.450
103	Дисперсія s^2		22.794
104	Обсяг вибірки n		100.000
105	Стандартний відхил s		4.774
106	Різниця середніх Δ		4.152
107	Рівень значущості α		0.05
108	Критерій Стьюдента розрахунковий t_p		8.696
109	Критерій Стьюдента табличний t_T		1.984
110	Рівень значущості p		7.086E-14
111	Довірчий інтервал $s_{cp} \cdot t_T$		0.947
112	Нижня межа довірчого інтервалу $\Delta - s_{cp} \cdot t_T$		25.502
113	Верхня межа довірчого інтервалу $\Delta + s_{cp} \cdot t_T$		27.397

Так як середнє значення сорту–стандарту лежить за межами довірчого інтервалу даних колекції, можна зробити висновок, що різниця між вибірками статистично значуща із прийнятою ймовірністю 95 %, тобто існує істотна відмінність між колекцією й сортом–стандартом.








Це підтверджується також результатами оцінки t –критерію Стьюдента, яка свідчить $t > t_{05(100)}$, відповідно $p < \alpha$. Із цього можна зробити висновок, що різниця між вибірками статистично значуща з імовірністю 95 %, тобто існує істотна відмінність між колекцією й сортом–стандартом. Так як $t > 0$, показник стандарту більший за показник колекції.









При текстовому або табличному представленні результатів інтервального оцінювання слід наводити фіксоване число x_0 , обсяг n , середньоарифметичне \bar{x} і середній квадратичний відхил s вибірки, прийнятий рівень значущості α , похибку результатів вимірювання $t_{\alpha(v)_T} \cdot s_{\bar{x}}$; при представленні результатів точкового оцінювання слід наводити фіксоване число x_0 , обсяг n і середньоарифметичне \bar{x} вибірки, назву критерію та отримане точне значення розрахункового рівня значущості p [5].









7.3.7.2.2. Порівняння вибіркової середньої з константою використанням ППП Statistica











Порівняння вибіркової середньої з константою використанням одновибіркового t -критерію

Для порівняння двох вибірок — *Колекція–2004* (чарунки **S3–S102**) і *Колекція–2005* (чарунки **W3–W139**) з константами — середніми вибірок *Степовий 1–2004* (чарунка **S103**) і *Степовий 1–2005*, (чарунка **W142**) взятими з табл. 2.11 на с. 96.

Розрахунки виконуються з використанням ППП Statistica у меню  /  використовується модуль  /  , далі вибираємо  — t -тест для середніх, розрахованих по одній вибірці) і потрапляємо на панель  / .

У вкладці  /  натискаємо  /  (1) відкриваємо вікно вибору змінних  /  , вказуємо досліджувані вибірки (2) і натиснувши **ОК** (3), повертаємося на панель  /  (рис. 7.8).

Тут слід задати рівень статистичної значущості (порогові значення)  /  (4), можна активізувати поле  /  (5), задати виведення і рівень довірчого інтервалу  /  (6) і включення в звіт розрахунку критерію  /  (7).

Далі при порівнянні однієї вибірки з константою відмічаємо  /  (8) і задаємо значення константи, при порівнянні з декількома вибірками відмічаємо  /  (8), натискаємо  /  (9) і задаємо значення двох констант (10), які порівнюються з відповідними вибірками, вставляючи дані із чарунок **S103** і **W142** табл. 2.11 на с. 96 та натискаємо **ОК** (11). Причому вибірки можна порівнювати також і із загальною константою, установивши у полі  /  необхідну величину  /  (10). Натисненням **ОК** (11) і **ОК** (12) отримуємо табл. 7.13.




Рис. 7.8. Діалогове вікно при оцінці відхилення середніх арифметичного вибірок від фіксованих значень

Таблиця 7.13. Оцінка відхилення середніх вибірок від фіксованих значень

Переменная	Сравнение выборочных средних с константой (Биометрия) T2(построчн.ПД)=112,926 F(2,98)=55,893 p<,00000									
	Среднее	Стд.от.	N	Стд.ош.	Доверит. -95,000%	Доверит. +95,000%	Константа Constant	t-знач.	Ст.св.	p
Колекція - 2004	26,44958	4,798408	100	0,479841	25,49747	27,40168	30,60119	-8,65205	99	9,4361E-14
Колекція - 2005	36,23756	6,680473	139	0,566630	35,11716	37,35796	39,25133	-5,31876	138	4,1102E-07

Імовірність відкинути нульову гіпотезу про те, що вибіркові середні не відрізняється від контрольних величини менше заданого рівня, тобто $p < 0.05$, тобто середні кількості стручків на центральній гілці статистично менше константи (середнього значення сорту–стандарту).

Застосування тестового інструменту ППП Statistica

При застосуванні t -критерій Стьюдента з використанням для оцінки відхилення середнього арифметичного від безпомилкового числа тестовим інструментом ППП **Statistica** у меню **Statistics** / **Анализ** вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables** / **Основные статистики и таблицы**, де на однойменній панелі, використавши опцію **Difference tests: r, %, means** / **Другие критерии значимости** виходимо на однойменну панель **Difference tests: r, %, means** / **Другие критерии значимости** (рис. 7.9).

У вкладці **Difference between two means (normal distribution)** / **Сравнение двух средних (нормальное распределение)** прийнявши **Single mean 1 vs. population mean 2** / **Среднее выборки 1 в сравнении со средним 2** (1) відповідно до табл. 7.36, с. 412 задаємо середнє \bar{x} , середній квадратичний відхил s вибірки, її обсяг n (2) та фіксоване значення числа x_0 (3), указуємо на вид критерію **Two-sided** / **Двусторонний** (4), так як немає теоретичного обґрунтування того, що один з коефіцієнтів кореляції свідомо більше іншого; якщо є таке теоретичне обґрунтування, і потрібно лише встановити, чи є відмінності статистично значущими, то задається односторонній тест (**One-sided** / **Односторонний**), і розраховуємо його значення (5).

Маємо $p < \alpha = 0.05$, тобто різниця між вибірками статистично значуща з $P = 95\%$ — існує істотна відмінність між колекцією і сортом-стандартом.

При цьому слід мати на увазі що тут статистичне порівняння виконується на основі нормального розподілу.

Непараметричною альтернативою для цих визначень є непараметричні методи виключення грубих похибок (промахів) з результатів досліджень з виключенням перед обчисленням сумнівних результатів, зокрема, **7.4.3.1.3 Відповідність довільної величини певній вибірці.**




Рис. 7.9. Діалогове вікно при оцінці відхилення середнього арифметичного від фіксованого значення

7.3.7.3. Двовибірковий гомоскедастичний t -тест

7.3.7.3.1. Розрахункове виконання двовибіркового t -тесту із статистично рівними дисперсіями

Незалежні вибірки — вибірки, які характеризуються тим, що ймовірність відбору будь-якого значення однієї вибірки не залежить від відбору будь-якого значення другої вибірки, або представники двох вибірок не складають пари корелюючих значень з рівнем $r > 0.69$, (див. с. 359).

Обчислення довірчого інтервалу для різниці середніх має ряд переваг — воно більш просте, так як не потрібне використання статистичних критеріїв; показує величину відмінностей між вибірками; дозволяє легше інтерпретувати результати.

Обмеженнями на застосування цієї методу є порушення умов:

- вибірки випадкові або хоча б репрезентативні;
- мають статистично рівні стандартні відхили;
- об'єкти дослідження в кожній із вибірок незалежні з безперервними нормальними розподілами.

Перевірка виконується у два етапи — спочатку за критерієм Фішера–Снедекора (див. підрозділ **7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**) слід упевнитися у статистичній рівності (однорідності) дисперсій s_1^2 і s_2^2 двох порівнюваних вибірок обсягом n_1 і n_2 , потім уже за критерієм Стюдента порівнюються їх середні значення.

Нульова гіпотеза завжди формульована так: вибірки взяті з однієї генеральної сукупності і їх середні арифметичні однакові, тобто $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$, а альтернативна матиме вигляд $H_A: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$ [33] чи за різницею між середніми арифметичними вибірок $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ при альтернативній $H_A: \bar{d}_\Delta \neq 0$ визначатися за виразом (7.9) [2].

За умови $t \leq t_{\alpha/2}(v_1+v_2)$, де v_1, v_2 — ступені вільності вибірок, нульова гіпотеза підтверджується, і це означає, що середні арифметичні двох порівнюваних вибірок однорідні і між ними існує статистично достовірна рівність.

Оцінки різниці середніх повинна обов'язково супроводжуватися аналізом статистичної рівності (однорідності) дисперсій s_1^2 і s_2^2 порівнюваних вибірок за згідно підрозділу **7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**.

У ППП **Statistica** ці розрахунки, як і саме критерій Стюдента, виконується програмно. При застосуванні **MS Excel** оцінка рівності дисперсій s_1^2 і s_2^2 вибірок виконується за критерієм Фішера за виразом (3.48) з використанням статистичних функцій **СЧЁТ, ДИСП.В, F.ОБР.ПХ, F.РАСП** (див. Додаток А і с. 45, 51, 562 і 566).

З результатів маємо $F < F_\tau$ і $p > \alpha$, що свідчить про рівність дисперсій.

Як було сказано вище, оскільки критична область двобічна, критичні значення розподілу критерію Фішера–Снедекора приймаються для рівня значущості $\alpha/2$.

Якщо порівнювані вибірки однакового обсягу n , то для похибки $s_{\bar{d}}$ різниці середніх \bar{d}_{Δ} використовують формулу [50]:

$$s_{\bar{d}} = \sqrt{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2} \quad \text{чи} \quad s_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{n}}. \quad (7.8)$$

Якщо нульова гіпотеза про статистичну рівність дисперсій справедлива при порівнянні вибірок однакового обсягу n для визначення емпіричного значення t -критерію, застосовується спрощена формула наближених розрахунків з використанням середньоквадратичної похибки різниці, розрахованої на основі формули (1.73) [50]:

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2}}, \quad (7.9)$$

де \bar{x}_1 і \bar{x}_2 – середні арифметичні першої та другої вибірки;

$s_{\bar{x}_1}$ і $s_{\bar{x}_2}$ – похибки середніх арифметичних першої та другої вибірки.

При значній різниці обсягів вибірок, використовується більш складна і більш точна формула із визначенням узагальнюючої оцінки дисперсій [50]

$$s_{\Sigma}^2 = \frac{s_1^2 \cdot v_1 + s_2^2 \cdot v_2}{v_1 + v_2}, \quad (7.10)$$

а сам критерій Стюдента знаходиться з виразу

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_1^2 \cdot v_1 + s_2^2 \cdot v_2}} \cdot \sqrt{n_1 \cdot n_2 \cdot \frac{v_1 + v_2}{n_1 + n_2}}. \quad (7.11)$$

Нульова гіпотеза $H_0: \bar{d}_{\Delta} = 0$ відхиляється за умови $t \geq t_{\alpha(v)}$, де $v = n_1 + n_2 - 2$ [15], а при $n_1 = n_2 = n$ становить $v = 2(n-1)$ [50].

Формула використовується при $5 < n < 125$, при більшій кількості спостережень поправку можна не враховувати, так як вона стає незначною [2].

Для ілюстрації наведено порівняльний аналіз даних, взятих з табл. 7.8, с. 360 і представлених у табл. 7.14.

Таблиця 7.14 – Порівняння середніх при однакових вибіркових дисперсіях

	А	В	С
1	Показник	Стандарт-2004	Колекція-2004
2	B102=CPЗНАЧ(B2:B12)	39.9	30.4
3	C102=CPЗНАЧ(C2:C101)	36.7	30.1
4	B103=СЧЁТ(B2:B12)	31.3	32.2
5	C103=СЧЁТ(C2:C101)	31.5	33.5
6	B104=ДИСП.В(B2:B12)	33.3	30.0
7	C104=ДИСП.В(C2:C101)	30.7	37.1
8	B105=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B12)	21.6	31.6
9	C105=СТАНДОТКЛОН.В(C2:C101)	29.9	29.8
10	B106=B103-1	26.3	25.1
11	C106=C103-1	27.1	30.1
12	B107=B104/C104	28.4	23.2
13	B112=(B111)^0.5		27.6
14	B109=1-F.РАСП(B107;B106;C106;ИСТИНА)		24.5
15	B110=F.ОБР.ПХ(B108/2;C106;B106)		26.3
16	B111=(B104*B106+C104*C106)/(B106+C106)		23.3
17			20.8
18			28.6
19			23.4
20	Середнє \bar{x}	30.60	26.45
21	Обсяг вибірки n	11	100
22	Дисперсія s^2	24.91	23.02
23	Середньостатистичний відхил s	4.991	4.798
24	Ступінь вільності ν	10	99
25	Розрахунковий критерій Фішера F_{ϕ}	1.0819	
26	Рівень значущості α	0.05	
27	Рівент значущості критерію Фішера p	0.383	
28	Табличний критерій Фішера F_T	3.1525	
29	Узагальнена оцінка дисперсії Σs^2	23.198	
30	Узагальнений середньостатист. відхил s	4.816	
31	Розрахунковий критерій Стюдента t_{ϕ}	2.713	
32	Табл. двостор. критерій Стюдента t_T	1.982	
33	Двосторон. розрах. рівень значущості p	0.00774	
34	Правостор. розрахунк. рівень значущ. p	0.00387	
35	B113=(B102-C102)/(B112*(1/B103+1/C103)^0.5)		
36	B114=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B108;(B106+C106))		
37	B115=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(B113;(B106+C106))		
38	B116=1-СТЮДЕНТ.РАСП(B113;(B106+C106);ИСТИНА)		

неоднорідні.

Про це також свідчить розташування нуля у межах довірчого інтервалу різниць.

Також достовірність різниці між середніми арифметичними вибірок може відхиляти при $t \geq 3$ [2, 65] (див. (1.109).

Далі за формулами (7.8)–(7.11) виконуємо оцінку вибірок за різницею середніх арифметичних і додатково за допомогою критерію Стюдента і довірчого інтервалу різниць, наведених на полі табл. 7.14.

З розрахунків згідно з табл. 7.8 і 7.14, маємо $F < F_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2)$, що свідчить про статистичну рівність дисперсій (див. с. 360).

Як було сказано вище, оскільки критична область двобічна, критичні значення розподілу критерію Фішера – Снедекора приймаються для рівня 3 результатів бачимо, розрахунковий t –критерій більше табличного, визначеного за статистичною функцією **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** ПА MS Excel (див. Додаток А).

Нульова гіпотеза підтверджується за умови $t \leq t_{\alpha/2}(\nu_1 + \nu_2)$ чи $p < \alpha$.

Так як $t = 2.713 > t_{\alpha/2}(\nu_1 + \nu_2) = 2.273$, наявна істотна відмінності між порівнюваними вибірками, тобто вони

7.3.7.3.2. Двовибірковий гомоскедастичний t -тест статистичною функцією ПА MS Excel **СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ**

Для ілюстрації наведено порівняльний аналіз експериментальних середніх за вихідними даними табл. 7.8, с. 360, представлений табл. 7.14.

З розрахунків згідно з табл. 7.8 і 7.14, маємо $F < F_{\alpha/2}(v_1, v_2)$, що свідчить про статистичну рівність дисперсій (див. с. 360). Далі за статистичною функцією Excel **СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ** (див. Додаток А), приймаючи **тип=2 для вибірок з рівними дисперсіями (гомоскедастичний t -тест)** (табл. 7.14), і прийнявши **хвости=2** чи **хвости=1** знаходимо відповідно двосторонній і односторонній (правосторонній) розрахунковий рівень значущості p .

Нульова гіпотеза підтверджується, так як $p = 0.0077 < \alpha = 0.05$, наявна істотна відмінності між порівнюваними вибірками, тобто вони неоднорідні.

7.3.7.4. Розрахункове виконання двовибіркового t -тесту із статистично різними дисперсіями (двовибірковий гетероскедастичний t -тест)

7.3.7.4.1. Точкова оцінка зі зміною критичного значення t

Для цього випадку нульова і альтернативна гіпотези будуть представлені умовами $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ і $H_A: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$.

Якщо перевіркою за критерієм Фішера–Снедекора за формулою (3.48) засвідчила статистичну відмінність вибірових дисперсій, розрахункове значення критерію Стюдента знаходиться за виразом (7.12) [50]

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_{\bar{x}_1}^2/n_1 + s_{\bar{x}_2}^2/n_2}}. \quad (7.12)$$

Розрахунковий t -критерій Стюдента при нульовій гіпотезі $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ про відсутність суттєвих статистичних відмінностей між вибірками порівнюється з критичним t_α^* визначеним на основі табличних $t_{\alpha(v_1)}$ і $t_{\alpha(v_2)}$ за формулою [50]

За умови $t \geq t_\alpha^*$ нульовій гіпотезі $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ не приймається (відкидається), що свідчить про істотність відмінностей між вибірками на прийнятому рівні значущості α [15, 14, 25, 50, 53].

$$t_{\alpha}^* = \frac{s_{\bar{x}_1}^2 \cdot t_{\alpha}(v_1) + s_{\bar{x}_2}^2 \cdot t_{\alpha}(v_2)}{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2}. \quad (7.13)$$

Таблиця 7.15 – Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях

	A	B	C
1	Показник	Колекція-2004	Колекція-2005
2	B142=CP3HAЧ(B2:B141)	30.4	37.9
3	B143=СЧЁТ(B2:B141)	30.1	39.0
4	B144=ABS(B142-C142)	32.2	38.1
139	B145=ДИСП.В(B2:B141)		40.0
140	B146=СТАНДОТКЛОН.В(B2:B141)		22.1
141	B147=B146/B143^0.5 B148=B143-1		39.3
142	Середнє \bar{x}	26.49	36.26
143	Обсяг вибірки n	101	140
144	Різниця середніх Δ	9.77	
145	Дисперсія s^2	22.97	44.37
146	Середньоквадратичний відхіл s	4.792	6.661
147	СКВ середнього s_{cp}	0.48	0.56
148	Ступінь вільності ν	100	139
149	Рівень значущості α	0.05	
150	Розрахунковий критерій Фішера F_{ϕ}	1.932	
151	Рівень значущості критерію Фішера p	0.0003	
152	Табличний критерій Фішера F_T	1.449	
153	Критерій Стюдента розрахунковий t_{ϕ}	13.240	
154	Критерій Стюдента табличний t_T	1.984	1.977
155	Критерій Стюдента порівнюваний t'	1.9803	
B150=C145/B145			
B151=1-F.РАСП(B150;C148;B148;ИСТИНА)			
B152=F.ОБР.ПХ(B149/2;C148;B148)			
B153=B144/(B145/B143+C145/C143)^0.5			
B154=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B149;B148)			
B155=(B154*B147+C154*C147)/(B147+C147)			

Порівняльний аналіз експериментальних середніх — кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–2005 рр., виконуємо для двох вибірок табл. 7.15.

Для неї числові дані колекції взято з табл. 2.11 (с. 96) чарунки **S3:S103** і **W3:W142**.

Перевірка виконується за розрахунковими формулами, наведеними на полі табл. 7.15.

У нашому випадку маємо $F > F_{\alpha/2}(v_1, v_2)$, що свідчить про статистичну відмінність дисперсій.

З результатів бачимо, що розрахунковий критерій Стюдента більше табличного, тобто $t_{\phi} = 13.240 > t' = 2.2704$, що свідчить про статистично значущу відмінності між середніми порівнюваних вибірок, тобто вони неоднорідні, при-

чому, показник 2005 р. перевищує величину 2004 р.

7.3.7.4.2. Точкова оцінка зі зміною ступеня вільності

Дещо інша методика виконання двовибіркового t -тесту із статистично різними дисперсіями наведена в [17].

Тут статистична оцінка виконується не порівнянням з критичним t_{α}^* при ступені вільності $v = n_1 + n_2 - 2$, а з $t_{\alpha/2}(v)$ при ступені вільності, розрахованій за виразом

$$\frac{1}{v} = \frac{c^2}{n_1 - 1} + \frac{(1 - c)^2}{n_2 - 1}, \quad (7.14)$$

де $c = \frac{n_2 \cdot s_1^2}{n_1 \cdot s_2^2 + n_2 \cdot s_1^2}.$

Виконання порівняльного аналізу експериментальних серед них — кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–2005 рр., тобто порівняння двох вибірок табл. 7.16.

Перевірка виконується за розрахунковими формулами, наведеними на полях табл. 7.15 і 7.17.

Таблиця 7.16 – Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях

	A	B	C
1	Показник	Колекція-2004	Колекція-2005
2		30.4	37.9
B154=C143*B145/(C143+B145+B143*C145) B155=1/(B154^2/(B143-1)+(-B154^2)/(C143-1)) B156=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(В149;В155)			
141			39.3
142	Середнє \bar{x}	26.49	36.26
143	Обсяг вибірки n	101	140
144	Різниця середніх Δ	9.77	
145	Дисперсія s^2	22.97	44.37
146	Середньоквадратичний відхіл s	4.792	6.661
147	СКВ середнього scp	0.48	0.56
148	Ступінь вільності v	100	139
149	Рівень значущості α	0.05	
150	Розрахунковий критерій Фішера F_ϕ	1.932	
151	Рівент значущості критерію Фішера p	0.0003	
152	Табличний критерій Фішера F_τ	1.449	
153	Критерій Стюдента розрахунковий t_ϕ	13.240	
154	Проміжне значення c	0.692	
155	Розрахунковий рівень вільності vp	121.4	
156	Критерій Стюдента табличний t_τ	1.980	

Таблиця 7.17 – Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях

	CU	CV	CW
1		Колекція-2004	Колекція-2005
2		30.4	37.9
3		30.1	39.0
100		28.6	37.5
101		23.4	42.8
102		30.6	47.8
103			35.0
104			34.2
CV144=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(CV2:CV102;CW2:CW141;2;3) CV145=СТЮДЕНТ.ТЕСТ(CV2:CV102;CW2:CW141;1;3)			
141			39.3
142	Середнє \bar{x}	26.5	36.3
143	Обсяг вибірки n	101	140
144	Двостор. розрах. рівень значущос. p	2.21652E-30	
145	Правостор. розрах. рівень значущ. p	1.10826E-30	

7.3.7.4.3. Точкова оцінка з використанням середньозваженої дисперсії вибірок

Для цього випадку нульова і альтернативна гіпотези будуть представлені умовами $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ і $H_A: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$.

При порівнянні середніх величин двох вибірок за допомогою t -критерію визначаються їх середнє арифметичне \bar{x}_1 і \bar{x}_2 з використанням формули MS Excel **CP3HACH** і дисперсії обох середніх s_1^2 і s_2^2 за формулою **ДИСП.В**.

Середня зважена цих дисперсій знаходиться за виразом [125]

$$s_{\text{св}}^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 1}, \quad (7.15)$$

де n_1 і n_2 – обсяги порівнюваних вибірок, визначені за формулою MS Excel **СЧЕТ**.

Таблиця 7.18 – Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях			
	А	В	С
1	Показник	Колекція-2004	Колекція-2005
2		30.4	37.9
3		30.1	39.0
4		32.2	38.1
101	B142=CP3HACH(B2:B102)	23.4	42.8
102	B143=СЧЕТ(B2:B102) B144=ДИСП.В(B2:B102) B145=B143-1 B147=C144/B144 B149=F.ОБР.ПХ(B146;C145;B145)	30.4	47.8
	B150=(B144*B145+C144*C145)/(B145+C145)		35.0
	B151=(C142-B142)*(B143*C143/((B143+C143)*B150))^0.5		34.2
	B148=(1-F.РАСП(B147;C145;B145;ИСТИНА))		40.9
	B152=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B146;(B145+C145))		40.0
	B153=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(B151/2;(B145+C145))		22.1
	B154=СТЮДЕНТ.РАСП(B151;(B145+C145);ИСТИНА)		39.3
141			
142	Середнє \bar{x}	26.49	36.3
143	Обсяг вибірки n	101	140
144	Дисперсія s^2	22.95	44.37
145	Ступінь вільності v	100	139
146	Рівень значущості α	0.05	
147	Розрахунковий критерій Фішера $F_{\text{ф}}$	1.9334	
148	Рівент значущості критерію Фішера p	0.0003	
149	Табличний критерій Фішера $F_{\text{т}}$	1.3644	
150	Середньозважна дисперсія $s_{\text{св}}$	35.41	
151	Критерій Стюдента розрахунковий $t_{\text{ф}}$	12.5765	
152	Критерій Стюдента табличний $t_{\text{т}}$	1.9699	
153	Двосторон. розрах. рівень значущості p	1.514E-09	
154	Правостор. розрахунк. рівень значущ. p	1.0000	

Величина t -критерію визначається за формулою

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_{\text{св}}^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}}. \quad (7.16)$$

Якщо знайдене значення t -критерію за абсолютною величиною перевершує двостороннє табличне значення, знайдене за виразом MS Excel з обраним рівнем значущості α , і ступенем вільності $v=n_1+n_2-2$, тобто **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**, то нульова гіпотеза про рівність середніх відхиляється.

Як приклад розглянемо результати дослідів з порівняльної оцінки кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–2005 рр. виконані для двох вибірок табл. 7.18.

Для неї числові дані колекції взято з табл. 2.11 (с. 96) чарунки S3:S103 і W3:W142.

Перевірка виконується за розрахунковими формулами, наведеними на полі табл. 7.18. При цьому ні в [51], ні в [125] нічого не сказано про вимоги до статистичної рівності дисперсій порівнюваних вибірок.

Оскільки емпіричний критерій Стюдента більше табличного, тобто $t_{\phi}=12.5765 > t=1.9699$ наявна статистично значуща відмінності між середніми порівнюваних вибірок, тобто вони неоднорідні, причому, показник 2005 р. перевищує величину 2004 р.

7.3.7.4.4. Двовибірковий гетероскедастичний t -тест функцією MS Excel **СТЮДЕНТ.ТЕСТ**

Виконання порівняльного аналізу експериментальних середніх — кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–2005 рр., тобто порівняння двох вибірок табл. 7.15.

Для неї числові дані колекції взято з табл. 2.11 (с. 96) чарунки **S3:S103** і **W3:W142**.

Перевірку виконуємо за статистичною функцією **СТЮДЕНТ.ТЕСТ** (див. Додаток А), приймаючи **тип=3** для вибірок з нерівними дисперсіями (*гетероскедастичний t -тест*) (табл. 7.14). Приймавши **хвости=2** чи **хвости=1** знаходимо відповідно двосторонній і односторонній (правосторонній) розрахунковий рівень значущості p .

Нульова гіпотеза підтверджується за умови $p < \alpha$. Так як маємо $2.2165 \cdot 10^{-30} < 0.05$, наявна істотна відмінності між порівнюваними вибірками, тобто вони неоднорідні.

7.3.7.4.5. Представлення середньозваженого при виконанні двовибіркового t -тесту із статистично різними дисперсіями

Найбільш достовірні значення фізичної величини при статистично різних дисперсіях отримується при використанні середнього зваженого, яке для обох вибірок знаходиться за формулою (1.22). При цьому їх СКВ визначаються за виразом (1.64).

Спочатку за критерієм Фішера–Снедекора з використанням формули (3.48) виконується перевірка статистичної відмінності вибірових дисперсій. Умова $F > F_{\alpha/2}(v_1, v_2)$ свідчить про їх статистичну відмінність.

Перевірка статистичної відмінності середніх за t -критерієм Стюдента

виконується за виразом (7.8) [49]

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{v_1 \cdot s_{\bar{x}_1}^2 + v_2 \cdot s_{\bar{x}_2}^2}} \cdot \sqrt{n_1 \cdot n_2 \cdot \frac{v_1 + v_2}{n_1 + n_2}}. \quad (7.17)$$

Умова $t \geq t_{\alpha/2(v)}$ свідчить про відмінності між порівнюваними вибірками. Тут число ступенів вільності знаходиться з виразу (7.18) [49]

$$v = \frac{\left(\sum_{i=1}^k \frac{1}{s_{\bar{x}_i}^2} \right)^2}{\sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{n_i + 1} \cdot \frac{1}{s_{\bar{x}_i}^4} \right)} - 2. \quad (7.18)$$

Таблиця 7.19 – Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях представленням середньозваженого

	А	В	С
1	Показник	Колекція-2004	Колекція-2005
142	Середнє \bar{x}	26.49	36.26
143	Обсяг вибірки n	101	140
144	Різниця середніх Δ	9.77	
145	Дисперсія s^2	22.97	44.37
146	Середньоквадратичний відхил s	4.79	6.66
147	СКВ середнього s_{cp}	0.48	0.56
148	Ступінь вільності v	100	139
149	Рівень значущості α	0.05	
150	Розрахунковий критерій Фішера F_ϕ	1.932	
151	Рівень значущості критерію Фішера p	0.578	
152	Табличний критерій Фішера F_T	1.449	
153	Середньозважене $\bar{x}_{зв}$	28.55	
154	СКВ середньозваженого $s_{сз}$	0.36	
155	Ступінь вільності середньозваж $v_{сз}$	217.23	
156	Критерій Стюдента розрахунковий t_ϕ	141.538	
157	Критерій Стюдента табличний t_T	1.971	
158	Довір.межа похибки середньозваж. $\Delta_{сз}$	0.821	

$$\begin{aligned} B153 &= (B142/B145^2 + C142/C145^2) / (B145^{-2} + C145^{-2}) \\ B154 &= (B147^{-2} + C147^{-2})^{-0.5} \\ B155 &= ((B147^{-2} + C147^{-2})^2) / (1 / ((B143+1) \cdot B147^4) + 1 / ((C143+1) \cdot C147^4)) \\ B156 &= B144 \cdot (B143 \cdot C143 \cdot (B148 + C148) / ((B143 + C143) \cdot (B148 \cdot B147^2 + C148 \cdot C147^2)))^{0.5} \\ B157 &= \text{СТЮДЕНТ.ОБР.} 2X(B149; B155) \quad B158 = B154 \cdot B157 \end{aligned}$$

Кінцевий вимірювання результат вимірювання подається величиною середньозваженого з довірчою похибкою, розрахованою за формулою (5.52).

Виконання порівняльного аналізу експериментальних середніх — порівняння кількості стручків на центральній гілці колекцій 2004–05 рр., тобто табл. 7.19.

Перевірка виконується за розрахунковими формулами, наведеними на полях табл. 7.15 і 7.17.

З табл. 7.19 бачимо, що розрахунковий t -критерій більше табличного — $t_\phi = 141.538 > t_T = 1.971$, що свідчить про статистично значущу відмінності між середніми вибірок, тобто вони неоднорідні, причому, показник 2005 р. перевищує величину 2004 р.

Остаточний результат подається наведенням середньозваженого $\bar{\bar{x}}$, його довірчої похибки $\Delta_{\bar{\bar{x}}}$, обсягу обох вибірок n_1 і n_2 та обраного рівня статистичної значущості α , а більш коротко — 28.55 ± 0.82 при $\alpha = 0.05$.

7.3.7.5. Застосування критерію В. І. Романовського

Для оцінки різниці середніх також використовується критерій В. І. Романовського [126]. За правилом трьох сигм, тобто на рівні значущості $\alpha = 0.003$, нульову гіпотезу відкидають за умови $t/s_t \geq 3$, де s_t — середня квадратична похибка величини t , яка залежить тільки від числа спостережень n_1 і n_2 . Вона визначається за виразом [65]

$$s_t = \sqrt{\frac{n_1 + n_2 - 2}{n_1 + n_2 - 4}}. \quad (7.19)$$

Якщо для обох рядів вимірювань нам відомі значення генеральних дисперсій s_1^2 і s_2^2 , то визначається дисперсія різниці

$$s_d^2 = \frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \quad (7.20)$$

і далі розраховується k

$$k = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_d^2}}. \quad (7.21)$$

Якщо k більше 2 або 3 (відповідно рівень значущості α 0.05 або 0.003), то слід визнати достатньо велику ймовірність невинної розбіжності між \bar{x}_1 і \bar{x}_2 . Якщо k менше 2, то вони значимо не розрізняються.

Подання результату оцінки при *інтервальному оцінюванні* для кожної з вибірок повинно містити їх обсяги n_1 і n_2 , середні арифметичні \bar{x}_1 і \bar{x}_2 , СКВ s_1 і s_2 , прийнятий рівень значущості α , результати обчислення параметрів оцінки нормальності розподілу з наведенням критеріїв та числовим представленням одержаних результатів — величину і точний рівень значущості p ; описові статистики різниці середніх арифметичних (точкове оцінювання)

\bar{d}_Δ , похибку результатів вимірювання $t_{\alpha(v)_T} s_{\bar{x}}$ [5].

При оцінці *перевіркою гіпотез (точкова оцінка)* замість похибки результату вимірювання $t_{\alpha(v)_T} s_{\bar{x}}$ слід наводити визначені точні величини рівня значущості p [5].

Альтернатива методу — непараметричний *U-критерій Манна-Уїтні* (див. 7.4.2.1 *U-критерій Манна-Уїтні*) (якщо розподіл хоча б однієї вибірки відрізняється від нормального або дисперсії статистично різняться).

7.3.7.6. Оцінка істотності різниці середніх вибірок однакового обсягу за *t*-критерієм

7.3.7.6.1. Оцінка різниці середніх незв'язаних вибірок

При цьому порівнюються *середні* двох незалежних вибірок однакового обсягу ($n_1=n_2=n$), коли одиниці спостереження першої вибірки не пов'язані ніяким загальним умовою з одиницями спостереження другої вибірки. У цьому випадку за *t*-критерієм Стюдента оцінюється істотність різниці середніх \bar{x}_1 і \bar{x}_2 (7.22)

$$\bar{d}_\Delta = \bar{x}_1 - \bar{x}_2. \quad (7.22)$$

Відомо, що похибка різниці або суми середніх арифметичних незалежних вибірок при однаковому числі спостережень визначається співвідношенням (1.69).

Гарантією надійності висновку про суттєвості або неістотності відмінностей між середніми \bar{x}_1 і \bar{x}_2 служить відношення різниці до її похибки, яке має назву *критерій суттєвості різниці* (7.23) [34]

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2}}. \quad (7.23)$$

За умови $t_{\text{емп}} \geq t_T$ нульова гіпотеза $H_0: \bar{d} = 0$ про відсутність істотних відмінностей між середніми спростовується, а якщо $t_{\text{емп}} < t_T$, то відмінності знаходяться у межах випадкових коливань для прийнятого рівня значущості α не спростовується.

Несуттєва різниця не стверджує, але і не заперечує, що між генеральними середніми не існує відмінності. Вона могла виявитися такою через не-

достатній обсяг вибірок, тоді як повторне дослідження на вибірках більшого обсягу дасть істотну різницю, чи через те, що однакові генеральні середні порівнюваних сукупностей, тому повторні дослідження на більш великому матеріалі також дають невизначений відповідь, тобто, різниця знову виявляється несуттєвою і нульова гіпотеза не спростовується.

Теоретичні значення t -критерію знаходять як $t_{\alpha(n_1+n_2-2)}$ для прийнятого рівня значущості α за кількістю ступенів свободи $\nu=n_1+n_2-2$ для двостороннього критерію Стюдента, визначеного за допомогою статистичної функції **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** ПА MS Excel (Додаток А) на основі двобічного зворотного t -розподілу.

Перевірити нульову гіпотезу можна також і за величиною найменшої істотної різниці, яку висловлюють в одиницях варійованої ознаки. Коли різниця між середніми $d \geq \text{НІР}$ і потрапляє в критичну область істотних відмінностей, вона визнається значущою і H_0 спростовується, а коли вона лежить в області випадкових коливань ($d < \text{НІР}$), то H_0 спростовується.

7.3.7.6.2. Точкове оцінювання середньої різниці за t -критерієм

У якості прикладу наведено аналіз порівняння кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр. Числовий вихідний матеріал для розрахунків узят з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96.

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (1.69), (7.22) і (7.23) та статистичними функціями MS Excel, які відображені на табл. 7.20 червоним кольором.

Так як має місце $t_{\text{емп}}=12.431 > t_{05(95)}=1.973$ (не-спрямована альтернатива), нульова гіпотеза за t -критерієм Стюдента $H_0: \bar{d}_\Delta=0$ відхиляється при значущості $\alpha=0.05$.

Отже, з імовірністю 95 % можна стверджувати, що різ-

Таблиця 7.20. Точкове оцінювання середньої різниці за t -критерієм

	А	В	С
1	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Різниця результатів
2	30.35	37.90	-7.55
3	30.05	39.00	-8.95
4	32.20	38.10	-5.90

C2=A2-B2 **C98=CPЗНАЧ(C2:C97)**
C99=CЧЁТ(C2:C97)
C101=ABS(C98/C100) **C105=C100*C103**
C103=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(C102;(C99-1))
C104=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(C101;2*C99-2)

95	23.28	40.90	-17.62
96	20.78	40.00	-19.22
97	30.42	39.25	-8.83
98	Середня різниця Δ		10.96
99	Кількість парних варіант n		96
100	Похибка різниці s_d		0.84
101	Критерій Стюдента емпіричний t		13.018
102	Прийнятий рівень значущості α		0.05
103	Критерій Стюдента табличний t_r		1.9725
104	p -рівень критерію Стюдента		3.8467E-23
105	Найменша істотна різниця (НІР)		1.660

C100=((СТАНДОТКЛОН.В(B2:B97)^2+СТАНДОТКЛОН.В(A2:A97)^2)/СЧЁТ(C2:C97))^0.5

ниці між даними вибірками статистично значуща, тобто між досліджуваними вибірками існує істотна статистична відмінність.

Альтернатива методу — непараметричний критерій *T-Уїлкоксона* (див. підрозділ **7.4.3.3 Знако–ранговий критерій (Т–критерій Уїлкоксона)** (якщо розподіл ознаки хоча б в одній вибірці відрізняється від нормального і *t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок* (див. підрозділ **7.3.7.3.1 Розрахункове виконання двовибіркового *t*-тесту із статистично рівними дисперсіями**) (якщо у двох вибірок відсутня пряма кореляція).

7.3.7.6.3. Точкове оцінювання середньої різниці за критерієм Бейлі

У якості прикладу наведено аналіз порівняння кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр. Числовий вихідний матеріал для розрахунків узято з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96.

Критерій Бейлі може використовуватися при дослідженні вибірок малого обсягу при повній невідомості про структуру сукупності. При цьому можуть порівнюватися *середні* двох незалежних вибірок різного обсягу [54].

На відміну від точкового оцінювання середньої різниці за *t*-критерієм (див. підрозділ **7.3.7.6.2 Точкове оцінювання середньої різниці за *t*-критерієм** у критерію Бейлі число ступенів вільності $v_{\bar{d}_\Delta}$ різниці \bar{d}_Δ визначається за формулою

$$v_{\bar{d}_\Delta} = \frac{v_1 \cdot v_2}{v_1 \cdot a_2 + v_2 \cdot a_1}. \quad (7.24)$$

Тут коефіцієнти a_1 і a_2 визначається за формулами [54]

$$a_1 = \left(\frac{s_{\bar{x}_1}^2}{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2} \right)^2 \quad \text{и} \quad a_2 = \left(\frac{s_{\bar{x}_2}^2}{s_{\bar{x}_1}^2 + s_{\bar{x}_2}^2} \right)^2. \quad (7.25)$$

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (1.69), (7.22), (7.23), (7.24), (7.25) та статистичними функціями **MS Excel**, які відображені на табл. 7.21 червоним кольором.

Так як $t_{\text{емп}} = 11.84 > t_{0.05(95)} = 1.974$ (неспрямована альтернатива), нульова гіпотеза $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ за критерієм Бейлі відхиляється при значущості $\alpha = 0.05$.

Таблиця 7.21. Точкове оцінювання середньої різниці за критерієм Бейлі

	А	В	С
1	№ п.п.	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05
2	1	30.4	37.9
3	B98=CP3HACH(B2:B97)	30.1	39.0
4	B99=СЧЁТ(B2:B97)-1	32.2	38.1
5	B100=ДИСП.В(B2:B97)	33.5	45.2
	B101=B100/СЧЁТ(B2:B97)		
95	B102=B101+C101	23.3	40.9
96	B103=(B101/B102)^2	20.8	40.0
97	96	30.4	39.3
98	Середнє \bar{x}_{cp}	26.45	36.41
99	Ступінт вільності вибірок ν_i	95	95
100	Дисперсія s^2	23.54	44.45
101	Квалрат похибки середнього $s_{\bar{x}}^2$	0.245	0.463
102	Сума квалратів похибок $\Sigma s_{\bar{x}}^2$	0.71	
103	Коефіцієнт a_i	0.1199	0.4273
104	Загальна ступінт вільності ν	173.6	
105	Критерій Бейлі емпіричний t	11.84	
106	Критерій Стюдента табличний t_T	1.9738	
107	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
108	p-рівень критерію Стюдента	2.3124E-24	
B104=B99*C99/(B99*C103+C99*B103)			
B105=ABS(B98-C98)/B102^0.5			
B106=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B107;B104)			
B108=СТЮДЕНТ.РАСП.ПХ(B105;B104)			

7.3.7.6.4. Точкове оцінювання середньої різниці за F –критерієм Фішера

У якості прикладу наведено аналіз порівняння кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр. Числовий вихідний матеріал для розрахунків узято з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96.

Критерій Фішера застосовується у тих випадках, коли вибірки не можна вважати однорідними (див. с. 110). При цьому можуть порівнюватися *середні* двох незалежних вибірок різного обсягу ($n_1 \neq n_2$) [54].

Критерій Фішера у цьому разі розраховується за формулою

$$F_{\bar{d}_\Delta} = \frac{d_\Delta^2}{\sigma_z^2} \cdot \frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}. \quad (7.26)$$

Тут σ_z^2 визначається за формулою [54]

$$\sigma_z^2 = \frac{(n_1 - 1)\sigma_1^2 + (n_2 - 1)\sigma_2^2}{n_1 + n_2 - 2}. \quad (7.27)$$

За умови $F_{\text{емп}} \geq F_T$ (чомусь при цьому у [54] застосовується спрямована альтернатива, тобто **F.ОБР.ПХ**), нульова гіпотеза $H_0: \bar{d} = 0$ про відсутність істотних відмінностей між середніми спростовується, а якщо $F_{\text{емп}} < F_T$, при ступені вільності $v_1 = 1$ і $v_2 = n_1 + n_2 - 2$, то відмінності знаходяться у межах випадкових коливань для прийнятого рівня значущості α не спростовується.

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (1.69), (7.22), (7.23), (7.26), (7.27) та статистичними функціями **MS Excel**, які відображені на табл. 7.21 червоним кольором.

Так як має місце $F_{\text{емп}} = 140.13 > F_{05(1,190)} = 3.89$, нульова гіпотеза $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ за критерієм Бейлі відхиляється при значущості $\alpha = 0.05$.

Таблиця 7.22. Точкове оцінювання середньої різниці за критерієм Фішера			
	A	B	C
1	№ п.п.	Кількість стручків на центральный гілці-04	Кількість стручків на центральный гілці-05
2	1	30.4	37.9
3	2	30.1	39.0
4	3	32.2	38.1
5	4	33.5	45.2
94	93	26.3	42.1
95	94	23.3	40.9
96	95	20.8	40.0
97	96	30.4	39.3
98	Середнє $\bar{x}_{\text{ср}}$	26.45	36.41
99	Ступінт вільності вибірок ν_i	95	95
100	Дисперсія s^2	23.54	44.45
101	Сумарна дисперсія s^2	33.99	
102	Критерій Фішера емпіричний F	140.13	
103	Критерій Фішера табличний F_T	3.8909	
104	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
105	p-рівень критерію Фішера	1.4191E-24	
B101=(B99*B100+C99*C100)/(B99+C99)			
B102=((B98-C98)^2)*(B99+1)*(C99+1)/((B99+C99+2)*B101)			
B103=F.ОБР.ПХ(B104;1;B99+C99)			
B105=F.РАСП.ПХ(B102;1;B99+C99)			

7.3.7.6.5. Оцінювання середньої різниці між вибірками довірчим інтервалом

У динамічних дослідженнях прийнято завжди віднімати значення “до” від значення “після”. У таких випадках додатне значення різниці відповідає збільшенню значень ознаки, наприклад у часі чи порівняно зі стандартом, а негативне — зменшенню.

У якості прикладу наведено аналіз матеріал табл. 7.20.

Порядок дій з використанням формулами (1.69), (7.22), (1.88) і (1.89) та статистичними функціями MS Excel відображено на табл. 7.23 червоним кольором.

Тут для розрахунку граничної похибки різниці $t_{\alpha(v)}s_{\bar{d}}$ статистичну функцію MS Excel **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ** краще не використовувати через особливість розрахунку v .

Отримані результати інтерпретуються таким чином:

— довірчий інтервал для середньої різниці включає нуль — слід вважати, що відмінність на прийнятому рівні статистичної значущості між групами відсутня;

— довірчий інтервал не включає нуль — відмінність між групами існує на прийнятому рівні статистичної значущості;

— довірчий інтервал включає як мінімальні, так і максимальні значення — результати недостатньо точні для того, щоб зробити певний висновок.

У нашому випадку довірчий інтервал не включає нуль і мінімальні та максимальні значення, що свідчить про відмінність вибірок та достатньо точні для того, щоб зробити певний висновок.

Таблиця 7.23. Оцінювання середньої різниці між вибірками довірчим інтервалом

	A	B	C
1	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Різниця результатів
2	30.35	37.90	-7.55
3	30.05	39.00	-8.95
4	32.20	38.10	-5.90
C98=СЧЁТ(С2:С97) C105=МИН(С2:С97) C101=МАКС(С2:С97) C2= A2-B2 C102=C103+ +СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(С100;(2*С98-2))* *С99 C103=ABS(СРЗНАЧ(С2:С97)) C104=C103- -СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(С100;(2*С98-2))* *С99			
95	23.28	40.90	-17.62
96	20.78	40.00	-19.22
97	30.42	39.25	-8.83
98	Кількість парних варіант n		96
99	Похибка різниці s_d		0.842
100	Рівень значущості α		0.05
101	Максимальне значення d_{max}		27.80
102	Верхнє довірче значення $\Delta+t \cdot s_{\Delta}$		12.61
103	Різниця середніх Δ		10.96
104	Нижнє довірче значення $\Delta-t \cdot s_{\Delta}$		9.30
105	Мінімальне значення d_{min}		0.00

C99=((СТАНДОТКЛОН.В(B2:B97)^2 +
+СТАНДОТКЛОН.В(A2:A97)^2)/СЧЁТ(С1:С97))^0.5

7.3.7.7. Розрахунковий метод оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами за середньою різницею

7.3.7.7.1. Загальні положення

При аналізі двох залежних вибірок можуть бути обчислені різниці значень ознаки для кожної пари спостережень (приклад, різниця ознаки до і після дослідження), а потім для групи в цілому обчислена середня різниця.

У динамічних дослідженнях прийнято завжди віднімати значення “до” від значення “після”. У таких випадках додатне значення різниці відповідає збільшенню значень ознаки, наприклад у часі чи порівняно зі стандартом, а негативне — зменшенню.

Необхідність у цьому виникає у випадках, коли значення досліджуваної ознаки зразка першої групи може бути ближче до значення ознаки у певного учасника дослідження з другої групи, ніж до значення випадково обраного зразка дослідження з другої групи. Такі ситуації виникають у випадках:

- при обстеженні зразків до і після досліджуваного впливу;
- при вивченні груп, сформованих з підібраних пар зразків;
- при обстеженні потомства і батьківських форм;
- в лабораторних дослідженнях з паралельним контролем.

При цьому пари зразків дослідження повинні бути випадково вибраними з генеральної сукупності чи бути репрезентативними, а різниці значень ознаки пари зразків в генеральній сукупності повинні бути розподілені нормально. Чим більше вибірка, тим менш суттєве це обмеження [5].

Додатковою умовою застосування для оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами є **пряма лінійна кореляція вибірок**, яка повинна становити $r > 0.69$, див. с. 359.

У цих випадках за критерієм Стьюдента оцінюється істотність **середньої величини різниць пар зв'язаних вибірок** \bar{d}_Δ , визначена з різниць між x_{i_1} і x_{i_2} , тобто попарно зв'язаними варіантами порівнюваних вибірок [15, 37]. Похибка різниці середніх для пов'язаних вибірок обчислюється різницеvim методом. Тобто оцінюється не різниця середніх (7.22), а істотність середньої різниці $\pm \bar{d}_\Delta$, хоча арифметично це одна і та ж величина [34]

$$\bar{d}_\Delta = \frac{\sum_{i=1}^n |x_{i_1} - x_{i_2}|}{n}, \quad (7.28)$$

де n — число парних варіант.

Сума квадратів D відхилень між варіантами становить

$$D = \sum_{i=1}^n (x_{i_1} - x_{i_2})^2. \quad (7.29)$$

Середній квадратичний відхил s_d різниці даних вибірок із попарно зв'язаними варіантами розраховується за виразом (7.30) чи за формулою **MS Excel СТАНДОТКЛОН.В**

$$s_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \left(\frac{\sum d_i^2}{n} - \bar{d}^2 \right)}. \quad (7.30)$$

де d_i – різниця між парою зв'язаних (залежних) вибірок x_{i_1} і x_{i_2} ;
 n – обсяг вибірки, тобто число попарно зв'язаних варіант, $n = n_1 = n_2$.

Число ступенів вільності визначається за виразом $\nu = n - 1$.

Звідси емпіричний t -критерій виражається як відношення середньої різниці до своєї похибки [34], тобто

$$t = \frac{|\bar{d}_\Delta|}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{|\bar{d}_\Delta|}{s_{\bar{d}}}. \quad (7.31)$$

де $s_{\bar{d}}$ – СКВ середнього різниць.

7.3.7.7.2. Точкове оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами за t -критерієм Стьюдента

За приклад використано аналіз порівняння кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр. Числовий вихідний матеріал для розрахунків узятो з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96.

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (7.28)–(7.31), які відображені на табл. 7.24 червоним кольором.

Так як розрахунковий критерій Стьюдента $t = 12.431$ більше табличного $t_{0.05(95)} = 1.985$, нульова гіпотеза $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ відхиляється на рівні значущості 0.05.

Таблиця 7.24. Точкове оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами за t -критерієм

	A	B	C
1	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Різниця результатів
2	30.4	37.9	-7.6
3	30.1	39.0	-9.0
4	32.2	38.1	-5.9

C2=A2-B2 **C98=CP3HA4(C2:C97)**
C99=C4ET(C2:C97) **C101=ABS(C98/C100)**
C100=(СУММКВ(C2:C97)/((C99-1)*C99))^0.5
C103=ТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(C102;(C99-1))
C104=СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ(C101;C99-1)
C105=C100*C103

95	23.3	40.9	-17.6
96	20.8	40.0	-19.2
97	30.4	39.3	-8.8
98	Середня різниця Δ		10.96
99	Кількість парних варіант n		96
100	Похибка різниці s_d		1.30
101	Критерій Стюдента емпіричний t		8.436
102	Прийнятий рівень значущості α		0.05
103	Критерій Стюдента табличний t_T		1.9853
104	p -рівень критерію Стюдента		1.8045E-13
105	Найменша істотна різниця (HIP)		2.578

Отже, з імовірністю 95 % можна стверджувати, що різниця між даними вибірками статистично значуща, тобто між досліджуваними вибірками існує істотна статистична відмінність, тобто погодні умови років різні.

Альтернатива методу — непараметричний критерій T -Уїлкоксона (див. підрозділ 7.4.3.3 Знако-ранговий критерій (T -критерій Уїлкоксона) (якщо розподіл ознаки хоча б в одній вибірці відрізняється від нормального і t -критерій Стюдента для незалежних вибірок (див. підрозділ 7.3.7.3.1 Розрахункове виконання двовибіркового t -тесту із статистично рівними дисперсіями) (якщо у двох вибірок відсутня пряма кореляція).

7.3.7.7.3. Оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами довірчим інтервалом

У якості прикладу наведено аналіз порівняння кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр. Вихідний матеріал для розрахунків узято з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96, аналогічно табл. 7.20.

Порядок дій з використанням статистичних функцій **MS Excel** відображено на табл. 7.25 червоним кольором.

Порядок дій з використанням формулами (7.28)–(7.31) та статистичними функціями **MS Excel** відображено на табл. 7.29 червоним кольором.

Тут для розрахунку граничної похибки різниці $t_{\alpha(v)}s_{\bar{d}}$ доцільно використовувати статистичну функцію **MS Excel** **ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ**.

Інтерпретація результатів подана у підрозділі 7.3.7.2 Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стюдента).

У нашому випадку довірчий інтервал не включає нуль і мінімальні та максимальні значення, що свідчить про відмінність вибірок.

Представлення результатів оцінки у текстовому вигляді за допомогою **довірчого інтервалу** (даний підрозділ і **7.3.7.2 Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стьюдента)** для кожної з вибірок повинно містити кількість пар досліджуваних варіантів n і число об'єктів у кожному з них; їх середні арифметичні \bar{x}_1 і \bar{x}_2 та середні квадратичні відхили s_1 і s_2 , прийнятий рівень значущості α , результати обчислення параметрів оцінки нормальності розподілу різниць d з наведенням критеріїв та числовим представленням одержаних результатів — величину і точний рівень значущості p ; описові статистики різниці середніх арифметичних (**точкове оцінювання**) \bar{d}_Δ , граничну похибку різниці $t_{\alpha(v)}s_{\bar{d}}$ та межі для середньої різниці (**інтервальне оцінювання**) [5].

Таблиця 7.25. Оцінювання середньої різниці вибірок із попарно зв'язаними варіантами довірчим інтервалом

	A	B	C
1	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Різниця результатів
2	30.35	37.90	-7.6
3	30.05	39.00	-9.0
4	32.20	38.10	-5.9

C2=A2-B2 **C98=CЧЕТ(C2:C97)**
C99=(СУММКВ(C2:C97)/((C98-1)*C98))^0.5
C101=МАКС(C2:C97) **C105=МИН(C2:C97)**
C102=C103+
+ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(C100;C99;C98)
C103=ABS(СРЗНАЧ(A2:A97)-
-СРЗНАЧ(B2:B97))
C104=C103-
-ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(C100;C99;C98)

94	26.30	42.10	-15.8
95	23.28	40.90	-17.6
96	20.78	40.00	-19.2
97	30.42	39.25	-8.8
98	Кількість парних варіант n		96
99	Похибка різниці s_d		1.30
100	Рівень значущості α		0.05
101	Максимальне значення d_{\max}		12.1
102	Верхнє довірче значення $\Delta+t$		10.23
103	Різниця середніх Δ		9.96
104	Нижнє довірче значення $\Delta-t$		9.70
105	Мінімальне значення d_{\min}		-27.8

7.3.7.8. Найменша істотна різниця (НІР)

7.3.7.8.1. Загальні положення

Найменша істотна різниця (**НІР**), є критичним значенням, вираженим в абсолютних числах і показує межу випадкових відхилень між порівнюваними середніми, яка відповідає надійному інтервалу для абсолютної різниці вибірових середніх арифметичних. Якщо вона менше **НІР**, то вибірки не відрізняються, а якщо більше, то вони статистично відмінні.

Оцінка **НІР** є однією з форм t -оцінки й застосовується для порівняння середніх **пари даних** — найчастіше зі стандартом, рідше із середнім значенням вибірки (адаптивною нормою).

Визначають **НІР** за формулою

$$\text{НІР}_\alpha = t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{d}}, \quad (7.32)$$

де $s_{\bar{d}}$ — стандартна похибка різниці між середніми арифметичними;

$t_{\alpha(v)}$ — теоретичне (критичне) значення критерію Стюдента для рівня значущості α і **ступенів вільності похибки**.

Тут $t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{d}}$ є граничною похибкою різниці вибірових середніх [34].

При оцінюванні, описаному у підрозділі **7.3.7.6.5 Оцінювання середньої різниці між вибірками довірчим інтервалом** похибка $s_{\bar{d}}$ різниці середніх арифметичних незалежних вибірок визначається співвідношенням (1.69), а теоретичні значення t -критерію $t_{\alpha(v)}$ знаходять для прийнятого рівня значущості α з кількістю ступенів свободи $v=2n-2$, див. табл. 7.20.

При оцінюванні, описаному у підрозділі **7.3.7.2 Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стюдента)** похибка $s_{\bar{d}}$ різниці середніх арифметичних залежних вибірок визначається співвідношенням (7.30), а теоретичні значення t -критерію $t_{\alpha(v)}$ знаходять для прийнятого рівня значущості α з кількістю ступенів свободи $v=n-1$ (див. табл. 7.24).

З даних табл. 7.20 і 7.24 бачимо, що у обох випадках довірчі інтервали $d \pm \text{НІР}$ лежать в області позитивних величин, тому H_0 відкидається і різниця між вибірками визнається істотною.

При порівняння із середнім похибку різниці середніх обчислюють на основі формули (1.67) неповторюваної вибірки (7.33) [50]

$$s_{\bar{d}} = \frac{s_z}{\sqrt{n}} \sqrt{1 - \frac{1}{n}} = s \cdot \frac{\sqrt{n-1}}{n}, \quad (7.33)$$

де n — число варіантів.

Таким чином **НІР** представляє собою довірчий інтервал результатів різниці між середніми арифметичними (див. с. 63).

Визначення критичного критерію Стюдента із застосуванням статистичної функції **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** пакету **Excel** (див. с. 61).

Нульову гіпотезу про відсутність істотних відмінностей між вибірковими середніми можна перевірити способом інтервальної оцінки генеральних параметрів сукупності з використанням довірчих інтервалів для генеральної різниці середніх. Якщо довірчі інтервали включають нульове значення,

то нульова гіпотеза $H_0: \bar{d}_\Delta = 0$ не відкидається, а якщо вони лежать в області позитивних величин, то H_0 відкидається і різниця визнається істотною [34].

Якщо фактична різниця d між вибірковими середніми відповідає умові $d \geq \text{НІР}$, то H_0 відкидається, а якщо $d < \text{НІР}$ — не відкидається.

Найменша істотна різниця широко використовується при побудові довірчих інтервалів і перевірці статистичних гіпотез. Довірчий інтервал для різниці генеральних середніх $\mu_1 - \mu_2$ визначається з співвідношення

$$d - \text{НІР} < \mu_1 - \mu_2 < d + \text{НІР} \quad \text{або} \quad d \pm \text{НІР}. \quad (7.34)$$

Визначення найменшої істотної різниці при дисперсійному аналізі викладено у підрозділі **10.9.2 Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми**, також наведені в табл. 10.3 на с. 567, 10.4 на с. 569, 10.6 на с. 571, 10.7 с. 573, 10.15 на с. 584, 10.17 с. 588, 10.21 с. 592, 10.23 с. 592, 10.64 с. 633 у яких НІР розраховується відносно одного з членів вибірки, у даному випадку сорту-стандарту); табл. 10.5 на с. 570, 10.61 на с. 630 — НІР розраховується відносно одного середнього вибірки.

7.3.7.8.2. Оцінка НІР середньої різниці попарно пов'язаних вибірок

Оцінка різності попарно пов'язаних вибірок, виконана за числовими даними узятими з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96 і подано у табл. 7.20, с. 384 представлена в табл. 7.26.

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (10.35) і (10.36), які відображені на полі табл. 7.26.

За даними табл. 7.26 бачимо, що за умови $d_i > \text{НІР}_{05}$ відмінності між показниками сортозразків 2004 і 2005 рр. статистично значимі на відповідному рівні.

Таблиця 7.26. Оцінка середньої різниці попарно пов'язаних вибірок

	А	В	С
1	Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Модуль різниці d _{ij}
2	30.35	37.90	7.55
3	30.05	39.00	8.95
4	33.20	38.10	5.00
54	33.15	39.10	5.95
55	31.58	28.10	3.48
56	33.63	34.80	1.18
57	30.25	31.40	1.15
58	28.40	39.70	11.30
59	26.88	40.50	13.62
94	26.30	42.10	15.80
95	23.28	40.90	17.62
96	20.78	40.00	19.22
97	30.60	39.25	8.65
98	Кількість парних варіант n		96
99	Середньоквадратичний відхил s		6.38
100	Рівень значущості α		0.05
101	Похибка різниці середнього s_d		0.651
102	Критерій Стюдента табличний t_T		1.985
103	Найменша істотна різниця НІР_{05}		1.292

C98=CЧЁТ(C2:C97)

C99=СТАНДОТКЛОН.В(C2:C97)

C101=C99/C98^0.5

C102=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(C100;C98-1)

C103=C101*C102

7.3.7.8.3. Оцінка НІР незалежних вибірок

Оцінка різності значень незалежних вибірок, виконана за даними, взятими з табл. 2.11 (с. 96) чарунки **S3:S103** і **W3:W142** і представлених у табл. 7.15, с. 377 виконана в табл. 7.27.

Так як відповідно в табл. 7.27 має місце $d=9.77 > \text{НІР}_{05}=1.453$, що свідчить про відмінності між порівнюваними вибірками, тобто вони неоднорідні, причому, показник 2005 р. перевищує величину 2004 р., що відповідає висновкам до табл. 7.15, с. 377.

Оцінку НІР середніх дисперсійного комплексу див. у підрозділі 10.9.2

Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми дисперсійного комплексу.

Таблиця 7.27. Оцінка різності середніх незалежних вибірок

	A	B	C
1	Показник	Колекція-2004	Колекція-2005
2	B142=CPЗНАЧ(B2:B102)	30.4	37.9
3	B143=C142-B142	30.1	39.0
4	B144=СЧЁТ(B2:B102)	32.2	38.1
5	B145=СТАНДОТКЛОН.B(B2:B141)	33.5	45.2
6	B146=B145/B144^0.5		
137	B147=(СУММКВ(B146;C146))^0.5		42.1
138	B149=СТЪЮДЕНТ.ОБР.2Х(B148;B144+C144-2)		40.9
139	B150=B147*B149		40.0
140			22.1
141			39.3
142	Вибіркове середнє x	26.49	36.26
143	Різниця вибірових середніх d	9.77	
144	Обсяг вибірки n	101	140
145	Середньостатистичний відхил s	4.792	6.661
146	Похибка вибірового середнього s_x	0.477	0.563
147	Похибка різниці середнього s_d	0.738	
148	Рівень значущості α	0.05	
149	Критерій Стъюдента табличний t_γ	1.9699	
150	Найменша істотна різниця НІР₀₅	1.453	

7.3.7.9. Перевірка гіпотези про рівність середніх без припущень про дисперсіях

При оцінці рівності середніх без припущень про дисперсії для двох незалежних вибірок однакового розміру, взятих з сукупності, що має нормальний розподіл критеріальні значення обчислюється за формулою [25]:

$$t = \frac{(|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|) \sqrt{n(n-1)}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n [x_1 - x_2 - (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)]^2}}, \quad (7.35)$$

де **n** – обсяг першої і другої вибірок;
 \bar{x}_1 і \bar{x}_2 – оцінки середніх значень;
 x_1 і x_2 – поточні значення змінних.

Число ступенів свободи для t -критерію $\nu = n - 1$. Критерій стійкий при малих відхиленнях від нормального розподілу.

Нульова гіпотеза неспрямована і має вигляд $H_0: x_1 = x_2$ проти $H_A: x_1 \neq x_2$. Гіпотеза про рівність середніх відкидається якщо за абсолютною величиною критеріального значення більше верхньої $\alpha/2$ точки t -розподілу, взятого з ν ступенями вільності, тобто при $|t| > t_{\alpha/2}$, для критеріальної оцінки використовуються формули статистичних функцій MS Excel **СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ** і **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

За приклад наведено аналіз порівняння кількості стручків у 2004–2005 рр. Вихідні дані узято з чарунок **G3:G98** і **K3:K98** табл. 2.12 с. 96, аналогічно табл. 7.20, продано в табл. 7.28.

Порядок дій виконується за формулами (7.28), (7.35) і (7.31), які відображені червоним кольором.

Особливістю даного розрахунку є те, що похибка різниці середніх $s_{\bar{x}}$ розраховується для з використанням СКВ для різниці між поточним значенням різниці і різницею середніх (7.36)

Таблиця 7.28. Оцінка середньої різниці між попарно зв'язаними вибірками				
	A	B	C	D
1		Кількість стручків на центральній гілці-04	Кількість стручків на центральній гілці-05	Різниця середніх Δ_i
2	D2=B2-C2-\$B\$101	30.4	37.9	2.41
3	B99=СЧЁТ(B2:B97)	30.1	39.0	1.01
4	B101=B100-C100	32.2	38.1	4.06
B98=ЕСЛИ((ABS(СРОТКЛ((B2:B97))/ /(СТАНДОТКЛОН.В(B2:B97))-0.7979)- -0.4/(СЧЁТ(B2:B97))^0.5)<0;"Нормальн."; "Ні") B100=СРЗНАЧ(B2:B97) B102=ABS(B101)*(B99*(B99-1)/СУММКВ(D2:D97))^0.5 B104=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(B103;B99-1) B105=СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ(B102;B99-1)				
95		23.3	40.9	-7.66
96		20.8	40.0	-9.26
97		30.6	39.3	1.31
98	Перевірка нормальності розподілу	Нормальн.	Нормальн.	
99	Кількість дослідів n	96		
100	Середня дослідів $\bar{x}_{\text{ср}}$	26.45	36.41	
101	Різниця середніх Δ	-9.96		
102	Критерій Стюдента емпіричний t	12.4309		
103	Прийнятий рівень значущості α	0.05		
104	Критерій Стюдента табличний t_t	1.9853		
105	p -рівень критерію Стюдента	6.1807E-22		

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{[(x_{1_i} - x_{2_i}) - (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)]^2}{n - 1}}. \quad (7.36)$$

Через це отримано різні результати розрахунків у табл. 7.20 і табл. 7.28, хоч загальні висновки про істотну статистичну відмінність середніх порівнюваних вибірок співпадають.

7.3.7.10. Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами парним двовибірковим t -тестом для середніх

Умовою застосування аналізу **Парный двухвыборочный t -тест для средних** для оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами є *додатна лінійна кореляція вибірок*, яка становить 0.098501.

Дані, наведені на рис. 7.10, взяті з табл. 7.20 на с. 384.




Рис. 7.10. Застосування інструменту **Парный двухвыборочный t -тест для средних**

Пакет аналізу **Excel** створить на окремому листі таблицю результатів. Відредагованою вона наведена в табл. 7.29. Критичні значення — $P(T \leq t)$, для спростування припущення про рівність середніх арифметичних воно повинно бути нижче, ніж прийняте критичне значення **Альфа: 0.05** (6 на рис. 7.10).

Якщо середні арифметичні не рівні використовується *двобічне значення $P(T \leq t)$* . *Однобічне значення $P(T \leq t)$* використовується для перевірки припущення про те, що одне із середніх менше, або більше другого [25].

Таблиця 7.29. Результати перевірки відмінності середньої різниці між вибірками з попарно зв'язаними варіантами

	Колекція-2005	Колекція-2004
Среднее	36.40756589	26.44752833
Дисперсия	44.44536943	23.5588523
Наблюдения	96	96
Корреляция Пирсона	0.098500747	
Гипотетическая разность средних	0	
df	95	
t-статистика	12.4308893	
P(T<=t) одностороннее	6.1807E-22	
t критическое одностороннее	1.661051818	
P(T<=t) двухстороннее	1.23614E-21	
t критическое двухстороннее	1.985250956	

З табл. 7.29 видно — двобічне значення $P(T \leq t)$ менше **Альфа: 0.05** (6) (рис. 7.10), що свідчить про істотну статистичну відмінність між вибірками 2004–2005 рр. Так як **t-статистика** > 0 , показник колекції 2005 р. перевищує величину 2004 р.



7.3.7.11. Виконання t -тесту Стьюдента з використанням ППП Statistica











У програмі **Statistica** реалізовано 2 способи порівняння даних за допомогою даного методу — це 1) *за групами* і 2) *за змінними*. Виділення цих двох способів обробки дуже зручно, оскільки ґрунтуються вони на обробці двох різних матриць даних. Так, перший спосіб актуальний, якщо будується матрицю вихідних даних однієї групи випробовуваних над іншою, а другий спосіб — коли кожен стовпець з даними представляє вихідну інформацію тільки однієї групи [9].



7.3.7.11.1. Виконання t -тесту Стьюдента порівнянням за змінними



Виконаємо порівняння *за змінними* кількості стручків на гілці в 2004 і 2005 рр. та порівняння вибірок сортозразків із сортом-стандартом у 2004 р. проводяться на основі рис. 7.11, за даними, використаними у табл. 7.8, с. 360.







Для одночасного використання двох вибірок переходимо на панель вибору змінних **Select two variable lists (lists of groups)** / **Выберите два списка переменных**, натискаємо









 Variables (groups) /  Переменные (группы) (5), указуємо необхідні вибірки (6) і натиснувши **ОК**, (7) повертаємося на вихідну панель процедур і установок.

У вкладці  Options /  Опции (8) слід задати рівень статистичної значущості (порогові значення)  p-level for highlighting: .05 /  Уровень значимости для выделения: .05 (9). Додатково можна активізувати поля  Display long variable names /  Отображать длинные имена переменных (10) і включення в звіт розрахунку певних критеріїв (поля  Levene's test /  Критерий Левена (11) і  Brown&Forsythe test /  Критерий Брауна и Форсайта (12) — критеріїв, розроблених для вибіркового спостереження).

Якщо поле  t-test with separate variance estimates /  t-критерий с разделен. оценками дисперсий (13) не активізувати, це означає, що завдання вирішується в умовах припущення про *невідомі, але рівні дисперсії* (табл. 7.30 і 7.33).

Якщо це поле активізується  t-test with separate variance estimates /  t-критерий с разделен. оценками дисперсий (13), то завдання вирішується в припущенні *невдомих і не рівних дисперсій* (табл. 7.31 і 7.32). При цьому в таблиці результатів з'являються три нові показники (у головці табл. 7.31 і 7.32, а також боковику табл. 7.34 вони позначені жовтим кольором).

Далі переходимо на вкладку  Quick /  Быстрый (14). Результати аналізу при натисненні  Summary /  OK (15) чи дії процедури  Summary: T-tests /  T-критерии (15) виводяться одним довгим рядком, що не зовсім зручно, тому у табл. 7.30–7.33 для більш наочного представлення рядки розбиваємо на частини.

У меню  Statistics /  Анализ (1) вибираємо модуль  Basic Statistics/Tables /  Основная статистика/Таблицы (2), далі опцію  t-test, independent, by variables /  t-критерий для независимых переменных (3), натискаємо **ОК** (4) для переходу на панель вибору процедур і установок  T-Test for Independent Samples by Variables /  Т-критерий для независимых выборок (рис. 7.11).




Рис. 7.11. Вікна вибору варіантів t -тесту для опції

t-критерий для независимых переменных

Для подання результатів колонками таблицю слід транспонувати (див. рис. 2.13, с. 110). Транспонування таблиць викладено на с. 110, тому сам процес транспонування тут не приводиться. Результат транспонування табл. 7.30–7.33 наведено у табл. 7.34.

У ППП **Statistica** передбачена зручна сервісна функція: якщо прийнята нульова гіпотеза відкидається з вибраним значенням α , тобто p -level for highlighting: .05 / **Уровень значимости для выделения:** .05 (9) на рис. 7.11, то при оцінці

результатів розрахунку t -критерію нема необхідності порівнювати t з $t_{\alpha(v)}$, чи p з α , істотні відмінності на цьому рівні значущості, зображуються червоним кольором [14] (див. табл. 7.30 і 7.31).

Тут жовтим кольором позначені відмінності результатів оцінки з припущеннями — невідомі і не рівні дисперсії (табл. 7.31) від оцінки з припущеннями — невідомі, але рівні дисперсії (табл. 7.30, с. 402). Це ж стосується і відмінностей у табл. 7.34.

Це стосується не лише даного розрахунку. Усі істотні значення в отриманих за допомогою ППП **Statistica** оціночних таблицях відмічаються червоним кольором (див. табл. 7.47, с. 431, табл. 7.50 і 7.51 на с. 437 та інші). На жаль, у транспонованих таблиць він зникає (див. табл. 7.34).

Оцінка за табл. 7.36 (с. 412) і 7.30 та табл. 7.38 (с. 414) і 7.32, отриманих з використанням пакету аналізу **MS Excel** та ППП **Statistica**, незважаючи на різну величину розрахункового критерію Фішера, співпадає, тобто наявна статистично достовірна відмінність як між вибірками 2004–2005 рр., так і між досліджуваними колекційними зразками і сортом-стандартом у 2004 р.

З табл. 7.30–7.33 можна зробити висновок, що аналіз за критерієм Стьюдента з використання ППП **Statistica** завжди слід проводити з активізованим полем ☒ *t-test with separate variance estimates* / ☒ *t-критерий с разделен. оценками дисперсий* (13) (див. рис. 7.11), тобто з припущенні *невдомих і не рівних дисперсій*.

Так як при цьому видаються також усі дані, які отримуються при не активізованому полі ☐ *t-test with separate variance estimates* / ☐ *t-критерий с разделен. оценками дисперсий* (13), тобто за умови *невдоми, але рівні дисперсії*, результати приймати, виходячи з величини критерію Левена.

При $p \leq 0.05$ для критерію Левена робиться висновок про відмінність дисперсій розподілів ознак у порівнюваних вибірках. Тут слід брати до уваги тільки значення p для p -критерію з роздільними оцінками дисперсій. При $p > 0.05$ для критерію Левена слід зробити висновок про рівність дисперсій у вибірках. У цьому випадку можна брати до уваги будь-який із результатів — класичного t -критерію або p -критерію для вибірок із різними дисперсіями.

Таблиця 7.30. Визначення відмінності вибірок сортотразків із сортом–стандартом у 2004 р. опцією

 t-критерий для независимых переменных з припущенням  t-критерий с разделен. оценками дисперсий

Группа 1 и Группа 2	Т-критерий независимых выборок (Биометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки								
	Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	t-знач.	ст.св.	p	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2	Ст.откл. Группа 1	Ст.откл. Группа 2
Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004	30.60909	26.45500	2.713878	109	0.007732	11	100	4.993687	4.800555

Группа 1 и Группа 2	Т-критерий независимых выборок (Биометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки							
	F-отн. Дисперсии	p Дисперсии	Левена F(1,сс)	Ст.св. Левена	p Левена	Бр-Форс F(1,сс)	Ст.св. Бр-Форс	p Бр-Форс
Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004	1.082081	0.766526	0.026348	109	0.871353	0.026017	109	0.872157


Таблиця 7.31. Визначення відмінності вибірок сортотразків із сортом–стандартом у 2004 р. опцією

 t-критерий для независимых переменных з припущенням  t-критерий с разделен. оценками дисперсий

		Т-критерий независимых выборок (Биометрия-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки									
Группа 1 и Группа 2		Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	t-знач.	ст.св.	p	t отдел. оц.дисп.	ст.св.	p двуст.	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2
Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004		30.60909	26.45500	2.713878	109	0.007732	2.628621	12.12380	0.021872	11	100

		Т-критерий независимых выборок (Биометрия-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки									
Группа 1 и Группа 2		Ст.откл. Группа 1	Ст.откл. Группа 2	F-отн. Дисперсии	p Дисперсии	Левена F(1,сс)	Ст.св. Левена	p Левена	Бр-Форс F(1,сс)	Ст.св. Бр-Форс	p Бр-Форс
Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004		4.993687	4.800555	1.082081	0.766526	0.026348	109	0.871353	0.026017	109	0.872157

Таблица 7.32. Визначення відмінності вибірок сортотразків у 2004–2005 рр. опцією

 t-критерий для независимых переменных з припущенням ☒ t-критерий с разделен. оценками дисперсий

		Т-критерий независимых выборок (Біометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки									
Группа 1 и Группа 2		Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	t-знач.	ст.св.	р	t отдел. оц.дисп.	ст.св.	р двуст.	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2
Кількість стручків-2004 vs. Кількість стручків-2005		26.49068	36.25908	-12.5731	239	0.000000	-13.2402	238.9995	0.000000	101	140
		Т-критерий независимых выборок (Біометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки									
Группа 1 и Группа 2		Ст.откл. Группа 1	Ст.откл. Группа 2	F-отн. Дисперсии	р Дисперсии	Левена F(1,сс)	Ст.св. Левена	р Левена	Бр-Форс F(1,сс)	Ст.св. Бр-Форс	р Бр-Форс
Кількість стручків-2004 vs. Кількість стручків-2005		4.792194	6.661271	1.932170	0.000574	8.577172	239	0.003733	8.416924	239	0.004064

Таблица 7.33. Визначення відмінності вибірок сортотразків у 2004–2005 рр. опцією

 t-критерий для независимых переменных з припущенням ☐ t-критерий с разделен. оценками дисперсий

		Т-критерий независимых выборок (Біометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки								
Группа 1 и Группа 2		Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	t-знач.	ст.св.	р	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2	Ст.откл. Группа 1	Ст.откл. Группа 2
Кількість стручків-2004 vs. Кількість стручків-2005		26.49068	36.25908	-12.5731	239	0.000000	101	140	4.792194	6.661271

		Т-критерий независимых выборок (Біометрія-П) Замечание: Переменные рассм. как независимые выборки							
Группа 1 и Группа 2		F-отн. Дисперсии	р Дисперсии	Левена F(1,сс)	Ст.св. Левена	р Левена	Бр-Форс F(1,сс)	Ст.св. Бр-Форс	р Бр-Форс
Кількість стручків-2004 vs. Кількість стручків-2005		1.932170	0.000574	8.577172	239	0.003733	8.416924	239	0.004064

Таблиця 7.34. Відмінність вибірок сорторазків із сортом–стандартом (транспоновані табл. 7.30–7.33)

Невідомі, але рівні дисперсії

☐ t-критерій с разделен. оценками дисперсий

Группа 1 и Группа 2	1 Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004	1 Кількість стручків на гілці-2004 vs. Кількість стручків на гілці-2005
Среднее	30.6090909	26.4906817
Среднее	26.455	36.2590841
t-знач.	2.71387806	-12.5731267
ст.св.	109	239
p	0.00773193932	3.64559421E-28
N набл.	11	101
N набл.	100	140
Ст.откл.	4.99368692	4.79219421
Ст.откл.	4.800555	6.66127115
F-отн.	1.08208088	1.9321703
p	0.766526341	0.000574431896
Левена	0.0263482215	8.57717212
Ст.св.	109	239
p	0.87135333	0.00373308153
Бр-Форс	0.0260172046	8.41692407
Ст.св.	109	239
p	0.872156901	0.00406429004

Невідомі, нерівні дисперсії

☒ t-критерій с разделен. оценками дисперсий

Группа 1 и Группа 2	1 Степовий 1 - 2004 vs. Колекція - 2004	1 Кількість стручків на гілці-2004 vs. Кількість стручків на гілці-2005
Среднее	30.6090909	26.4906817
Среднее	26.455	36.2590841
t-знач.	2.71387806	-12.5731267
ст.св.	109	239
p	0.00773193932	3.64559421E-28
t-отдел.	2.62862134	-13.2402061
ст.св.	12.1238039	238.999538
p	0.0218724798	2.21652377E-30
N набл.	11	101
N набл.	100	140
Ст.откл.	4.99368692	4.79219421
Ст.откл.	4.800555	6.66127115
F-отн.	1.08208088	1.9321703
p	0.766526341	0.000574431896
Левена	0.0263482215	8.57717212
Ст.св.	109	239
p	0.87135333	0.00373308153
Бр-Форс	0.0260172046	8.41692407
Ст.св.	109	239
p	0.872156901	0.00406429004



Крім того у табл. 7.30 і 7.31 хоч розрахункове значення критерію Фішера співпадає з результатами табл. 7.8 на с. 360 і табл. 7.9 на с. 362, значення p –критерію у два рази більше, тобто визначене для ненаправленого критерію, що легше підтверджує рівність дисперсій у вибірках.




Оцінюється підраховане значення p для p –критерію (класичного чи модифікованого). Якщо $p > 0.05$, то нульова гіпотеза про відсутність відмінностей середніх арифметичних не відхиляється.







Якщо $p \leq 0.05$, то нульова гіпотеза відхиляється і приймається альтернативна про відмінність середньоарифметичних у порівнюваних вибірок [5].



Представлення результатів оцінки текстом чи таблицею, отриманих *перевіркою гіпотез*, для кожної з вибірок повинно містити їх об'єми n_1 і n_2 , середні арифметичні \bar{x}_1 і \bar{x}_2 , середні квадратичні відхили s_1 і s_2 , прийнятий рівень значущості α , результати оцінки нормальності розподілу і рівності дисперсій з наведенням критеріїв та числовим представленням одержаних результатів — величину і точний рівень значущості p ; назву критерію і результати його застосування і вказівку на використання модифікованого критерію Стюдента для вибірок із різними дисперсіями [5].



7.3.7.11.2. Тест Стьюдента при порівнянні за групами


При порівнянні вибірок сортозразків із сортом–стандартом у 2004 р. *по групах* дані оформляються двома колонками, як при побудові графіків типу *Whisker plot* (див. підрозділ 15.6 Діаграми діапазонів) або *Box–whisker plot* (підрозділ 15.7 Побудова діаграми розмахів). Одна з них групуюча ( *Grouping variable:* / *Группирующие:*) містить коди, що вказують приналежність даних до конкретної групи *Стандарт–2004* чи *Колекція–2004*. Інша — досліджувана (залежна) змінна ( *Dependent variable:* / *Зависимые:*) — містить власне дані.


Для виконання *t*–тесту для незалежних вибірок необхідно виконати наступні дії. У меню *Statistics* / *Анализ* (1) вибираємо модуль  *Basic Statistics/Tables* / *Основная статистика/Таблицы* (2) (рис. 7.11, на с. 400). Далі відмічаємо опцією /  *t-критерий для независимых выборок* (1), натиснувши **ОК** (2) для переходу в діалогове вікно /  *Т-критерий для независимых групп:* (рис. 7.12).



Тут у вкладці *Options* / *Опции* натискаємо  *Variables:* /  *Переменные:* (3) відкриваємо вікно вибору змінних  *Select the dependent variables and one grouping variable* / *Выберите зависимые переменные и одну группирующую переменн...* і вказуємо, що залежною ( *Dependent variable:* / *Зависимые:*) є *Показник*, а групуючою ( *Grouping variable:* / *Группирующие:*) *Група* (4) і натисканням **ОК** (5) повертаємося в діалогове вікно /  *Т-критерий для независимых групп:* і задаємо рівень статистичної значущості *p-level for highlighting:* *0.05* / *Уровень значимости для выделения:* *0.05* (6). Додатково можна активізувати поля  *Display long variable names* /  *Отображать длинные имена переменных* (7) і включення в звіт розрахунку певних критеріїв (поля  *Levene's test* /  *Критерий Левена* (8) і  *Brown & Forsythe test* /  *Критерий Брауна и Форсайта* (9) — критеріїв, розроблених для вибіркового спостереження).

Якщо поле  *t-test with separate variance estimates* /  *t-критерий с разделен. оценками дисперсий* (10) не активізувати, це означає, що завдання вирішується в умовах припущення про *невідомі, але рівні дисперсії* (табл. 7.30 і 7.33).

Якщо це поле активізується  *t-test with separate variance estimates* /  *t-критерий с разделен. оценками дисперсий* (10), то завдання вирішується в припущенні *невдомих і не рівних дисперсій* (табл. 7.31 і 7.32). При цьому в таблиці результатів з'являються три нові показники (у головці табл. 7.31 і 7.32, а також боковику табл. 7.34 вони позначені жовтим кольором).

Рис. 7.12. Вікна вибору варіантів t -тесту для опції

 t-критерий для независимых выборок

Далі переходимо на вкладку **Quick/Быстрый** (11). Результати аналізу при натисненні  **Summary/OK** (12) чи дії процедури  **Summary: I-tests/OK** (12) виводяться одним довгим рядком, що не зовсім зручно, тому у табл. 7.30–7.33 для більш наочного представлення рядки розбиваємо на частини.

У меню **Statistics** / **Анализ** (1) вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables** / **Основная статистика/Таблицы** (2) (рис. 7.11), вказуємо опцію **t-test, dependent samples** / **t-критерий для зависимых выборок** (3) і натисненням **ОК** (4) переходимо на вкладку **Advanced** / **Дополнительно** (5) панелі процедур і установок

T-Test for Dependent Samples: / **t-критерий для зависимых выборок:** (рис. 7.13).

Далі натиснення кнопки процедури Box & whisker plots / Диаграммы размаха

(12) дає блокову діаграму розмаху, аналогічну наведеним на рис. 2.19, с. 117.

Одержані дані, представлені в табл. 7.35, співпадають із результатами табл. 7.20 і 7.29 і також свідчать, про статистично істотну відмінність між порівнюваними вибірками.

Представлення результатів описано у підрозділі **7.3.7.6.5 Оцінювання середньої різниці між вибірками довірчим інтервалом**.







Якщо дві незалежні вибірки розподілені ненормально, то для їх порівняння слід застосувати тест Уїлкоксона (*Wilcoxon matched pair test*) (див. **7.4.3.3 Знако–ранговий критерій (Т–критерій Уїлкоксона)**).



Таблиця 7.35. Результати перевірки відмінності різниці середніх вибірок з попарно зв'язаними варіантами

Переменная	Т-критерий для зависимых выборок (Биометрия-П) Отмечены разности, значимые на уров. $p < .05000$							
	Среднее	Стд. от.	N	разн.	Стд. от. разн.	t	сс	p
Кількість стручків на гілці-04	26.44753	4.853746						
Кількість стручків на гілці-05	36.40757	6.666736	96	-9.96004	7.850447	-12.4309	95	0.000000

7.3.7.11.4. Тестове визначення t –критерію Стьюдента

При застосуванні t –критерій Стьюдента для оцінки середнього двох вибірок ППП **Statistica** використовуються їх показники: середні значення \bar{x} , середньостатистичні відхили s і об'єми вибірок n .

При розрахунках у меню **Statistics / Аналіз** вибираємо модуль  **Basic Statistics/Tables** /  **Основные статистики и таблицы**, де на однойменній панелі, використавши опцію  **Difference tests: r, %, means** /  **Другие критерии значимости** виходимо на однойменну панель  **Difference tests: r, %, means** /  **Другие критерии значимости** (рис. 7.14 і 7.15).

На вкладці **Difference between two means (normal distribution)** / **Сравнение двух средних (нормальное распределение)** задаємо середні значення \bar{x} , середньостатистичні відхили s і об'єми вибірок n . Вони позначені відповідно (1) і (2), далі указуємо вид критерію  **Two-sided** /  **Двусторонний** (3) — застосовуємо двобічний критерій (так як немає теоретичного обґрунтування того, що одно із середніх свідомо більше іншого) і, натиснувши **Compute** / **Вычислить** (4), розраховуємо його значення.

На рис. 7.14 представлено застосуванні t –критерій Стьюдента для оцінки середнього вибірок кількості стручків на центральній гілці у 2004 р. для сорту–стандарту за табл. 2.8, с. 93 і колекції за табл. 2.10, с. 95. У результаті за рис. 7.14 маємо $p=0.0077$.

На рис. 7.15 представлено визначення t –критерію Стьюдента за числовими даними кількості стручків на центральній гілці у 2004 р., взятими з табл. 2.11 с. 96 і у 2005 р.

Другие критерии значимости: Таблица данных1

☐ Печатать результаты после каждого вычисления

Отмена

Сравнение двух коэффициентов корреляции

r1: 0.00 N1: 10 r: 1.0000

r2: 0.00 N2: 10

☐ Односторонний

☒ Двусторонний

Вычислить

Сравнение двух средних (нормальное распределение)

1 C1: 30.6012 St.откл.1: 4.99106 N1: 11

C2: 26.4496 St.откл.2: 4.79846 N2: 100 2

p: 0.0077

☐ Односторонний

☒ Двусторонний 3

Вычислить

☐ Среднее выборки 1 в сравнении со средним 2

Сравнение двух пропорций (долей)

Пр.1: .50 N1: 10

Пр.2: .50 N2: 10 p: 1.0000

☐ Односторонний

☒ Двусторонний

Вычислить

Рис. 7.14. Порівняння середніх при однакових вибіркових дисперсіях

Таким чином як результат дій з рис. 7.15 маємо результатом $p=0.0000$, беручи відповідно до табл. 7.15, с. 377 маємо різні вибіркові дисперсії.

Difference tests: r, %, means: Біометрія

☐ Send/print results for each Compute to Report window

Cancel

Difference between two correlation coefficients

r1: 0.00 N1: 10

r2: 0.00 N2: 10 p: 1.0000

☐ One-sided

☒ Two-sided

Compute

Difference between two means (normal distribution)

1 M 1: 26.4906 StDev 1: 4.79219 N1: 101

M 2: 36.2590 StDev 2: 6.66127 N2: 140 2

p: 0.0000

☐ One-sided 3

☒ Two-sided

Compute 4

☐ Single mean 1 vs. population mean 2

Difference between two proportions

Pr.1: .500000 N1: 10

Pr.2: .500000 N2: 10 p: 1.0000

☐ One-sided

☒ Two-sided

Compute

Рис. 7.15. Порівняння середніх при різних вибіркових дисперсіях

За результатами рис. 7.14 і 7.15, отримані з використанням ППП **Statistica**, маємо $p < \alpha$, таким чином нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про те, що середні значення різні.

Таким чином результати дій за рис. 7.14 і 7.15 співпадають відповідно з результатами табл. 7.15 і 7.14, а також табл. 7.30 і 7.31.

Так як за табл. 7.14, с. 375 перша пара розподілів має однакові вибіркові дисперсії, а відповідно до табл. 7.15, с. 377 друга пара розподілів харак-

теризується різними вибіровими дисперсіями, використаний інструмент придатний визначення t -критерію Стюдента за любых умов.

При текстовому чи табличному представленні результатів слід навести середньоарифметичні \bar{x} вибірок, обсяги n , середній квадратичний відхил s вибірки, назву критерію, прийнятий рівень значущості α , та отримане точне значення розрахункового рівня значущості p [5].

7.3.7.12. Аналіз вибірок за допомогою t - і z -тестів із використанням пакету аналізу Microsoft Excel

7.3.7.12.1. Загальні положення

Тести t і z використовуються для порівняння середніх арифметичних двох вибірок — чи існує статистично значуще розходження між **двома** вибірками. З них Z -тест, який ґрунтується на нормальному розподілі, призначений для більших вибірок (понад 100). T -тест (критерій Стюдента) нагадує z -тест, але він підходить для невеликих вибірок (менше 30, а то й 10 значень).

При використанні критерію Стюдента (як і всіх параметричних) слід ураховувати необхідність перевірки обмежень його застосування:

— критерій Стюдента, як і z -тест, чутливий до нормальності статистичних вибірок, тому треба переконатися в нормальності статистичного розподілу даних обох порівнюваних вибірок [25] (див. підрозділи **6.5.4 Використання χ^2 -критерію для перевірки нормальності статистичного розподілу (підгонка розподілу)**, **6.11 Перевірка нормальності статистичного розподілу за допомогою коефіцієнтів асиметрії й ексцесу** і **7.4.2.3 Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова для оцінки розбіжності між емпіричними сукупностями**), і при необхідності зробити їх перетворення;

— розрахунок критерію Стюдента виконується за різними формулами в залежності від рівності або нерівності дисперсій порівнюваних рядів, що слід ураховувати (підрозділи **7.3.7.12.2 Виконання двовибіркового t -тесту із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel** і **7.3.7.12.3 Виконання двовибіркового t -тесту із статистично різними дисперсіями пакетом аналізу Excel**).

Для різних ситуацій розрахункові формули Використання критерію Стюдента неоднакові. Тому перш за все необхідно знати **залежні** чи **незалежні** порівнювані вибірки. Потім знайшовши фактичний критерій Фішера F , визначити рівні між собою чи не рівні дисперсії s_1^2 і s_2^2 порівнюваних вибірок (див. підрозділ **7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**).

Далі, виходячи з результатів, для ПА MS Excel вибирається тест

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями чи Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями.

7.3.7.12.2. Виконання двовибіркового t -тесту із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel

Для ілюстрації наведено порівняльний аналіз середніх значень кількості стручків на центральній гілці колекції сортозразків із сортом-стандартом у 2004 р., тобто порівняння отриманої вибірки з контрольною (рис. 7.16) використовуючи замість розрахункового способу, наведеного у підрозділі **7.3.7.3 Двовибірковий гомоскедастичний t -тест**, **Двухвыборочный t -тест с одинаковыми дисперсиями** ПА MS Excel.

При розрахунках взяті ті ж самі дані, що і для табл. 7.14, с. 375.

Перед застосуванням цього тесту за критерієм Фішера–Снедекора слід упевнитися у статистичній рівності (однорідності) дисперсій s_1^2 і s_2^2 *двох* порівнюваних вибірок (див. підрозділ **7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**, табл. 7.8, с. 360).




Рис. 7.16. Порядок застосування інструменту ПА MS Excel

Двухвыборочный t -тест с одинаковыми дисперсиями

Спочатку слід натиснути **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) і на одній панелі з **Инструменты анализа** вибрати **Двухвыборочный t -тест с одинаковыми дисперсиями** (3) і натиснути **ОК** (4). На відкрит-

тій панелі **Генерация случайных чисел** у **Входные данные** активізувати ☒ **Метки** (5) для включення в дані заголовків, задати рівень статистичної значущості α **Альфа: 0.05** (6) (див. с. 339), окремо указати **Интервал переменной 1:** (7) і **Интервал переменной 2:** (8), у **Параметры вывода** призначити вивід результатів на **Новый рабочий лист:** (9) та натиснути **ОК** (11).

За **Гипотетическая средняя разность:** приймається **нуль**. Це пояснюється тим, що нульова гіпотеза полягає у збігу двох порівнюваних значень, тобто $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$ або щось подібне. В такому випадку гіпотетична, тобто передбачувана різниця може становити тільки одне єдине значення — нуль. Отже, при порівнянні середніх, не залежно від використовуваного методу, в вікні **Гипотетическая средняя разность:** слід вказувати **нуль**, який можна не вводити.

Відредагована таблиця результатів (табл. 7.36) має вигляд.

З отриманих результатів у загальному випадку цікава не величина t сама по собі (хоча цю величину теж представляють). Уся змістовна інформація знаходиться в другій величині — це величина p довірчого рівня значущості, яка представлена критичними значеннями — однобічним $P(T \leq t)$ і двобічним $P(T \leq t)$. Щоб спростувати нульову гіпотезу, яка завжди формульована так: вибірки взяті з однієї генеральної сукупності і їх середні арифметичні однакові, тобто $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$, вони повинні бути нижче, ніж прийняте критичне значення **Альфа: 0.05** (6 на рис. 7.16). Тобто при $p \leq \alpha$ нульова гіпотеза відкидається, і це означає, що середні арифметичні двох порівнюваних вибірок не рівні і між ними існує статистично достовірна відмінність. Так як **t-статистика** > 0 , показник стандарту більші за показник колекції.

Таблица 7.36. Проверка відмінностей застосуванням

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями

Показник	Стандарт-2004	Колекція-2004
Среднее	30.60118523	26.44957665
Дисперсия	24.9107206	23.02472056
Наблюдения	11	100
Объединенная дисперсия	23.19774809	
Гипотетическая разность средних	0	
df	109	
t-статистика	2.713490717	
P(T<=t) одностороннее	0.003870201	
t критическое одностороннее	1.658953458	
P(T<=t) двухстороннее	0.007740401	
t критическое двухстороннее	1.98196749	

Слід звернути увагу, якщо середні арифметичні не рівні, використовується **P(T<=t) двухстороннее**. При **P(T<=t) одностороннее** приймається при перевірці припущення про те, що одне із них менше або більше за інше [25]. Зауважимо, що порівняння виконується лише для правобічних гіпотез, тобто нульова гіпотеза буде спростовуватися за умови **t-статистика** \geq **t критическое двухстороннее**, тобто **P(T<=t) двухстороннее** \leq **Альфа: 0.05**, так як **P(T<=t) двухстороннее** $>$ **P(T<=t) одностороннее** і відповідно **t критическое двухстороннее** $>$ **t критическое одностороннее**.

Дані табл. 7.36 і 7.14 (с. 375) повністю співпадають.

При непараметричному розподілі або представлення даних дискретною шкалою для порівняння вибірок із рівними дисперсіями використовується *U-критерій Манна-Уїтні*, див. 7.4.2.1 *U-критерій Манна-Уїтні*.

7.3.7.12.3. Виконання двовибіркового *t*-тесту із статистично різними дисперсіями пакетом аналізу Excel

Основне припущення у вихідній формі *t*-тесту полягає в рівності дисперсій двох вибірок, проте, як зрозуміло, реально це припущення майже не виконується. Щоб обійти це явище було створено інший варіант *t*-тесту — *Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями*.

Дані взято аналогічно табл. 7.15, с. 377.

Сам процес розрахунку аналогічний наведеному вище *Двухвыборочному t-тесту с одинаковыми дисперсиями* (див. 7.3.7.12.2 *Виконання двовибіркового t-тесту із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel*) з тою різницею, що на виниклій панелі *Анализ данных* (рис. 7.16) в *Инструменты анализа* слід замість *Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями* прийняти тест з різними дисперсіями, тобто *Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями*.

Перед застосуванням тесту за критерієм Фішера слід оцінити статистичну нерівність дисперсій порівнюваних вибірок, як представлено у табл. 7.37. Її дані свідчить про нерівність дисперсій.

Таблиця результатів створена на окремому листі, представляється у відредагованому вигляді (табл. 7.38).

Як бачимо розрахунковий *t*-критерій більше табличного, $13.24 > 2.256$, що свідчить про відмінності між порівнюваними вибірками, тобто вони неоднорідні. Так як *t-статистика* > 0 , показник колекції 2005 р. перевищує величину 2004 р.

Таблица 7.37. Результаты теста за критерием Фишера

	A	B	C
1		Колекція-2004	Колекція-2005
2		30.4	37.9
3		30.4	37.9
4		28.6	37.5
100		23.4	42.8
101		30.6	47.8
102			35.0
103			34.2
104			40.9
105			40.0
106			22.1
107			39.3
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142	Дисперсия s^2	22.97	44.37
143	Степень вольности n	100	139
144	Рівень значущості α	0.05	
145	Розрахунковий критерій Фішера F_{ϕ}	1.932	
146	Рівент значущості критерію Фішера p	0.00029	
147	Табличний критерій Фішера F_T	1.364	

Таблиця 7.38. Перевірка відмінностей застосуванням

Двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями

Найменування показника	Колекція-2004	Колекція-2005
Среднее	36.25908415	26.49068168
Дисперсия	44.37253327	22.96512537
Наблюдения	140	101
Гипотетическая разность средних	0	
df	239	
t-статистика	13.24020608	
P(T<=t) одностороннее	1.10823E-30	
t критическое одностороннее	1.651254165	
P(T<=t) двухстороннее	2.21646E-30	
t критическое двухстороннее	1.969939406	

Результати табл. 7.38 і 7.15 (с. 377) повністю співпадають.

Якщо дисперсії не беруться до уваги, то при однаковій величині вибірок використовується *t-тест без припущення про дисперсії* [25].

З даних табл. 7.11, 7.36 і 7.38 видно, що у всіх випадках двобічне значення $P(Z \leq z)$ і $P(T \leq t)$ уведене критичне значення **Альфа: 0.05** (6) (рис. 7.16 і 7.7), що свідчить про статистично достовірну відмінність як між вибірками 2004–2005 рр., так і між досліджуваними колекційними зразками і сортом-стандартом у 2004 р. Так як $z > 0$, показник колекції 2005 р. перевищує величину 2004 р.

Також для всіх випадків виконуються умови $z \geq z_{\alpha(v)}$ і $t \geq t_{\alpha(v)}$ (z і t – статистика відповідно більше ніж z і t критичне двобічне), що свідчить про істотну відмінність між досліджуваними вибірками [53].

7.3.7.13. Швидкий тест Вайєра

Для швидкого порівняння двох статистичних рядів слід користуватися швидким тестом Вайєра, який обчислюється за формулою [6]

$$W = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{\sqrt{v_1 \cdot s_{\bar{x}_1}^2 + v_2 \cdot s_{\bar{x}_2}^2}} \cdot \sqrt{n_1 \cdot n_2 \cdot \frac{v_1 + v_2 - 2}{n_1 + n_2}}. \quad (7.37)$$

Якщо виконується умова $W \geq 2$, то вибірки статистично достовірно відрізняються на довірчому рівні значущості $\alpha = 0.05$.

7.3.7.14. Оцінка різниці між коефіцієнтами варіації

Статистична значущість різниці між коефіцієнтами варіації V_1 і V_2 двох порівнюваних незалежних вибірок, взятих з нормально розподілених сукупностей оцінюється за t -критерієм Стьюдента [15].

Нульова гіпотеза завжди формулювана: вибірки взяті з однієї генеральної сукупності і їх коефіцієнти варіації однакові, тобто $H_0: V_\Delta = 0$, альтернативна — матиме вигляд $H_A: V_\Delta \neq 0$ [33].

При **точковій оцінці** розрахунок виконується за формулою (1.108) і нульова гіпотеза відхиляється при $t \geq t_{\alpha(v)}$, де $v = n_1 + n_2 - 2$ [15]. Також достовірність різниці між коефіцієнтами варіації можна відхилити при $t \geq 3$ [65] з поправкою $\frac{6}{n-4}$ на малу кількість (при $n < 25$) спостережень [2].

Особливості формули (1.108) є те, що вона застосовується як при рівності, так і нерівності вибірок [15].

Для ілюстрації наведено порівняльний аналіз експериментальних коефіцієнтів варіації за вихідними даними табл. 7.8, с. 360, поданий в табл. 7.39.

Порядок дій виконується у відповідності з формулами (1.100), (1.102), (1.106) і (1.108), які відображені на табл. 7.20 червоним кольором.

Розрахунковий критерій Стьюдента $t = 0.4611$ менше табличного $t_{0.025(109)} = 2.6285$, нульова гіпотеза приймається при значущості 0.05, тобто можна стверджувати, що різниця між даними вибірками статистично незначуща.

Оцінка за допомогою **довірчого інтервалу** статистичної рівності коефіцієнтів варіації застосовується за нормального розподілу ознаки. При цьому межі довірчого інтервалу розраховуються за виразами (1.106) чи (1.107).

Отримані межі довірчих інтервалів вибірок за умови $H_0: V_1 = V_2$ з прийнятим рівнем значущості α повинні взаємно перекриватися, що має місце у даному випадку.

Таблиця 7.39. Оцінка різниці між коефіцієнтами варіації

	CL	CM	CN
102	Середнє \bar{x}	30.6	26.4
103	Обсяг вибірки n	11	100
104	Стандартний відхил s	4.991	4.798
105	Коефіцієнт варіації V	16.31	18.14
106	Рівень значущості α	0.05	
107	Табличний критерій Стьюдента t_r	2.2728	
108	Похибка коефіцієнту варіації s_v	3.7428	1.3310
109	Розрахунковий критерій Стьюдента t_ϕ	0.4611	
110	Нижня межа довірчого інтервалу $V - t_r \cdot s_v$	15.031	17.609
111	Верхня межа довірчого інтервалу $V + t_r \cdot s_v$	17.826	18.708

$CM105 = 100 * CM104 / CM102$ $CN105 = 100 * CN104 / CN102$
 $CM107 = \text{СТЮДЕНТ.ОБР.}2X(CM106/2; (CM103 + CN103 - 2))$
 $CM108 = CM105 * ((1 + 2 * (CM105/100)^2) / (2 * (CN103 - 1)))^{0.5}$
 $CN108 = CN105 * ((1 + 2 * (CN105/100)^2) / (2 * (CN103 - 1)))^{0.5}$
 $CM109 = \text{ABS}(CM105 - CN105) / (CM108^2 + CN108^2)^{0.5}$
 $CM110 = CM105 / (1 + CM107 * CM108 / 100)$
 $CM111 = CM105 / (1 - CM107 * CM108 / 100)$
 $CN110 = CN105 / (1 + CM107 * CN108 / 100)$
 $CN111 = CN105 / (1 - CM107 * CN108 / 100)$

Також цей спосіб застосовується для оцінки статистичної відповідності коефіцієнту варіації V заданому (фіксованому значенню коефіцієнту варіації V_0 як у підрозділі **7.3.7.2.1 Розрахунковий метод оцінки за одновибірковим t -критерієм Стюдента**) за умови $H_0: V=V_0$ з прийнятим рівнем значущості α . Для прийняття нульової гіпотези фіксоване значення коефіцієнтами варіації V_0 повинно розташовуватися у межах довірчих інтервалів коефіцієнтів варіації.

7.3.8. Множинні порівняння вибірок

7.3.8.1. Помилки у використанні t -критерію Стюдента

Критерій Стюдента призначений для порівняння двох груп. Однак на практиці він неправильно використовується для оцінки відмінності більшого числа груп за допомогою попарного їх порівняння. При цьому вступає в силу ефект множинних порівнянь [45].

Розглянемо приклад. Досліджують ступінь подрібнення маси кормозбиральних комбайнів фірм “Зоря” і “Зірка”. Дослідження проводять на трьох машинах — базової “Ганна” фірми “Зоря” і серійної “Гапка” та модернізованої “Гапка–Прима” фірми “Зірка”. За допомогою t -критерію Стюдента проводять три парних порівняння, порівнюючи комбайни “Ганна” і “Гапка”, “Ганна” і “Гапка–Прима” та “Гапка ” і “Гапка–Прима”. Отримавши досить високе значення t в будь-якому з трьох порівнянні повідомляють що $p < \alpha$. Це означає, що ймовірність помилкового висновку про існування різниці не перевищує α . Але це невірно: ймовірність помилки значно перевищує α .

Розберемося докладніше. У дослідженні був прийнятий α рівень значущості. Значить ймовірність помилитися при порівнянні машин “Ганна” і “Гапка–Прима” — α . Здавалося б все правильно. Але точно також ми помилимося в α випадках при порівнянні комбайнів “Гапка ” і “Гапка–Прима”. І нарешті, при порівнянні машин “Ганна” і “Гапка” помилка можлива також у α випадків. Отже, ймовірність помилитися хоча б в одному з трьох порівнянні складе не α , а значно більше.

У загальному випадку ця ймовірність дорівнює [45]

$$p = 1 - (1 - \alpha)^k \approx \alpha^k, \quad (7.38)$$

де k — число порівнянь.

Тобто ймовірність помилитися при кількості k багаторазових порівнянь хоча б в одному з них приблизно у k разів більше ніж у парному, тобто у нашому випадку приблизно 3α . Таким чином, якщо t -критерій Стюдента

був використаний для перевірки відмінностей між декількома групами, то справжній рівень значимості можна отримати, помноживши емпіричний рівень значущості на число можливих порівнянь.

Тобто, коли при випробуваннях, виявили таким способом "ефективний" комбайн з емпіричним рівнем значущості p , ймовірність помилки, насправді буде дорівнює $3p$ [45].

7.3.8.2. Перевірка рівності декількох середніх за допомогою дисперсійного аналізу

Перевіряється нульова гіпотеза про приналежність декількох середніх значень нормально розподілених вибірок до однієї генеральної сукупності, тобто $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \bar{x}_3$.

Використовується методологія дисперсійного аналізу (3.48) розраховуємо критеріальне значення знаходимо емпіричний критерій Фішера [25]

$$F = \frac{\sum_{i=1}^m n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{m - 1} \cdot \frac{n - m}{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n n_i (\bar{x}_{ij} - \bar{x}_i)^2}, \quad (7.39)$$

де n – загальна кількість експериментів, $n = \sum_{i=1}^m n_i$;

n_i – обсяг i -ої вибірки;

\bar{x}_i – середнє значення по i -ій вибірці;

\bar{x} – загальне середнє значення по об'єднаній вибірці;

x_{ij} – значення змінної в j -му експерименті i -ої вибірки.

Для знаходження першого співмножника виразу (7.39), який представляє собою оцінку вибірових дисперсій, спочатку за виразом (7.40) знаходиться стандартна похибка $s_{\bar{x}}$ загальнсереднього \bar{x} [45]

$$s_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2}{k - 1}} \quad (7.40)$$

і далі за виразом (7.41) отримується внутрішня дисперсія [45]

$$s_v^2 = n \cdot s_{\bar{x}}. \quad (7.41)$$

Таким чином другий співмножник виразу (7.39) є об'єднаною оцінкою дисперсії сукупності і визначається як середнє вибірових дисперсій [45]

$$s_z^2 = \frac{\sum_{i=1}^k s_i^2}{k}, \quad (7.42)$$

Далі за виразом (3.48) знаходимо емпіричний критерій Фішера, який порівнюється з одностороннім критичним, знайденим для прийнятого рівня значущості α і ступенів вільності вибірових дисперсій і дисперсії сукупності, розрахованих відповідно за виразами (7.43) і (7.44)

$$v_v = m - 1; \quad (7.43)$$

$$v_z = n - m. \quad (7.44)$$

Таблиця 7.40 – Перевірка рівності декількох середніх за F -критерієм Фішера

	A	B		
		В	С	D
1	B24=СЧЁТ(В3:В23)	Рік		
2	B29=ДИСП.В(В3:В23)	2010 р.	2011 р.	2012 р.
3	B25=СРЗНАЧ(В3:В23)	7.8	16.8	14.3
4	B26=СТАНДОТКЛОН.В(В25:В25)	6.2	14.9	12.6
5	B27=СЧЁТ(В24:В24)	4.0	10.9	9.2
6	B28=СЧЁТ(В3:В23)-В27	4.6	14.2	11.8
7	B30=СУММКВ(В29:В29)/В27	3.8	13.6	11.3
8	B31=СРЗНАЧ(В24:В24)*В26^2	3.1	13.1	11.1
9	B32=В31/В30	2.4	12.7	10.8
10	B33=Ф.ОБР.ПХ(В33; (В27-1); В28)	7.5	16.3	13.7
11	B34=Ф.РАСП.ПХ(В32; (В27-1); В28)	6.1	14.7	12.4
12		3.7	10.1	8.4
13		3.8	11.7	10.0
14		2.7	9.6	8.1
15		2.6	11.2	9.4
16		2.0	10.4	8.9
17		8.9	19.2	16.1
18		7.5	18.0	15.3
19		5.0	13.4	11.3
20		3.4	10.5	8.8
21		3.6	13.0	11.0
22		1.4	6.1	5.0
23		1.8	9.5	8.0
24	Кількість дослідів n	21	21	21
25	Середня дослідів \bar{x}	4.38	12.85	10.83
26	Середньоквадратична похибка дослідів	4.43		
27	Кількість груп m	3		
28	Число ступенів вільності v	60		
29	Середньоквадратичний відхил s	4.69	9.95	7.19
30	Дисперсія сукупності sz^2	57.58		
31	Міжгрупова дисперсія sv^2	411.66		
32	Критерій Фішера емпіричний F	7.150		
33	Прийнятий рівень значущості α	0.05		
34	Критерій Фішера табличний $F_{\text{т}}$	3.150		
35	p -рівень критерій Фішера	1.6402E-03		

Для прикладу оцінимо вплив погодних умов на урожайність за трирічними даними (табл. 7.40).

Оцінка рівності середніх вибірок за критерієм Фішера виконується за виразами (7.39)–(7.44) з використанням відповідних статистичних формул **СТАНДОТКЛОН.В**, **СЧЁТ**, **СРЗНАЧ**, **СУММКВ**, **СРЗНАЧ**, **Ф.ОБР.ПХ**, **Ф.РАСП.ПХ** і **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** і **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** ПА MS Excel (див. Додаток А), наведених на полі табл. 7.40 червоним кольором.

Для двобічного критерію тобто $F=7.150 < F_{\alpha/2(v_1, v_2)}=3.150$, відповідно $p=1.6402 \cdot 10^{-3} < \alpha=0.05$. Виходячи з цього вибірові середні на

прийнятому рівні значущості не є оцінками однієї генеральної сукупності, тобто вплив погодних умов на урожайність за трирічними даними статистично істотний.

Однак дисперсійний аналіз дозволяє перевірити лише гіпотезу про рівність всіх дисперсій. Але якщо гіпотеза не підтверджується, не дозволяє дізнатися яка саме група відрізняється від інших.

Це дозволяють зробити методи множинного порівняння.

7.3.8.3. Множинні порівняння за t -критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні

Так як при множинних порівняннях через багаторазового застосування критерію ймовірність помилково знайти відмінності там, де їх немає зростає, то при дослідженні груп більше двох, слід скористатися дисперсійним аналізом і упевнитися у рівності середніх. Далі проводяться використовуються **методи множинного порівняння**.

Всі вони ґрунтуються на t -критерії Стюдента, але враховують, що порівнюється більше однієї пари середніх.

При цьому слід за допомогою дисперсійного аналізу перевірити нульову гіпотезу про рівність всіх *середніх*, а вже потім якщо нульова гіпотеза відкинута виділити серед них відмінні від інших, використовуючи для цього методи множинного порівняння.

Найпростіший з методів множинного порівняння — введення поправки Бонферроні, яка ґрунтується на формулі (7.38). Цей результат є окремим випадком нерівності Бонферроні, якщо k раз застосувати критерії з довірчим рівнем значущості α , то ймовірність хоча б в одному випадку знайти відмінність там, де його немає не перевищує добутку k на α . Нерівність Бонферроні виглядає так: [45]

$$\alpha' < k\alpha, \quad (7.45)$$

де α' — ймовірність хоча б один раз помилково виявити відмінності.

Можна сказати, що α' власне і є істинним рівнем значущості багаторазово застосованого критерію. З нерівності Бонферроні слід, що якщо ми хочемо забезпечити ймовірність помилки α' , то в кожному з порівнянь ми повинні прийняти рівень значущості $\alpha = \alpha'/k$ — це і є поправка Бонферроні.

Поправка Бонферроні добре працює, якщо число порівнянь невелика. Якщо воно перевищує 8, метод стає занадто "суворим" і навіть досить великі відмінності доводиться визнавати статистично незначущими.

Один із способів пом'якшити строгість поправки Бонферроні полягає в тому, щоб збільшити число ступенів вільності, скориставшись знайомої з дисперсійного аналізу внутрішньогрупової оцінкою дисперсії, використовуючи її замість об'єднаної оцінки дисперсії сукупності, тобто [45]

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_z^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}}, \quad (7.46)$$

де s_z^2 – об'єднана оцінка дисперсії сукупності.

Число ступенів вільності у цьому разі

$$v_z = k(m - 1), \quad (7.47)$$

тобто воно збільшується зі зростанням числа груп m , завдяки чому критичне значення t зменшиться.

Сама ж залежність числа парних порівнянь k від числа груп m виражається комбінацією числа груп m по 2, тобто

$$k = C_m^2 = \frac{m!}{2(m-2)!}. \quad (7.48)$$

Для визначення числа комбінацій груп в ПА **MS Excel** використовується статистична функція **ЧИСЛКОМБ** (див. Додаток А).

Розглянемо приклад. При дослідженні якості подрібнення маси, а саме, відсотку маси корму, яка не відповідає зоотехнічним вимогам, кормозбиральними комбайнами базовим “Ганна” фірми “Зоря” і серійним “Гапка” та модернізованого “Гапка–Прима” фірми “Зірка”. Дослідженнями, які проводилися на основі вивчення 25 зразків отримано відповідно 11.6, 10.1 і 9.0 % при середньостатистичних відхилах відповідно 1.18, 1.45 і 1.52 %. Чи можна вважати ці показники випадковими (табл. 7.41)?

Далі оцінимо середні вибіркові (див підрозділ **7.3.8.2 Перевірка рівності декількох середніх за допомогою дисперсійного аналізу за критерієм Фішера**).

Так як для двобічного критерію тобто $F = 8.786 < F_{\alpha/2}(v_1, v_2) = 3.124$, відповідно $p = 3.8524 \cdot 10^{-4} < \alpha' = 0.05$. Виходячи з цього вибіркові середні на прийнятому рівні значущості $\alpha' = 0.05$ є оцінками однієї генеральної сукупності, статистично рівні між собою, тобто однорідні.

Однак залишилося неясним, чи відрізняються від базового комбайна “Ганна” серійний “Гапка” та модернізований “Гапка–Прима” і чи відрізняються вони між собою. Тепер, використовуючи критерій Стюдента з поправкою Бонферроні, ми можемо попарно порівняти всі три комбайни.

При застосуванні оцінка рівності середніх дисперсії s_1^2 і s_2^2 вибірок за критерієм Фішера за виразом (3.48) та множинні порівняння за t -критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні виконуються із застосуванням розрахункових формул (7.45)–(7.48) та відповідних статистичних формул

ЧИСЛКОМБ, СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х і СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х ПА MS Excel (див. Додаток А), наведених на полі табл. 7.41 червоним кольором.

За даними табл. 7.41 є статистична достовірна відмінність між показниками комбайнів — модернізованим “Гапка–Прима” і “Ганна”, так як у цьому разі

$$t=4.175 < t_{\alpha(v_z)}=2.451,$$

відповідно

$$p=8.222 \cdot 10^{-5} < \alpha=0.05/3=0.0167.$$

Таблиця 7.41 – Множинні порівняння за t -критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні

	A	B	C	D	E	
1	Показник	Комбайн				
2		“Ганна”	“Гапка”	“Гапка-Прима”	“Ганна”	
3	Кількість дослідів <i>n</i>	25	25	25		
4	Середня дослідів <i>x</i> ср	11.6	10.1	9.0		
5	Середньоквадратична похибка дослідів	1.305				
6	Кількість груп <i>m</i>	3				
7	Число порівнянь <i>k</i>	3				
8	Число ступенів вільності <i>v</i>	72				
9	Середньоквадратичний відхил <i>s</i>	2.2	2.1	2.3		
10	Дисперсія сукупності <i>sz</i> ²	4.847				
11	Міжгрупова дисперсія <i>s v</i> ²	42.583				
12	Прийнятий рівень значущості <i>α</i>	0.05				
13	Критерій Фішера емпіричний <i>F</i>	8.786				
14	Критерій Фішера табличний <i>F</i> т	3.124				
15	<i>p</i> -рівень критерій Фішера	3.8524E-04				
16	Критерій Стюдента емпіричний <i>t</i>	2.409		4.175		
17			1.767			
18	Істинний рівень значущості <i>α'</i>	0.0167				
19	Критерій Стюдента табличний <i>t</i> т	2.4512				
20		0.0186		8.222E-05		
21	<i>p</i> -рівень критерію Стюдента		0.0815			

B5=СТАНДОТКЛОН.В(B4:D4)

B7=0.5*ФАКТР(B6)/ФАКТР(B6-2)

B8=СЧЁТ(B3:D3)*(СРЗНАЧ(B3:D3)-1)

B14=F.ОБР.ПХ(B12;(B6-1);B8)

B15=F.РАСП.ПХ(B13;(B6-1);B8)

B16=ABS(B4-C4)*(((B3*C3)/((B3+C3)*B10))^0.5)

D16=ABS(D4-B4)*(((D3*B3)/((D3+B3)*B10))^0.5)

C17=ABS(C4-D4)*(((C3*D3)/((C3+D3)*B10))^0.5)

B19=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(B18;(B8))

B20=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(B16;(B8))

D20=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(D16;B8)

C21=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(C17;B8)

B10=СУММКВ(B9:D9)/B6

B6=СЧЁТ(B3:D3)

B11=СРЗНАЧ(B3:D3)*B5^2

B13=B11/B10

B18=B12/B7

7.3.8.4. Застосування критерію Ньюмена–Кейлса

Як було сказано вище, якщо число порівнянь k перевищує 8, що з розрахунку за виразом (7.48) відповідає $m=5$, критерій Стюдента з поправкою Бонферроні стає надто жорстким і навіть вельми великі відмінності доводиться визнавати статистично незначущими. У цьому разі критерій Ньюмена–Кейлса більш чутливий і дає точнішу оцінку ймовірності α' .

При використанні критерію Ньюмена–Кейлса спочатку все середні впорядковують за зростанням і за допомогою дисперсійного аналізу перевіряється нульова гіпотеза про рівність всіх середніх. Якщо вона відкидається, для всіх пар порівнюваних даних за формулою (7.49) обчислюється емпірич-

ні значення p -критерію Ньюмена–Кейлса [45]:

$$q = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_z^2}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}}, \quad (7.49)$$

тобто порівняно з виразом (7.46) результат збільшений у $\sqrt{2}$ разу.

Обчислення значення q порівнюється з критичним значенням q_T (табл. Е.3 [45]). Критичне значення залежить від α' (ймовірність помилково виявити відмінності хоча б в одній з усіх порівнюваних пар, тобто справжній рівень значущості) числа ступенів вільності, розрахований за виразом (7.47) і інтервалу порівняння l , який визначається таким чином. Якщо порівнювані середні стоять відповідно на j -му та i -му місці в упорядкованому ряду, то інтервал порівняння становить

$$l = j - i + 1. \quad (7.50)$$

Результат застосування критерію Ньюмена–Кейлса залежить від черговості порівнянь, тому їх слід проводити в певному порядку. Цей порядок задається двома правилами.

Якщо ми розташували середні від меншого до більшого (від 1 до k), то спочатку потрібно порівняти найбільше (останнє) з найменшим (першим), тобто m -те з 1-им, потім m -те з 2-им і т.д. аж до $(m-1)$ -го. Потім передостаннє $(m-1)$ -е тим же порядком порівнюється з 1-им, 2-им і т.д. до $(m-2)$ -го. Продовжуються поки не переберем всі пари.

Таблиця 7.42 – Множинні порівняння за q -критерієм Ньюмена–Кейлса					
	A	B	C	D	E
1	Показник	Комбайн			
2		"Гапка–Прима"	"Гапка"	"Ганна"	"Гапка–Прима"
3		25	25	25	
4		9.0	10.1	11.6	
5		1.305			
8	Число ступенів вільності v	72			
9	Середньоквадратичний відхил s	2.3	2.1	2.2	
15	p -рівень критерій Фішера	3.852E-04			
16	Критерій Ньюмена-Кейлса	2.498		5.905	
17	емпіричний p	3.407			
18	Положення в ряду	1	2	3	
19	Інтервал порівняння l	2		3	
20			2		
21	Критерій Ньюмена-Кейлса	2.822		3.388	
22	табличний p_T		2.822		
$B16=ABS(B4-C4)*(((2*B3*C3)/((B3+C3)*B10))^0.5)$ $D16=ABS(D4-B4)*(((2*D3*B3)/((D3+B3)*B10))^0.5)$ $C17=ABS(C4-D4)*(((2*C3*D3)/((C3+D3)*B10))^0.5)$ $B19=C18-B18+1 \quad D19=D18-B18+1 \quad C20=D18-C18+1$					

Якщо будь-які середні не розрізняються, то все середні, що лежать між ними теж не розрізняються.

Для прикладу розглянемо використання критерію Ньюмена–Кейлса для аналізу використаємо вихідний матеріал табл. 7.42. При цьому дані ко-

лонок слід заздалегідь формувати за зростанням середніх значень досліджуваного показника, надаючи їм відповідний номер (рядок **18**).

Формули для розрахунків в рядках **5–15** табл. 7.42 відповідають формулам табл. 7.41.

Множинні порівняння за Ньюмен–Кейлса виконуються із застосуванням розрахункових формул (7.53)–(7.54), наведених на полі табл. 7.42 червоним кольором.

Знайдені за величинами $\alpha=0.05$, $v=72$ і $l=2$ та $l=3$ за табл. Е.3 критичні значення q_T вносяться в табл. 7.42.

З неї бачимо наявну статистично достовірну відмінність між показниками комбайнів — модернізованим “Гапка–Прима” і “Ганна”, так як у цьому разі $q = 5.905 < q_{\alpha(v;l)} = 3.388$ та “Гапка” і “Ганна” — $q = 3.047 < q_{\alpha(v;l)} = 2.822$.

Таким чином менш жорсткий, тобто більш чутливий критерій Ньюмена–Кейлса виявив додатково статистично істотну відмінність між комбайнами “Гапка” та “Ганна”.

Недоліком критерію Ньюмена–Кейлса є те, що його критичні значення подані лише таблицею [45] і не апроксимуються функціями широко вживаними в ПА MS Excel. Через це його незручно використовувати.

7.3.8.5. Критерій Тьюкі у множинних порівняннях

Критерій Дж. Тьюкі збігається з критерієм Ньюмена–Кейлса у всьому крім способу визначення критичного значення. У на відміну від критерію Ньюмена–Кейлса критичне значення q у критерію Тьюкі залежить лише від кількості груп m а не інтервалу порівняння l . Таким чином, критичне значення q весь час одне і те ж. Критерій Ньюмена–Кейлса був розроблений як удосконалення критерію Тьюкі. Оскільки в критерії Тьюкі при всіх порівняннях використовується максимальне критичне значення q , відмінності будуть виявлятися рідше, ніж при використанні критерію Ньюмена–Кейлса [45].

Застосовуючи критерій Тьюкі до щойно розглянутої задачі табл. 7.42 при $\alpha=0.05$, $v=72$ і $k=3$ за табл. Е.3 критичне значення q_T для всіх порівнянь дорівнюватиме $q_{\alpha(v;k)} = 3.388$.

Таким чином за цим критерієм статистично достовірною відмінністю буде лише між показниками комбайнів — модернізованим “Гапка–Прима” і “Ганна”, так як у цьому разі $q = 5.905 < q_{\alpha(v;m)} = 3.388$.

Критерій Тьюкі занадто жорстокий і відкидає існування відмінностей частіше, ніж потрібно, а критерій Ньюмена–Кейлса занадто м'який. Загалом, вибір критерію визначається скоріше психологічним фактором, чого більше боїться дослідник знайти відмінності там, де їх немає або пропустити їх там, де вони є. На погляд [45] краще використовувати критерій Ньюмена–Кейлса.

7.3.8.6. Множинні порівняння з контрольної групою

Іноді завдання полягає в тому, щоб порівняти кілька груп з контрольною. Звичайно, можна було б використовувати будь-який з описаних методів множинного порівняння (**7.3.8.3 Множинні порівняння за t-критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні**, **7.3.8.4 Застосування критерію Ньюмена–Кейлса** чи **7.3.8.5 Критерій Тьюкі у множинних порівняннях**): попарно порівнюючи всі групи, а потім відібрати ті порівняння, в яких брала участь контрольна група. Однак в будь-якому випадку (особливо при застосуванні поправки Бонферроні) через велику кількість зайвих порівнянь критичне значення виявиться не виправдано високим. Іншими словами ми занадто часто будуть пропущені реально існуючі відмінності [45].

Подолати ці труднощі дозволяють спеціальні методи порівняння — ще одна модифікація критерію Стюдента з поправкою Бонферроні і критерії Даннета. Як і інші методи множинного порівняння їх слід застосовувати тільки після того, як за допомогою дисперсійного аналізу буде відкинута нульова гіпотеза про рівність всіх середніх [45].

7.3.8.6.1. Використання поправки Бонферроні у множинних порівняннях з контрольної групою

При застосуванні поправки Бонферроні до порівняння показників \bar{x}_i декількох груп з однією контрольною \bar{x}_0 хід обчислень такий же що і для поправки Бонферроні (див. підрозділ **7.3.8.3 Множинні порівняння за t-критерієм Стюдента з поправкою Бонферроні**) у загальному випадку [45]

$$q' = \frac{\bar{x}_0 - \bar{x}_i}{\sqrt{s_z^2}} \cdot \sqrt{\frac{n_0 \cdot n_i}{n_0 + n_i}}. \quad (7.51)$$

Треба тільки врахувати, що число порівнянь k для розрахунку за формулою (7.45) становить тепер $m - 1$, число ж ступенів вільності знаходиться за формулою (7.47) [45].

Розглянемо приклад. При порівнянні якості подрібнення маси серійним кормозбиральними комбайном “Гапка” і модернізованим “Гапка–Прима” фірми “Зірка” з комбайном “Ганна” фірми “Зоря” і серійного “Гапка” та модернізованого “Гапка–Прима” фірми “Зірка”.

Порядок розрахунку і розрахункові формули використовуються як і у табл. 7.41 за винятком, що прийнятий рівень значущості, розрахований за формулою (7.45) становить $\alpha = \alpha'/k = 0.05/2 = 0.025$, Відповідно $t_{\alpha(v_z)} = 2.2892$.

Маємо наявну статистично достовірну відмінність між показниками базового комбайна “Ганна” з серійним “Гапка” — $t = 2.409 < t_{\alpha(v_z)} = 2.4512$ і з модернізованим “Гапка–Прима” — $t = 4.175 < t_{\alpha(v_z)} = 2.4512$.

Таким чином на відміну результатів підрозділу **7.3.8.3 Множинні порівняння за t-критерієм Стьюдента з поправкою Бонферроні** через збільшення α статистично значущим стає і відмінність між базовим комбайном “Ганна” з серійним “Гапка”.

7.3.8.6.2. Використання критерію Даннета при множинних порівняннях з контрольної групою

Критерій Даннета — це варіант критерію Ньюмена–Кейлса для порівняння декількох груп з однієї контрольної. Він обчислюється за виразом (7.51) [45].

Число порівняннi дорiвнює числу груп не рахуючи контрольної, тобто, $k = m - 1$ і значно менше ніж порівнянь в вихідному критерію Ньюмена–Кейлса (див. підрозділ **7.3.8.4 Застосування критерію Ньюмена–Кейлса**).

При розрахунку контрольну групу по чергово порівнюють з іншими. Число ступенів вільності обчислюють як в критерію Ньюмена–Кейлса за виразом (7.47).

Критичне значення критерію Даннета знаходиться за (табл. Е.4) для прийнятого рівня значущості α і параметру, рівному числу груп включаючи контрольну, тобто m [45].

Застосуємо критерій Даннета до аналізу даних табл. 7.41, виконаний в табл. 7.43. Формули для розрахунків в рядках **5–15** табл. 7.43 відповідають формулам табл. 7.41.

Множинні порівняння за критерієм Даннета, обчислювані за виразом (7.51), наведені на полі табл. 7.43 червоним кольором.

За табл. Е.4 знаходимо критичне значення для рівня значущості $\alpha = 0.05$ і $m = 3$, яке становить 2.264. Порівняємо показники комбайнів “Гапка” і модернізованого “Гапка–Прима” з базовим “Ганна”. З табл. 7.43 наявна статистична достовірність відмінності між показниками комбайнів — базового “Ганна” і модернізованого “Гапка–Прима”, так як у цьому разі $q' = 4.1765 < q'_{\alpha(v;m)} = 2.264$ та “Гапка” і “Ганна” — $q = 3.047 < q_{\alpha(v;l)} = 2.822$, відмінність між комбайнами “Гапка” і “Ганна” статистично неістотна.

Таблиця 7.43 – Множинні порівняння за q' -критерієм Даннета

	A	B	C	D	E
1	Показник	Комбайн			
2		“Ганна” (база)	“Гапка”	“Гапка– Прима”	“Ганна” (база)
3		Кількість дослідів n	25	25	25
4		Середня досліду \bar{x} ср	9.0	10.1	11.6
15	p -рівень критерій Фішера	3.852E-04			
16	Критерій Даннета емпіричний q'	1.767		4.175	
17	Критерій Даненета табличний q'_T	2.264			

$$B16=ABS(B4-C4)*(((B3*C3)/((B3+C3)*B10))^{0.5})$$

$$D16=ABS(D4-B4)*(((D3*B3)/((D3+B3)*B10))^{0.5})$$

Критерій Даннета, як варіант критерію Ньюмена–Кейлса більш чутливий, ніж критерій Стюдента з поправкою Бонферроні, особливо при великій кількості груп. Якби груп було більше, ми переконалися б, що критерій Ньюмена–Кейлса виявляє ті відмінності, які випускає критерій Стюдента з поправкою Бонферроні завищують критичні значення t [45].

7.4. ОБЧИСЛЕННЯ НЕПАРАМЕТРИЧНИХ КРИТЕРІЇВ

7.4.1. Загальні положення

Непараметричні критерії мають широку область застосування, стійкість висновків, простоту математичних засобів. При розподілах, відмінних від нормального, вони більш ефективні і точні за параметричні.

В основі непараметричних статистичних критеріїв лежить оперування частотами або рангами емпіричних даних. Для цього данні повинні бути представлені в шкалі *найменувань* (*номінативний*, див. с. 351), *рангів* (див. с. 352), *інтервалів* (див. с. 352). Розподіл даних при використанні непараметричних критеріїв може бути будь-яким, але при цьому необхідно враховувати обмеження, специфічні для деяких критеріїв.

Непараметричні методи застосовуються за умови:

- розподіл генеральній сукупності не відповідає нормальному закону;
- є сумніви в нормальності розподілу ознаки в генеральній сукупності, але вибірка занадто мала, щоб за нею його остаточно оцінити;
- не виконується вимога однорідності дисперсії при порівнянні середніх значень для незалежних вибірок.

На практиці перевага непараметричних методів найбільш помітна, коли в даних є викиди (екстремальна великі чи малі значення).

При вибірках з розмірами більше 100, то непараметричні методи порівняння використовувати недоцільно, навіть якщо не виконуються деякі вихі-

дні вимоги застосування параметричних методів. З іншого боку, якщо обсяги порівнюваних вибірок дуже малі (10 і менше), то результати застосування непараметричних методів можна розглядати лише як попередні.

Непараметричні тести можуть, звичайно, застосовуватися і в разі нормального розподілу значень. Але в цьому випадку вони будуть мати лише 93–95 % ефективності в порівнянні з параметричними тестами.

Рішення про вибір того чи іншого критерію приймається на підставі того, скільки вибірок зіставляється і який їхній обсяг.

Часто вживаними тестами є тести для порівняння двох і більше незалежних або залежних вибірок. Відомими тестами для цього є *U-тест Манна-Уїтні*, *H-тест Краскала-Уоллеса*, тест *Уїлкоксона* і тест *Фрідмана*. Важливу роль також відіграє одновибірковий тест *Колмогорова-Смирнова*, який може застосовуватися для перевірки наявності нормального розподілу.

При виборі непараметричного критерію насамперед слід визначити, чи є вибірка *залежною* або *незалежною*. Далі слід визначити їх *однорідність* чи *неоднорідність*. Потім слід оцінити *обсяг* вибірки і, знаючи обмеження кожного критерію за обсягом, вибрати *критерій*, який найбільш повно розкриють інформацію, що міститься в експериментальних даних.

При малому обсязі вибірки слід збільшувати величину рівня значущості (не менше 1%), так як невелика вибірка і низький рівень значимості призводять до збільшення ймовірності прийняття хибних рішень.

7.4.2. Порівняння двох незалежних вибірок

7.4.2.1. U-критерій Манна-Уїтні

7.4.2.1.1. Загальні положення при застосуванні U-критерію

U-критерій Манна-Уїтні (*Mann-Whitney Test for Two Independent Samples*) представляє собою двовибірковий варіант T-критерію Уїлкоксона (див. 7.4.3.3 Знако-ранговий критерій (T-критерій Уїлкоксона) рекомендується застосовувати для порівняння двох незалежних непараметричних малих вибірок за рівнем кількісно виміряної ознаки [37]. Будучи найбільш потужним (чутливим) серед непараметричних аналогів t-критерію Стюдента для незалежних вибірок, він застосовується в разі відмінності хоч би однієї вибірки від нормального статистичного розподілу, чи статистично значущої відмінності дисперсій, і рекомендується для вибірок чисельністю від 8 до 50 [74]. За іншими джерелами у кожній групі повинно бути не менше 3 спостережень (якщо в першій 2, то в другій — 5) і не більше 60 спостережень.

Критерій Манна-Уїтні перевіряє гіпотезу про однорідність двох незалежних вибірок: чи співпадають закони розподілу їхніх генеральних сукупностей. При використанні критерію Манна-Уїтні в гіпотезі найчастіше сфо-

рмулюється твердження щодо конкретного параметра.

Наприклад, нульова гіпотеза: не існує статистично значущих відмінностей в їх врожайності (вибірки взяті з однієї генеральної сукупності). Альтернативна гіпотеза: така відмінність існує (вибірки взяті із різних генеральних сукупностей). Емпіричне значення критерію відображає те, наскільки велика зона збігу між рядами. Чим менше емпіричне значення, тим більш імовірно, що відмінності достовірні.

Ідея критерію ґрунтується заснована на порівнянні m елементів першої вибірки з n елементами другої попарно. Всього утворюється $m \times n$ пар порівнянь. Для кожного елемента першої вибірки підраховується число другої, які менше, чи рівні, причому, якщо пар кілька елементів мають однакове значення, їм надаються середні арифметичні значення попереднього їм і наступного за ними рангів.

Емпіричне значення критерію показує, наскільки збігаються два ряди значень вимірюваної ознаки. Для обчислення статистики критерію значення двох вибірок представляються однією впорядкованою ранговою послідовністю значень від найменших до найбільших. Зауважимо, що у нього, як і у всіх рангових методах робляться поправки на співпадаючі ранги.

Значення U -критерію для вибірок U_1 і U_2 обчислюється за формулою

$$U_{1,2} = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_{1,2}(n_{1,2} + 1)}{2} - R_{1,2}, \quad (7.52)$$

де n_1, n_2 – відповідно обсяг першої й другої вибірки;
 R_1, R_2 – відповідно сума рангів за першою й другою вибіркою.
 Вірність розрахунку перевіряється виконанням умови

$$U_1 + U_2 = n_1 \cdot n_2. \quad (7.53)$$

У якості емпіричного значення приймається найменше значення з U_1 чи U_2 . Слід звернути увагу, що для U -критерій Манна–Уїтні *нульова гіпотеза відхиляється, якщо емпіричне значення менше критичного*, тобто за умови $U < U_{кр}$ і приймається альтернативна про відмінність вибірок [37].

Результати обох груп об'єднуються в загальний ранжований ряд, замінюючи числові значення ряду порядковими номерами цих значень при розташуванні їх за зростанням. Якщо кількість значень, які чергуються ("перехрещень") обох груп досить велике, то можна зробити висновок про схожість даних. У цьому випадку приймається нульова статистична гіпотеза.

Якщо ж кількість "перехрещень" невелика, то мова піде про розбіжності в розташуванні результатів груп, тобто про достовірність відмінностей між ними та прийнятті альтернативної гіпотези.

Значення сумують для кожної вибірки. За статистику приймається мінімальна з одержаних сум.

7.4.2.1.2. Розрахункове визначення U -критерію Манна-Уїтні

Визначити чи є різниця між схожістю двох партій насіння, табл. 7.44.

Таблиця 7.44 – Схожість насіння, %

Пар тія А	2.3	3.5	4.6	2.1	3.4	6.3	1.5	2.7	6.5	4.1	7.1
Пар тія В	1.3	2.4	4.5	3.2	2.5	4.2	3.5	4.6	2.8		

Нульова гіпотеза — вибірки між собою не відрізняються.

Виконаємо підрахунки випадків $\Pi A > \Pi B$ і $\Pi B > \Pi A$ (табл. 7.45), розташована у чарунках **Q1:T14**.

З результату вибираємо мінімальне значення $U = 41$.

За табл. Е.6 критичне значення U -критерій Манна-Уїтні при $n_1=11$ і $n_2=9$ для рівня значущості $\alpha=0.05$ становить $U_{кр}=23$. У даному випадку маємо $U > U_{кр}$, таким чином нульова гіпотеза підтверджується — вибірки між собою статистично не відрізняються, так як вона відхиляється, якщо емпіричне значення більше за критичне.

Таблиця 7.45 – Розрахункова таблиця U -критерію

Партія А		Партія В	
Схожість, %	Випадок $\Pi A > \Pi B$	Схожість, %	Випадок $\Pi B > \Pi A$
92.3	1	91.3	0
93.5	1	92.4	3
94.6	1	94.5	3
92.1	3	93.2	4
93.4	5	92.5	4
96.3	5.5	94.2	5.5
91.5	6	93.5	7
92.7	8.5	94.6	7
96.5	9	92.8	7.5
94.1	9		
97.1	9		
Разом	58		41

7.4.2.1.3. Визначення U -критерію Манна-Уїтні за допомогою ППП Statistica

Для ілюстрації використання непараметричних критеріїв візьмемо дані з підрозділу **7.3.7.7 Розрахунковий метод оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами за середньою різницею** (чарунки G3:G98 і K3:K98 табл. 2.12) і сформуємо табл. 7.46. Дані цієї таблиці подаються одним стовбцем, використовуючи рік, як змінну для групування.

У меню **Statistics** / **Анализ** (1) запускаємо модуль **Nonparametrics** / **Непараметрическая статистика** (2) (рис. 7.17).

На його панелі вибираємо опцію **Comparing two independent samples(groups)** / **Сравнение двух независимых групп** (3) і натискаємо **ОК** (4). На відкритій панелі процедур та установок **Comparing Two Groups** / **Сравнение двух групп** натискаємо **Variables** / **Переменные** (5) і на панелі **Select dep. variables and an indep. (grouping) variable** / **Выберите группирующую переменную и зависимые переменные** у якості показника групування **Indep. (grouping) variable** / **Группирующая переменная** вказуємо змінну **Рік** (7), а в якості залежної **Dependent variable list** / **Зависимые переменные** — змінну **кількості стручків на гілці** (6) і натиснувши **ОК** (8), повертаємося на панель **Comparing Two Groups** / **Сравнение двух групп**. На цій панелі задаємо рівень статистичної значущості (порогові значення) **05** (9) і натиснувши **M-W U test** / **OK** (10), або запустивши процедуру **Mann-Whitney U test** / **Критерий Манна-Уитни** (10) одержуємо табл. 7.47 з аналізом за U -критерій Манна-Уїтні).

За U -критерієм Манна-Уїтні нульова гіпотеза, сформульована зазвичай як: вибірки між собою не відрізняються.

Слід звернути увагу, що $n \geq 20$ приймається значення p , розташоване у 5-му стовбці, інакше — у 7-му [120]. Таким чином у нашому випадку маємо $p=0.518110$, тобто $p > \alpha$, що підтверджує відсутність у даних вибірок статистично істотних відмінностей — вибірки між собою статистично не відрізняються.

Таблиця 7.46

Вихідні дані для розрахунку U -критерію

STATISTICA - [Data: Test.sta* (10v		
File Edit View Insert Form		
Arial 10		
	1 Партія	2 Схожість, %
1	I	92.3
2	I	93.5
3	I	94.6
4	I	92.1
5	I	93.4
6	I	96.3
7	I	91.5
8	I	92.7
9	I	96.5
17	II	94.2
18	II	93.5
19	II	94.6
20	II	92.8




Рис.7.17. Вибір команд при обчисленні непараметричних критеріїв опцією **Comparing two independent samples(groups)/Сравнение двух независимых групп**.

Таблица 7.47. Результат перевірки використанням **Критерий Манна-Уитни**

Манна-Уитни U критерий (Тест)										
По перем. Партия										
Отмеченные критерии значимы на уровне $p < .05000$										
Перем.	Сум. ранг I	Сум. ранг II	U	Z	p-уров.	Z скорр.	p-уров.	N набл. I	N набл. II	2-х стор точный p
Схожість, %	124.0000	86.00000	41.00000	0.645777	0.518425	0.646263	0.518110	11	9	0.551631

Цей висновок співпадає з висновком до підрозділу **7.4.2.1.2 Розрахункове визначення U-критерію Манна-Уїтні**.

7.4.2.2. Визначення достовірності відмінності T -критерієм Уайта

T -критерій Уайта призначений для встановлення достовірності відмінностей при оцінці не взаємно зв'язаних спостережень кількісних ознак у вибірках однакового або різного об'єму, отриманих за порядковою шкалою.

Він здатний виявити відмінності між двома сукупностями по їх провідним тенденціям, однак не оцінюючи ступеня коливання варіант. Тому дві вибірки з одно вираженими тенденціями, але з різними межами коливань будуть кваліфіковані критерієм Уайта як однакові.

Якщо обидві вибірки взяті з однієї генеральної сукупності, то суми їх рангів повинні бути рівні. І, навпаки, чим більше різняться вибірки, тим більше буде різниця між сумою їх рангів.

Нульова гіпотеза відкидається (а відмінність між вибірками визнається істотним), якщо сума рангів однією з вибірок (завжди береться менша з двох сум) менше табличного значення T_t , розрахованого для вибірок різного об'єму табл. Е.8, де найбільша вибірка не перевищує 27, а найменша — 15.

Слід звернути увагу на ту обставину, що для багатьох непараметричних статистик висновки про достовірність відмінностей робиться у випадку, якщо розрахункове значення критерію менше табличного, тоді як параметричні статистики дають висновки про значущість відмінностей, коли розрахункова величина критерію більше табличній.

Для прикладу визначимо чи є різниця між схожістю двох партій насіння, представлених в табл. 7.44.

Таблиця 7.48. Порядок розрахунку T -критерію Уайта

№ п.п.	Партія	Схожість	Партія	Схожість	Ранг	№ п.п.	Партія	Схожість	Ранг	№ п.п.	Партія	Схожість	Ранг
1	I	92.3	II	91.3	1	1	I	91.5	2	1	II	91.3	1
2	I	93.5	I	91.5	2	2	I	92.1	3	2	II	92.4	5
3	I	94.6	I	92.1	3	3	I	92.3	4	3	II	92.5	6
4	I	92.1	I	92.3	4	4	I	92.7	7	4	II	92.8	8
5	I	93.4	II	92.4	5	5	I	93.4	10	5	II	93.2	9
6	I	96.3	II	92.5	6	6	I	93.5	11.5	6	II	93.5	11.5
7	I	91.5	I	92.7	7	7	I	94.1	13	7	II	94.2	14
8	I	92.7	II	92.8	8	8	I	94.6	16.5	8	II	94.5	15
9	I	96.5	II	93.2	9	9	I	96.3	18	9	II	94.6	16.5
10	I	94.1	I	93.4	10	10	I	96.5	19				
11	I	97.1	I	93.5	11.5	11	I	97.1	20				
12	II	91.3	II	93.5	11.5	Сума рангів			124	Сума рангів			86
13	II	92.4	I	94.1	13								
14	II	94.5	II	94.2	14								
15	II	93.2	II	94.5	15								
16	II	92.5	I	94.6	16.5								
17	II	94.2	II	94.6	16.5								
18	II	93.5	I	96.3	18								
19	II	94.6	I	96.5	19								
20	II	92.8	I	97.1	20								

Нульова гіпотеза — вибірки між собою не відрізняються.

Порядок розрахунку критерію Уайта за допомогою **MS Excel** проілюстровано табл. 7.48.

Спочатку всі спостереження обох вибірок розташовують в одну колонку з наведенням колонки з ідентифікаційним кодом вибірки (тут партії насіння) і колонки з номером спостереження в загальній колонці.

Далі результати створюється таблиця з колонки ідентифікаційного коду і колонки вибірки, яка ранжується (впорядковується) за показниками вибірки. Після цього праворуч до таблиці додається колонка “**Ранг**” у яку заносяться ранги даних. У випадку, коли попадаються однакові оцінки в різних групах, ставиться середній ранг, отриманий шляхом ділення суми рангів, що мають однакові значення показників, на число таких однакових показників.

Після цього дані ранжується за ідентифікаційними кодом і згідно його розділяються на дві таблиці, в яких окремо підраховуються суми рангів. Важливо, щоб суми рангів були пораховані правильно. Загальна сума рангів повинна співпадати з сумою номерів спостереження у колонці вихідної таблиці.

Далі отримана менша сума рангів, тобто $T_M = 86$ порівнюється з табличним значенням T_T , поданим в табл. Е.8 для обсягу обох вибірок, тобто 9 і 11, яке дорівнює $T_T = 68$. Так як маємо $T_M > T_T$, нульова гіпотеза не відкидається — відмінність між партіями насіння не виходить за межі випадкових коливань.

Це висновок відповідає статистичному висновку, зробленому в підрозділах **7.4.2.1.2 Розрахункове визначення U-критерію Манна-Уїтні** і **7.4.2.1.3 Визначення U-критерію Манна-Уїтні за допомогою ППП Statistica**.

7.4.2.3. Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова для оцінки розбіжності між емпіричними сукупностями

7.4.2.3.1. Розрахунковий метод

Критерій Колмогорова–Смирнова (тест Колмогорова використовується для порівняння спостережуваного й теоретичного статистичного розподілу див. підрозділ **6.6 Одновибірковий тест Колмогорова для перевірки виду статистичного розподілу**) — це непараметрична альтернатива t -критерію для незалежних вибірок. Він ґрунтується на порівнянні емпіричних функцій розподілу двох вибірок і перевіряє нульову гіпотезу про те, що вибірки взяті з однієї і тієї ж генеральної сукупності, тобто функції розподілу обох генеральних сукупностей однакові (однорідні), проти альтернативної гіпотези — вибірки взяті з різних сукупностей.

Іншими словами, перевіряється гіпотеза однорідності двох вибірок. Для використання тесту повинні виконуватися припущення про **незалежність вибірок** і представлення даних **порядковою шкалою**.

Емпіричним значенням критерію є максимальна розбіжність частот. Значення розбіжності частот Δ обчислюється так, як і у випадку одновибіркового тесту, але критичні значення критерію будуть іншими (табл. Е.12).

Як і всі критерій Колмогорова він представляє собою зіставлення рядів **відносних накопичених частот** порівнюваних сукупностей і визначенні максимального значення δ_{\max} модуля різниці між ними і є чутливим до відмінності загальних форм їх (зокрема, відмінності в розсіянні, асиметрії і т.д.). Знайдене значення δ_{\max} слід порівняти із критичним значенням, поданим у табл. Е.10.

Якщо порівнювані вибірки відносяться до однієї й тієї ж генеральної сукупності, то максимальна абсолютна різниця між частотами δ_{\max} буде мінімальною і обумовленою випадковим коливанням дослідних даних. Занадто велике значення δ_{\max} дає підставу відкинути нульову гіпотезу і визнати істотною відмінність між вибірками [50].

Критерій λ знаходять за формулою:

$$\lambda = \delta_{\max} \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}}, \quad (7.54)$$

де n_1, n_2 – число спостережень відповідно першої та другої вибірки.

Коли $n_1 = n_2$, то зіставляють чисельності **безпосередньо спостережень**, а критерій λ знаходять по формулою (6.12).

Емпіричне значення λ порівнюють з граничними значеннями його для рівня значущості λ_α , розрахованим за формулою (6.15). Нульова гіпотеза — **H_0 : Немає відмінності**, відкидається якщо отримане розрахункове значення критерію більше критичного [50].

Для прикладу розглянемо кількість ям і горбів на мірних ділянках лісової дороги (табл. 7.49). У табл. 7.49 на відміну від табл. 6.8 (с. 322) накопичені суми та абсолютна різниця розраховується в питомому представленні, тобто діленими на відповідне число спостережень.

Таблиця 7.49. Перевірка відповідності вибірок одновибірковим тестом Колмогорова – Смирнова

	BD	BE	BF	BG	BH	BI
1				Відносна накопичена сума		Різниця δ
2	Ділянка	Кількість горбів, шт	Кількість ям, шт	Кількість горбів, шт	Кількість ям, шт	
3	1	1	0	0.031	0.000	0.031
4	2	6	1	0.219	0.042	0.177
5	3	7	1	0.438	0.083	0.354
6	4	4	4	0.563	0.250	0.313
7	5	5	6	0.719	0.500	0.219
8	6	2	3	0.781	0.625	0.156
9	7	0	2	0.781	0.708	0.073
10	8	2	2	0.844	0.792	0.052
11	9	1	1	0.875	0.833	0.042
12	10	1	2	0.906	0.917	0.010
13	11	2	2	0.969	1.000	0.031
14	12	1	0	1.000	1.000	0.000
15	Сума	32	24		$\delta_{\max} = 0.354$	
16					$\lambda = 1.312$	

$BG3=BE3/BE15$
 $BG4=BG3+BE4/BE15$
 $BG14=BG13+BE14/BE15$
 $BH3=BF3/BF15$
 $BH4=BH3+BF4/BF15$
 $BH14=BH13+BF14/BF15$
 $BI3=ABS(BG3-BH3)$
 $BI14=ABS(BG14-BH14)$
 $BI15=МАКС(BI3:BI14)$
 $BI16=BI15*(BE15*BF15/(BE15+BF15))^0.5$

За даними табл. 7.49 представлено рис. 7.18, де подано криві розподілу абсолютної і відносної кількості накопичення кількості ям і горбів. Максимальну абсолютну різницю між попарно пов'язаними даними вибірок позначено Δ_{\max} , відповідну відносну різницю — δ_{\max} .










Рис. 7.18. Криві розподілу абсолютної кількості (а) і відносної кількості накопичення (б) кількості ям і горбів


Згідно табл. Е.10 маємо $D_{.05} = 1.36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}}$, звідки для $n_1=32$ і $n_2=24$

отримуємо $D_{.05} = 1.36 \sqrt{\frac{32 + 24}{32 \cdot 24}} = 0.367$, тобто $D_{\max} < D_{.05}$, таким чином нульова гіпотеза відхиляється — кількість горбів і ям на даній дорозі взаємопов'язана. Це підтверджується отриманим розрахунковим значенням критерію $\lambda = 1.312$, яке менше табличного на 5 %-му рівні ($\lambda_{.05} < 1.36$).

7.4.2.3.2. Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова з використанням ППП Statistica

Робота з тестом Колмогорова–Смирнова в ППП **Statistica** не відрізняється від використання *U*-критерію Манна–Уїтні, розглянутої у підрозділі **7.4.2.1 *U*-критерій Манна–Уїтні**, за винятком того, що натискується не  /  (**10**), чи запускається процедура  /  (**10**), а виконується процедура  /  (**11**) (рис. 7.17). При цьому отримуємо табл. 7.50 з аналізом даних за тестом Колмогорова–Смирнова.

Таблиця 7.50. Результат перевірки за двовибірковим тестом

 Критерий Колмогорова–Смирнова

	Критерий Колмогорова-Смирнова (Test.sta) По перем. Рік Отмеченные критерии значимы на уровне $p < .05000$								
Перем.	Макс.отр Разн.	Макс. по Разн.	p-уров.	Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	Ст. откл Группа 1	Ст. откл Группа 2	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2
Кількість стручків на гілці	-0.666667	0.00	$p < .001$	26.44688	36.40833	4.852736	6.664986	96	96

За умови $p \leq \alpha$ рівнем статистичної значущості p приймається альтернативна гіпотеза про статистичну відмінність вибірок.

7.4.2.4. Критерій серій Вальда–Вольфовиця

Критерій серій Вальда–Вольфовиця являє собою непараметричну альтернативу *t*-критерію для незалежних вибірок і передбачає, що розглянуті змінні є безперервними і виміряні, принаймні, в порядкової шкалою.

Організований він таким чином. Для порівняння двох груп за певною ознакою упорядковуються їхні дані, наприклад, за зростанням, і знаходяться випадки, коли суб'єкти однієї групи примикають один до одного в побудованому варіаційному ряду (тобто, утворюють серію).



Серія складається таким чином. Спочатку обчислюється медіана, а потім береться кожне окреме значення і порівнюється з медіаною. Якщо вибране значення більше медіани, то ставиться, наприклад, плюс, а якщо менше — мінус. Таким чином, дані приводяться до бінарним виду.


При відсутності групових відмінностей число і довжина “серій”, що відносяться до однієї і тієї ж групи, будуть більш–менш випадковими. В іншому випадку групи відрізняються один від одного, тобто не є однорідними.

Таким чином перевіряється гіпотеза про те, що дві незалежні вибірки взяті з двох сукупностей, які істотно різняться між собою, тобто не лише середніми, але також і формою розподілу. У цьому випадку він використовується для перевірки гіпотези H_0 : *Незалежна є однаково розподіленою випа-*

дковою величиною, тобто обидві вибірки однорідні.

Цей критерій застосовується для аналізу регресійних залишків поряд із критеріями Манна–Уїтні (підрозділ 7.4.2.1 *U–критерій Манна–Уїтні*), знаків (7.4.3.1 *Критерій знаків*), екстремумів.

Робота із двовибірковим критерієм Вальда–Вольфовиця аналогічна описанім вище у підрозділах 7.4.2.1 *U–критерій Манна–Уїтні* і 7.4.2.3.2 *Двовибірковий тест Колмогорова–Смирнова з використанням ППП Statistica*, за винятком того, що запускається процедура  Wald-Wolfowitz runs test /  Критерій серій Вальда-Вольфовиця (12). Як результат маємо табл. 7.51 з аналізом порівнюваних вибірок.

За отриманими результатами у всіх трьох таблицях (табл. 7.47 на с. 7.47, 7.50 на с. 7.50 і 7.51) розрахунковий рівень значущості p менше прийнятого (порогового)  (9) (рис. 7.17), що свідчить про статистичну відмінність між вибірками 2004–2005 рр. Про це ж свідчить і червоний колір результатів таблиць, одержаних ППП Statistica.

Таблиця 7.51. Результат перевірки за  Критерій серій Вальда-Вольфовиця

Перем.	Критерій серій Вальда-Вольфовиця (Test.sta)									
	По перем. Рік									
	Отмеченные критерии значимы на уровне $p < .05000$									
	N набл. Группа 1	N набл. Группа 2	Среднее Группа 1	Среднее Группа 2	Z	p-уров.	Z скорр.	p-уров.	Число серий	Число совп.
Кількість стручків на гілці	96	96	26.44687	36.40833	-6.51226	0.000000	6.439902	0.000000	52	12

При текстовому чи табличному поданні результатів оцінки непараметричними критеріями Манна–Уїтні, Колмогорова–Смирнова й Вальда–Вольфовиця слід представити обсяг кожної з вибірок, медіану Me й похибку результату вимірювання $t_{\alpha(v)_T} s_{\bar{x}}$. Навести прийнятий рівень значущості α та точне значення рівня статистичної значущості p [5].

7.4.2.5. X–критерій Ван–дер–Вардена

Цей критерій відноситься до групи рангових критеріїв, його застосовують для перевірки нульової гіпотези при порівнянні незалежних вибірок між собою [15].

Техніка розрахунків X–критерію зводиться до наступного. Порівнянні вибірки ранжують в один загальний ряд за зростанням ознаки. Потім кожному члену ряду привласнюють порядковий номер, що відзначає його місце в загальному ранжируемому ряду. Далі за порядковими номерами однієї з вибірок, зазвичай менший за обсягом, знаходять відношення $R/(n_1+n_2+1)$, де R – порядковий номер членів ряду, тобто їх ранг; n_1 і n_2 – обсяги порівнюваних вибірок [15].

Таблиця 7.52. Результат оцінки за
X-критерій Ван-дер-Вардена

	A	B	C	D	E
1	Зрізані бур'яни, %		Ранг R	$R/(n_1+n_2)$	$\psi[R/(n_1+n_2)]$
2	На початку	У кінці			
3		76	1		
4		76	2		
5		78	3		
6	80		4	0.1905	-0.88
7		82	5		
8	84		6	0.2857	-0.57
9		84	7		
10		85	8		
11	86		9	0.4286	-0.18
12		86	10		
13		87	11		
14	88		12	0.5714	0.18
15		89	13		
16	91		14	0.6667	0.43
17	91		15	0.7143	0.57
18		94	16		
19	95		17	0.8095	0.88
20		96	18		
21	96		19	0.9048	1.31
22	99		20	0.9524	1.66
23	Обсяг обох вибірок $n=20$				
24	Емпіричне значення $X_{\text{емп}}=3.40$				
25	Критичне значення $X_{0.05(20)}=3.84$				

E25=СЧЁТ(A3:B22) D6=C6/(\$E\$23+1)
E24=СУММ(E3:E22)

За допомогою спеціальної таблиці (див. табл. Е.14 на с. 1101) знаходять значення функції $\psi[R/(n_1+n_2+1)]$ для кожного значення $R/(n_1+n_2+1)$. Підсумовуючи результати (обов'язково з урахуванням знаків), отримують величину $X_{\text{емп}}=\sum \psi[R/(n_1+n_2+1)]$, яку порівнюють з критичною точкою цього критерію X_T для прийнятого рівня значущості α і загального числа членів порівнюваних вибірок, тобто n_1+n_2 . Критичні точки X-критерію містяться в табл. Е.15 на с. 1104.

Нульова гіпотеза зводиться до припущення, що порівнювані вибірки витягнуті з генеральних сукупностей з однаковими функціями розподілу. Якщо виявиться, що $X_{\text{емп}} \geq X_T$ нульова гіпотеза повинна бути відкинута на прийнятому рівні значущості.

Приклад. Проаналізу-

ємо за допомогою X-критерію Ван-дер-Вардена результати підрізання бур'янів культиваторними лапами на початку і в кінці зміни.

На початку роботи на дев'яти мірних гонах відсоток знищення бур'янів становив 80, 86, 84, 88, 91, 91, 99, 96, 95; в кінці роботи на одинадцяти мірних гонах було підрізано бур'янів 82, 76, 78, 76, 85, 84, 86, 87, 89, 94, 96. Оформлені дані у відповідності з вищенаведеними вимогами подані в табл. 7.52.

Виконавши дії за формулами, наведеними на полі цієї таблиці у колонку Е вносимо відповідні дані з табл. Е.14. Їх сума, тобто X_T становить 3.40.

Критичні точки X-критерію за табл. Е.15 для $\alpha=0.05$, $n_2-n_1=2$ і $n_1+n_2=20$ становить 3.84.

Так як має місце $X_{\text{емп}}=3.40 < X_T=3.84$, нульову гіпотезу про рівність знищення бур'янів на початку і в кінці зміни не враховувати не можна; різниця між ними статистично недостовірна — культиваторні лапи можна ще не гострити.

7.4.3. Порівняння двох залежних вибірок

7.4.3.1. Критерій знаків

7.4.3.1.1. Загальні положення

Критерій знаків (*Sing Test*) непараметрична альтернатива t -критерію для залежних вибірок і застосовується у ситуаціях, коли проводяться два виміри (наприклад, при різних умовах) одних і тих же суб'єктів і бажано встановити наявність або відсутність відмінності результатів.

Для застосування цього критерію потрібні дуже слабкі припущення (наприклад, однозначна визначеність медіани для різниці значень). Не потрібно ніяких припущень про природу або форми розподілу.

При нульовій гіпотезі (наприклад про відсутність ефекту) число додатних різниць має біноміальний розподіл з середнім, рівним половині обсягу вибірки (додатних різниць буде приблизно стільки ж, скільки негативних). Грунтуючись на цьому розподілі, можна обчислити критичні значення.

Тобто він використовується для встановлення загального напрямку змін досліджуваної ознаки і застосовується до змін, які можна визначити лише якісно (зміна негативного чи позитивного ставлення до будь чого) і якщо зміни можуть бути виміряні кількісно (скорочення часу). Вибірка повинна бути отримана випадковим способом, причому будь які вимоги до закону розподілу її генеральної сукупності відсутні [9].

Критерій знаків ґрунтується на ранжируванні різниць пар значень залежних вибірок, причому ведеться окремий підрахунок додатних і негативних різниць, що може виявитися корисним тоді, коли відмінності між вибірками будуть не дуже помітні. Послідовність знаків є результатом n незалежних досліджень з двома можливими результатами: "плюс" або "мінус". При збігу розподілів у кожному дослідженні ймовірність становить $1/2$, тобто

$$P(“+”) = P(“-”) = 1/2. \quad (7.55)$$

Кількість плюсів і кількість мінусів є випадковими величинами, які розподілені за біноміальним законом і теоретично повинні бути рівні між собою. Мала кількість плюсів (чи мінусів) означає, що гіпотеза невірна.

Статистика методу полягає у тому, що при обсязі вибірки $n \leq 25$ вибираємо у якості критерію x_{\min} (кількість мінусів, кількість плюсів). Критичне значення знаходяться по табл. Е.24. Якщо x виявиться менше або дорівнює критичного значення з таблиці, то гіпотеза відкидається.

Якщо вибірка $n > 25$, то критерій визначається виразом

$$z = \frac{2x - n + 1}{\sqrt{n}}. \quad (7.56)$$

Отримане значення критерію порівнюється з критичним значенням $z_{кр}$ знайденим за таблицею нормального розподілу чи статистичною функцією Excel **НОРМ.СТ.ОБР($\alpha/2$)**, де α – заданий рівень значущості для двобічної області і за умови $z \geq z_{кр}$ нульова гіпотеза про рівність відкидається. також вона відкидається за умови $p \leq \alpha$, де p – розрахунковий рівень значущості, знайдений за статистичною функцією **НОРМ.СТ.РАСП(z ; истина)**.

Розглянемо ряд прикладів застосування цього критерію.

7.4.3.1.2. Гіпотеза про частку ознаки

Із обстежених 100 господарств зони виявлено, що 70 з них надає перевагу вирощування озимих олійних культур, 30 — ярих.

Упевнитися на рівні значущості $\alpha = 0.01$, що для $n = 100$ така пропорція не випадкова.

За нульову гіпотезу приймаємо $H_0: x = 0.5$, тобто озимих і ярих повинно було б бути порівну, за альтернативну — $H_A: x \neq 0.5$.

Підрахувавши за виразом (7.56) значення критерію z отримуємо $z = \frac{2 \times 30 - 100 + 1}{\sqrt{100}} = -3.9$.

Для даного випадку маємо $z_{кр} = -2.575829304$ і $p = 0.0000481$ тому нульова гіпотеза відкидається з прийнятим рівнем значущості $\alpha = 0.01$.

7.4.3.1.3. Відповідність довільної величини певній вибірці

Приймалося, що середня кількість машин, яка проїздить повз пункт реєстрації за одну годину протягом 20 годин становить $x_0 = 40$ шт. Фактичний розподіл їх кількості представлений в табл. 7.53.

На рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити висунуту гіпотезу про статистичну рівність прийнятого довільного значення середньому

Таблиця 7.53. Кількість машин		
	А	В
1		Значення вибірки
2		18
3		30
4		39
5		36
6		43
7		29
8		34
9		40
10		40
11		32
12		39
13		34
14		16
15		37
16		45
17		39
18		22
19		36
20		28
21		52
22	Прийняте значення x_0	40
23	Середнє значення x_{cp}	34.5
24	Розмах вибірки R	36
25	Розрахункове κ	0.154
26	Табличне $\kappa_{0.05(20)}$	0.104

арифметичному вибірці. Таким чином нульовою гіпотезою є $H_0: x = x_0$, альтернативною — $H_A: x \neq x_0$.

За цим способом визначається відношення абсолютної різниці між прийнятим значенням і середньоарифметичним усіченої вибірки (див. підрозділ **5.12.3.4 Застосування розмаху усіченої вибірки**) до її розмаху R (без врахування сумнівної величини) [72]

$$k = \frac{|x_0 - \bar{x}|}{R}, \quad (7.57)$$

де \bar{x} – середнє арифметичне вибірки;
 x_0 – прийнята величина, $x_0 = 35$ шт.;
 R – розмах вибірки.

Для ранжируваного за зростанням ряду при прийнятті за сумнівний результат x_{min} і при прийнятті за сумнівний результат x_{max} розмах усіченої вибірки R розраховується відповідно за виразами

$$R = x_{max} - x_{n-1} \quad \text{і} \quad R = x_2 - x_{min}. \quad (7.58)$$

Отримане значення k порівнюється з табличним k_T , наведеним в табл. Д.24 [72]. У разі $k \geq k_T$ сумнівний результат вважається промахом.

Для числа варіантів (обсягу) $n = 40$ і рівня ймовірності оцінки 95 % згідно табл. Д.24 критичне значення критерію становить $k_{0.05(20)} = 0.104$.

Таким чином маємо разі $k > k_T$ — нульова гіпотеза відкидається на рівні значущості $\alpha = 0.05$.

7.4.3.1.4. Гіпотеза однорідності парних вибірок

У табл. 7.54 представлені показники результатів 15-ти спортсменів на останньому тренуванні і на змаганнях. На рівні значущості $\alpha = 0.05$ слід упевнитися, що ставлення спортсменів до змагань відповідальніше, ніж до тренування.

Таблиця 7.54 – Показники тренування і змагання

Спортсмен	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Тренування	30	13	14	16	14	52	14	22	17	12	11	30	14	17	15
Змагання	30	19	19	23	29	64	42	20	12	39	14	81	17	31	52
Різниця	0	6	5	7	15	12	28	-2	-5	27	3	51	3	14	37

За нульову гіпотезу приймаємо H_0 : **Зміни не відбулися**, за альтернативну — H_A : **Наявні зміни**.

Підрахувавши у табл. 7.54 різниці між показниками змагань і тренування бачимо, що маємо 12 додатних і 2 негативних значення та 1 співпадання. Так як нульове значення не враховується, тому приймаємо $n = 14$.

Таким чином маємо $x = \min(2, 12) = 2$. За табл. Е.24 для $\alpha = 0.05$ і $n = 14$ ненульових пар, отримуємо $x_{(14)} = 2$. Так як $x < x_{(14)}$ нульова гіпотеза відкидається на рівні значущості $\alpha = 0.05$.

У табл. 7.62 (с. 450) подано розрахунок критерію знаків із використанням ППП **Statistica**, яка також підтверджує наведені вище висновки.

7.4.3.1.5. z-критерій знаків

У тих випадках, коли результати спостережень виражаються не числами, а знаками плюс (+) і мінус (-), відмінності між попарно пов'язаними членами порівнюваних вибірок оцінюють за допомогою критерію знаків z [15].

Він ґрунтується на міркуваннях: якщо попарно порівнювані значення двох залежних вибірок істотно не відрізняються один від одного, то число плюсових і мінусових різниць виявиться абсолютно однаковим; якщо ж помітно переважають плюси чи мінуси, це буде вказувати на позитивне або негативне дію досліджуваного фактору на результативний ознака. Більше число однозначних різниць служить в якості фактично знайденої величини z -критерію знаків. При цьому нульові різниці, тобто випадки, що не дали ні позитивного, ні негативного результату, позначаються цифрою 0 і в розрахунок не приймаються, а число парних спостережень відповідно зменшується.

Як і будь-який інший вибірковий показник, z -критерій знаків є величиною випадковою; він служить для перевірки нульової гіпотези, тобто, припущення про те, що сукупність або сукупності, з яких взяті порівнювані вибірки мають одну і ту ж або однакові функції розподілу. Нульова гіпотеза відкидається, якщо $z_{\text{емп}} \geq z_{\text{т}}$ для прийнятого рівня значущості α і числа парних спостережень n , взятих без нульових різниць [15].

Таблиця 7.55			
Успішність учнів у 1-му і 2-му півріччі			
№ п.п.	Середній бал		Ефект
	1-ше півріччя	2-ге півріччя	
1	3.8	3.0	-
2	3.8	4.5	+
3	3.5	3.5	0
4	3.5	4.2	+
5	3.5	3.1	-
6	3.9	4.0	+
7	3.1	3.5	+
8	3.2	3.6	+
9	3.1	3.1	0
10	3.1	3.6	+
11	4.3	4.5	+
12	3.5	4.1	+
Кількість плюсів			8
Кількість мінусів			2

Таблиця 7.56 Сезонність відвідування театру			
№ п.п.	Взимку	Влітку	Ефект
1	++	++	0
2	+++	++	+
3	++	+	+
4	++	+	+
5	++	++	0
6	++	+++	-
7	++	+	+
8	+	++	-
9	+++	++	+
10	++	+	+
11	++	+++	-
12	++	+	0
13	++	+	+
14	++	+	+
Кількість плюсів			8
Кількість мінусів			3

бал 12 учнів у першому і другому півріччі (табл. 7.55). Чи суттєве покращання навчання у другому півріччі?

Із табл. 7.55 бачимо, що із 12 учнів у другому півріччі 8 стали учитися краще, 2 — гірше і 2 як і раніше.

За даними табл. знаходимо $z_{05(8,10)}=9$, тобто $z_{емп} \geq z_T$. Таким чином з рівнем значущості $\alpha = 0.05$ можна вважати що діти, як кажуть вчителі, “взялися за розум”.

7.4.3.1. Гіпотеза про значення медіани

Приймаємо, що медіальна годинна кількість машин, яка проїздить повз пункт реєстрації протягом 20 годин становить 40 шт., тобто $Me_0=40$. Фактичний розподіл їх кількості представлений в табл. 7.57.

На рівні значущості $\alpha = 0.05$ перевірити висунуту гіпотезу.

Критичні точки z_T для двох рівнів значущості і числа парних спостережень містяться в табл. Е.25.

Розглянемо приклад. Відповіді 14 театралів про перегляд спектаклів взимку і влітку наведено в табл. 7.56. Чи суттєва зміна кількості відвідування театру відповідно сезону?

Із табл. 7.56 бачимо, що із 14 опитаних театралів 8 надають перевагу відвідуванню театру взимку, 3 — влітку і для трьох однаково коли.

За даними табл. Е.25 знаходимо $z_{05(8,11)}=10$, тобто $z_{емп} \geq z_T$. Таким чином з рівнем значущості $\alpha = 0.05$ можна вважати що пора року істотно впливає на відвідування театру.

Приклад.

Проаналізовано середній

Таблиця 7.57. Кількість машин			
	A	B	C
1		Значення вибірки	Різниця із заданим
2		18	22
3		30	10
4		39	1
5		36	4
6		43	-3
7		29	11
8		34	6
9		40	0
10		40	0
11		32	8
12		39	1
13		34	6
14		16	24
15		37	3
16		45	-5
17		39	1
18		22	18
19	36	4	
20	28	12	
21	52	-12	
22	Задана величина		40
23	Кількість мінусів		3
24	Кількість плюсів		15
25	Мінімальна кількість		3
26	Таблична кількість x(18)		4
C2=\$C\$22-B2 ... C21=\$C\$22-B21			
C23=СЧЁТЕСЛИ(C2:C21;"<0")			
C24=СЧЁТЕСЛИ(C2:C21;">0")			
C25=МИН(C23:C24)			

За нульову гіпотезу приймаємо $H_0: Me=40$, за альтернативну — $H_A: Me \neq 40$.

Підрахувавши у табл. 7.57 різниці між різниці між прийнятим і фактичним, бачимо, що маємо 15 додатних і 3 від’ємних значення, тобто 15 “плюсів” і 3 “мінуси” (нульове значення не враховується, тому приймаємо $n=18$).

Таким чином маємо $x = \min(3, 15) = 3$. За табл. Е.24 для $\alpha = 0.05$ і $n = 18$ отримуємо $x_{(18)} = 4$. Так як $x < x_{(18)}$, нульова гіпотеза відкидається на рівні значущості $\alpha = 0.05$.

7.4.3.2. Обчислення заданого довірчого інтервалу для медіани

Медіанний тест — це “груба” версія критерію Краскела–Уоллеса. При нульовій гіпотезі (всі вибірки витягнуті з популяцій з рівними медіанами) очікується, що приблизно 50 % всіх спостережень в кожній вибірці потрапляють вище (або нижче) загальною медіани. Медіанний тест особливо корисний, коли шкала містить штучні межі, і багато спостереження потрапляють в ту чи іншу крайню точку (виявляються “поза шкалою”) [9].

Якщо ознака має розподіл, відмінний від нормально-го, або просто невідомо, який він насправді, то можна скористатися способом обчислення прийнятого довірчого інтервалу для медіани.

Для цього потрібно виконати наступне.

Ранжувати значення досліджуваного ознаки в порядку зростання і поряд з отриманої колонкою створити колонку рангів (для прикладу взято данні табл. 7.58. За табл. Е.23 з урахуванням обсягу вибірки n , який у нашому випадку становить $n = 20$, та прийнятої довірчої ймовірності α , у нашому випадку $\alpha = 0.05$, знаходимо ранги, значення яких відповідають межам довірчого інтервалу, ранги становлять 6 і 15. Таким чином межі довірчого інтервалу досліджуваної ознаки, які відповідають цим рангам за табл. 7.58 становлять від 29 до 39, що підтверджує результат, отриманий у підрозділі 7.4.3.1 Гіпотеза про значення медіани.

За прийняття $\alpha = 0.01$ за табл. Е.23 ранги становлять 4 і 17, що відповідає межам довірчого інтервалу від 23 до 40.

Таблиця 7.58

Довірчий
інтервал для
медіани

Ранг	Кількість машин, шт.
1	16
2	18
3	22
4	28
5	29
6	30
7	32
8	34
9	34
10	36
11	36
12	37
13	39
14	39
15	39
16	40
17	40
18	43
19	45
20	52

7.4.3.3. Знако–ранговий критерій (T –критерій Уїлкоксона)

7.4.3.3.1. Розрахункове визначення T –критерію Уїлкоксона для двох залежних попарно зв'язаних вибірок

Критерій Уїлкоксона (Вілкоксона) парних порівнянь є непараметричною альтернативою t –критерію для залежних вибірок (див. підрозділ 7.3.7.7 Розрахунковий метод оцінки вибірок із попарно зв'язаними варіантами за середньою різницею, 7.3.7.10 Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами парним двовибірковим t –тестом для середніх та 7.3.7.11.3 Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами використанням ППП Statistica). Вимоги до критерію Уїлкоксона більш суворі, ніж до критерію знаків. Однак якщо вони задоволені, то критерій Уїлкоксона має більшу потужність, ніж критерій знаків.

T –критерій Уїлкоксона (*Wilcoxon Signed–Rank Test for Matched Pairs*) є найбільш чутливим (потужним) ранговим критерієм і застосовується для порівняння *двох залежних попарно зв'язаних вибірок*, представлених у всіх шкалах, крім номінальної, чи коли неможливо використання відповідних параметричних критеріїв, зокрема, t –тесту Стьюдента для попарних вибірок.

Критерієм перевіряється статистична значимість нульової гіпотези про те, що розподіл випадкових величин, тобто, функції, котра однозначно визначає ймовірність того, що випадкова величина приймає задане значення, або лежить у відповідно заданому інтервалі, є симетричним щодо нуля. Отримані випадкові величини представляють собою нову вибірку, утворену з різниць відповідних даних оцінюваних масивів.

T –критерій дозволяє встановити не лише спрямованість змін, але і їхнє вираження, тобто, здатний визначити, чи зміщені показники в одному напрямку більш інтенсивне, ніж у іншому. Доцільно застосовувати даний критерій при зміні варіювання в діапазоні 10–15 % обсягу вибірки, величина якої становить від 5 до 50 елементів (див. табл. Е.27).

Він є найбільш чутливим (потужним) для залежних вибірок і ґрунтується на обчисленні різниці d_i кожної i –ої пари n зв'язаних вибірок. Різниці подаються рангами від менших значень до більших, так, щоб від'ємні різниці мали від'ємний ранг, нульові — нульовий, а додатні — додатний ранг. Рівним різницям надають середні арифметичні значення їхніх рангів. Для ранжирування слід використовувати статистичну функцію MS Excel РАНГ.СР (див. Додаток А).

Далі окремо підраховуються фактична сума рангів $T_{\Phi}^{(+)}$ додатних різниць і абсолютна фактична сума рангів від'ємних різниць $T_{\Phi}^{(-)}$. Менша із цих сум приймається в якості статистики, критичне значення якого T_T для ненульових пар значень $n \leq 25(30)$ визначається за табл. Е.27 на с. 1112, або розраховуються за формулою

$$T_{\text{T}} = \frac{n(n+1)}{4} - t_{\alpha(v)_{\text{T}}} \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}. \quad (7.59)$$

чи формулою (7.60) [88]

$$T_{\text{T}} = z_{\text{kp}} \sqrt{\frac{n^2(2n+1)}{12}}. \quad (7.60)$$

де $z_{кр}$ – значення аргументу функції Лапласа, тобто $\Phi(z_{кр})=(1-\alpha)/2$.

Нульова гіпотеза відхиляється, *нульова гіпотеза відхиляється, якщо емпіричне значення менше критичного*, тобто $T < T_T$ [15, 37].

Для ілюстрації розглянемо приклад, наведений у підрозділі **7.4.3.1.4 Гіпотеза однорідності парних вибірок** (табл. 7.54, с. 441).

Таблиця 7.59. Перевірка за T -критерієм Уїлкоксона

	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT
1	№ п.п	Тренування	Змагання	Різниця d_i	Абсолютна різниця $ d_i $	Ранг абсолютної різниці rd_i	Ранги абсолютної різниці від'ємні	Ранги абсолютної різниці додатні
2	1	30	30	0	0			
3	2	13	19	6	6	6		6
4	3	14	19	5	5	4.5		4.5
5	4	16	23	7	7	7		7
6	5	14	29	15	15	10		10
7	6	52	64	12	12	8		8
8	7	14	42	28	28	12		12
9	8	22	20	-2	2	1	1	
10	9	17	12	-5	5	4.5	4.5	
11	10	12	39	27	27	11		11
12	11	11	14	3	3	2.5		2.5
13	12	30	81	51	51	14		14
14	13	14	17	3	3	2.5		2.5
15	14	17	31	14	14	9		9
16	15	15	52	37	37	13		13
17	Кількість n		14	Сума додатніх рангів $T(+)_\phi$			99.5	
18	$\alpha=$		0.05	Сума від'ємних рангів $T(-)_\phi$				-5.5
19	AP2=AO2-AN2			Абсолютне мінімальне значення			5.5	
20	AP16=AO16-AN16			Критерій Стюдента табличний t_r				2.1604
21	AQ2=ABS(AP2)			Т-критичне двустороннє T_r				18
22	AQ16=ABS(AP16)			Критерій Стюдента розрахунковий t_ϕ				-2.9505
23	AO17=СУМ(T(AR2·AR16))			Рівень значущості p				0.0113

AS17=СУММ(AS2:AS16) AS19=МИН(AS17:AT18)
 AT18=СУММ(AT2:AT16) AT20=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(АО18;АО17-1)
 AT23=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(-AT22;АО17-1)
 AT21=АО17*(АО17+1)/4-AT20*((АО17*(АО17+1)*(2*АО17+1))/24)^0.5
 AT22=(AS19-АО17*(АО17+1)/2)/(((АО17*(АО17+1)*(2*АО17+1))/6)^0.5)
 AR3=ПАНГ.СР(AQ3;\$AQ\$3:\$AQ\$16;1)
 AR16=ПАНГ.СР(AQ3;\$AQ\$3:\$AQ\$16;1)

У результаті розрахунку критерію Уїлкоксона (табл. 7.59, чарунки АМ1:АТ23) отримано $T^{(+)}=99.5$ і $T^{(-)}=-5.5$ при кількості порівнюваних пар $n=14$.

Так як з табл. Е.27 видно, що $T_T=21$, тобто маємо $T^{(-)} < T_T$, нульова гіпотеза відхиляється для значущості $\alpha=0.05$ і робиться ґрунтовний висновок про статистично значущу різницю між порівнюваними вибірками. Також нульова гіпотеза відкидається так як за табл. 7.59 маємо розрахунковий рівень значущості $p=0.0113$, тобто він менше прийнятого рівня значущості $\alpha=0.05$.

7.4.3.3.2. Розрахункове визначення T -критерію Уїлкоксона для двох незв'язаних вибірок

Розглянемо приклад: із першої ділянки взяті 12 рослин, з другої — 16, кількість стручків на кожній з них наведена у чарунках **В1:Q2** табл. 7.60.

Таблиця 7.60. Перевірка за T -критерієм Уїлкоксона

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Перша	26	17	8	67	65	9	40	95	46	25	89	44										
2	Друга	8	4	65	26	6	8	1	87	36	44	23	66	24	90	76	56						
3	Перша		17		67		9	40	95	46	25	89											
4	Друга		4			6	8	1	87	36		23	66	24	90	76	56						
5	Перша	95		89			67			46	40		25			17	9						
6	Друга		90		87	76		66	56			36		24	23			8	6	4	1	Сума	Кількість
7	Перша	1		3			6			9	10		12			15	16					72	8
8	Друга		2		4	5		7	8			11		13	14			17	18	19	20	138	12
9												Емпіричний критерій Вількоксона $W=0.535$											

Далі якщо в обох рядах виявляться збігаються варіанти, то їх викреслюють і в подальшому не розглядають — скорочуються члени, які є в обох рядах (26, 8, 65, 44), після чого формуються ряди **В3:Q4**.

Потім дані в рядках **В3:Q4** ранжуються за убутанням, розміщуючись у відповідних рядках **В5:U6**. Після цього ранжовані дані замінюються відповідними рангами рядки **В7: U8**. Якщо в ряду є кілька однакових значень, то кожному з них надається однаковий ранг, який дорівнює середньому арифметичному номерів, займаних цими однаковими значеннями.

Далі обчислюється сума рангів і кількість чисел кожного з рядів окремо і результати підставляються у формулу:

$$W = \frac{n_M(n_M + n_6 + 1) - 2\sum R_M}{\sqrt{n_M n_6 (n_M + n_6 + 1)}}, \quad (7.61)$$

де n_M – число членів ряду з меншою сумою рангів;
 n_6 – число членів ряду з меншою сумою рангів;
 $\sum R_M$ – менша сума рангів.

Якщо отримане значення перевищує 1,13, то можна зробити висновок про достовірність відмінностей рядів.

Оскільки отримане значення критерію 0.53 (табл. 7.60) значно менше критичного 1,13, то немає підстав для висновку про існування суттєвих відмінностей в чисельності стручків на рослині на двох вивчених ділянках (за формальними ознаками дані ділянки однакові).

7.4.3.3.3. Застосування T -критерію Уїлкоксона і критерію знаків із використанням ППП Statistica

Для прикладу використання непараметричних критеріїв візьмемо дані, використані табл. 7.59.

Нульова гіпотеза для обох критеріїв сформульована так: *вибірки між собою не відрізняються*. Для аналізу в меню **Statistics/Анализ** (1) запускаємо модуль **Nonparametrics/Непараметрическая статистика** (2) (рис. 7.19).

На однойменній панелі вибираємо опцію **Comparing two dependent samples (variables)** / **Сравнение двух зависимых переменных** (3) і натискаємо **ОК** (4). На відкритій панелі процедур і установок **Comparing two variables: Test** / **Сравнение двух переменных:** приймаємо рівень статистичної значущості (порогові значення) α **0.01** (5) і натискаємо **Variables** / **Переменные** (6). Потім на виниклій панелі **Select the two variable lists to be compared** / **Выберите два списка переменных для сравнения** у списку змінних указуємо **Тренування** і **Змагання** (7) натискаючи **ОК** (8), повертаємося на панель **Comparing two variables: Test** / **Сравнение двух переменных:**. Тут указавши виконання процедури **Wilcoxon matched pairs test** / **Критерий Вилкоксона** (9), одержуємо табл. 7.61 з результатами аналізу за T -критерієм Уїлкоксона, задавши процедуру **Sign test** / **Критерий знаков** (10) отримуємо табл. 7.62 з результатами аналізу за критерієм знаків.

Порівнюючи результати табл. 7.59 (с.446) і 7.61 бачимо, що вони де-що відрізняються лише величиною рівня значущості p .

Це пояснюється тим що розрахунки на основі формули (7.59) дійсні лише за умови $n > 25(30)$ ненульових пар значень.





Рис. 7.19. Обчислення непараметричних критеріїв опцією

Comparing two dependent samples (variables) / Сравнение двух зависимых переменных

При використанні цієї ж формули при $n=49$ і $\alpha=0.05$ різниця між результатом розрахунку T_T і даним у табл. Е.27 становила 1.22 %, рівні значущості, отримані на основі формули (7.59), і розрахованим із використанням ППП **Statistica** відрізнялися лише на $1.126 \cdot 10^{-5}$.

Результати, наведені у табл. 7.62 підтверджують висновки, наведені вище у табл. 7.54, с. 441, за якими нульова гіпотеза також відкидається на рівні значущості $\alpha=0.05$.



Таблиця 7.61. Результат перевірки за процедурою  Критерій Вількоксона
(*T*-критерієм Уїлкоксона)

Пара перем.	Критерій Вількоксона (Тест) Отмеченные критерии значимы на уровне $p < .05000$			
	Число набл.	T	Z	p-уров.
Тренування & Змагання	15	5.500000	2.950495	0.003173

Таблиця 7.62. Результат перевірки  Критерій знаків (критерієм знаків)

Пара перем.	Критерій знаків (Тест) Отмеченные критерии значимы на уровне $p < .05000$			
	Число несовп.	Процент $v < V$	Z	p-уров.
Тренування & Змагання	14	85.71429	2.405351	0.016157

За результатами табл. 7.61 і 7.62 нульова гіпотеза відхиляється, так як при перевірці за *T*-критерієм Уїлкоксона $p=0.003172$, при перевірці за критерієм знаків $p=0.016157$.

Виконання процедури  Бок & whisker plots for all variables /  Диаграммы размаха (11) дає змогу отримати для обох вибірок блокові діаграми розмаху вибірок, представлені на рис. 7.20, аналогічні наведеному на рис. 2.19 (с. 117).

Слід звернути увагу, що використання ППП Statistica для *T*-критерію Уїлкоксона неможливе для двох незв'язаних вибірок див. підрозділ 7.4.3.3.2 Розрахункове визначення *T*-критерію Уїлкоксона для двох незв'язаних вибірок).




Рис. 7.20. Блокова діаграма

7.4.3.4. Порівняння декількох середніх за допомогою рангового критерію Дункана

Якщо нульова гіпотеза за F -критерієм Фішера не приймається ($F=s_1^2/s_2^2 > F_{\alpha(v_1, v_2)}$), то додатково проводять попарно перевірку середніх значень серій за допомогою критерію Дункана за формулою [86]

$$q = \frac{|\bar{x}_k - \bar{x}_l|}{s_2} \cdot \sqrt{\frac{2n_k n_l}{n_k + n_l}} > q(\alpha, m_k, v_2), \quad (7.62)$$

де α – прийнятий рівень значущості;
 k, l – ранговий порядок порівнюваних середніх;
 \bar{x}_k, \bar{x}_l – величини порівнюваних середніх рангів;
 n_k, n_l – повторення для відповідних рангів;
 s_2 – середній квадратичний відхил похибки;
 v – ступінь вільності похибки;
 m – ранговий порядок.

Тут s_2 і v беруться із результатів ДА всієї вибірки, а m визначається як $m=k-l$.

Числові значення $q(\alpha, m, v_2)$ знаходять за табл. Е.28.

Використання критерію Дункана пов'язане з деякою складністю його розрахунку за формулами. Крім того, як пише про нього авторитет в дисперсійному аналізі, як Г. Шеффе [127]: "Я не здатний дати йому обґрунтування".

Але хоч і існує багато альтернативних критеріїв, таких, як T -критерій, запропонований Дж. Тюкі (див. підрозділ **10.9.3 Попарне порівняння даних за методом Тюкі**), і s -критерій, запропонований Г. Шеффе, але він представлений в апостеріорних умовах ППП Statistica (див. **10.9.4 Основи розрахунку за тестом Шеффе**).

Для критерію Дункана з наперед заданим $q(\alpha, m, v_2)$ рівень значущості знижується разом з числом середніх значень, розташованих у порядку убутання між \bar{x}_k, \bar{x}_l . В результаті рівень значимості більш високого порядку визначається виразом

$$\alpha^* = p(\bar{x}_k; \bar{x}_l) = \alpha^{\Delta m_{kl}}. \quad (7.63)$$

З ростом числа проміжних середніх одночасно зростає і ризик появи помилки першого роду (див. **10.9 Апостеріорні критерії. Порівняння групових середніх дисперсійного комплексу**, а також табл. 7.63).

Тому буває доцільно відмовитися від традиційних уявлень, знайти фактичний рівень значущості і обговорити його. Для попарної перевірки сере-

дніх в літературі іноді застосовується розширена форма t -критерію **10.9.1 Множинний t -критерій Фішера (захиснений t -критерій)**. При цьому “множинні критерії” якість перевірки знижується набагато швидше, ніж при критерії Дункана. Тому для попарного порівняння середніх при $n > 2$ “множинний t -критерій” не рекомендується.

Таблиця 7.63 – Рівні значущості високих порядків при попарному порівнянні m середніх за критерієм Дункана

Рівень значимості більш високого порядку	Рівень значущості α		Δm_{kl}	$\bar{x}_1 > \bar{x}_2 > \bar{x}_3 > \bar{x}_4 > \bar{x}_5$
	0.05	0.01		
$\alpha^* =$	0.05	0.01	1	
	0.0975	0.0199	2	
	0.1427	0.0298	3	
	0.1855	0.0394	4	

Розглянемо оцінку однорідності урожайності восьми ділянок, тобто чи статистично значущі їхні відмінності (табл. 7.64), приклад взято з [86].

Таблиця 7.64 – Значення урожайності ділянок

Повторення	Ділянка							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1.42	1.42	1.42	1.38	1.36	1.37	1.38	1.32
2	1.42	1.39	1.38	1.41	1.37	1.34	1.37	1.33
3	1.41	1.38	1.41	1.41	1.37	1.38	1.36	1.34
4	1.44	1.38		1.42	1.39	1.34	1.37	1.32
Середнє	1.423	1.393	1.403	1.405	1.373	1.358	1.370	1.328

Виконаємо однофакторний дисперсійний аналіз, результати якого наведені в табл. 7.65.

Таблиця 7.65 – Значення урожайності ділянок

Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_F	Рівень значущості p
Загальна варіація	58.64923	31			
Вільний член	58.61804	1	58.61804	243286.9	0.000E+00
Урожайність	0.02565	7	0.00366	15.2	2.885E-07
Похибка	0.00554	23	0.00024		

Результати розрахунків рангового критерію Дункана наведені в табл. 7.66.

Таблиця 7.66 – Розрахунок рангового критерію Дункана

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q			
1	Повторення	Ділянка								Результати диспаналізу									
2		A	B	C	D	E	F	G	H	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Ступені вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_φ	Рівень значущості p				
3		1	1.42	1.42	1.42	1.38	1.36	1.37	1.38		1.32	Загальна варіація	58.649	31	1.89	7852.14	4.57E-40		
4		2	1.42	1.39	1.38	1.41	1.37	1.34	1.37		1.33		Вільний член	58.618	1	58.62	243286.9	0.000E+00	
5		3	1.41	1.38	1.41	1.41	1.37	1.38	1.36		1.34		Урожайність	0.026	7	0.00	15.21	2.885E-07	
6	4	1.44	1.38		1.42	1.39	1.34	1.37	1.32		Похибка		0.006	23	0.00				
7	Середнє	1.423	1.393	1.403	1.405	1.373	1.358	1.370	1.328										
8	Розташування	1	2	3	4	5	6	7	8										
9																			
10	Ранжовані дані																		
11	Урожай	1.423	1.405	1.403	1.393	1.373	1.370	1.358	1.328	B7=CP3HAЧ(B3:B6) ... I7=CP3HAЧ(I3:I6)									
12	Кількість	4	4	3	4	4	4	4	4								B11=B7	B12=CЧЕТ(B3:B6)	B13=B2
13	Ділянка	A	D	C	B	E	G	F	H								C11=E7	C12=CЧЕТ(E3:E6)	C13=E2
14																	D11=D7	D12=CЧЕТ(D3:D6)	D13=E2
15																	E11=C7	E12=CЧЕТ(C3:C6)	E13=C2
16			D	C	B	E	G	F	H	F11=F7	F12=CЧЕТ(F3:F6)	F13=F2							
17		A	2.25	2.29	3.87	6.44	6.76	8.38	12.24	G11=H7	G12=CЧЕТ(H3:H6)	G13=H2							
18		D		0.20	1.61	4.19	4.51	6.12	9.99	H11=G7	H12=CЧЕТ(G3:G6)	H13=G2							
19		C			1.29	3.68	3.98	5.47	9.05	I11=I7	I12=CЧЕТ(I3:I6)	I13=I2							
20		B				2.58	2.90	4.51	8.38	C17=(B11-C11)*(2*B12*C12/(B12+C12)/\$N\$8)^0.5 D17=(B11-D11)*(2*B12*D12/(B12+D12)/\$N\$8)^0.5 E17=(B11-E11)*(2*B12*E12/(B12+E12)/\$N\$8)^0.5 I17=(B11-I11)*(2*B12*I12/(B12+I12)/\$N\$8)^0.5 D18=(C11-D11)*(2*C12*D12/(C12+D12)/\$N\$8)^0.5 E18=(C11-E11)*(2*C12*E12/(C12+E12)/\$N\$8)^0.5 I18=(C11-I11)*(2*C12*I12/(C12+I12)/\$N\$8)^0.5 H22=(G11-H11)*(2*G12*H12/(G12+H12)/\$N\$8)^0.5 I22=(G11-I11)*(2*G12*I12/(G12+I12)/\$N\$8)^0.5 I23=(H11-I11)*(2*H12*I12/(H12+I12)/\$N\$8)^0.5									
21		E					0.32	1.93	5.80										
22		G						1.61	5.48										
23		F							3.87										
24																			
25	Ранговий порядок m																		
26			D	C	B	E	G	F	H	D27=C27+1 ... I27=H27+1 C47=C17-C37 ... I53=I23-I43									
27		A	2	3	4	5	6	7	8										
28		D		2	3	4	5	6	7										
29		C			2	3	4	5	6										
30		B				2	3	4	5										
31		E					2	3	4										
32		G						2	3										
33		F							2										
34																			
35	Табличне значення q(α,m,v ₂)																		
36			D	C	B	E	G	F	H	D27=C27+1 ... I27=H27+1 C47=C17-C37 ... I53=I23-I43									
37		A	2.93	3.08	3.16	3.23	3.29	3.32	3.35										
38		D		2.93	3.08	3.16	3.23	3.29	3.32										
39		C			2.93	3.08	3.16	3.23	3.29										
40		B				2.93	3.08	3.16	3.23										
41		E					2.93	3.08	3.16										
42		G						2.93	3.08										
43		F							2.93										
44																			
45	Різниця між розрахунковим і табличним																		
46			D	C	B	E	G	F	H	D27=C27+1 ... I27=H27+1 C47=C17-C37 ... I53=I23-I43									
47		A	-0.67	-0.79	0.71	3.21	3.48	5.06	8.90										
48		D		-2.73	-1.46	1.03	1.28	2.84	6.67										
49		C			-1.63	0.60	0.82	2.24	5.76										
50		B				-0.35	-0.18	1.35	5.15										
51		E					-2.60	-1.14	2.64										
52		G						-1.31	2.40										
53		F							0.94										

Отримані в табл. 7.66 результати співпадають з результатами розрахунків, поданих в [86].

З представленою видно, що використання даного розрахункового способу недоцільне, при необхідності отримання розрахунків за критерієм Дункана слід використовувати визначення його інструментами ППП Statistica.

8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ОЗНАК

8.1. СТАТИСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРОК ЗА ЯКІСНИМИ ОЗНАКАМИ

У біологічних і економічних дослідженнях часто доводиться мати справу з якісною мінливістю ознак: різною формою і забарвленням насіння і плодів, розщепленням гібридів і т. п.

Окремим випадком якісної мінливості є альтернативна, при якій варіюють ознаки являють собою одну з двох можливостей (альтернатив) — наявність або відсутність ознаки, наприклад чоловічі або жіночі екземпляри, рослини хворі і здорові, колосся остисті і безості і т. п. Угрупування результатів спостережень при якісному варіюванні зводиться до розподілу сукупності об'єктів на групи (класи) з різними якісними ознаками.

Розподіл якісних ознак описуються за допомогою основних статистичних показників (характеристик) [34, 50]:

- 1) Частка ознаки — p_1, p_2 і т.д.
- 2) Показник мінливості — s .
- 3) Квадратична похибка частки s_p .

Частка — це середня, яка характеризує кількість одиниць у вибірці, яка має досліджувану ознаку. Частка ознаки, або відносна чисельність (частота) окремої варіанти в даній сукупності позначається через p_1, p_2, p_3 і т.д. і може бути виражена в частках одиниці чи у відсотках. У першому випадку сума всіх часток у межах даної сукупності або ряду розподілу дорівнює одиниці, а в другому — 100 %.

Частка ознаки представляє відношення чисельності кожного з членів ряду ($n_1; n_2$ і т.д.) до загальної чисельності сукупності — N , тобто [34]

$$p_1 = \frac{n_1}{N}; \quad p_2 = \frac{n_2}{N} \text{ і т.д.} \quad (8.1)$$

Частка вибіркового спостереження є оцінкою частки генеральної сукупності.

Показник мінливості s якісної ознаки характеризує варіювання величин ряду відносно одна одної. Цей показник як і СКВ характеризує варіювання кількісних ознак. Однак між цими двома характеристиками є принципова відмінність.

Середнє квадратичне відхилення обчислюється на основі відхилень значень ознаки від середньої арифметичної, показник же мінливості характеризує варіювання величин ряду відносно одна одної. Математично показник варіювання s дорівнює середній геометричній частот розподілу [34, 50]

$$s = \sqrt[k]{p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdots p_k}, \quad (8.2)$$

де $p_1, p_2 \dots p_k$ — частки ознаки (або відсоткові їх значення) у загальній сукупності;

k — число градацій ознаки, на які вона розподілена.

Якщо розподіл складається з двох градацій (альтернативний розподіл, тобто, *бінарне варіювання*), то частка однієї ознаки — p_1 , другої — p_2 , або

$$q=(1-p), \quad (8.3)$$

У цьому разі показник варіювання s становить (8.4) [34]

$$s = \sqrt{p(1-p)}. \quad (8.4)$$

Однак у такому вигляді ці показники ускладнюють оцінку відносної міри мінливості. Тому більш правильним буде характеризувати відносну ступінь мінливості за допомогою коефіцієнта варіації, який представлений виразом (8.5) і являє собою відсоткове відношення до максимально можливого при даному k [34, 50], тобто до $s_{\max}=1/k$

$$V_p = 100 \cdot \frac{s}{s_{\max}} = 100 \cdot s \cdot k. \quad (8.5)$$

Похибка вибіркової частки s_p — міра відхилення частки ознаки вибіркової сукупності p від частки його по всій генеральній сукупності P унаслідок неповної репрезентативності вибірки. Похибка частки s_p однакова для всіх часток розподілу і обчислюється за формулами (8.6) і (8.7) [34, 60]

$$s_p = \frac{s}{\sqrt{n}}; \quad (8.6)$$

$$s_p = \frac{s}{\sqrt{n-1}}. \quad (8.7)$$

Для альтернативного (бінарного) варіювання, формули розрахунку значення похибки вибіркової частки відповідно до (8.6) і (8.7) набувають вигляду [50]

$$s_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \quad (8.8)$$

$$s_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n-1}}. \quad (8.9)$$

З поправкою Пірсона формула (8.8) представлена у повному (8.12) чи спрощеному (8.24) вигляді [15]

$$s_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)}; \quad (8.10) \quad s_p = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{N}\right)}. \quad (8.11)$$

Імовірність зустріти p (або q) в інтервалі $p \pm s_p$ становить близько 68 %, в інтервалі $p \pm 2s_p$ — 95 % і в інтервалі $p \pm 3s_p$ — близько 99 %. Отже, подібно до кількісної мінливості, все значення p з імовірністю 99 % укладаються в межах потрійний похибки вибіркової частки [34].

Оцінка істотної різниці між вибірковими частками за умовами рівності вибірок, тобто $n_1 = n_2$, при якісній мінливості виконується так, як і при кількісній мінливості (8.12) [34]

$$t = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{s_{p_1}^2 + s_{p_2}^2}}, \quad (8.12)$$

де p_1 і p_2 — вибіркові частки;

s_{p_1} і s_{p_2} — похибки часток, розраховані за виразом (8.7).

Отриманий результат порівнюється за t -критерієм Стюдента визначенням для прийнятого рівня значущості α і ступеня вільності $\nu = n_1 + n_2 - 2$.

Також для визначення похибки різниці пропонується вираз (8.13) [60]

$$t = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1 - 1} + \frac{p_2 q_2}{n_2 - 1}}}. \quad (8.13)$$

8.2. ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ ДЛЯ ЧАСТКИ

Визначення довірчого інтервалу частки при альтернативному варіюванні ґрунтується на тих же принципах, що і при нормальному розподілі.

Довірчий інтервал результатів вимірювання визначає проміжок між довірчими межами. Межі довірчого інтервалу для генеральної частки визначають так само, як і для генеральної середньої рядовий мінливості, тобто у якому із заданою ймовірністю міститься **розрахункове** значення оцінюваного параметра, у даному разі p [50]

$$p_{ді} = p(1 \pm t_{\alpha(n_1+n_2-1)} \cdot s_p), \quad (8.14)$$

Тут $t_{\alpha(n_1+n_2-1)}$ двосторонній критерій Стюдента, визначений за допомогою статистичної функції **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** ПА **MS Excel** (Додаток А) на основі двобічного зворотного t -розподіл Стюдента для прийнятого рівня значущості α і ступеня вільності $\nu = n_1 + n_2 - 1$.

У тих випадках, коли виникає необхідність визначити довірчий інтервал не для частки (або відсотка), а для кількості об'єктів, які мають певні ознаки, тобто, n_1 і n_2 , знаходять аналогічним чином, однак квадратичну похибку обчислюють за іншою формулою

$$s_p = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}. \quad (8.15)$$

У цьому разі межі кількості об'єктів з певними ознаками, тобто, n_1 і n_2 знаходяться за виразом [15, 50]

$$n_{ді1,2} = n_{1,2} (1 \pm t_{\alpha(n_1+n_2-1)} \cdot s_p). \quad (8.16)$$

Подані вище формули застосовують тоді, коли вибірккові частки p_1 і p_2 незначно відхиляються від 50 %-ої чисельності груп. За умови $75\% < p < 25\%$, довірчі межі для генеральної частки визначається за формулою [15]

$$P = \frac{1}{n + t_{\alpha(n-1)}^2} \left[\left(m + \frac{t_{\alpha(n-1)}^2}{2} \right) \pm t_{\alpha(n-1)}^2 \sqrt{\frac{m(n-m)}{n} + \frac{t_{\alpha(n-1)}^2}{4}} \right], \quad (8.17)$$

де n – число спостережень;

m – абсолютна чисельність однієї з груп;

$t_{\alpha(n-1)}$ – нормоване відхилення, яке визначається за значенням ймовірності p .

8.3. АНАЛІЗ ТАБЛИЦЬ СПРЯЖЕНОСТІ (КРОСТАБУЛЯЦІЇ)

8.3.1. Загальні пояснення

Аналіз таблиць спряженості застосовується для вирішення завдань, які можуть бути сформульовані наступним чином:

— необхідно порівняти два (або більше) розподіли між собою, наприклад, чи розрізняються сорти стійкість проти різних захворювань?

— необхідно визначити зв'язок між двома номінативними ознаками (між класифікаціями об'єктів за двома різними показниками), наприклад, чи пов'язано співвідношення прояву різних хвороб з сортом?

Неважко помітити, що ці завдання відрізняються лише словесно. Так, вивчення зв'язку між двома номінативними змінними тотожне порівнянню градацій однієї номінативної змінної з розподілу інший номінативної змінної.

У подібних випадках використовується аналіз таблиць спряженості, у яких стовпці відповідають порівнюваним розподілів (градаціях однієї номінативної змінної), а рядки відповідають градаціях порівнюваних розподілів (градаціях іншої номінативної змінної).

Формулювання перевіряється H_0 : класифікація досліджуваних об'єктів за одним показником не залежить від їх класифікації за іншим показником.

Вихідні дані: визначено належність кожного об'єкта вибірки до однієї з градацій першої номінативної змінної і до однієї з градацій другої номінативної змінної. Іншими словами, дві номінативні змінні виміряні на вибірці об'єктів. Рядки таблиці спряженості відповідають градаціях однієї номінативної змінної, стовпці — градаціях інший номінативної змінної.

Якщо перевірка змістовної гіпотези передбачає аналіз таблиці спряженості, то принциповим є питання про розмірності таблиці. Будемо розрізняти два випадки:

- загальний випадок (число градацій хоча б однієї з ознак більше 2-х);
- окремий випадок: таблиці спряженості 2×2 (по дві градації для кожної змінної).

Ці випадки розрізняються як порядком розрахунків, так і особливостями інтерпретації [5].

8.3.2. Порівняння груп за якісними бінарних ознакою

Бінарні (дихотомічні) ознаки являють собою альтернативні наслідки дії на об'єкти дослідження, наприклад: поліпшення — без поліпшення і т.д.

Саме на аналізі таких результатів побудовані всі сучасні методики докази ефектів.

У даному розділі існує можливість вибору одностороннього або двостороннього критерію статистичної значущості. Односторонній критерій статистичної значущості слід використовувати лише в тих випадках, коли заздалегідь (апріорі) відомо, яка із порівнюваних підгруп переважає за частотою і лише необхідно обчислити значення p для того, щоб підтвердити статистичну значущість вихідного припущення. Однак у цьому випадку така апріорна гіпотеза повинна бути обґрунтована.

У переважній більшості ситуацій таке обґрунтування неможливо, тому необхідно користуватися двостороннім критерієм статистичної значущості. Даний критерій видає значення p , що перевищує приблизно у два рази таке ж для одностороннього критерію [5].

8.3.3. Порівняння вибіркової відносної частоти з популяційною

При рішенні можуть використовуватися такі підходи: порівняння довірчого інтервалу для вибіркової відносної частоти (пропорції, частки) з популяційних значенням викладена в підрозділах **8.3.3.1 Порівняння довірчого інтервалу вибіркової відносної частоти з популяційною**), z -критерій (див. підрозділ **8.3.3.3 Перевірка гіпотез за z -критерієм**).

Перевірка гіпотез критерієм χ^2 описана у підрозділі **8.3.4.5 Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при двох градаціях критерієм χ^2** для іншого прикладу, тому тут не наводиться.

8.3.3.1. Порівняння довірчого інтервалу вибіркової відносної частоти з популяційною

Побудова довірчого інтервалу для відносної частоти значення бінарної ознаки з використанням t -критерію вимагає одночасного виконання умов:

- $n \cdot p \geq 5$;
- $n(1-p) \geq 5$;
- $0.3 \leq p \leq 0.7$.

Тут p – відносна частота прояву, виражена десятковим дробом, n – обсяг вибірки (див. с. 455–456). Дані умови пов'язані з апроксимацією бінарного розподілу нормальним [5].

При розрахунку верхньої p_v і нижньої p_n меж довірчого інтервалу для відносної частоти бінарної ознаки використовується наближена формула (8.18)

$$p_{v,n} = p \pm t \cdot \left(\sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n}} + \frac{1}{2n} \right), \quad (8.18)$$

де p – емпірична відносна частота, спостережувана у вибірці;
 \bar{P} – відносна частота (поширеність) досліджуваного стану в популяції.

Тут доданок $\frac{1}{2n}$ є поправкою на безперервність, яка компенсує похибку, що виникає при апроксимації бінарного розподілу нормальним [5].

Відносно популяційного значення можуть розглядатися дві ситуації:

- відома точкова оцінка популяційної частоти, тобто одне число \bar{P} ;
- відома інтервальна оцінка популяційної частоти, тобто довірчий інтервал $[\bar{P}_H; \bar{P}_B]$.

Рішення полягає відповідно або в розгляді, чи *потрапляє* популяційне значення у межі обчисленого *довірчого інтервалу* (у першій ситуації), або в розгляді, чи *перекриваються довірчі інтервали* для вибіркового і популяційного значень.

Приклад: Вихід яєць вищої і першої категорії на фермі у 277 курей після запровадження певних заходів склав 66.3 %. Відомо, що для цієї породи даний показник дорівнює 57.8 %. Необхідно дізнатися, чи дійсно проведені заходи характеризується необхідним впливом?

Рішення. Розрахунки, виконані за формулами (8.3), (8.18) та статистичною функцією **MS Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** наведені на полі табл. 8.1.

За нашими даними точкова оцінка значення для породи курей 0.578 знаходиться поза розрахованого за вибіркою довірчого інтервалу показників ферми [0.604; 0.722], а точкова вибіркова оцінка показників ферми 0.663 — поза зоною популяційного довірчого інтервалу для породи курей [0.516; 0.640].

Але через те, що довірчі інтервали вибіркової та популяційної величин перекриваються, то відмінність статистично незначуща. Таким чином можна вважати, що показники ферми статистично значимо (з рівнем значущості 0.05) не відрізняється від показників породи за значенням досліджуваної бінарної ознаки (пропорції), тобто проведені заходи не характеризується статистично значимим впливом.

При представленні результатів слід привести значення популяційної відносної частоти \bar{P} і її довірчий інтервал, тобто $\bar{x}_{ПВ,Н}$; значення вибіркової відносної частоти p і її довірчий інтервал, тобто $p_{В,Н}$; прийнятий рівень значущості α [5].

Таблиця 8.1 – Порівняння довірчого інтервалу вибіркової відносної частоти з популяційною

	А	В	С
1	Показник	Показник ферми	Показник породи
2	Поголів'я курей	277	
3	Вихід яєць даних категорій	0.663	0.578
4	Рівень значущості	0.05	
5	Табличне значення t-критерію	1.9686	
6	Нижній довірчий інтервал	0.604	0.516
7	Верхній довірчий інтервал	0.722	0.640
B5=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B4;B2-1) B6=B3-((B3*(1-B3)/B2)^0.5+0.5/B2)*B5 B7=B3+((B3*(1-B3)/B2)^0.5+0.5/B2)*B5			

8.3.3.2. Відповідність ймовірності події певному значенню

Нехай проведено n незалежних випробувань (n – досить велике число), в кожному з яких деяка подія A з’являється з однією і тією ж, але невідомою ймовірністю p , і знайдена відносна частота m появ A в цій серії випробувань. Перевіримо при заданому рівні значущості α нульову гіпотезу H_0 , яка полягає в тому, що ймовірність p , яка становить $p=m/n$, статистично дорівнює деякому значенню p_0 .

Прийmemo в якості статистичного критерію випадкову величину

$$U = \left(\frac{m}{n} - p_0 \right) \sqrt{\frac{n}{p_0 q_0}}, \quad (8.19)$$

яка має нормальний розподіл з параметрами $M(U)=0$, $\sigma(U)=1$ (тобто нормовану). Тут $q_0=1-p_0$ [87].

Висновок про нормальний розподіл критерію впливає з теореми Лапласа (при досить великому n відносну частоту можна наближено вважати нормально розподіленою з математичним очікуванням p і середнім квадратичним відхиленням $\sqrt{\frac{pq}{n}}$).

Критична область будується у залежності від виду конкуруючої гіпотези.

1) Якщо $H_0:p=p_0$, а конкуруюча (альтернативна) $H_A:p \neq p_0$, то критичну область потрібно побудувати так, щоб ймовірність попадання критерію в цю область дорівнювала заданим рівнем значущості α . При цьому найбільша потужність критерію досягається тоді, коли критична область складається з двох інтервалів, ймовірність попадання в кожен з яких дорівнює $\frac{\alpha}{2}$.

Тому $u_{кр}$ визначається по таблиці значень функції Лапласа з умови $\Phi(u_{кр})=1-\alpha$, а критична область має вигляд $(-\infty; u_{кр}) \cup (u_{кр}; +\infty)$.

Далі обчислити емпіричне (спостережуване) значення критерію

$$U_{емп} = (p - p_0) \sqrt{\frac{n}{p_0 q_0}}, \quad (8.20)$$

Якщо $|U_{емп}| < u_{кр}$, то нульова гіпотеза приймається.

Якщо $|U_{емп}| > u_{кр}$, то нульова гіпотеза відкидається.

2) Якщо альтернативна гіпотеза $H_A:p > p_0$, то критична область визначається нерівністю $U > u_{кр}$, тобто є правобічною, причому $p(U_{емп} > u_{кр}) = \alpha$. Тоді

$p(0 < U < u_{кр}) = 1 - 2\alpha$. Отже, $u_{кр}$ можна знайти по таблиці значень функції Лапласа з умови, що $\Phi(u_{кр}) = 1 - 2\alpha$.

Обчислимо спостережуване значення критерію за формулою (8.20).

Якщо $U_{емп} < u_{кр}$, то нульова гіпотеза приймається.

Якщо $U_{емп} > u_{кр}$, то нульова гіпотеза відкидається.

3) Для конкуруючої гіпотези $H_A: p < p_0$ критична область є лівобічною і задається нерівністю $U < -u_{кр}$, де литок обчислюється так само, як в попередньому випадку.

Якщо $U_{емп} > -u_{кр}$, то нульова гіпотеза приймається.

Якщо $U_{емп} < -u_{кр}$, то нульова гіпотеза відкидається.

Приклад. Нехай проведено $n=50$ незалежних випробувань, і відносна частота появи події A виявилася рівною $p=0.12$. Перевірити при рівні значущості $\alpha=0.01$ нульову гіпотезу $H_0: p=0.1$ при конкуруючій гіпотезі $H_A: p > 0.1$.

Рішення. За формулою (8.20) знайдемо

$$U_{емп} = (0.12 - 0.10) \sqrt{\frac{50}{0.1(1-0.1)}} = 0.471$$

Критична область є правобічною, а $u_{кр}$ знаходимо з рівності $\Phi(u_{кр}) = 1 - 2\alpha = 1 - 2 \cdot 0.01 = 0.98$. З таблиці значень функції Лапласа (табл. В.3).

Тут число z визначається з рівності $\Phi(z) = \alpha/2$, яка впливає з $2\Phi(z) = \alpha$ і для $2\Phi(u_{кр}) = 0.98$ становить $u_{кр} = 2.33$. Отже $U_{емп} < u_{кр}$ і нульова гіпотеза про те, що p і p_0 статистично рівні за умови $\alpha=0.01$, приймається [87].

При використанні статистичної функції **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР** береться значення аргументу $[1 + \Phi(u_{кр})]/2$. Таким чином маємо **НОРМ.СТ.ОБР(0.99) = 2.326348**.

8.3.3.3. Перевірка гіпотез за z -критерієм

Необхідно порівняти відносну частоту p якогось явища, спостережувану у досліджуваній вибірці, з відомим (або очікуваним) популяційним значенням відносної частоти цієї події \bar{P} .

Приклад: Відносна частота ураження 500 рослин деякої хворобою після обробки хімічним препаратом склала $p = 3\%$. Відомо, що на необроблених ділянках в середньому відносна частота цього захворювання становить $\bar{P} = 6\%$ (95 % довірчий інтервал — $[4\%; 8\%]$). Необхідно дізнатися, чи дійсно цей препарат характеризується необхідним впливом?

При перевірці зазначеної нульової гіпотези про збіг спостережуваної (вибіркової) і очікуваної (популяційної) частот необхідно обчислити середньостатистичну похибку s_p для передбачуваного (очікуваного) популяційно-

го значення в даній вибірці за формулою (8.9).


Потім розраховується значення z -статистики критерію (з урахуванням поправки на апроксимацію біноміального розподілу нормальним) [5]

$$z = \frac{|p - \bar{P}| - 0.5n}{s_p}, \quad (8.21)$$

де p – відносна частота, спостережувана у вибірці.

Для зазначених вище даних маємо $s_p = 0.036807$ і $z = 1.7890$.

Для перевірки нульової гіпотези скористаємося імовірнісним калькулятором (рис. 8.1), який обчислює рівень значущості p за величиною z -статистики.



Так як $p = 0.0368 < \alpha = 0.05$, нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про те, що відмінності між вибірковою і популяційною відносними частотами статистично значущі.

У представленні результатів приводяться значення популяційної відносної частоти \bar{P} , її довірчий інтервал, тобто $[\bar{P}_H; \bar{P}_B]$, значення вибіркової відносної частоти p і її довірчий інтервал, тобто $p_{B,H}$, точне значення обчисленого рівня значущості p , отримане при перевірці нульової гіпотези [5].

8.3.4. Порівняння двох частот всередині однієї і у двох групах

За результатами підрахунку абсолютних і відносних частот та візуального аналізу таблиці частот для якісної ознаки в одній або двох групах у дослідника можуть виникнути наступні припущення:

- частка об'єктів з будь-яким значенням якісної ознаки більше частки об'єктів з іншим значенням цього ж ознаки в цій же групі;
- частки об'єктів з яким-небудь значенням якісної ознаки у двох групах розрізняються.

Обидва припущення слід перевіряти з використанням статистичних методів. Відповідно можуть бути сформульовані наступні завдання.

- вивчити переважання будь якого значення якісної ознаки (відносної частоти) у вибірці.
- порівняти дві групи по відносній частоті значень якісного (номінального або порядкового) ознаки.

8.3.4.1. Порівняння довірчого інтервалу вибіркової частоти з популяційною

8.3.4.1.1. Розрахунковий метод порівняння довірчого інтервалу з використанням MS Excel

Приклад. Із 129 курчат, які вилупилися в інкубаторі 79 (61.2 %) курочок. Визначити чи статистично значима їх кількісна перевага над півниками.

При розрахунках необхідно дослідити, чи випадковий цей результат, тобто чи буде такий же результат спостерігатися, наприклад, в 95 з 100 інших вибірок з досліджуваної популяції. В даному випадку необхідно показати, що 61.2 % статистично значимо більше, ніж 38.8 %. Зрозуміло, що зі збільшенням обсягу вибірки зростає переконливість.

Таблиця 8.2 – Розрахунковий метод порівняння довірчого інтервалу			
	А	В	С
1	Показник	Курочки	Півники
2	Загальна кількість курчат	129	
3	Частка	0.612	0.388
4	Рівень значущості	0.05	
5	Табличне значення t-критерію	1.9787	
6	Нижній довірчий інтервал	0.519	0.295
7	Верхній довірчий інтервал	0.705	0.481
$C3=1-B3$ $B5=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B4;B2-1)$ $B6=B3-((B3*(1-B3)/B2)^{0.5}+0.5/B2)*B5$ $B7=B3+((B3*(1-B3)/B2)^{0.5}+0.5/B2)*B5$			

Це визначення може виконуватися двома способам. Першим, описаним у підрозділі 8.3.3.1 Порівняння довірчого інтервалу вибіркової відносної частоти з популяційною і за наведени на полі табл. 8.2 формулами (8.3), (8.18) та статистичною функцією **MS Excel** **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

За точковою оцінкою частки курочок 0.612 знаходиться поза вибіркою довірчого інтервалу показників півників [0.295; 0.481], а точкова вибіркова оцінка показників півників 0.388 — поза зоною популяційного довірчого інтервалу для курочок [0.519; 0.705] [5].

Так як довірчі інтервали часток курочок і півників не перекриваються, то відмінність статистично значуща.

8.3.4.1.2. Порівняння двох пропорцій (часток) вибірок з використанням ППП Statistica

При порівнянні двох пропорцій (часток) вибірок з використанням ППП Statistica у меню **Statistics/Анализ** вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables/Основные статистики и таблицы**, де на однойменній панелі, використавши опцію **Difference tests: r, %, means/Другие критерии значимости** виходимо на однойменну панель **Difference tests: r, %, means/Другие критерии значимости** (рис. 8.2).




Рис. 8.2. Порівняння двох пропорцій (часток) однієї вибірки

На вкладці **Difference between two proportions/Сравнение двух пропорций (долей)** задаємо частки курочок (1) і півників (2) та обсяг вибірки, далі указуємо вид критерію **Two-sided/Двусторонний** (3) — застосовуємо двобічний критерій (так як немає теоретичного обґрунтування того, що одно із середніх свідомо більше іншого) і, натиснувши **Compute/Вычислить** (4), розраховуємо його значення.

У результаті за рис. 8.2 маємо $p = 0.0003 < \alpha = 0.05$, тому нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про існування статистичної відмінності між відносними частотами значень ознаки.

При порівнянні двох відносних частот всередині однієї і у двох групах якщо $p > 0.05$, то нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між відносними частотами значень ознаки не відхиляється, за умови $p \leq 0.05$ нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про існування відмінностей між відносними частотами значень ознаки [5].

При представленні результатів слід навести обсяг вибірки, значення популяційних відносних частот і точне значення обчисленого рівня значущості p , отримане при перевірці нульової гіпотези [5].

8.3.4.2. Оцінка різниці між вибірковою і генеральною частками

При оцінці різниці між відомою генеральною часткою \bar{P} і часткою вибірки p обсягом n нульовою гіпотезою є припущення, що різниця між ними виникла випадково. Критерій Стюдента тоді виражається у вигляді відношення різниці $\bar{P} - p = d_p$ до своєї похибки, яку визначають за формулою

$$s_{d_p} = \sqrt{\frac{\bar{P} \cdot (1 - \bar{P})}{n}}. \quad (8.22)$$

Як і в попередніх випадках, умовах для неприйняття нульової гіпотези H_0 служить t -критерій

$$t_{\text{екс}} = \left| \frac{\bar{P} - p}{s_{d_p}} \right| \geq t_T. \quad (8.23)$$

Табличне значення t -критерію у цьому разі визначається для ступеня вільності $\nu = n - 1$ і прийнятого рівня значущості α .

Приклад: Працівники стрілецького тиру вирішили перевірити, чи правда, що високорослі стрільці частіше влучають у верхню частину мішені, а низкорослі — у нижню. Результати перевірки подано в табл. 8.3.

За нульову гіпотезу прийнята умова $H_0: \bar{P} = 0.5$, тобто, для всіх стрільців попадання у верхню і нижню частину мішені рівні між собою.

Розрахунки, виконані за формулами (8.22), (8.23) та іншими і статистичними функціями MS Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** та **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** наведені на полі табл. 8.3.

За даними табл. 8.3 бачимо, що для жодної ростової групи стрільців нульова гіпотеза не спростовується, таким чином як високорослі, так і низкорослі стрільці влучають у верхню і нижню частину мішені зі статистично однаковою імовірністю.

Таблиця 8.3 – Оцінка різниці між вибірковою і генеральною частками

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Висота стрільця, см	Пострілів, шт.		Частка	Різниця з генеральним	Похибка різниці	t -критерій		Рівень значущості p
2		усього	у верхню частину мішені				емпіричний	табличний	
3	160-165	120	51	0.425	0.075	0.0456	1.6432	1.9801	0.1030
4	165-170	100	48	0.480	0.020	0.0500	0.4000	1.9842	0.6900
5	170-175	90	46	0.511	0.011	0.0527	0.2108	1.9870	0.8335
6	175-180	140	76	0.543	0.043	0.0423	1.0142	1.9772	0.3123
7	Генеральна частка \bar{P}			0.5					
8	Прийнятий рівень значущості α			0.05					

D3=C3/B3 E3=ABS(\$D\$7-D3) G3=E3/F3
F3=(\$D\$7*(1-\$D\$7))/B3^0.5 H3=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(\$D\$8;B3-1)
I3=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(G3;B3-1)

8.3.4.3. Перевірка статистичної рівності частот у двох популяціях

8.3.4.3.1. Розрахунковий метод перевірки статистичної рівності частот з використанням MS Excel

Приклад. Курчат розділили на дві групи. У одній з них 64 курчати, з яких 44 курочка (0.688 %), у другій відповідно 65 і 34 (0.523 %). Слід визначити чи статистично рівні частки курочок у обох групах.

Розрахунок виконаний з використанням формули (8.12) і (8.24) наведено у верхній частині табл. 8.4, за виразами (8.12) і (8.13) — у її нижній частині, та за статистичними функціями MS Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** і **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х**.

Для верхньої її частини маємо бачимо $p=0.0548$, для нижньої $p=0.0566$. У обох випадках виконується умова $p < \alpha$, яка свідчить про статистичну рівність часток курочок у обох групах.

При поданні результатів слід привести число спостережень в групі (групах); привести числа прояву відповідного явищ і їх відносні частоти; привести точну величину рівня значущості p [5].

Таблиця 8.4 – Порівняння двох пропорцій (часток) двох вибірок.			
	A	B	C
1	Найменування показника	I група	II група
2	Поголів'я, шт.		
3	Курочки	44	34
4	Півники	20	31
5	Разом	64	65
6	Частки		
7	Курочки	0.6875	0.5230
8	Півники	0.3125	0.4769
9	Критерій Стюдента розрахунковий t_{ϕ}	1.9384	
10	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
11	Двостор. таблич. критер. Стюдента t_{τ}	1.9788	
12	Двостор. емпірич. рівень значущості p	0.0548	
$B4=B5-B3$ $B7=B3/B5$ $B8=1-B7$			
$B9=(B7-C7)/(B7*B8/B5+C7*C8/C5)^{0.5}$			
$B11=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(B10;B5+C5-2)$			
$B12=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(B9;B5+C5-2)$			
9	Критерій Стюдента розрахунковий t_{ϕ}	0.5125	0.4770
10	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
11	Двостор. таблич. критер. Стюдента t_{τ}	1.9788	
12	Двостор. емпірич. рівень значущості p	0.0566	
$B9=(B7-C7)/(B7*B8/(B5-1)+C7*C8/(C5-1))^{0.5}$			

8.3.4.3.2. Перевірка статистичної рівності частот з використанням ППП Statistica

Використовуючи ППП **Statistica** і виконуючи дії за рис. 8.3 отримуємо $p=0.0561 < \alpha=0.05$ — нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між відносними частотами значень ознаки не відхиляється — відмінність статистично незначуща.

Порівнюючи результати, отримані розрахунками (табл. 8.4) і представлені на рис. 8.3), бачимо, що результатами визначення за допомогою ППП **Statistica** співпадають з розрахунками за виразами (8.12) і (8.13).




Рис. 8.3. Порівняння двох пропорцій (часток) двох вибірок.

Може виникнути ситуація, при якій досліджувана ознака в одній з порівнюваних груп зустрічався у всіх (100 %) або у жодного (0 %) об'єкта дослідження. У цій ситуації в діалогове вікно слід

вводити не число 1 (відносна частота у випадку 100 %) а число, близьке до 1, тобто 0.9999999. Аналогічно замість 0 слід вводити число, близьке до 0, тобто 0.0000001. Така заміна практично не впливає на результат обчислень [5].

8.3.4.3.3. Оцінка різниці між частками

Вибіркова частка залежить від числа одиниць ознак у вибірці а загальне число таких одиниць у генеральній сукупності визначає генеральну частку \bar{P} . Оцінкою різниці між генеральними частками $P_1 - P_2 = D$ служить різниця між вибірковими долями $p_1 - p_2 = d$. Відношення цієї різниці до своєї помилку дає випадкову величину $t = d/s_{d_p}$, яка слід t -розподілу Стюдента. Нульову гіпотезу H_0 , або припущення про те, що $P_1 = P_2$, відкидають, якщо $t_{\text{емп}} \geq t_{\text{т}}$ для $v = n_1 + n_2 - 2$ і прийнятого рівня значущості α . Похибка різниці між частками, нерівних вибірок, тобто $n_1 \neq n_2$, але приблизно рівновеликих (за чисельністю розрізняються не більше ніж на 25 %), визначається виразом (8.24) [15, 34]

$$s_{d_p} = \sqrt{\frac{p_1 \cdot q_1}{n_1} + \frac{p_2 \cdot q_2}{n_2}}, \quad (8.24)$$

де $q_2 = 1 - p_1$.

Якщо частки виражені в процентах від загального числа спостережень, помилку різниці між ними визначають за формулою

$$s_{d_p} = \sqrt{\frac{p_1 \cdot (100 - p_1)}{n_1} + \frac{p_2 \cdot (100 - p_2)}{n_2}}. \quad (8.25)$$

Зіставляються групи n_1 і n_2 можуть бути виражені абсолютними числами m_1 і m_2 . Помилка спостерігається між ними різниці визначається за такою формулою

$$s_{d_p} = \sqrt{\frac{m_1 \cdot (n_1 - m_1)}{n_1} + \frac{p_2 \cdot (n_2 - m_2)}{n_2}}, \quad (8.26)$$

але так як $m_1/n_1=p_1$; $m_2/n_2=p_2$; $(n_1-m_1)/n_1=q_1$; $(n_2-m_2)/n_2=q_2$, то формулу (8.24) можна представити і в такому вигляді;

$$s_{d_p} = \sqrt{n_1 \cdot p_1 \cdot q_1 + n_2 \cdot p_2 \cdot q_2}. \quad (8.27)$$

Коли порівнюють частки з нерівновеликих вибірок і при $75\% < p < 25\%$, помилку різниці між ними визначають за формулою

$$s_{d_p} = \sqrt{p \cdot q m_1 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}, \quad (8.28)$$

а p визначають як середньозважену з p_1 і p_2 часткою, або ж з абсолютних величин груп:

$$p = \frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2}. \quad (8.29)$$

У цих формулах n_1 і n_2 — чисельності груп, на яких визначають частки $p_1=m_1/n_1$ і $p_2=m_2/n_2$. Якщо частки виражають у відсотках від n , то замість $q=1-p$ потрібно брати $q=100-p$. Якщо ж нерівновеликих групи виражені абсолютними числами m_1 і m_2 , помилку різниці між ними визначають за формулою

$$s_{d_p} = \sqrt{\frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2} \cdot \left(1 - \frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2} \right) \cdot \frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}, \quad (8.30)$$

Приклад. У одному з п'ятих класів школи з 29 учнів 3 відмінників, у другому з 23 учнів — 8. Чи статистично істотні відмінності успішності між учнями цих класів?

Розрахунки за наведеними вище формулами представлені на табл. 8.5.

З неї видно, що особливістю отриманих результатів є те, що оцінка відмінності різниць досліджуваного показника за числовими значеннями, статистично незначуща, у той час, як оцінка їхньої відмінності, виконана за різницями часток, свідчить про статистичну значущість.

8.3.4.4. Оцінка якісних ознак коефіцієнтом варіювання

При оцінці мінливості часток у двох чи більше вибірок більш вірно буде характеризувати її відносну ступінь за допомогою коефіцієнта варіювання (8.5).

Приклад 1. Розрахунок показників мінливості забарвлення помідорів третього покоління гібридів (табл. 8.6) [50]. Слід виявити яке потомство більш мінливе.

Розрахунок виконуються з використанням формул (8.1) і (8.5) як показано на полі табл. 8.6. З неї видно що більш мінливе потомство жовто–червоного забарвлення.

Приклад 2. Після просіювання через решета різного діаметра насіння двох сортів пшениці отримані наступні розподіли його за фракціями (табл. 8.7) [50]. Насіння якого сорту більш вирівняне за величиною?

Розрахунки виконуються з використанням формул (8.5) і (1.101) як показано на полі табл. 8.7. З неї видно що насіння пшениці сорту Харківська 4 більш вирівняне за величиною.

Таблиця 8.5. Оцінка різниці між частками				
	A	B	C	D
1	Найменування показника		Числа	Частки
2	Клас 5-а	Загалом учнів	29	
3		Відмінники	3	0.103
4		Останні	26	
5	Клас 5-б	Загалом учнів	23	
6		Відмінники	8	0.348
7		Останні	15	
8	Різниця d		5	
9	Прхибка різниці s_d		2.8	
10	Емпіричний критерій $t_{\text{емп}}$		1.7781	
11	Рівень значущості α		0.05	
12	Табличний критерій t_{τ}		2.0086	
13	Рівень значущості		0.0815	
14	Середньозваж. частка відміносі p			0.212
15	Середньозваж. частка останн. q			0.788
16	Різниця d			0.244
17	Прхибка різниці s_d			0.114
18	Емпіричний критерій $t_{\text{емп}}$			2.1431
19	Рівень значущості			0.0370
<div>C4=C2-C3 C7=C5-C6 D3=C3/C2 D6=C6/C5 C8=ABS(C3-C6) C10=C8/C9 C9=(C3*(C2-C3)/C2+C6*(C5-C6)/C5)^0.5 C12=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(C11;C2+C5-2) C13=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(C10;C2+C5-2) D14=(D3*C2+D6*C5)/(C2+C5) D15=1-D14 D16=ABS(D3-D6) D18=D16/D17 D17=((D14*D15)*(1/C2+1/C5))^0.5 D19=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(D18;C2+C5-2)</div>				

Таблиця 8.6. Зміна забарвлення помідорів						
	A	B	C	D	E	F
1	Забарвлення плодів F2	Кількість рослин F3 за забарвленням, шт.				Коефіцієнт варіювання, %
2		жовте	жовто-червоне	червоне	малинове	
3	Червоно-жовте	6	14	6	2	
4	Жовто-червоне	10	13			
5		Частка рослин F3 за забарвленням				
6	Червоно-жовте	0.214	0.500	0.214	0.071	80.5
7	Жовто-червоне	0.435	0.565			99.1
B6=B3/СУММ(\$B\$3:\$E\$3) C7=C4/СУММ(\$B\$4:\$C\$4) F6=100*CPГЕОМ(B6:E6)*CЧЕТ(B3:E3) F7=100*CPГЕОМ(B7:C7)*CЧЕТ(B4:C4)						

Таблиця 8.7. Фракційний склад насіння двох сортів пшениці

	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н
1	Сорт	Фракція, %					Коефіцієнт варіювання, %	Вирівняність, %
2		дуже велика	велика	середня	мала	дуже мала		
3	Одеська	3	10	40	30	17	71.8	28.2
4	Харківська 4	6	66	24	4		55.9	44.1

G3=CPГЕОМ(B3:F3)*CЧЁТ(B3:F3) H3=100-G3

8.3.4.5. Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при двох градаціях критерієм χ^2

8.3.4.5.1. Розрахунковий метод з використанням MS Excel

Критерій Пірсона χ^2 використовується при вивченні якісних ознак для оцінки відповідності емпіричних даних певної теоретичної передумові, нульовій гіпотезі H_0 і застосовується у випадках, коли треба визначити відповідність між собою двох порівнюваних рядів розподілу — емпіричного і теоретичного або двох емпіричних [34].

Найчастіше критерій χ^2 використовується для оцінки відповідності емпіричних даних певній теоретичній передумові, зокрема, нульовій гіпотезі H_0 , коли треба переконалися у тому, що виявлене відхилення є закономірним, чи лежить у межах можливих випадкових коливань

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f - F)^2}{F}, \quad (8.31)$$

де k – кількість чарунок таблиці розподілу чи спряженості, які містять емпіричні значення частот;

f – фактичні (емпіричні) частоти в чарунці таблиці спряженості;

F – очікувані, теоретично розраховані частоти у тій же чарунці.

Критичне значення χ^2 залежить від розмірів таблиці спряженості, тобто від числа порівнюваних методів лікування (рядків таблиці) і числа можливих результатів (стовпців таблиці). Розмір таблиці виражається числом ступенів свободи ν .

Застосування критерію χ^2 вимагає обережності. У формулу (8.31) повинні підставлятися *лише частоти*, а не фізичні величини, отримані при дослідженнях. При перевірці гіпотези про відповідність емпіричних статистичних розподілів нормальному потрібно мати не менше 50 спостережень, а в кожній теоретично розрахованій групі не менше п'яти спостережень (при

менш строгому підході за мінімум приймають три спостереження). Тому якщо крайні групи в ряді розподілу нечисленні, їх слід об'єднувати [3].

У найбільш типових випадках використання критерію відповідності число ступенів вільності визначається за формулою (8.32)

$$v = (r - 1) \cdot (c - 1), \quad (8.32)$$

де r – кількість градацій (колонок в аналітичній таблиці) при співставленні розподілів;

c – кількість співставлень розподілів (рядків).

При перевірці гіпотеза за допомогою формули (8.31) для критерію χ^2 , де $k=2$ (сума складається з двох доданків), $c=2$ і $l=2$, кожна з двох емпіричних частот відповідає чисельності порівнюваних груп. Таким чином $v=1$ [34].

Приклад зводиться до порівняння чисельності двох часток об'єктів (людей, подій і т.д.) відповідно того, притаманна чи ні їм деяка властивість.

При цьому перевіряється нульова гіпотеза H_0 : співвідношення часток у генеральній сукупності не відрізняється від очікуваного (теоретичного) співвідношення.

Вихідні дані: визначено належність кожного випробуваного до однієї з двох категорій номінативної змінної. Задано очікуване (теоретичне) співвідношення чисельності категорій.

Для перевірки таких гіпотез застосовують критерій χ^2 –Пірсона (8.31). Критерій χ^2 визначається наступним чином:

— підсумовування проводиться по всіх чарунках таблиці. Як видно з формули, чим більше різниця спостережуваного і очікуваного числа, тим більший внесок вносить чарунка в величину χ^2 . При цьому чарунки з малим очікуваним числом вносять більший вклад. Таким чином, критерій задовольняє обом вимогам — по-перше, вимірює відмінності і, по-друге, враховує їх величину щодо очікуваних чисел.

— чисельності кожної з порівнюваних груп (емпіричної частоти) ставиться у відповідність теоретична частота. Сума теоретичних частот дорівнює сумі емпіричних частот, а співвідношення теоретичних частот одно очікуваному (теоретичному) співвідношенню.

Зазвичай, зіставляючи частки, ми сподіваємося виявити відмінності їх пропорції від деякого очікуваного співвідношення. Співвідношення чисельності груп, яке ми отримуємо в результаті дослідження, називається **емпіричним розподілом**. Очікуваному відповідає теоретичний розподіл. У якості теоретичного розподілу найчастіше виступає рівномірний розподіл.

Вивчаючи кількість доз з надлишком і нестачею, ми сподіваємося, що чисельність одних і других буде відрізнятися за чисельністю, тобто розподіл доз на дві категорії буде відрізнятися від рівномірного розподілу.

Слід зазначити, що точне рішення для такого роду завдань дає застосування біноміального критерію. Але оскільки його розрахунок трудоміст-

кий, а таблиці критичних значень громіздкі, ми пропонуємо для розрахунків "вручну" використовувати наближення за допомогою критерію критерій χ^2 -Пірсона (8.31), який ще називають критерієм згоди (емпіричного та теоретичного розподілів). При цьому чисельності кожної з порівнюваних груп (емпіричної частоти) ставиться у відповідність теоретична частота. Сума теоретичних частот дорівнює сумі емпіричних частот, а співвідношення теоретичних частот дорівнює очікуваному (теоретичному) співвідношенням.

Приклад. Із 50 доз виданих дозатором корму для групи тварин, які знаходяться в одному загоні, 28 доз були з надлишком, а 22 з нестачею, див. табл. 8.8. Теоретичні частоти для надлишку і нестачі відповідно становлять 25 і 25 доз. Чи можна стверджувати, що кількість доз з надлишком статистично значуще перевищує їх кількість з нестачею?

Таблиця 8.8. Емпіричні і теоретичні розподіли при двох градаціях для 50 доз.			
	А	В	С
1	Показник	Розподіл доз	
2		емпіричний	теоретичний
3	Надлишок	28	25
4	Нестача	22	25
5	Разом	50	50
6	Ступінь вільності ν	1	
7	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
8	Емпіричний критерій χ^2	0.7200	
9	Табличний критерій χ^2	3.8415	
10	Емпіричний рівень значущості p	0.3961	
B5=СУММ(B3:B4) C3=B5/2 B6=СЧЁТ(B3:B4)-1 B8=((B3-C3)^2+(B4-C4)^2)/C3 B9=ХИ2.ОБР.ПХ(B7;B6) B10=ХИ2.РАСП.ПХ(B8;B6)			

Розрахунки, наведені за формулами (8.31) і (8.32) та статистичними функціями MS Excel ХИ2.ОБР.ПХ і ХИ2.РАСП.ПХ на полі табл. 8.8 показують, що нульову гіпотезу H_0 слід прийняти, тобто відмінності статистично

незначущі, так як $\chi^2_{\text{емп}}=0.2700 < \chi^2_{\text{т}}=3.8415$ — число доз з надлишком статистично достовірно вище числа доз з нестачею.

Результат роботи цього дозатора при видачі доз корму для всієї ферми з поголів'я 500 тварин наведено в табл. 8.9).

Співвідношення емпіричних і теоретичних частот

Таблиця 8.9. Емпіричні і теоретичні розподіли для 500 доз.		
Показник	Розподіл доз	
	емпіричний	теоретичний
Надлишок	280	250
Нестача	220	250
Разом	500	500
Ступінь вільності ν	1	
Прийнятий рівень значущості α	0.01	
Емпіричний критерій χ^2	7.2000	
Табличний критерій χ^2	6.6349	
Емпіричний рівень значущості p	0.0073	

надлишку і нестачі таке ж як і у попередньому випадку, число ступенів свободи не змінюється, а емпіричне значення критерію збільшилося (див. табл. 8.9). Слід також звернути увагу, оскільки $n > 100$, вибираємо для прийняття статистичного рішення $\alpha=0.01$, що призводить до збільшення критичного значення χ^2 .

Згідно з табл. 8.9 маємо $p > \alpha$, таким чином H_0 приймається, тобто, змістовний висновок буде іншим: кількість доз з надлишком статистично значуще перевищує їх кількість з нестачею.

Слід звернути увагу: прийняття H_0 не дозволяє зробити ніякого висновку про співвідношення чисельності порівнюваних груп. Навпаки, відхилення H_0 дозволяє в даному випадку говорити не тільки про розбіжність порівнюваних часток, але і про направлення відмінностей — про те, що одна частка більше іншої [123].

8.3.4.5.2. Порівняння з використанням ППП Statistica

При порівнянні з використанням ППП Statistica дані емпіричних і очікуваних частот, наведені в табл. 8.8 (с. 474) вносять в окремий файл даних і потім проводять розрахунки, як представлено на рис. 8.4 [5].






















Рисунок 8.4. Порядок перевірки гіпотез за критерієм χ^2 опцією

Observed versus expected X? Сравнение наблюдаемых и ожидаемых частот

Порядок дій наведено червоними цифрами на полі рис. 6.1 на с. 312 і рис. 8.4. У меню **Statistics** / **Анализ** (1) задіємо модуль **Nonparametrics** / **Непараметрическая статистика** (2) і далі на панелі **Nonparametric Statistics:** /

 Непараметрическая статистика вибираємо опцію  /  Сравнение наблюдаемых и ожидаемых частот (3) і натискуємо кнопку ОК (4).

На відкритій панелі процедур і установок  /  Наблюдаемые и ожидаемые частоты натискуємо  Variables /  Переменные (5) і на панелі вибору змінних  /  Выберите переменные с наблюдаемыми и ожидаемыми частотами у якості  Наблюдаемые частоты укажуємо Емпіричні частоти (6) і в якості  /  Ожидаемые частоты — Очікувані частоти (7).


Натискуємо ОК (8) і далі на панелі  /  Наблюдаемые и ожидаемые частоты натискуємо кнопку вибору процедур  Summary /  ОК (9) або  Summary: Obs. vs. exp. frequencies /  Наблюдаемые и ожидаемые частоты (9).

Після виконання розрахунків з'явиться вікно результатів (табл. 8.10).

Тут треба звернути увагу на розраховане значення p , що розташоване праворуч у верхній частині вікна. Тут бачимо повне співпадання результату з табл. 8.8 на с. 474.

Отримані результати інтерпретуються таким чином. Якщо $p > 0.05$, то нульова гіпотеза про збіг спостережуваної і очікуваної частот не відхиляється, за умови $p \leq 0.05$ нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про відмінність між спостерігається і очікуваної частотами [5].

Таблица 8.10. Результаты процедуры



Observed vs. Expected Frequencies (Spreadsheet1)				
Chi-Square = .7200000 df = 1 p = .396145				
	observed Емпіричні частоти	expected Теоретичні частоти	O - E	(O-E)**2 / E
Case				
C: 1	28.00000	25.00000	3.00000	0.360000
C: 2	22.00000	25.00000	-3.00000	0.360000
Sum	50.00000	50.00000	0.00000	0.720000

8.3.4.6. Число градаций больше двух

8.3.4.6.1. Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при більше ніж двох градациях

Як і в попередньому випадку, при зіставленні декількох градаций найчастіше перевіряють гіпотезу про те, чи розрізняються по чисельності відповідні частки сукупності. Це відповідає задачі зіставлення емпіричного і рівномірного теоретичного розподілу. Але очікуване (теоретичне) розподіл може бути і будь-яким іншим: послідовність рішення при цьому не змінюється.

Як *приклад* розглянемо кількість бур'янів різного семи видів, виявлених на обліковій ділянці (табл. 8.11).

Чи можна стверджувати, що в сукупності всіх видів бур'янів спостерігаються істотні відмінності у співвідношенні їх кількості на ділянці, тобто чи, відрізняється їх розподіл від рівномірного розподілу?

Зазначимо, що стосовно даної ділянки відповідь очевидна: види бур'янів розподілені явно не рівномірно. Але питання при статистичній перевірці сформулюється інакше: чи можна поширити цей висновок на все поле, тобто, на генеральну сукупність, з якої вилучено дана вибірка?

Оскільки $n > 100$, вибираємо для прийняття статистичного рішення $\alpha = 0.05$. Нульова гіпотеза сформульована таким чином H_0 : емпіричний розподіл відповідає теоретичному рівномірному розподілу, тому завдання полягає у порівнянні емпіричного розподілу з ідентичним за загальною чисельністю, але рівномірним теоретичним (очікуваним) розподілом.

Таблиця 8.11. Емпіричні і теоретичні розподіли при більше ніж двох градаціях.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Показник	Розподіл бур'янів, шт							
2		емпіричний							теоретичний
3	Бур'ян	A	B	B	Г	Д	Е	Ж	
4	Кількість, шт	20	16	13	10	8	6	5	11.14
5	Ступінь вільності v	6	$I4=CP3HACH(B4:H4)$ $B5=CHET(B4:H4)-1$						
6	Прийнятий рівень значущості α	0.05	$B7=((B4-I4)^2+(C4-I4)^2+(D4-I4)^2+(E4-I4)^2+(F4-I4)^2+(G4-I4)^2+(H4-I4)^2)/I4$						
7	Емпіричний критерій χ^2	16.2308							
8	Табличний критерій χ^2	12.5916	$B8=XI2.OBP.PX(B6;B5)$						
9	Емпіричний рівень значущості p	0.0126	$B9=XI2.PACP.PX(B7;B5)$						

Розрахунки, виконані за формулою (8.31) та статистичними функціями MS Excel **XI2.OBP.PX** і **XI2.PACP.PX** подані на полі табл. 8.11 показують, що нульову гіпотезу H_0 слід відхилити, тобто відмінності статистично значущі, так як $\chi^2_{\text{емп}} = 16.3208 < \chi^2_{\text{т}} = 12.5916$.

Зазначимо, що H_0 , ми приймаємо альтернативну гіпотезу про те, що розподіл кількості бур'янів за видами є нерівномірним. Але альтернативна гіпотеза не містить і не може містити твердження про те, що в якійсь конкретній чарунці значення більше, а в який — менше. Будь-яка конкретизація цього твердження буде некоректною. Для обґрунтованих стверджень про це необхідна додаткова статистична перевірка, як правило, парними порівняннями величин [123].

8.3.4.6.2. Порівняння двох вибірок χ^2 -критерієм

У порівнянні з аналізом класифікації, специфіка застосування критерію χ^2 -Пірсона (формула (8.31) до таблиць спряженості полягає в тому, що теоретичні частоти розраховуються окремо для кожного елементу таблиці. Таким чином, число доданків у формулі (8.33) дорівнює кількості елементів таблиці спряженості $n = c \cdot l$, де c — число рядків, l — число стовпців

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{c-1} \frac{(f - F)^2}{F}, \quad (8.33)$$

Формула для розрахунку теоретичної частоти для чарунки i -го рядка і j -го стовпця має вигляд

$$F_{ij} = \frac{f_i \cdot f_j}{n}, \quad (8.34)$$

де f_i – сума частот у всіх чарунках i -го рядка;
 f_j – сума частот у всіх чарунках j -го стовпця;
 N – сума частот всієї таблиці спряженості, тобто загальна чисельність вибірки.

Для прикладу розглянемо частоту зараження деякими хворобами двох сортів рослин, взятих з дослідної ділянки, представлені у табл. 8.12.

Таблиця 8.12. Результат впливу хвороб на сорти

	A	B	C	D	E	F	G
1	Емпіричні частоти	Розподіл за хворобами, шт					Разом
2		A	Б	В	Г	Д	
3	Сорт I	5	25	10	8	3	51
4	Сорт II	11	12	19	5	7	54
5	Разом	16	37	29	13	10	105
6	Теоретичні частоти	Розподіл за хворобами, шт					Разом
7		A	Б	В	Г	Д	
8	Сорт I	7.77	17.97	14.09	6.31	4.86	51
9	Сорт II	8.23	19.03	14.91	6.69	5.14	54
10	Разом	16	37	29	13	10	105
11	Показник	Значення χ^2					
12		A	Б	В	Г	Д	
13	Сорт I	0.99	2.75	1.19	0.45	0.71	
14	Сорт II	0.93	2.60	1.12	0.43	0.67	
15	Ступінь вільності ν	4					
16	Прийнятий рівень значущості α	0.05					
17	Емпіричний критерій χ^2	11.8269					
18	Табличний критерій χ^2	9.4877					
19	Емпіричний рівень значущості p	0.0187					

G3=СУММ(B3:F3) ... G5=СУММ(G3:G4)
B5=СУММ(B3:B4) ... F5=СУММ(F3:F4)
B8=\$G3*\$B\$5/\$G\$5 ... F9=\$G4*\$F\$5/\$G\$5
G8=СУММ(B8:F8) ... G10=СУММ(G8:G9)
B10=СУММ(B8:B9) ... F10=СУММ(F8:F9)
B13=((B3-B8)^2)/B8 ... F14=((F4-F9)^2)/F9
B15=(СЧЁТ(B3:B4)-1)*(СЧЁТ(B3:F3)-1)
B17=СУММ(B13:F14)
B18=ХИ2.ОБР.ПХ(B16;B15)
B19=ХИ2.РАСП.ПХ(B17;B15)

Перевіряється змістовна гіпотеза про залежність зараження хворобами від сорту рослини.

Нульова гіпотеза H_0 : класифікації об'єктів за двома підставами є незалежними (розподіл хвороб по сортам не залежить від їх розподілу за перевагами хвороб) перевіряється на рівні $\alpha = 0.05$.

При розрахунках під вихідної таблицею (чарунки **A1:G5**) будується таблиця спряженості (чарунки **A6:G10**) для теоретичних (очікуваних) частот — з тими ж полями, що і для таблиці емпіричних (спостережуваних) частот, розрахованих за формулою (8.34).

Далі під таблицею спряженості (чарунки **A6:G10**) будується таблиця критеріїв χ^2 –Пірсона (чарунки **A11:F14**), розрахованих за кожної чарунки за доданками виразу (8.31).

Далі як і у табл. 8.8 (с. 474) розраховується оцінка порівняння сортів за виразами, наведеними на полі табл. 8.12, причому слід звернути увагу, що число ступенів вільності свободи розраховується за формулою (8.32).

З табл. 8.12 бачимо, що $p < \alpha$, таким чином H_0 можна відхилити.

Звернемо увагу, що при відхиленні H_0 приймається альтернативна гіпотеза про зв'язок двох факторів класифікації, яка проявляється принаймні для однієї чарунки таблиці спряженості. Але залишається невідомим те, відносно яких саме елементів таблиці спряженості зв'язок проявляється, а відносно яких не проявляється. Іншими словами, виникає проблема множинних порівнянь. І для подальшої конкретизації результатів необхідний аналіз співвідношення 2–х часток або таблиць спряженості 2×2 , див. підрозділ **8.3.5 Таблиці спряженості 2×2 : критерій χ^2 –Пірсона. Коефіцієнт асоціації (зв'язності).**

Дослідження зв'язку сорту і хвороб може бути продовжено. Так, може бути додатково перевірена гіпотеза про те, що хвороба **Б** вражає частіше *Сорт I*, ніж *Сорт II*. Тоді необхідно порівнювати емпіричне розподіл вражень цією хворобою *Сорту I* і *Сорту II* (25:12) з рівномірним розподілом (13.5:13.5) — за допомогою **8.3.4.5 Порівняння емпіричного і теоретичного розподілів при двох градаціях.**

Може бути також перевірена гіпотеза про те, що хвороба **Б** частіше вражає *Сорт I*, а хвороба **В** — *Сорт II*. Тоді необхідно зіставити дві емпіричних розподіли 25:12 і 10:19 — за допомогою аналізу таблиць спряженості 2×2 , як викладено в підрозділі **8.3.5 Таблиці спряженості 2×2 : критерій χ^2 –Пірсона. Коефіцієнт асоціації (зв'язності)** [123].

8.3.4.6.3. Порівняння розподілу вибірки із заданим

Особливо широко критерій відповідності χ^2 використовується в генетичному аналізі, коли необхідно переконатися в тому, чи є виявлене відхилення від теоретично очікуваного розщеплення (1:1:3:1; 9:3:4; 9:3:3:1 і т.д.) відхиленням закономірним або воно лежить в межах можливих випадкових коливань [34].

Оцінка успадкування ознак гібридами відповідає певній моделі розподілу (9:3:3:1), поданого в табл. 8.13. Слід визначити відповідність розподілу, отриманого експериментально у нащадків F_2 , наведеного також у цій таблиці.

Тут приведено теоретичні розподіли, розраховані у відповідності з сумою величин експериментального розподілу з даними розподілу моделі.

Нульова гіпотеза полягає у статистичній рівності емпіричного розподілу заданій моделі теоретичному.

Виконаємо їх порівняння за критерієм χ^2 , який не вимагає ніяких припущень щодо параметрів сукупності, з якої взяті вибірки. Для цього за виразом (8.31) визначається критерій χ^2 . Критичне значення χ_{α}^2 і його рівень значущості p знаходиться з використанням статистичних функцій ПА MS Excel **ХИ2.ОБР.ПХ** та **ХИ2.РАСП.ПХ**.

За даними табл. 8.13 бачимо, що $\chi^2 < \chi_{\alpha}^2$ та $p > \alpha$, таким чином нульова гіпотеза про статичну відповідність емпіричної і теоретичної частоти прояву. Таким чином нульова гіпотеза приймається з прийнятим рівнем значущості.

Таблиця 8.13. Спадкування показників у фенотипі

	А	В	С	Д	Е
1	Найменування показника	Звичайний нормальний	Звичайний високий	Пізній нормальний	Пізній високий
2	Фактичне розщеплення	41	9	9	1
3	Модель розщеплення	9	3	3	1
4	Теоретичне розщеплення	33.750	11.250	11.250	3.750
5					
6		Емпіричний коефіцієнт χ^2 -Пірсона	Прийнятий рівень значущості α	Табличний коефіцієнт χ_{α}^2 -Пірсона	Емпіричний рівень значущості p
7		4.474	0.05	7.8147	0.21461

$B4=B3*СУММ(\$B\$2:\$E\$2)/СУММ(\$B\$3:\$E\$3)$

$E4=E3*СУММ(\$B\$2:\$E\$2)/СУММ(\$B\$3:\$E\$3)$

$B7=(B2-B4)^2/B4+(C2-C4)^2/C4+(D2-D4)^2/D4+(E2-E4)^2/E4$

$D7=ХИ2.ОБР.ПХ(C7;СЧЁТ(В2:Е2)-1)$ $E7=ХИ2.РАСП.ПХ(B7;СЧЁТ(В2:Е2)-1)$

8.3.5. Таблиці спряженості 2×2: критерій χ^2 -Пірсона. Коефіцієнт асоціації (зв'язності)

8.3.5.1. Розрахунковий метод для таблиць спряженості

Багато досліджень вивчають якісні величини (забарвлення, стать, наявність або відсутність певного стану, і т.п.). Для таких ознак також можна визначити ступінь “пов’язаності”. Один з показників, який дозволяє це зробити — *коефіцієнт асоціації* ϕ , який змінюється від 0 до 1. Чим ближче ϕ до 1, тим сильніше зв’язок.

Розглянемо приклад. Студенти двох груп по 49 і 52 чоловіка здавали заліки. На підготовку до них у першій групі було обмаль, а у другій достатньо часу. Студенти з другої групи служили контролем.

Після здачі заліків виявилось, що заліки не склали 14 і склали 87 студентів. З тих, хто їх не склав 9 студентів були з першої і 5 з другої групи.

Дані описаного експерименту зручно представити у вигляді так званої таблиці спряженості розміром 2×2 (чотирипільна таблиця, або таблиця з двома входами), яка представлена вихідними даними табл. 8.14.

У ній для кожної з груп указуємо число студентів, які склали і не склали заліки. Є дві ознаки: тривалість підготовки (недостатня – достатня і залік (склав – не склав); в таблиці вказані всі їх можливі поєднання, тому вона називається таблицею спряженості. У даному випадку розмір таблиці 2×2 .

Також у таблиці наведено загальну кількість студентів, їхню кількість по групах. Наведено також кількість студентів які склали і не склали заліки, та ці показники від загального числа студентів.

Далі розраховуються очікувані числа таблиці за виразами, наведеними на полі табл. 8.14.

Порівнюючи вихідні і розрахункові дані, бачимо, що числа у чарунках відрізняються. Виконаємо їх порівняння за критерієм χ^2 , який не вимагає ніяких припущень щодо параметрів сукупності, з якої взяті вибірки, однак зауважимо, що його застосування правомірне, якщо очікуване число в будь-який з чарунок більше або дорівнює п'яти, інакше слід використовувати точний критерій Фішера.

Критерій χ^2 визначається за виразом (8.31).

Для таблиць розміром 2×2 маємо $\nu = (2 - 1) \cdot (2 - 1) = 1$. Критичне значення χ^2 і його рівень значущості p знаходиться з використанням статистичних функцій Excel **ХИ2.ОБР.ПХ** та **ХИ2.РАСП.ПХ**.

Наведена формула (8.31) для χ^2 у разі таблиці 2×2 (тобто при $\nu = 1$) дає дещо завищені значення. Це викликано тим, що теоретичний розподіл χ^2 безперервний, тоді як набір обчислених значень χ^2 дискретний. На практиці це призведе до того, що нульова гіпотеза буде відхилятися занадто часто. Щоб компенсувати цей ефект, у формулу вводять поправку Йетса. Вона застосовується тільки при $\nu = 1$, тобто для таблиць 2×2 [123]

Таблиця 8.14. Результати складання заліків і їх оцінювання

	A	B	C	D
1	Вихідні дані			
2	Тривалість підготовки	Не склали	Склали	Разом
3	Обмаль часу	9	40	49
4	Достатньо часу	5	47	52
5	Разом	14	87	101
6	Частка від загального	0.1386	0.8614	
7	Розрахункові дані			
8	Тривалість підготовки	Не склали	Склали	Разом
9	Обмаль часу	6.792	42.208	49
10	Достатньо часу	7.208	44.792	52
11	Разом	14	87	101
12	Емпіричне χ^2	1.618	B6=B5/\$D\$5 C6=C5/\$D\$5 B9=D3*B6 C10=C6*D4	
13	Емпіричне χ^2 (Йетса)	0.968		
14	Прийнят.рівень значущості α	0.05		
15	Критичне χ^2	3.8415		
16	Емпір. рівень значущості p	0.2033	D3=СУММ(B3:C3) B5=СУММ(B3:B4)	
17	Рівень значущості p (Йетса)	0.3251		
B12=(B3-B9)^2/B9+(C3-C9)^2/C9+(B4-B10)^2/B10+ + (C4-C10)^2/C10				
B13=(ABS(B3-B9)-0.5)^2/B9+(ABS(C3-C9)-0.5)^2/C9+ + (ABS(B4-B10)-0.5)^2/B10+ + (ABS(C4-C10)-0.5)^2/C10				
B15=ХИ2.ОБР.ПХ(B14;1) B16=ХИ2.РАСП.ПХ(B12;1)				
B17=ХИ2.РАСП.ПХ(B13;1)				

$$\chi^2 = \sum \frac{(|f - F| - 0.5)^2}{F}. \quad (8.35)$$

За а даними, отриманими в табл. 8.14 бачимо що вплив виділеного часу на підготовку студентів до заліку на результати складання заліків статистично не значущий як з поправкою Йетса так і без неї.

8.3.5.2. Визначення коефіцієнту асоціації (зв'язності) за допомогою ППП Statistica

Розглянемо приклад, наведений у підрозділі 8.3.5.1 Розрахунковий метод для таблиць спряженості.

Для розрахунку коефіцієнта асоціації за табл. 8.14 даними необхідно запустити з меню **Statistics/Анализ** запускаяемо модуль **Nonparametrics / Непараметрическая статистика** (2) (рис. 9.11 на с. 526), далі на рис. 8.5 натискаємо **2 x 2 Tables (X²/V²/Phi², McNemar, Fisher exact)** (1) та на виниклій панелі **2 x 2 Tables:** (2) ввести дані про чисельність студентів кожній з експериментальних груп (відповідно до табл. 8.14) (2) натиснути **Summary: 2X2 Table/** чи **Summary/** (9).






Рис. 8.5. Розрахунок коефіцієнта асоціації (зв'язності)

У результаті цього з'явиться таблиця з великим набором статистичних показників (табл. 8.15). Нам необхідно рядок **Phi-square/Фи коэффициент**, в якому знаходиться значення коефіцієнта асоціації, піднесена до квадрату для надання йому додатного значення. У нашому випадку Φ -квадрат дорівнює 0.01602. Після вилучення кореня отримуємо $\Phi=0.1265701$. Таким чином, отримане значення Φ вказує на досить слабкий зв'язок між тривалістю підготовки і успішністю здачі заліку.

Таблиця 8.15. Результати аналізу таблиці спряженості

	Таблиця 2x2 (Таблиця даних1)		
	Столб. 1	Столб. 2	Сумма строкам
Частоты, строка 1	9	40	49
Процент от общего	8.911%	39.604%	48.515%
Частоты, строка 2	5	47	52
Процент от общего	4.950%	46.535%	51.485%
Сумма по столбцам	14	87	101
Процент от общего	13.861%	86.139%	
Хи-квадрат (ст.св.=1)	1.62	p= .2033	
V-квадрат (ст.св.=1)	1.60	p= .2056	
Поправка Йетса	.97	p= .3251	
Фи коэффициент	.01602		
Фишера p, односторонний		p= .1627	
двусторонний		p= .2551	
Макнемара Хи-квадрат (A/D)	24.45	p= .0000	
Хи-квадрат (B/C)	25.69	p= .0000	

Зауважте, що модуль  / 

можна використовувати також для порівняння частот бінарних якісних ознак у двох групах. Так, в табл. 8.15 крім коефіцієнта асоціації наведені значення: **критерію χ^2** без поправки Йетса, а також і з нею; **точного критерію Фішера**; **критерію Мак-Немара** для залежних груп. Аналізуючи, наприклад, результат тесту χ^2 , можна припустити, що незважаючи на встановлений нами слабкий ефект між тривалістю

підготовки і успішністю здачі заліку в контрольній та експериментальній групах все ж статистично значимо розрізняється ($p=0.2033$; див. рядок Chi-square(df=1)/Хи-квадрат (ст.св.=1) на табл. 8.15) [120].

Порівнюючи значення χ^2 і значення χ^2 , отримані з поправкою Йетса в табл. 8.15 і 8.14, бачимо повну їх взаємну рівність.

Перелічимо використовувані в розрахунках статистичні методи.

χ^2 – класичний критерій χ^2 за Пірсоном;

V^2 – скоригований критерій χ^2 ;

Поправка Йетса – з поправкою Йетса на безперервність — використовується, якщо абсолютні частоти в чарунках таблиці частот менше 10;

Фі-коефіцієнт – міра асоціації бінарних ознак;

Фішера p – точний критерій Фішера, найбільш точний метод з перелічених. Пропонуються два варіанти методу: **односторонній** – односторонній тест і **двосторонній** – двосторонній тест, переважний в більшості завдань.

Мак-Немара χ^2 – використовується для пов'язаних груп, наприклад, при описі результатів досліджень до і після деякого впливу [5].

Таблиця 8.16. Результати аналізу таблиці спряженості

	Таблиця 2x2 (Диспаналіз)		
	Столб. 1	Столб. 2	Сумма строкам
Частоты, строка 1	6	21	27
Процент от общего	11,765%	41,176%	52,941%
Частоты, строка 2	2	22	24
Процент от общего	3,922%	43,137%	47,059%
Сумма по столбцам	8	43	51
Процент от общего	15,686%	84,314%	
Хи-квадрат (ст.св.=1)	1,85	p= ,1734	
V-квадрат (ст.св.=1)	1,82	p= ,1777	
Поправка Йетса	,95	p= ,3293	
Фи коэффициент	,03634		
Фишера p, односторонний		p= ,1653	
двусторонний		p= ,2553	
Макнемара Хи-квадрат (A/D)	8,04	p= ,0046	
Хи-квадрат (B/C)	14,09	p= ,0002	

В табл. 8.16 наведені розрахунки подібної оцінки сумлінності інших груп студентів при значенні в чарунці менше ніж 5, тобто 2, тому слід використовувати точний критерій Фішера [120].

За даними табл. 8.16 рівня значущості як для одно-, так і для двостороннього критерію Фішера перевищують прийнятий пороговий рівень $\alpha=0.05$. Таким чином бачимо, що для цих груп вплив виділеного часу на підготовку студентів до заліку на результати складання заліків статистично не значущий.

8.4. АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ: КРИТЕРІЙ СЕРІЙ

Цей метод застосовується для аналізу послідовності об'єктів (явищ, подій), упорядкованих у часі або в порядку зростання (спадання) значень вимірюваної ознаки. Він вимагає подання послідовності у вигляді бінарної змінної — як чергування подій 0 і 1. Вихідні дані, вимагають перетворення: упорядкування (за часом або за рівнем) і приведення до бінарного виду [123].

Серія — це послідовність однотипних подій, безпосередньо перед і після якої відбулися події іншого типу. Нульова гіпотеза H_0 про випадковий розподіл подій 1 серед подій 0 відхиляється, якщо кількість серій W або занадто мала, або занадто велика, тобто, гіпотеза H_0 відхиляється, якщо емпіричне число серій W менше або дорівнює $W_{0,025}$ або більше чи дорівнює $W_{0,925}$.

Критерій серій застосовується для рішення двох класів завдань. Крім дослідження часової послідовності подій X і Y , або динаміки зміни кількісної ознаки, метод може застосовуватися і для перевірки гіпотез про відмінність між двома вибірками за рівнем і мінливості ознаки, вимірюваної в кількісній шкалою. У зв'язку з цим застосування методу вимагає вирішення проблеми перетворення вихідних даних.

Проблема перетворення вихідних даних. Як було відзначено, для застосування методу дані необхідно представити у вигляді однієї бінарної змінної. Залежно від завдання дослідження і виду вихідних даних це може бути зроблено різними способами.

Якщо вивчається динаміка мінливості кількісної ознаки, то після упорядкування значень ознаки відповідно до тимчасової послідовності вибирається один із способів переходу до бінарної шкалою. Для метричних даних точкою поділу виступає середнє, а для рангових даних — медіана. Значенням нижче точки поділу присвоюється 0, а значенням вище неї — 1. Після такого перетворення можливе застосування до змінної критерію серій.

Проблема спрямованості гіпотези H_0 повинна вирішуватися ще до проведення дослідження. Якщо дослідника цікавить будь-яке відхилення від H_0 — як в сторону занадто малого, так і занадто великого числа серій W , то

необхідна перевірка ненаправленої гіпотези. Якщо ж його цікавлять тільки малі значення W або тільки занадто великі значення W , то слід перевіряти спрямовану гіпотезу. Важливість попереднього визначення спрямованості гіпотези обумовлена у тому, що *при одному і тому ж числі серій W p -рівень для спрямованої гіпотези буде в два рази менше, ніж для неспрямованої*. Будь-які сумніви в спрямованості гіпотези, як завжди, необхідно вирішувати на користь вибору неспрямованої альтернативи.

Якщо чисельність $m(n) < 20$ (де n – прояви одиниці і m – прояви нуля), то для перевірки H_0 застосовуються таблиці критичних значень для числа серій (Додаток Ж) [123].

Розглянемо приклад. При оцінці роботи дозатора стеблових кормів при дозуванні силосу і сінажу згідно [63] було взято по 30 проб, відхилення яких від середніх за бінарною шкалою подано в табл. 8.17.

З її даних бачимо, що для обох кормів емпірична кількість серій W знаходиться у межах від $W_{0.025}$ до $W_{0.975}$, таким чином нульова гіпотеза H_0 про випадковий розподіл подій, тобто випадковість величини проб, не відхиляється.

Таблиця 8.17. Оцінка роботи дозатора стеблових кормів

Вид корму	Номер проби																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Силос	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0
Сінаж	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1

Вид корму	Калькість одиниць n	Калькість нулів m	$W_{0.025}$	Кількість подій W	$W_{0.975}$
Силос	14	16	10	12	20
Сінаж	15	15	10	18	21

Альтернативним способом визначення p -рівня є застосування Z -критерію серій, який ґрунтується на тому, що число серій W при виконанні H_0 розподілено приблизно нормально з відомими середнім $\bar{x}_{W_{\text{емп}}}$ і СКВ $s_{W_{\text{емп}}}$. Формула для визначення емпіричного значення Z -критерію серій:

$$Z = \frac{W - 0.5 - \bar{x}_W}{s_W}. \quad (8.36)$$

Тут середнє арифметичне \bar{x}_W і СКО $s_{W_{\text{емп}}}$ визначаються відповідно за виразами (8.37) і (8.38).

$$\bar{x}_W = 1 + 2nm / (n + m); \quad (8.37)$$

$$s_W = \sqrt{\frac{2nm(2nm - n - m)}{(n + m)^2(n + m + 1)}}. \quad (8.38)$$

Обмеження на застосування Z -критерію серій: $n > 20$, $m > 20$; причому m і n несуттєво відрізняються. Якщо вони розрізняються суттєво, то слід скористатися комбінаторним методом (наприклад, Монте Карло).

Перевага критерію серій порівняно з іншими методами порівняння вибірок, проявляється в тому, що він дозволяє виявити не тільки рівневі відмінності (в цьому його чутливість не надто висока), але і співвідношення розподілів. Наприклад, одне розподіл може бути більш компактным, ніж інше [123].

9. КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА ЇХ АНАЛІЗ

9.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Кореляційний зв'язок виникає коли взаємозалежність між величинами не має чіткого функціонального характеру — зміна однієї ознаки обов'язково викликає тенденцію зміни другої ознаки, але ця зміна відбувається не в чітко визначених розмірах у кожній окремій складовій вибірці. Тобто він не є жорсткою залежністю однієї ознаки від іншої, але може бути у межах від повністю відсутньої ознаки до функціональної залежності [12].

Суть кореляції не обмежується простим її визначенням. Її методи кореляції вирішують такі завдання:

- визначення середню зміну залежної величини відносно впливу одного або комплексу факторів;
- встановлення ступінь залежності між результативною ознакою й одним із факторів за середнього значення інших;
- встановлення міри змін відносної величини та залежної змінної на одиницю відносної зміни фактору або факторів;
- визначення рівня тісноти зв'язку результативної ознаки з усім комплексом включених до аналізу факторів або з окремим фактором за винятком впливу інших факторів;
- статистичний аналіз загального об'єму варіації залежної змінної і визначення ролі кожного фактору в цьому варіюванні;
- статистична оцінка вибірових показників кореляційного зв'язку, отриманих за вибіровими даними [52].

Для нормально розподілених випадкових величин відсутність кореляції означає відсутність всякої залежності.

Перевірка одержаних даних досліджуваних показників на взаємну кореляційну залежність дозволяє мати числову оцінку ступеня взаємного зв'язку між явищами у випадку, коли функціональний зв'язок між ними неясний, проте він існує й ще нерозкритий [12].

Завдання кореляційного аналізу (КА) полягає у вивченні взаємозв'язку: наявності і сили зв'язаності кількісних ознак; кількісних та якісних порядкових ознак; якісних порядкових ознак. У статистиці прийнято називати два перші взаємозв'язки *кореляціями*, останній — *асоціацією* [5].

Кореляцію називають *простою*, якщо досліджується зв'язок між двома ознаками, або *множинною*, коли на величину однієї результативної ознаки впливають декілька факторіальних.

При КА слід перевіряти умови придатності застосування даного виду кореляції.

Залежно від характеру змін результативної ознаки під впливом факторіального розрізняють:

- *лінійну кореляцію*, коли зі збільшенням середнього значення однієї ознаки пропорційно збільшується або зменшується середнє значення іншої;

— **криволінійну кореляцію**: при зростанні значень однієї ознаки інша приймає значення, яке зростає до певної величини, а потім убыває.

Ступінь зв'язаності між значеннями ознак виражають відносним числом, яке при лінійній кореляції називають **коефіцієнтом кореляції** (позначається r), при криволінійній кореляції — **кореляційним відношенням** (позначається η_{yx}), причому завжди $r < \eta_{yx}$ [128].

Варто зауважити, що наявність кореляції будь-якої сили не може інтерпретуватися як доказ причино–наслідкового зв'язку цих ознак. Величина значення коефіцієнта кореляції встановлює тільки міру зв'язку. Сам же по собі зв'язок може бути наслідком: причинної залежності однієї ознаки від іншої, тобто, одна ознака впливає на іншу; обидві ознаки знаходяться під впливом інших невідомих факторів; бути й результатом простого збігу значень ознак. Причинність або випадковість зв'язку визначає сам дослідник, переходячи від кореляційного до дисперсійного чи регресійного аналізу [5, 6].

9.2. ЛІНІЙНА КОРЕЛЯЦІЯ (КОРЕЛЯЦІЯ ПІРСОНА)

9.2.1. Лінійна кореляційна залежність

В якості числового показника лінійної кореляції, яка вказує на тісноту й напрямок зв'язку X з Y , вимірних для однієї і тієї ж вибірки і представлених у метричній шкалі (див. с. 351), служить коефіцієнт парної кореляції r . Він є безрозмірною величиною, що змінюється в межах $-1 \leq r \leq +1$ [7].

Під лінійною кореляційною між двома ознаками X і Y розуміють залежність лінійного характеру. Математична суть коефіцієнта кореляції полягає в тому: на скільки стандартів σ_y у середньому зміниться функціональна величина Y , якщо факторіальна величина X змінюється на один стандарт σ_x [7]. Тобто кореляція є нормованою коваріацією.

Про наявність чи відсутність кореляції між двома випадковими величинами якісно можна судити по виду поля кореляції, помістивши експериментальні точки на координатну площину. Позитивна кореляція між випадковими величинами представлена на рис. 9.1, а), а на рис. 9.1, б) – зворотна кореляція. Порівняно слабка кореляція представлена на рис. 9.1, в), на рис. 9.1, в) наведено приклад відсутності кореляції [129].

Простежимо логіку отримання рівняння кореляції. Положення будь-якого з членів кожної вибірки щодо інших точок може бути задано величинами і знаками відхилень відповідних значень змінних x_i і y_i від своїх середніх величин \bar{x} і \bar{y} , тобто виразами $(x_i - \bar{x})$ і $(y_i - \bar{y})$. Якщо знаки цих відхилень співпадають, то це свідчить на користь прямого взаємозв'язку так як великим значенням x відповідає більше значення y або меншим значенням x відповідає менше значення y . Таким чином додатний добуток відхилень

$(x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})$ свідчать про прямий взаємозв'язок, від'ємний — про зворотній. Відповідно, якщо x і y в основному пов'язані прямо пропорційно, то більшість добутоків відхилень буде додатними, а якщо вони пов'язані зворотним співвідношенням, то їх більшість буде від'ємними.




Рисунок 9.1. Лінійна кореляційна залежність

Якщо систематичного зв'язку між змінними не буде спостерігатися, то додатні доданки (добутки відхилень) урівноважуються від'ємними доданками, і сума всіх добутоків відхилень буде близька до нуля.

Отже, загальним показником для сили і напрямку взаємозв'язку може служити сума всіх добутоків відхилень для даної вибірки, але щоб сума добутоків не залежала від обсягу вибірки, достатньо її усереднити, розділивши на показник ступеня вільності $\nu = n - 1$, де n — кількість пар вибірки.

Отримана на основі цього міра зв'язку, яка широко застосовувана в фізиці і технічних науках, називається **кореляційним моментом, моментом зв'язку** чи **коваріацією (Covariance)** і має квадратичну розмірність виміру аналізованої ознаки [84]

$$\text{cov}_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}. \quad (9.1)$$

Але у більшості випадків дослідників цікавить не абсолютне значення ознаки, а взаємне розташування досліджуваних показників у групі. До того ж **коваріація** досить чутлива до масштабу шкали (дисперсії), в якій виміряні ознаки. Щоб зробити міру зв'язку незалежними від одиниць вимірювання x і y , коваріацію слід розділити на відповідні стандартні (середньостатистичні) відхилення досліджуваних показників s_x і s_y . Таким чином була отримана формула коефіцієнта кореляції Карла Пірсона, яка після ділення виразу (9.1) на s_x і s_y та підстановки їхніх значень (див. (1.56)) набуває вигляду [123]

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \times \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}. \quad (9.2)$$

Також коефіцієнт лінійної кореляції розраховується за формулою [34]

$$r = \frac{n \sum_{i=1}^n (X \cdot Y) - \sum_{i=1}^n X \cdot \sum_{i=1}^n Y}{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n X^2 - \left(\sum_{i=1}^n X \right)^2 \right] \cdot \left[\sum_{i=1}^n Y^2 - \left(\sum_{i=1}^n Y \right)^2 \right]}}. \quad (9.3)$$

Для малих вибірок коефіцієнт кореляції слід скорегувати [60]

$$r' = r \left[1 + \frac{1 - r^2}{2 \cdot (n - 3)} \right]. \quad (9.4)$$

Таким чином, величина кореляції є однаковою для будь яких систем виміру, а також їхнього поєднання, а сам коефіцієнт кореляції визначає однакову міру зв'язку між першою й другою ознакою, тобто міра зв'язку між X

і Y така сама, як і між Y і X , тобто $r_{xy} = r_{yx}$. Крім того, будь-які лінійні перетворення ознак (множення на константу, чи її додавання) не змінюють значення коефіцієнта кореляції. Винятком є множення однієї з ознак на від'ємну константу, тоді коефіцієнт кореляції змінює свій знак на протилежний.

При лінійній кореляції за умови $r = \pm 1$ наявна повна пряма кореляція, при $r = -1$ — повна зворотна. У цих випадках кореляційна залежність дорівнює функціональній — фізична зміна Y строго пропорційна фізичній зміні X , причому знак коефіцієнта кореляції відповідає знаку коефіцієнта лінійного рівняння. Чим менше відрізняється абсолютна величина r від одиниці, тим ближче до лінії регресії розташовуються експериментальні точки, тобто більше лінійний зв'язок між параметрами. При $r = 0$ він повністю відсутній [12, 84].

Тобто, незалежні випадкові величини завжди некорельовані. Однак із некорельованості величин у загальному випадку не витікає умова їхньої незалежності. Лише у випадку нормального розподілу рівність нулю коефіцієнта кореляції свідчить про відсутність зв'язку між випадковими величинами [84].

Особливе значення для оцінки точності передбачення має дисперсія оцінок залежної змінної. По суті, дисперсія оцінок залежної змінної Y — це та частина її повної дисперсії, яка обумовлена впливом незалежної змінної X . Інакше кажучи, відношення дисперсії оцінок залежної змінної до її істинної дисперсії дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції, який називається **коефіцієнтом детермінації**, тобто $D = r^2$. Він визначає частку варіабельності однієї ознаки, що залежить від варіабельності другої і показує частку тих змін Y , які залежать від X , а саме, наскільки результативна ознака залежить від аналізованої. На відміну від коефіцієнта кореляції, він відображає зв'язок між ознаками лінійно, зростаючи із збільшенням сили зв'язку і є адитивним, тобто допускає усереднення для декількох вибірок. [34]

Коефіцієнт детермінації дає можливість оцінити величину кореляційної залежності, прийнявши її середньою при $D = 0.5$, тобто $r \approx 0.7$ [128].

На цій основі прийнято три градації величин кореляції по силі зв'язку:
 $r < 0.3$ — слабкий зв'язок (менш 10 % від загальної частки дисперсії);
 $0.3 < r < 0.7$ — помірний (від 10 до 50 % від загальної частки дисперсії);
 $r > 0.7$ — сильний (50 % і більш від загальної частки дисперсії) [9].

Також прийнято вважати, що за умови $0.75 < |r| < 0.95$ існує сильна кореляція, а при $0.95 < |r| \leq 1$ — функціональна залежність [60].

Проте, градації інтервалу кореляційної залежності від $r = 0$ і до середньої та від середньої і до $r = 1$ оцінюються дослідниками неоднозначно (табл. 9.1). Загальновизнаною мірою є шкала Чеддока [33].

Поняття “сильна/слабка кореляція” у загальному випадку некоректне й може використовуватися лише для порівняння результатів у межах однієї задачі [36]. Крім того, **від'ємну кореляцію доцільно перевірити за допомогою парціальних коефіцієнтів кореляції**.

Для визначення коефіцієнта кореляції параметричним методом Пірсона, який не чутливий до криволінійності зв'язку, й виконання перевірки отриманих результатів на значущість, потрібно упевнитися що:

- дані мають відносний або інтервальний характер (див. с. 352);
- вибірка має нормальний закон розподілу (див. підрозділ **6 Перевірка нормальності статистичного розподілу оцінюваних вибірок**);
- залежність між змінними приблизно лінійна (див. підрозділ **9.7.2 Оцінка елементів криволінійного кореляційного зв'язку**);
- наявна гомоскедастичність, тобто статистична однорідність дисперсій, див. підрозділи **7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій** та **7.3.7.11.1 Виконання *t*-тесту Стьюдента порівнянням за змінними**;
- обсяг вибірки повинен бути не менше ніж в 3–5 рази більше кількості факторів.

Таблиця 9.1. Оцінка кореляційної залежності

Оцінка	Межі значення								
Відсутня				0–0.2					
Дуже слабка	0–0.1						<0.2	0–0.1	
Слабка	0.1–0.3	<0.25	<0.333	0.2–0.4	0.2–0.3	<0.3	0.2–0.3	0.1–0.3	<0.3
Помірна	0.3–0.5	0.25–0.75		0.4–0.7				0.3–0.5	
Помітна	0.5–0.7							0.5–0.7	0.3–0.7
Середня			0.333–0.667		0.5–0.7	0.3–0.7	0.3–0.5		
Значна				–				≥0.5	
Тісна	0.7–0.9		>0.667				0.5–0.7		
Висока	0.9–0.99	>0.667		–	0.8–0.9	>0.7	>0.7	0.7–0.9	>0.7
Досить висока	0.99–1.0			0.7–1.0				0.9–1.0	
Джерело	[3, 33] ^{*)}	[5]	[1]	[37]	[50]	[34]	[130]	[33]	[9]
*) За шкалою Чеддока,									

На практиці зв'язок між двома змінними, якщо він є, має ймовірнісний характер і графічно представляє хмару розсіювання еліпсоїдної форми (див. рис. 16.31, с. 1015). Його можна апроксимувати у вигляді прямої лінії, або лінії регресії, побудованої методом найменших квадратів [9].

Це означає, що дисперсія значень функції $y(x)$ рівномірна для всіх значень аргументу x . На графіку це проявляється таким чином — значення y повинні бути приблизно рівномірно розподілені вище й нижче лінії регресії $y(x)$ по всій її довжині, тобто точки на графіку мають утворювати досить симетричну еліпсоїдну форму, без значних викидів, велика вісь якої саме й характеризує лінійну кореляційну залежність (див. рис. 11.65 на с. 751). Істотні ознаки нелінійності або відхилення від гомоскедастичності свідчать про необхідність використовувати іншу міру зв'язку й інший критерій значущості [37].

Лінійний коефіцієнт кореляції пов'язаний із коефіцієнтом регресії (див. рис. 2.22 на с. 120 та с. 119 і 758) залежністю:

$$r_{xy} = b_i \frac{\sigma_{x_i}}{\sigma_y}, \quad (9.5)$$

де b_i – коефіцієнт регресії відповідної факторіальної ознаки;
 σ_{x_i} – стандартний відхил відповідної факторіальної ознаки;
 σ_y – стандартний відхил функції.

Перевірка значущості (достовірності) коефіцієнту кореляції виконується визначенням критичного значення за формулою

$$r_{кр} = \frac{2.58}{\sqrt{n-1}} \cdot \left(1 - \frac{0.69}{n-1}\right). \quad (9.6)$$

За умови $r_{xy} > r_{кр}$ наявність кореляційного зв'язку вважається статистично достовірним.

Для графічного представлення подібного зв'язку можна використовувати прямокутну систему координат з осями, які відповідають обом змінним. Кожна пара значень маркується за допомогою певного символу. Такий графік називається “діаграма розсіювання”, “точкова діаграма”, або “кореляційне поле” (див. рис. 2.22, с. 120).

Таблиця 9.2. Використання коефіцієнта кореляції у залежності від типу змінних

Тип шкали		Міра зв'язку
Змінна x	Змінна y	
Інтервальна чи відношень	Інтервальна чи відношень	Коефіцієнт Пірсона
Рангова, інтервальна чи відношень	Рангова, інтервальна чи відношень	Коефіцієнт Спірмена
Рангова	Рангова	Коефіцієнт Кендалла
Дихотомічна	Дихотомічна	Коефіцієнт ϕ
Дихотомічна	Рангова	Рангово-бісеріальний
Дихотомічна	Інтервальна чи відношень	Бісеріальний

Метод обчислення коефіцієнта кореляції залежить від виду шкали змінних. Так, при вимірювання змінних за кількісними шкалами (див. с. 352) необхідно, використовувати коефіцієнт кореляції Пірсона. Якщо принаймні одна із двох змінних має порядкову шкалу (див. с. 352), або не є нормально розподіленою (див. с. 336), треба використовувати рангову кореляцію ρ –Спірмена або τ –

Таблиця 9.3. Застосування кореляції Пірсона і Спірмена

Кореляція	Змінні	
	залежна	незалежна
Пірсона	метричні	
Спірмена	рангові	
	метрична	рангова
	метричні	

Кендалла. У випадку, коли одна із двох змінних є **дихотомічною**, тобто бінарною із класифікацією лише за двома альтернативними рівнями оцінки, використовується точкова дворядна кореляція, а якщо обидві змінні представлені дихотомічними — чотирипільна кореляція. Розрахунок коефіцієнта ко-

реляції між двома недихотомічними змінними не позбавлений сенсу лише тоді, коли зв'язок між ними лінійний (односпрямований) [37]. Використання коефіцієнта кореляції в залежності від типу змінних подано у табл. 9.2.

Умови застосування кореляції Пірсона і Спірмена при різному представленні змінних наведені в табл. 9.3 [9].

При тісному зв'язку між показниками ($r_{\min}^2 > 0.75$, див. с. 675), проводять регресійний аналіз (див. розділ **11 Регресійний аналіз. Планування і обробка результатів експериментальних досліджень**), обчислюючи коефіцієнт регресії R_{xy} . Результатом регресійного аналізу є побудова математичної моделі залежності між показниками. [1]

9.2.2. Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції

При кореляційному аналізі, окрім розрахунку коефіцієнта кореляції, треба обов'язково перевіряти на значущість, тобто, чи суттєво він відрізняється від нуля, обчислювати і значення його похибки або ймовірності [60].

Інтерпретуючи довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції можна вважати із прийнятою довірчою ймовірністю, що його емпіричне значення знаходиться в розрахованих межах (*інтервальне оцінювання*) [5].

Для визначення середньоквадратичної похибки s_r коефіцієнта кореляції використовуються відповідні вирази (9.7) [34], (9.8) [50], (9.9) [12].

$$s_r = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}; \quad (9.7)$$

$$s_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{n-1}}; \quad (9.8)$$

$$s_r = \frac{1-r^2}{\sqrt{n}}. \quad (9.9)$$

Вираз (9.7) використовується для кількості пар спостережень менше 100 ($n \leq 100$), вираз (9.8) — для нормально розподіленої вибірки [52], а (9.9) застосовується для генеральної вибірки.

У ППП **Statistica** фактичний t -критерій Стюдента незалежно від кількості пар спостережень, розраховується для s_r , визначеного за виразом (9.10) (див. рис. 9.3 на с. 503 і табл. 9.10 на с. 507.)

$$s_r = \sqrt{\frac{1-r^2}{n-1}}. \quad (9.10)$$

Для перевірки нульової гіпотези $H_0:r=0$ (тобто $r=0$ — кореляція відсутня) про відсутність зв'язку між двома змінними, тобто чи значуще відрізняється від нуля коефіцієнт кореляції, використовується t -критерій Стюдента, значення якого обчислюється за формулою:

$$t_r = \frac{r}{s_r}, \quad (9.11)$$

За формулами (9.11) і (9.7) отримуємо виразом вираз (9.12) [50]

$$t_r = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}}. \quad (9.12)$$

Табличний критерій Стюдента при співставленні з фактичним у цьому разі береться для *неспрямованої альтернативи* для обраного рівня значущості α й числа ступенів вільності, яке становить $\nu = n - 2$ [37], тобто з використанням статистичної функції **MS Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

Відповідно знаходження рівня значущості p виконується за функцією **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** при числі ступенів вільності, поданий у чисельнику підкореневого виразу формули (9.10), тобто $\nu = n - 1$.

При досить великих вибірках ($n > 100$) коефіцієнт кореляції можна вважати істотним за умови $r/s_r > 3$ [50, 52].

При обсязі вибірки $n > 50$ визначається показник критерію

$$z = \frac{r_{xy} \sqrt{n}}{\sqrt{1-r_{xy}^2}} \quad (9.13)$$

за умови $H_0:r=0$ розподілений практично по нормальному закону [88].

Критична область двобічна, оцінку нульової гіпотези H_0 див на с. 64. Якщо $z > z_{кр}$, то гіпотеза H_0 відхиляється, а отже, величини X і Y корельовані.

При використанні статистичної функції **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР** використовується значення аргументу $u_{кр}/2$.

Як для коефіцієнта кореляції Пірсона, так і для коефіцієнтів кореляції, розрахованих непараметричними методами, коли обсяг вибірки малий ($n \leq 10$) і значеннях r , близьких до одиниці, розподіл вибірових коефіцієнтів кореляції відрізняється від нормального. Тому для оцінки значущості коефіцієнта

кореляції в генеральній сукупності і порівняння коефіцієнтів кореляції t -критерій Стьюдента стає ненадійним. Щоб обійти це утруднення, р. Фішер запропонував перетворити r в величину z , яка розподілена нормально. Для переходу від r до z використовується табл. И.1, вираз (9.14) чи статистична функція **MS Excel ФИШЕР(x)**, див. Додаток А

$$z = \frac{1}{2} \cdot \ln \frac{1+r}{1-r}. \quad (9.14)$$

Для зворотного перетворення переходу від z до r використовується табл. И.1, вираз (9.15) чи функція **ФИШЕРОБР(y)**, див. Додаток А.

$$r(z) = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1}. \quad (9.15)$$

Зворотним перетворенням також обчислюються нижня й верхня межі довірчого інтервалу коефіцієнта кореляції r

$$\left[\frac{e^{2z_1} - 1}{e^{2z_1} + 1}; \frac{e^{2z_2} - 1}{e^{2z_2} + 1} \right]. \quad (9.16)$$

Стандартна (середньоквадратична) похибка s_z для величини z і різниці $s_{z_1} - s_{z_2}$ відповідно дорівнює [50]

$$s_z = \frac{1}{\sqrt{n-3}}, \quad (9.17) \quad s_{z_1-z_2} = \sqrt{\frac{1}{n_1-3} + \frac{1}{n_2-3}}. \quad (9.18)$$

Емпіричну величину критерію значущості для z і для різниці $z_1 - z_2$ визначають за співвідношенням [34, 123]

$$t_z = \frac{z}{s_z}, \quad (9.19)$$

$$t_{z_1-z_2} = \frac{z_1 - z_2}{\sqrt{\frac{1}{n_1-3} + \frac{1}{n_2-3}}}. \quad (9.20)$$

При *інтервальному оцінюванні* нижня z_{\min} і верхня z_{\max} межі довірчого інтервалу для z при невеликій кількості пар вимірювання обчислюються на основі формул (9.14), (9.17), (9.19) і (9.23) виразом (9.21)

$$z_{\min} = z - t_{\alpha(v)} \cdot s_z \quad \text{і} \quad z_{\max} = z + t_{\alpha(v)} \cdot s_z, \quad (9.21)$$

або якщо число кореляційних пар досить велике — декілька сотень виражається на основі виразу (9.9) за формулою

$$r_{\min} = r - t_{\alpha(v)} \cdot s_r \quad \text{і} \quad r_{\max} = r + t_{\alpha(v)} \cdot s_r, \quad (9.22)$$

де $t_{\alpha(v)}$ — значення t -критерію для числа ступенів вільності $v = n - 3$.

Також при невеликій кількості пар вимірювання нижня r_{\min} і верхня r_{\max} межі довірчого інтервалу для r обчислюються за формулами (9.14), (9.17), (9.19) і (9.23) [131]

$$th\left(\frac{1}{2} \cdot \ln \frac{1+r}{1-r} - \frac{\varepsilon}{\sqrt{n-3}}\right) \leq r \leq th\left(\frac{1}{2} \cdot \ln \frac{1+r}{1-r} + \frac{\varepsilon}{\sqrt{n-3}}\right), \quad (9.23)$$

Функція $th(y)$ представляє собою гіперболічний тангенс, який можна виразити через експонентну функцію подвійного аргументу

$$th(y) = \frac{e^{2y} - 1}{e^{2y} + 1}. \quad (9.24)$$

Число ε знаходиться за функцією Лапласа (3.29)

$$\alpha = 2\Phi(\varepsilon). \quad (9.25)$$

Число ε знаходиться за статистичною функцією **MS Excel НОРМ.СТ.ОБР(1- α /2)** (див. Додаток А). При $\alpha = 0.05/2$ маємо $\varepsilon = 1.95996$ (див. табл. В.4).

Якщо число кореляційних пар досить велике — декілька сотень виражається на основі виразу (9.9) більш простою формулою

$$r - \varepsilon(1-r) / \sqrt{n} \leq r \leq r + \varepsilon(1-r) / \sqrt{n}. \quad (9.26)$$

При *точковому оцінюванні* за критерієм Стюдента для обчислення використовуються формули (9.14), (9.18) і (9.20). При цьому його ступінь вільності визначається як $v = n_1 + n_2 - 3$.

Перевірити нульову гіпотезу можна і без розрахунків критерію безпосередньо за табл. И.2. У ній дані граничні значення коефіцієнтів кореляції на 5 %-му і 1 %-м рівні значущості. Між X і Y є істотна зв'язок, і H_0 відкидається, якщо $r \geq r_T$. Розглядаючи цю таблицю, легко помітити, який вплив надає на розмір вибірки величина коефіцієнта кореляції r . Так, для доказу значущості слабого зв'язку необхідно 40–100, середніх — 12–40 і сильних — 6–12 пар спостережень.

При аналізі зв'язку ознак перевіряється нульова статистична гіпотеза про відсутність лінійного зв'язку ознак $H_0: r = 0$ (тобто $r = 0$ — кореляція відсутня), і обчислюється величини рівні значущості p . Тоді за умови $p > \alpha$ незалежно від значення коефіцієнта кореляції r нульова гіпотеза про те, що його значення дорівнює нулю, не відхиляється і висновок обмежується констатацією того, що статистично достовірний зв'язок не виявлений; при $p \leq \alpha$ нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про те, що виявлений статистично достовірний (значущий) зв'язок між досліджуваними змінними (наявна пряма чи зворотна — у залежності від знаку кореляції). У цьому випадку його значення можна піддати інтерпретації [123].

Якщо наявна сильна статистично значуща кореляція, то про кореляційний зв'язок (*не залежність*) свідчить не величина коефіцієнта кореляції, а тільки його ймовірність [36].

Наявність кореляції між двома ознаками зовсім не означає обов'язкової наявності прямого причино-наслідкового зв'язку між ними. Можливо, що ці зміни обох ознак є наслідок варіації деякого третьої ознаки.

Значення коефіцієнта кореляції записуються як і середнє (див. с. 68), для *вибіркової характеристики* у вигляді $r \pm s_r$, [50], при поданні *результатів* — $r \pm t_{\alpha(n)} \cdot s_r$, з наведенням довірчого рівня значущості α [34].

При поданні результатів слід навести число пар ознак; значення коефіцієнта кореляції r із точністю до **двох** значущих цифр; указати назву застосованого методу КА; представити визначені величин p (текстом або у вигляді кореляційної матриці); привести довірчий інтервал для найбільш важливих коефіцієнтів кореляції з метою інтерпретації зв'язку ознак.

Тому результати слід подавати таким чином: $r = 0.56 \pm 0.11$, $p = 0.028$, описуючи в тексті “Спостерігався прямий кореляційний зв'язок між ознаками. Коефіцієнт кореляції Пірсона становив $r = 0.56 \pm 0.11$ (при довірчій імовірності $p = 0.028$)” [36]

Для найбільш важливих результатів для наочності бажано представити графік розсіювання об'єктів дослідження в координатах, що відповідають двом досліджуваним ознаками, як подано на рис. 2.22, с. 120, бажано з наведенням еліпсу розсіювання точок (див. рис. 16.37, с. 1019). Чим сильніше зв'язок, тим більше витягнуто еліпс уздовж лінії тренду [5].

9.2.3. Довірчі оцінки коефіцієнта кореляції

Для незалежних величин емпіричний коефіцієнт кореляції може виявитися відмінним від нуля внаслідок випадкового розсіювання результатів вимірювання. Тому перш за все слід перевірити його значимість, тобто перевірити можливість відкинути гіпотезу про відсутність кореляції розглянутих вибірок.

Значимість коефіцієнта кореляції перевіряється шляхом порівняння абсолютної величини емпіричного коефіцієнта кореляції r , помноженої на $\sqrt{n-1}$, з його критичними значеннями при заданому рівні значущості α .

Отримане значення (9.27)

$$H = |r| \sqrt{n-1} \quad (9.27)$$

порівнюється з критичним значенням добутку представленим у табл. И.4 для

Таблиця 9.4 – Визначення довірчої оцінки коефіцієнта кореляції			
	A	B	C
1		x	y
2		3	15
3		7	4
4		12	
5			
6		3	8
7		4	10
8		4	8
9		8	0
10		1	25
11		6	4
12		5	9
13		4	8
14	Обсяг вибірки n	12	
15	Коеф. кореляції r	-0.811	
16	t -критерій емпіричний	4.377	
17	Прийнята значущість α	0.05	
18	t -критерій табличний	2.201	
19	Рівень значущості p	0.001	
20	H емпіричне	2.688	
21	Критичне значення $H_{05(12)}$	1.91	

різних заданих рівнів значущості α і різних чисел вимірювань n . Якщо емпіричний коефіцієнт кореляції H виявиться більше критичного значення $H_{\alpha(n)}$ то з рівнем значущості α слід відкинути гіпотезу про відсутність кореляції розглянутих вибірок.

Розглянемо приклад, наведений в табл. 9.4. У ній результати визначені математичними та статистичними функціями MS Excel: **СЧЁТ**, **КОРРЕЛ** — для розрахунку значення коефіцієнту кореляції r та розрахованих за виразом (9.27) і критичними даними, взятими з табл. И.4.

З неї бачимо, що виконується умова $H=2.688 > H_{05(12)}=1.91$, вибірки корельовані між собою з рівнем значущості α .

У цій же таблиці наведена точкова довірка перевірка за t -критерієм Стьюдента, яка виконуються з використанням формули (9.12) і статистичних функцій MS Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** та **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х**.

Так як виконується умова $t=4.377 > t_{05(11)}=2.201$ і відповідно $p=0.001 < \alpha=0.05$, вибірки корельовані між собою з рівнем значущості α .

За обома критеріями коефіцієнт кореляції є значущим, тому з рівнем значущості $\alpha = 0.01$ можна вважати, що теоретичний коефіцієнт кореляції відмінний від нуля.

9.2.4. Оцінка “підозрілих” значень при кореляційному аналізі

Якщо серед експериментальних точок виявляється одна аномальна (підозріла) (рис. 9.2), яка різко виділяється поміж інших точок, то питання про її виключення вирішується таким чином.

Підраховуємо СКВ s_x^2 і s_y^2 обох вибірок, їх обсяг n та коефіцієнт кореляції r для всіх точок, а також ці показники для всіх точок, крім підозрілої, тобто \tilde{s}_x^2 , \tilde{s}_y^2 , \tilde{n} та \tilde{r} [31].




Рис. 9.2. Графік корелюючих вибірових значень

Далі знаходимо відношення (9.28)

$$R = \frac{\tilde{n} \cdot \tilde{s}_x^2 \cdot \tilde{s}_y^2 \cdot (1 - \tilde{r}^2)}{n \cdot s_x^2 \cdot s_y^2 \cdot (1 - r^2)} \quad (9.28)$$

і порівнюємо з критичним — мінімально допустимим його значенням за табл. И.5 [31].

У табл. И.5 мінімально допустимі значення відношення R наведені для різної довірчої значущості α і різних кількостей n результатів вимірювань. Якщо при заданій довірчій значущості α підраховані відношення (9.28) виявиться менше відповідного мінімально допустимого значення $R_{\alpha(n)}$, то підозріле значення вважається грубою помилкою і з заданою довірчою значущістю α виключається з подальшої обробки результатів. В іншому випадку це значення залишається [31].

Розглянемо приклад, наведений в табл. 9.5.

У ній в колонках **B** і **C** представлено вихідні значення корельованих вибірок; в колонках **D** і **E** — вони ж без “підозрілих” значень, вони отримані відповідними посиланнями на колонки **B** і **C**; в колонці **F** — частка від ділення y/x відповідних даних колонок **C** і **B**.

Ця частка використовується для визначення, яка пара в колонках **B** і **C** є випадальною. Так як у нашому разі $r < 0$ — це максимальне значення частки.

У табл. 9.5 ній результати визначені математичними та статистичними функціями **MS Excel: СЧЁТ, ДИСП.В, КОРРЕЛ** та розрахованих за виразом (9.28) і критичними даними, взятими з табл. И.5.

Так як для вихідного стану маємо $R > R_{\alpha(n)}$, то у першу чергу (для першого кроку) максимальним значенням для $y/x \in 25$, тобто $y/x=25$ що відповідає $x=1$ і $y=25$. Поставивши у колонках **D** і **E** перед відповідними посиланнями знак зірочки (*) (див. рис. 2.6 на с. 92) отримуємо також $R > R_{\alpha(n)}$, що вимагає продовження роботи.

Таблиця 9.5. Оцінка “підозрілих” значень при кореляційному аналізі

перший крок

	A	B	C	D	E	F
1	D2=B2 E2=C2	x	y	x	y	y/x
2	F2=C2/B2	3	15	3	15	5.0
3	B14=СЧЁТ(B2:B13)	7	4	7	4	0.6
4	B15=ДИСП.В(B2:B13)	4	12	4	12	3.0
5		9	6	9	6	0.7
6		3	8	3	8	2.7
7		4	10	4	10	2.5
8		4	8	4	8	2.0
9		8	0	8	0	0
10		1	25	=B10	=C10	25
11		6	4	6	4	0.7
12		5	9	5	9	1.8
13		4	8	4	8	2.0
14	Обсяг вибірки n	12		11		
15	Дисперсія s	5.24	40.45	4.16	16.85	
16	Коеф.кореляції r	-0.811		-0.755		
17	Коеф.емпіричн. R	0.380				
18	Коеф.критичн. $R_{05(n)}$	0.296				

другий крок і т.д.

	A	B	C	D	E	F
1		x	y	x	y	y/x
2		3	15	=B2	=C2	5.0
3		7	4	7	4	0.6
4		4	12	4	12	3.0
5		9	6	9	6	0.7
6		3	8	3	8	2.7
7		4	10	4	10	2.5
8		4	8	4	8	2.0
9		8	0	8	0	0
10		1	25	=B10	=C10	25
11		6	4	6	4	0.7
12		5	9	5	9	1.8
13		4	8	4	8	2.0
14	Обсяг вибірки n	12		10		
15	Дисперсія s	5.24	40.45	4.04	12.10	
16	Коеф.кореляції r	-0.811		-0.724		
17	Коеф.емпіричн. R	0.267				
18	Коеф.критичн. $R_{05(n)}$	0.296				

B16=КОРРЕЛ(B2:B13;C2:C13)

B17=D14*D15*E15*

*(1-D16^2)/(B14*B15*C15*(1-B16^2))

Далі виключаючи з розрахунку дані для $y/x=5$ (при $x=3$ і $y=15$), отримуємо $R=0.267 < R_{05(12)}=0.296$.

Таким чином з корельованих вибірок слід виключити пари $x=1$ і $y=25$ та $x=3$ і $y=15$.

9.2.5. Мінімальний обсяг вибірки для оцінки коефіцієнта кореляції

Так як для малих вибірок при порівнянні коефіцієнтів кореляції t -критерій Стюдента стає ненадійним за перетвореним емпіричним коефіцієнтом кореляції z (див. підрозділ 9.2.2 Довірчий інтервал для коефіцієнта кореляції) можна розрахувати обсяг n вибірки для даного значення коефіцієнта кореляції r , який був би достатній для спростування нульової гіпотези якщо кореляція між ознаками існує). Для цього служить наступна формула [15]

$$n = \left(2t_{\alpha(n-2)} / \ln \frac{1+r}{1-r} \right)^2 + 3, \quad (9.29)$$

де $t_{\alpha(n-2)}$ – квантиль однобічного t -критерію Стюдента при довірчому рівні статистичної значущості α і ступені вільності $\nu = n - 2$.

Таблиця 9.6 – Визначення мінімального обсягу вибірки при оцінці коефіцієнта кореляції

	А	В
1	Показник	Значення
2	Коефіцієнт кореляції r	0.69
3	Рівень значущості α	0.01
4	Обсяг вибірки прийнятий n_o	14
5	Обсяг вибірки розрахований n_p	12.996
6	Різниця обсягів Δ	1.004
$B5 = (4 * (\text{СТЮДЕНТ.ОБР}(1-B3; B4-2))^2) / ((\ln((1+B2)/(1-B2))))^2 + 3$ $B6 = B4 - B5$		

Так як відшукуваний обсяг вибірки n входить і у визначення $t_{\alpha(n-2)}$, він визначається підбиранням доки не буде отримана різниця $\Delta = n_o - n_p$, яка має найменше позитивне значення.

Залежності, за якими виконується цей процес наведені в табл. 9.6.

В табл. 9.7 та табл. И.3 [54] наведені розрахунки мінімального обсягу n вибірки при оцінці коефіцієнта кореляції для довірчих рівнів α 0.001, 0.01 і 0.05.

З табл. 9.7 видно, що мінімальний обсяг вибірки, необхідний для точної оцінки коефіцієнта кореляції, збільшується зі зменшенням самого коефіцієнта і вже підтвердження статистичної значущості коефіцієнта кореляції $r=0.4$ становить $n=20$ при $\alpha=0.05$, $n=37$ при $\alpha=0.01$ і $n=62$ при $\alpha=0.001$.

Таблиця 9.7. Мінімальний обсяг n вибірки при оцінці коефіцієнта кореляції


Рівень значущості α	Коефіцієнт кореляції r									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.05	274	71	34	20	14	11	9	7	6	4
0.01	544	138	63	37	24	18	13	10	8	4
0.001	957	241	108	62	40	28	21	16	12	5

Цей підрозділ носить суто теоретичний характер, так як ППП **Statistica** при кореляційному аналізі програмно використовує формули (9.7)–(9.15).

9.2.6. Розрахунок параметрів коефіцієнту кореляції калькулятором PPP Statistica

При застосуванні t -критерій Стьюдента для визначення коефіцієнта кореляції Пірсона з використанням для тестової оцінки ППП **Statistica** у меню **Statistics** / **Аналіз** вибираємо модуль **Probability Calculator** / **Вероятностный калькулятор** і далі **Correlations...** / **Корреляции...**. Виникає панель **Pearson Product Moment Correlation Dis...** **Значимость коэффициента корреляции Пирсона** (рис. 9.3).

Параметрами в цьому діалозі є значення n – обсяг вибірки, r – коефіцієнт кореляції, p – рівень довіри і $\text{Fisher z} / z \text{ Фишера}$ – критичні значення розподілу). Кожен з них можна

або задати, або обчислити на основі заданих. Для цього слід ввести значення в будь-які два поля n ,  Compute p from z/

☒ Compute p from r / ☐ Вычислить r по p☒ Compute p from p / ☐ Вычислить p по p

залишивши інші два поля порожніми, а потім натисніть кнопку **Compute/Вычислить**

, щоб знайти два невідомих значення. Тобто, можна обчислити p -рівень і $\frac{\text{Fisher } z}{z \text{ Фишера}}$ на основі заданих параметрів r і n , або обчислити r і $\frac{\text{Fisher } z}{z \text{ Фишера}}$ на основі заданих параметрів p і n .




Рис. 9.3. Розрахунок параметрів коефіцієнту кореляції калькулятором ППП **Statistica**

Порівнюючи результати верхньої частини рис. 9.3 з даними табл. 9.6 на с. 502 і табл. 9.20 на с. 521 бачимо їх повну тотожність.

9.2.7. Кореляційний аналіз квадратних матриць

9.2.7.1. Кореляційний аналіз застосуванням інструменту

MS Excel **КОРРЕЛЯЦИЯ**

Кореляційні матриці бувають двох типів — квадратні $n \times n$, де n — кількість аналізованих факторів, якій дорівнює кількість рядків і стовбців, і прямокутні $k \times j$, де k, j — кількість факторів, які утворюють відповідно рядки і стовбці. Слід відмітити, що при $k = j$ матриця не перетворюється у квадратну.

Інструмент MS Excel **Корреляция** обчислює коефіцієнти кореляції між необмеженим числом вибірок.

Для ілюстрації визначення кореляційних залежностей використовуємо числові дані табл. 2.11 на с. 96 (чарунки P3:S103). Матрична таблиця подає взаємозалежність параметрів на їх перетині [53].

Порядок дії при розрахунку наведено на полі рис. 9.4 червоними цифрами.

При виконанні аналізу слід натиснути **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) (рис. 2.4, с. 100). Далі на панелі **Анализ данных** (рис. 9.4) з **Инструменты анализа** вибрати **Корреляция** (3) і натиснути **ОК** (4).

На відкритій панелі **Корреляция** у **Входные данные** треба активізувати **Метки в первой строке** (5) — якщо вибірки даних підписані (стоїть номер вибірки, її назва тощо), то для включення в дані заголовків, у даному пункті слід поставити маркер. Якщо ж виділялися тільки числові дані, даний пункт не відмічаємо. Далі указати групування **по столбцам** (6), яке визначає характер розташування даних у вибірках — за рядками, чи за стовпцями, указати вхідний інтервал **P\$2:\$S\$103** (7) і у **Параметры вывода** призначити виведення результатів на **Новый рабочий лист** (8) та натиснути **ОК** (9).

У результаті цих дій отримуємо кореляційну таблицю (табл. 9.8).




Рис. 9.4. Порядок застосування інструменту **Корреляция**

Таблиця 9.8. Коефіцієнти кореляції квадратної матриці

Показник	Висота рослини	Висота штамбу	Кількість гілок	Кількість стручків
Висота рослини	1			
Висота штамбу	0.398	1		
Кількість гілок	0.242	-0.111	1	
Кількість стручків	0.265	0.285	0.277	1

Дані більшої інформативності використовуючи формули (9.11), (9.12) та статистичну функцію **MS Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** при числі ступенів вільності $\nu = n - 2$ визначимо ймовірності коефіцієнтів кореляції для отримання квадратної матриці табл. 9.9, надавши їй вигляду табл. 9.10 на с. 507.

Таблиця 9.9. Матриці коефіцієнтів кореляції та їхні ймовірності

	A	B	C	D	E
1	Показник	Висота рослини	Висота штамбу	Кількість гілок	Кількість стручків
2	Висота рослини	1	B5=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(ABS(B4* *((101-2)/(1-B4^2))^0.5);101-2)		
3	Висота рослини	1			
4	Висота штамбу	0.398	1		
5	Висота штамбу	3.744E-05			
6	Кількість гілок	0.242	-0.111	1	
7	Кількість гілок	0.0149	0.2691		
8	Кількість стручків	0.265	0.285	0.277	1
9	Кількість стручків	0.0074	0.0039	0.0050	

9.2.7.2. Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica

Для ілюстрації визначення кореляційних залежностей і побудови матриць за допомогою ППП **Statistica** використовуємо числові табл. 2.11 на с. 96 (чарунки **P3:S103**). Для візуалізації отриманих залежностей ця програма представляє кореляційну матрицю також графічно. Матричний графік складається з окремих кадрів, де представлено точки вибірки і графік (за умовчанням лінійний), який описує взаємозалежність параметрів, на перетині яких він знаходиться. [53]

У меню **Statistics** / **Анализ** (1) (рис. 9.5) вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables/Основные статистики и таблицы** (2), де на однойменній панелі використовуємо опцію **Correlation matrices/Парные и частные корреляции** (3) і натиснувши **ОК** (4), переходимо на панель установок і процедур **Product-Moment and Partial Correlations/Парные и частные корреляции**.





Рис. 9.5. Вибір колонок для квадратної кореляційної матриці.

На її вкладці **Options**/Опции (5) задаємо необхідний довірчий інтервал **p-level for highlighting: .05** / **Уровень значим. для выделения: .05** (6) і встановлюємо перемикач **Display r, p-levels, and N's**/Отображать p-уровень и N (7) — представлення в матриці одночасно з коефіцієнтами кореляції їхньої ймовірності, вибираємо **One variable list**/Квадратная матрица (8) і на відкритій панелі **Select the variables for the analysis** / **Выберите переменные для анализа** задаємо необхідні показники (9).

Далі для побудови квадратної кореляційної таблиці (табл. 9.10) або матриці (рис. 2.21, с. 119) натикнувши **OK** (10), повертаємося на панель **Product-Moment and Partial Correlations** / **Парные и частные корреляции**: і переходимо на її вкладку **Quick**/Парные (рис. 9.6).

Дії кнопки **Summary** / **OK** (1) і процедури **Summary: Correlation matrix** / **Матрица парных корреляций** (1) вкладки **Quick** / **Парные** (рис. 9.6) і процедури **Summary: Correlation matrix** / **Матрица парных корреляций** вкладки **Advanced/plot**/Частные корреляции (рис. 9.9) ідентичні.

Рис. 9.6. Вкладка **Quick**/Парные

Product-Moment and Partial Correlations:
Парные и частные корреляции:

Задіявши на вкладці **Quick**/Парные (рис. 9.6) процедуру **Summary: Correlation matrix** / Матрица парных корреляций (1) маємо табл. 9.10, де червоним відмічені коефіцієнти кореляції, значущі для прийнятого довірчого інтервалу, тобто при $p \leq 0.05$ і наведено їхню ймовірність.

Дані табл. 9.10 повністю відповідають даним табл. 9.9 на с. 505.

Таблица 9.10. Коефіцієнти кореляції квадратної матриці та їхні ймовірності

Переменная	Корреляции (Биометрия-П.ста) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ N=101 (Построчное удаление ПД)			
	Висота рослини-2004	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на гілці-2004
Висота рослини-2004	1.0000	.3981	.2418	.2651
	$p = \text{---}$	$p = .000$	$p = .015$	$p = .007$
Висота штамбу-2004	.3981	1.0000	-.1110	.2846
	$p = .000$	$p = \text{---}$	$p = .269$	$p = .004$
Кількість гілок-2004	.2418	-.1110	1.0000	.2774
	$p = .015$	$p = .269$	$p = \text{---}$	$p = .005$
Кількість стручків на гілці-2004	.2651	.2846	.2774	1.0000
	$p = .007$	$p = .004$	$p = .005$	$p = \text{---}$

При виконанні процедури **Scatterplot matrix** / Матричная диаграмма рассеяния (2) (рис. 9.6) слід вибирати необхідні показники для побудови графічного відображення кореляційної матриці (табл. 9.10) і після натиснення **OK** отримати його (рис. 2.21, с. 119). Як уже відмічалось (с. 119), особливістю версій **Statistica 8.0** і вище є додаткова кнопка **Graphs** (4) (рис. 9.6), натисненням якої представляє двовимірні діаграми розсіювання із графіком залежності в поєднанні з гістограмами аргументу й функції (див. рис. 2.22 б), с. 120), які деталізують рис. 2.21, рис. 9.10 і 9.8.

Отриману табл. 9.10 з показниками кореляції зручно наводити у текстовому описі, з поданням r і p , згідно рекомендацій [36] (див. с. 504). Якщо замість установки **Display r, p-levels, and N's** / Отображать r-уровень и N (7) — представлення в матриці разом із коефіцієнтами кореляції їхньої ймовірності (рис. 9.5), активізувати **Display detailed table of results** / Подробная таблица результатов, то у результаті подальших дій маємо табл. 9.11 з докладною характеристикою кореляційного зв'язку.

Таблиця 9.11. Докладна характеристика кореляційного зв'язку
квадратної матриці

Пер.Х и Пер.У	Корреляции (Биометрия-П) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < 0.05000$ (Построчное удаление ПД)										
	Среднее	Стд.откл	r(X,Y)	r2	t	p	N	Св.член завис.У	Наклон завис.У	Св.член завис.Х	Наклон завис.Х
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513	1.000000	1.000000			101	0.0000	1.000000	0.0000	1.000000
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065	0.398092	0.158477	4.31785	0.000037	101	-13.3955	0.392547	65.1035	0.403715
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	0.241777	0.058456	2.47920	0.014857	101	3.4500	0.055037	63.1264	1.062131
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	0.265051	0.070252	2.73504	0.007392	101	11.6284	0.209513	62.0549	0.335310
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513	0.398092	0.158477	4.31785	0.000037	101	65.1035	0.403715	-13.3955	0.392547
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065	1.000000	1.000000			101	0.0000	1.000000	0.0000	1.000000
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	-0.111009	0.012323	-1.11140	0.269088	101	7.7245	-0.025626	17.9872	-0.480874
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	0.284630	0.081014	2.95422	0.003917	101	23.1935	0.228167	5.0449	0.355064
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033									
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513	0.241777	0.058456	2.47920	0.014857	101	63.1264	1.062131	3.4500	0.055037
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033									
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065	-0.111009	0.012323	-1.11140	0.269088	101	17.9872	-0.480874	7.7245	-0.025626
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	1.000000	1.000000			101	0.0000	1.000000	0.0000	1.000000
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	0.277393	0.076947	2.87276	0.004979	101	19.4068	0.963253	5.2380	0.079882
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194									
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513	0.265051	0.070252	2.73504	0.007392	101	62.0549	0.335310	11.6284	0.209513
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194									
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065	0.284630	0.081014	2.95422	0.003917	101	5.0449	0.355064	23.1935	0.228167
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	0.277393	0.076947	2.87276	0.004979	101	5.2380	0.079882	19.4068	0.963253
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	1.000000	1.000000			101	0.0000	1.000000	0.0000	1.000000



Наведені у табл. 9.11 значенням r , n і t дозволяють використовуючи наведені формули подавати результати у вигляді $r \pm s_r$ і $r \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_r$ (див с. 504).



У колонках табл. 9.11 **Св.член завис. У** і **Наклон завис. У** та **Св.член завис. Х** і **Наклон завис. Х** представляють собою вільний член a і коефіцієнт b лінійного рівняння регресії відповідно $y = b + ax$ і $x = b + ay$ (див. табл. 9.11 і рис. 2.22 на с. 120). Саме графіки цих рівнянь наводяться на графічних відображеннях кореляційних матриць, представлених на рис. 2.21 на с. 119, рис. 9.10, та рис. 9.8 на с. 511.

Для побудови частинних кореляцій натисненням (3) (рис. 9.9) слід перейти на вкладку **Advanced/plot** / **Частные корреляции**, і виконавши процедуру **Partial correlations** / **Частные корреляции** (1) при виборі необхідних показників (2) згідно рис. 2.21 (с. 119), отримати коефіцієнти частинної кореляції (табл. 9.17).

9.2.8. Кореляційні залежності і побудова прямокутних матриць за допомогою ППП Statistica

9.2.8.1. Визначення кореляційних залежностей і побудова прямокутних матриць

При необхідності натисненням  Two lists (rect. matrix) /  Прямоугольная матрица (5) (рис. 9.9) виконується перехід до панелі вибору колонок для побудови прямокутної матриці (рис. 9.7). Тут, вибравши необхідні показники (1) для побудови прямокутної кореляційної таблиці (табл. 9.12) або матриці (рис. 9.8), слід натиснути **OK** (2).

На вкладці **Quick** / **Парные** кнопкою  Summary: Correlation matrix /  Матрица парных корреляций (аналогічно рис. 9.6) отримуємо табл. 9.12, де червоним відмічені коефіцієнти, значущі при $p \leq 0.05$ (значення встановлюється як на рис. 9.5, с. 506).






Рис. 9.7. Панель вибору колонок для прямокутної матриці

При цьому слід мати на увазі, що для кореляційної матриці назви рядків формує **First variable list** / **Первый список переменных**, а колонок — **Second variable list** / **Второй список**, а для графічного відображення кореляційної квадратної матриці — навпаки.

Таблиця 9.12. Коефіцієнти кореляції показників прямокутної матриці та їхні ймовірності







Переменная	Корреляции (Биометрия) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .0500$ N=101 (Построчное удаление ПД)	
	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на гілці-2004
Висота рослини-2004	.2418	.2651
	$p=.015$	$p=.007$
Висота штамбу-2004	-.1110	.2846
	$p=.269$	$p=.004$

Активізувавши  Display detailed table of results /  Подробная таблица результатов у результаті подальших дій маємо табл. 9.13 з докладною характеристикою кореляційного зв'язку.

Таблиця 9.13. Докладна характеристика кореляційного зв'язку прямокутної матриці

Пер. X и Пер. Y	Корреляции (Биометрия) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ (Построчное удаление ПД)										
	Среднее	Стд. откл.	r(X,Y)	r2	t	p	N	Св. член завис. Y	Наклон завис. Y	Св. член завис. X	Наклон завис. X
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	0.241777	0.058456	2.47920	0.014857	101	3.44998	0.055037	63.12644	1.062131
Висота рослини-2004	70.93749	6.062513									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	0.265051	0.070252	2.73504	0.007392	101	11.62838	0.209513	62.05489	0.335310
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	-0.111009	0.012323	-1.11140	0.269088	101	7.72446	-0.025626	17.98719	-0.480874
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065									
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	0.284630	0.081014	2.95422	0.003917	101	23.19348	0.228167	5.04490	0.355064

Порівнюючи дані табл. 9.12 і 9.8 бачимо, що перша з них більш придатна до внесення в текстовий матеріал, а в другій дані наведені з більш високою точністю.

Після повернення до панелі  Product-Moment and Partial Correlations: /  Парные и частные корреляции (рис. 9.6 б) натисненням корінця  Frequency Tables: Би... /  Парные и частные к... у вкладці **Quick** / **Парные**, слід задіяти кнопку  Scatterplot matrix /  Матричная диаграмма рассеяния. Спочатку знову пропонується встановити необхідні колонки для побудови графічного відображення кореляційної матриці, а після натиснення **ОК** видається кореляційна матриця (рис. 9.8).

З даних табл. 9.12 і 9.13, табл. 9.8 (с. 505), табл. 9.10 (с. 507) та табл. 9.11 (с. 508) бачимо тотожність результатів.

Подальша обробка графічного відображення кореляційних матриць (рис. 2.21 на с. 119, рис. 9.10 і 9.8) засобами **Statistica** описана у підрозділі **16.2.4 Редагування кореляційних матриць. Обробка зображення.**




Рис. 9.8. Графічне відображення кореляційної прямокутної матриці

9.2.1. Множинний кореляційний аналіз

На відміну від парної кореляції і регресії, де досліджувалася розглядає взаємозв'язок двох змінних, в множинному кореляційному і регресійному аналізі розглядаються взаємозв'язок багатьох показників. Цей кореляційний аналіз є допоміжним інструментом і відіграє важливу аналітичну роль при статистичній обробці, у той же час, застосовуючи множинний кореляційний аналіз, можна отримати додаткову корисну інформацію про взаємозв'язки досліджуваних показників.

Досліджувані показники досить часто знаходяться під впливом не одного, а багатьох чинників. Взаємозв'язок між безліччю показників вивчає множинна кореляція. При цьому можуть досліджуватися дві проблеми:

- вплив на один який-небудь показник сукупності факторів;
- аналіз взаємозв'язку двох будь-яких чинників при виключенні впливу на них обох інших факторів.

Множинний кореляційний аналіз ґрунтується на парній кореляції. Нехай є n показників. Для проведення множинного кореляційного аналізу об-

числюються парні коефіцієнти кореляції між кожною парою економічних показників і на їх основі складається кореляційна матриця (9.30)

$$K = \begin{vmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{n1} & r_{n2} & \dots & 1 \end{vmatrix}. \quad (9.30)$$

Для вимірювання інтенсивності спільного впливу всіх факторів на досліджувану ознаку використовують коефіцієнт множинної кореляції, який розраховується на основі наступного співвідношення (9.31)

$$R_{1.23\dots n} = \sqrt{1 - \frac{D}{D_{11}}} \quad (9.31)$$

де D – визначник повної матриці кореляції;
 D_{11} – визначник підматриці повної матриці кореляції, що містить всі елементи за винятком елементів *першого рядка і першого стовпця* у якому розміщені *показники результуючої ознаки*.

Визначники матриці кореляції розраховується за допомогою статистичної функції **MS Excel МОПРЕД**.

Межі зміни коефіцієнта множинної кореляції від 0 до 1. Чим ближче його значення до 1, тим тісніше зв'язок досліджуваного ознаки з усім набором факторів.

Перевірка статистичної значущості $F_{\text{емп}}$ здійснюється на основі критерію Фішера (9.32)

$$F_{\text{емп}} = \frac{n-k-1}{k} \cdot \frac{R_{1.23\dots n}^2}{1 - R_{1.23\dots n}^2}, \quad (9.32)$$

де $R_{1.23\dots n}^2$ – квадрат множинного коефіцієнта кореляції;
 n – обсяг вибірки;
 k – число факторів, вплив яких вивчається.

Емпіричне значення $F_{\text{емп}}$ порівнюють з критичним (табличним) F_T для рівня значущості α і числа ступенів свободи $\nu_1=k$ і $\nu_2=n-k-1$. Критичне значення F_T розраховується за допомогою статистичної функції **MS Excel F.ОБР.ПХ**.

Якщо $F_{\text{емп}} > F_T$, тоді $R_{1.23\dots n}^2$ статистично значущий. У іншому випадку

$(F_{\text{емп}} \leq F_{\text{т}})$ — статистично незначущий.

У якості прикладу розглянемо матрицю парних коефіцієнтів кореляції (табл. 9.8) між ними, розрахованих за вибіркою з 101 значень (табл. 9.14).

Слід звернути увагу на відмінність між порядком розташування факторних ознак і результуючої ознаки в табл. 9.8 і 9.14.

Розрахунки визначників (алгебраїчного доповнення D_{yx} , D_{xx} і D_{yy}), які здійснюються за допомогою статистичної формули **MS Excel МОПРЕД**, представлено на полі табл. 9.14. Тут же наведено розрахунок множинний коефіцієнт кореляції (9.31) та його оцінки (9.32).

Розрахуємо коефіцієнт множинної кореляції і перевіримо статистичну значущість отриманого коефіцієнта.

Таблиця 9.14. Визначення коефіцієнта множинної кореляції

	A	B	C	D	E
1	Показник	Кількість стручків	Кількість гілок	Висота рослини	Висота штамбу
2	Кількість стручків	1	0.277	0.265	0.285
3	Кількість гілок	0.277	1	0.242	-0.111
4	Висота рослини	0.265	0.242	1	0.398
5	Висота штамбу	0.285	-0.111	0.398	1
6	Обсяг вибірки	101	Множинна кореляція		0.428
7	Число факторів	3	Емпіричний $F_{\text{емп}}$		7.235
8	Визначник матриці	0.612	Табличний $F_{\text{т}}$		2.698
9	Визначн. підматриці	0.749	Рівень значущості p		1.971E-04

B8=МОПРЕД(B2:E5) B9=МОПРЕД(C3:E5)
E6=(1-B8/B9)^0.5 E9=F.РАСП.ПХ(E7;B7;B6-B7-1)
E7=((B6-B7-1)*E6^2)/((1-E6^2)*B7)
E8=F.ОБР.ПХ(0.05;B7;B6-B7-1)

Таким чином маємо $F_{\text{емп}}=7.235 > F_{05(3, 97)}=2.698$, також $p=1.971 \cdot 10^{-4} < \alpha=0.05$, отже отриманий коефіцієнт множинної кореляції $R_{1.23...n}^2$ є статистично значущим.

9.2.2. Частинний коефіцієнт кореляції

9.2.2.1. Використання ПА MS Excel при визначенні частинного коефіцієнта кореляції

Досить часто зустрічаються випадки, коли дві змінні корелюють одна з одною тільки за рахунок того, що обидві вони змінюються під впливом деякої третьої змінної. Тобто, насправді зв'язок між відповідними властивостями цих двох змінних відсутній, але проявляється в статистичному взає-

мозв'язку, або кореляції, під впливом загальної причини, викликаной третьою змінною.

Крім коефіцієнта множинної кореляції використовуються частинні (чисті, парціальні) коефіцієнти кореляції, що оцінюють ступінь зв'язку однієї ознаки з одним фактором при виключенні впливу всіх інших факторів. Тобто вони дозволяють виявити “чисту” залежність ознаки від одного з факторів і встановити, яким був би вплив цього фактору на величину ознаки за умови, що вплив інших (іншого) факторів на неї ознака виключається.

Частинні коефіцієнти можуть бути різних порядків. Порядок коефіцієнта визначається числом факторів, вплив яких виключається.

Так, приватні коефіцієнти кореляції r_{yz-z} , r_{yz-x} — це коефіцієнти першого порядку; r_{yz-zv} , r_{yz-vx} — це коефіцієнти другого порядку і т.д.

Таким чином, якщо кореляція між двома змінними зменшується, при фіксованій третій випадковій величині, то це означає, що їх взаємозалежність виникає частково через вплив цієї третьої змінної. Якщо ж часткова кореляція дорівнює нулю або дуже мала, то можна зробити висновок про те, що їх взаємозалежність цілком обумовлена власним впливом і ніяк не пов'язана із третьою змінною.

Для виявлення “чистої” залежності між економічними показниками і впливу на неї виключаються факторів необхідно порівняти частинні і відповідні парні коефіцієнти кореляції.

Розрахунок парних і частинних коефіцієнтів кореляції і їх подальше порівняння може привести до одного з наступних висновків:

— $r_{yx} > r_{yx-z\dots v}$ — фактори z, \dots, v спотворюють взаємозв'язок між Y і X в бік її збільшення;

— $r_{yx} < r_{yx-z\dots v}$ — фактори z, \dots, v спотворюють взаємозв'язок між Y і X в бік її зменшення. У цьому разі можна зробити висновок про те, що інші змінні послабили зв'язок, або “сховали” кореляцію.

— $r_{yx} \approx r_{yx-z\dots v}$ — фактори z, \dots, v практично не спотворюють взаємозв'язок між Y і X .

У якості прикладу розглянемо матрицю парних коефіцієнтів кореляції (табл. 9.8) між ними, розрахованих за вибіркою з 101 значень (табл. 9.16).

Необхідно обчислити частинний коефіцієнт кореляції другого порядку r_{yx-xv} .

До того ж необхідно пам'ятати про те, що кореляція не є причинність. Виходячи із цього, не можна безапеляційно говорити про наявність причинного зв'язку: деяка зовсім відмінна від розглянутих в аналізі змінна може бути джерелом цієї кореляції. Як при звичайній кореляції, так і при частинних кореляціях припущення про причинність повинне завжди мати суттєві позастатистичні підстави) [9].

Таким чином зв'язок між X і Y без урахування впливу Z визначається виразом

$$r_{yx-z} = \frac{r_{yx} - r_{xz}r_{yz}}{\sqrt{(1-r_{xz}^2)(1-r_{yz}^2)}}. \quad (9.33)$$

Нульова гіпотеза $H_0: r_{xy-z}=0$ (тобто $r_{xy-z}=0$ — кореляція відсутня). Емпіричне значення t -критерію для перевірки цієї гіпотези визначається як (9.34) чи (9.35) [34, 37]

$$t_{\text{емп}} = r_{\text{част}} \cdot \sqrt{\frac{n-k-2}{1-r_{\text{част}}^2}}. \quad (9.34)$$

$$t_r = \frac{r_{xy-z} \sqrt{n-3}}{\sqrt{1-r_{xy-z}^2}}. \quad (9.35)$$

Тут вираз $n-k-2$ представляє собою число ступенів вільності, $v=n-k-2$.

Емпіричне значення $t_{\text{емп}}$ порівнюють з критичним (табличним) t_r для рівня значущості α і числа ступенів свободи $v=n-k-2$. Критичне значення t_r розраховується за допомогою статистичної функції **MS Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**.

Одержане емпіричне значення критерію Стьюдента t порівнюється з табличним $t_{\alpha(v)}$ відповідно до прийнятого рівня значущості α і числа ступенів вільності $v=n-k-2$ чи $v=n-3$. За умови $t_r \geq t_{\alpha(v)}$ кореляційний зв'язок істотний і коефіцієнт кореляції вважається значущим, при $t_r < t_{\alpha(v)}$ — неістотним [34, 37].

При цьому слід мати на увазі, що для лінійної частинної кореляції умови її застосування для всіх трьох змінних аналогічні викладеним на с. 491.

У якості прикладу розглянемо матрицю парних коефіцієнтів кореляції (табл. 9.8 на с. 505) між ними, розрахованих за вибіркою з 101 значень.

Лінійна кореляція між кількістю стручків на рослині і її висотою становить $r=0.2652$ при $p=0.007$. У той же час виявлена істотна лінійна кореляція кількості гілок на рослині з її висотою ($r=0.242$ при $p=0.015$).

Таким чином кореляція між кількістю стручків на рослині і її висотою має ознаку частинної кореляції.

У табл. 9.15 подано її розрахунки за допомогою **MS Excel** на основі формул (5.38) і (5.39) та оцінку з використанням неспрямованого t -критерію Стьюдента.

З табл. 9.15 бачимо, що отриманий коефіцієнт лінійної частинної кореляції між кількістю стручків на рослині і її висотою більше за розрахований за безпосередніми даними, так як вилучено вплив третьої змінної — кількості гілок на рослині.

Таблиця 9.15. Визначення частинної кореляції.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Обсяг вибірки	Величина отриманих кореляцій			Рівень значущості α	Значення розрахунків			
2						Частинна кореляція	Статистична оцінка		
3		Стручки - Висота	Стручки-Штамб	Висота-Штамб		Стручки - Висота	Розрах. t -критерій	Табличн. t -критерій	p -рівень
4	101	0.2652	0.2847	0.3981	0.05	0.3490115	36.4982	1.984467	7.537E-59

$$F4 = (D4 - B4 * C4) / ((1 - B4^2) * (1 - C4^2))^{0.5} \quad G4 = (D4 - B4 * C4) / ((1 - B4^2) * (1 - C4^2))^{0.5}$$

$$H4 = \text{СТЮДЕНТ.ОБР.2X}(E4; A4 - 3) \quad I4 = \text{СТЮДЕНТ.РАСП.2X}(G17; B17 - 3)$$

Таблиця 9.16. Визначення коефіцієнта частинної кореляції

	A	B	C	D	E
1	Показник	Кількість стручків	Кількість гілок	Висота рослини	Висота штамбу
2	Кількість стручків	1	0.277	0.265	0.285
3	Кількість гілок	0.277	1	0.242	-0.111
4	Висота рослини	0.265	0.242	1	0.398
5	Висота штамбу	0.285	-0.111	0.398	1
6	Обсяг вибірки	101	Емпіричний $t_{\text{емп}}$		3.082
7	Число факторів	3	Табличний $t_{\text{т}}$		1.985
8	Частинна кореляція	0.289	Рівень значущості p		0.003
9					
10	Показник	Кількість стручків	Висота рослини	Висота штамбу	
11	Кількість гілок	0.277	0.242	-0.111	
12	Висота рослини	0.265	1	0.398	
13	Висота штамбу	0.285	0.398	1	
14	Визначн. підматриці D_{yx}	0.217	B14=МОПРЕД(B11:D13)		
15					
16	Число факторів	Кількість стручків	Висота рослини	Висота штамбу	
17	Кількість гілок	1	0.242	-0.111	
18	Висота рослини	0.242	1	0.398	
19	Висота штамбу	-0.111	0.398	1	
20	Визначн. підматриці D_{xx}	0.749	B20=МОПРЕД(B17:D19)		
21	E6=B8*((B6-B7-2)/(1-B8)^0.5)^0.5				
22	Кількість гілок	Кількість гілок	Висота рослини	Висота штамбу	
23	Кількість стручків	1	0.265	0.285	
24	Висота рослини	0.265	1	0.398	
25	Висота штамбу	0.285	0.398	1	
26	Визначн. підматриці D_{yy}	0.750	B26=МОПРЕД(B23:D25)		

E8=СТЫЮДЕНТ.РАСП.2Х(E6;B6-B7-2)
E7=СТЫЮДЕНТ.ОБР.2Х(0.05;B6-B7-2)

$$E8 = \text{СТЮДЕНТ.РАСП.2X}(E6; B6 - B7 - 2)$$

$$E7 = \text{СТЮДЕНТ.ОБР.2X}(0.05; B6 - B7 - 2)$$

$$B11 = B3 \quad C11 = D3 \quad \dots \dots$$

$$B17 = C3 \quad \dots \dots \dots$$

$$B13 = B5 \quad \dots \dots \quad D13 = E5$$

$$\dots \dots \dots \quad D19 = E5$$

$$B23 = B2 \quad C23 = D2 \quad D23 = E2$$

$$B8 = B14 / (B20 * B26)^{0.5}$$

$$B24 = B4 \quad C24 = D4 \quad D24 = E4$$

$$B25 = B5 \quad C25 = D5 \quad D24 = E5$$

Розрахунок частинних коефіцієнтів кореляції може здійснюватися на основі матричного обчислення (9.36) за допомогою алгебраїчних доповнень кореляційної матриці (9.30)

$$r_{12-34\dots n} = -\frac{D_{12}}{\sqrt{D_{11} \cdot D_{22}}} \quad (9.36)$$

де D_{11}, D_{12}, D_{22} – алгебраїчні доповнення відповідно до елементів r_{11}, r_{12}, r_{22} кореляційної матриці.





Межі зміни частинних коефіцієнтів кореляції $-1 < r_{\text{част}} < 1$ і їх інтерпретацій така ж, як і у парних коефіцієнтів кореляції.

Розрахунки визначників (алгебраїчного доповнення D_{yx}, D_{xx} і D_{yy}), які здійснюються за допомогою статистичної формули **MS Excel МОПРЕД**, представлено на полі табл. 9.16. Тут же наведено розрахунок частинний коефіцієнт кореляції (9.36) та його оцінки (9.34).

Таким чином, отриманий показник є значущим лише на рівні 43 %. Так як $r_{yx}=0.265$, що більше ніж $r_{yx-zv}=0.079$, то чинники z і v спотворюють взаємозв'язок між Y і X у бік її збільшення.







Величина частинної кореляції у табл. 9.16 і 9.18 на с. 519 співпадає.


9.2.2.2. Визначення параметрів частинної кореляції за допомогою ППП Statistica

Виконанням процедури  Scatterplot matrix /  Матричный (4) у вкладці  Advanced/plot /  Частные корреляции (рис. 9.9) з наступним вибором необхідних показників (2) і натисненням **ОК** (3) одержуємо графічне відображення (рис. 9.10) частинної кореляційної матриці, представленої табл. 9.17.

Дані табл. 9.17 слід читати таким чином. Наприклад, кореляційна залежність кількості стручків на центральній гілці при вилученні кількості гілок (розташована на перетині висоти рослини і штамбу) становить 0.3491.

Це відповідає даним, отриманим у табл. 9.15 на с. 516.

Розглянемо ще деякі можливості аналізу наших даних, які представляє панель вибору дій. Виконанням процедури  2D scatterplots /  2М рассеяния вкладки  Advanced/plot /  Частные корреляции панелі  Product-Moment and Partial Correlations: /  Парные и частные корреляции (рис. 9.9) з наступним вибором необхідних показників (2) і натисненням **ОК** (3) дає двовимірні діаграми розсіювання, які деталізують рис. 2.21 (с. 119) і рис. 9.8, з них залежність кількості гілок першого порядку від висоти рослини, представлена на рис. 2.22 а) на с. 120.

Рис. 9.9. Вкладки **Advanced/plot**/Частные корреляции панелі

Product-Moment and Partial Correlations: Парные и частные корреляции:

Таблица 9.17. Коэффициенты частинной корреляции та їхні ймовірності

Частные корреляции (Биометрия) Управление: Кількість стручків на гілці-2004 Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ N=101 (Построчное удаление ПД)			
Переменная	Висота рослины-2004	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004
Висота рослины-2004	1.0000	.3491	.1816
	$p = ---$	$p = .000$	$p = .071$
Висота штамбу-2004	.3491	1.0000	-.2063
	$p = .000$	$p = ---$	$p = .040$
Кількість гілок-2004	.1816	-.2063	1.0000
	$p = .071$	$p = .040$	$p = ---$

Після повернення до панелі **Product-Moment and Partial Correlations:** / **Парные и частные корреляции:** (рис. 9.9) натисненням **Frequency Tables: Би...** / **Парные и частные к...** за допомогою процедури **3D histograms** / **3D гистограммы** у тій же вкладці **Advanced/plot**/Частные корреляции, вибору необхідних показників для побудови гістограми і натиснення **OK** одержуємо 3-х вимірну гістограму, аналогічну рис. 2.16 на с. 114.

У цій же вкладці **Advanced/plot**/Частные корреляции виконанням процедури **3D scatterplot** / **3D рассеяния** виводимо тривимірну діаграму розсіювання (рис. 2.23, с. 121), а виконанням процедури **Surface plot** / **График поверхности** будуються поверхні функції відклику в залежності від двох показників (факторів) (рис. 2.24 на с. 121 і рис. 2.26–2.30 на с. 122–124).

Розрахунок частинної кореляції виконується також при регресійному аналізі (табл. 9.18) див. підрозділ **11.6.2 Визначення і оцінка коефіцієнтів лінійної регресії з використанням ППП Statistica**, отримані за рис. 11.31 на с. 719.

Величина частинної кореляції, наведена в табл. 9.18 і 9.16 на с. 516 співпадає.

Напівчасткова кореляція є кореляціями між відповідною незалежною змінною скоригованою щодо інших змінних і вихідною (не скорегованою) залежною змінною. Таким чином, ця кореляція є кореляцією відповідної незалежної змінної після коригування щодо інших змінних, і не скорегованими вихідними значеннями залежної. Інакше кажучи, квадрат напівчасткової кореляції є показником відсотка загальної дисперсії, яка пояснюється відповідною незалежною змінною, в той час як квадрат частинної кореляції є показником відсотка залишкової дисперсії, яка визначається після коригування залежної змінною щодо незалежних змінних.




Рис. 9.10. Графічне відображення частинної кореляційної матриці

Таблица 9.18. Коэффициенты частинной корреляции

Переменная	Переменные, входящие в уравнение (Біометрія)						
	Бета(в)	Частная Корр.	Получаст Корр.	Толеран.	R-квадр.	t(97)	p-знач.
Висота рослини-2004	0.082082	0.078845	0.071498	0.758724	0.241276	0.778954	0.437903
Висота штамбу-2004	0.284044	0.269912	0.253404	0.795900	0.204100	2.760792	0.006896
Кількість гілок-2004	0.289079	0.288896	0.272793	0.890498	0.109502	2.972023	0.003731

У табл. 9.18 частинна і напівчасткова кореляції мають близькі значення, причому напівчасткова кореляція завжди менше.

Якщо напівчасткова кореляція дуже мала, в той час як часткова кореляція відносно велика, то відповідна змінна може мати самостійну “частина” в поясненні мінливості залежною змінною (тобто “частину”, яка не пояснюється іншими змінними). Однак для практичної значущості, ця частина може бути мала, і представляти тільки невелику частку від загальної мінливості.

9.2.3. Кореляційний аналіз вибірок малого обсягу із застосуванням функції MS Excel **KORREL**

Проілюструємо кореляційний аналіз вибірок малого обсягу ($n \leq 10$), виконаний за формулою (9.15) з використанням MS Excel.

Таблиця 9.19 – Кореляційний аналіз вибірок малого обсягу		
	А	В С
1	Показник	Продуктивність Q, кг/год. Коефіцієнт варіації V, %
2	B11=KORREL(B2:B10;C2:C10)	47.8 4.9
3	B12=0.5*LN((1+B11)/(1-B11))	54.9 4.3
4	B13=СЧЁТ(B2:B10)-2	59.4 4.8
5	B14=1/(B13-2)^0.5	63.2 4.5
6	B17=B12+B14*B16	71.5 3.8
7	B18=B12-B14*B16	77.1 4.1
8	B21=СРЗНАЧ(B19:C20)	61.9 3.8
9		71.2 3.0
10		78.0 3.3
11	Коефіцієнт кореляції r	-0.7279
12	Величина z	-0.9242
13	Ступінь вільності ν	7
14	Стандартна похибка s_z	0.4082
15	Прийнятий рівень значущості α	0.05
16	Табличний критерій Стюдента t_T	2.3646
17	Верхня межа z_1	0.0412
18	Нижня межа z_2	-1.8895
19	Верхня межа коефіцієнта кореляції r_1	0.0412
20	Нижня межа коефіцієнта кореляції r_2	-0.9553
21	Номінальний коефіцієнт кореляції r	-0.4571
22	Похибка середнього Δ_r	0.4982
23	Фактичний критерій Стюдента t_Φ	2.8083
24	Рівень значущості p	0.0262
B16=СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(B15;B13) B19=(EXP(2*B17)-1)/(EXP(2*B17)+1) B20=(EXP(2*B18)-1)/(EXP(2*B18)+1) B22=B21-B20 B23=ABS(B11*(B13/(1-B11^2))^0.5) B24=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(B23;B13)		

За основу взято аналіз кореляційної залежності між експериментальними даними, отриманими при дослідженні дозатора зв'язуючої речовини при виготовленні паливних брикетів із соломи. Дослідження виконувалися за повнофакторним експериментом для двох факторів згідно табл. К.5, таким чином була отримана вибірка обсягом у дев'ять пар замірів.

Обчислення коефіцієнту кореляції між двома вибірками із застосуванням статистичної функції Excel **KORREL** (див. Додаток А) дає результат $r = -0.7279$.

З огляду на те, що результат, отриманий, з використанням цієї функції

через малу вибірку недостовірний, продовжуємо розрахунки за формулами (9.7)–(9.26), як це наведено на полі табл. 9.19.

З результату бачимо, що коефіцієнт кореляції між досліджуваними факторами при звичайному розрахунку становить $r = -0.7279$, тобто наявний **високий** зворотній кореляційний зв'язок при довірчій імовірності $p = 0.0262$. Після прямого і зворотного перетворення r в z за методом Р. Фішера виявлено **помірну** зворотною кореляцію $r = -0.457$ з такою ж самою довірчою імовірністю $p = 0.0262$.

Для порівняння наведемо традиційне визначення характеристики кореляційного зв'язку за допомогою ППП **Statistica** (табл. 9.20). З неї бачимо що значення фактичного критерію Стюдента t і рівня значущості p у обох випадках співпадають.

Таблиця 9.20. Докладна характеристика кореляційного зв'язку квадратної матриці

Пер.Х и Пер.У	Корреляции (Брикет) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ (Построчное удаление ПД)										
	Среднее	Стд.откл	r(X,Y)	r2	t	p	N	Св.член завис.У	Наклон завис.У	Св.член завис.Х	Наклон завис.Х
Продуктивність Q	65.00000	10.22627									
Продуктивність Q	65.00000	10.22627	1.000000	1.000000			9	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
Продуктивність Q	65.00000	10.22627									
Коефіцієнт варіації V	4.04881	0.65485	-0.727862	0.529782	-2.80833	0.026209	9	7.0784	-0.0466	111.0207	-11.3665
Коефіцієнт варіації V	4.04881	0.65485									
Продуктивність Q	65.00000	10.22627	-0.727862	0.529782	-2.80833	0.026209	9	111.0207	-11.3665	7.0784	-0.0466
Коефіцієнт варіації V	4.04881	0.65485									
Коефіцієнт варіації V	4.04881	0.65485	1.000000	1.000000			9	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000

Даний результат можна записати у вигляді: "... коефіцієнт кореляції Пірсона, отриманий при аналізі дев'яти пар даних з прийнятим рівнем значущості $\alpha = 0.05$, становить $r = -0.457 \pm 0.498$ ", або згідно з [36]: "при аналізі дев'яти пар даних між досліджуваними ознаками спостерігається високий від'ємний кореляційний зв'язок. Коефіцієнт кореляції Пірсона становить $r = -0.7279$ при довірчій імовірності $p = 0.0262$ ".

9.3. Міри зв'язку змінних, виражених у неметричних шкалах

9.3.1. Показники непараметричної кореляції

У випадку, якщо хоч би одна зі змінних представлена в порядковій (ранговій) шкалі (див. табл. 9.3, с. 493), слід використовувати коефіцієнти рангової кореляції ρ -Спірмена, γ — коефіцієнт кореляції знаків Фехнера, τ -Кендалла.

Застосування цих рангових кореляцій також має обмеження:

— обидві змінні повинні бути наведені в кількісній шкалі (метричній чи ранговій), див. с. 352;

— зв'язок між змінними повинен бути монотонним, тобто для квадратичної залежності не \cup – чи \cap –подібним (не мати екстремуму) [123].

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена — це непараметричний метод, який використовується з метою статистичного вивчення зв'язку між явищами. У цьому випадку визначається фактична ступінь паралелізму між двома кількісними рядами досліджуваних ознак і дається оцінка тісноти встановленого зв'язку за допомогою кількісно вираженого коефіцієнта.

Якщо члени вибірки спочатку були ранжирувані за змінною x , потім — за змінною y , то кореляцію між змінними x і y можна отримати, просто обчисливши коефіцієнт Пірсона для двох рядів рангів. За умови відсутності зв'язків у рангах (тобто відсутність повторюваних рангів) у тієї і іншої змінної, формула для Пірсона може бути істотно спрощена в обчислювальному відношенні і перетворена в формулу, відому як Спірмена.

Потужність коефіцієнта рангової кореляції Спірмена дещо поступається потужності параметричного коефіцієнта кореляції Пірсона. Також його недоліком є те, що для кількісних ознак однаковим різницям рангів можуть відповідати зовсім інші різниці значень ознак.

Коефіцієнт рангової кореляції доцільно застосовувати при наявності невеликої кількості спостережень. Даний метод може бути використаний не тільки для кількісно виражених даних, але також і у випадках, коли реєстровані значення визначаються описовими ознаками різної інтенсивності.

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена при великій кількості однакових рангів за однією чи обома зіставляваними змінними дає огублені значення. В ідеалі обидва кореляційні ряди повинні представляти собою дві послідовності незбіжних значень [9].

Коефіцієнт рангової кореляції ρ –Спірмена так само, як і коефіцієнт r Пірсона може приймати значення в такому ж діапазоні (від -1 до +1), пояснюючи мінливість однієї змінної від мінливості іншої. Фактично це і є коефіцієнт кореляції Пірсона, обчислений за **рангами** змінних, після попереднього ранжирування (сортування), у випадках, коли статистичні ряди не відповідають нормальному статистичному розподілу, або кількісно дуже малі ($n \geq 3$). При ранжируванні, як завжди, рівним різницям надають середні арифметичні значення їхніх рангів

При відсутності повторення рангів коефіцієнт ρ –Спірмена визначається за виразом

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}, \quad (9.37)$$

де d_i — різниця рангів двох ознак i -го елемента вибірки.

Перевірка статистичної значущості коефіцієнта рангової кореляції ρ –Спірмена не відрізняється від аналогічної процедури для коефіцієнта кореляції r Пірсона (при числі спостережень у вибірці 10 і більше розподіл вибі-

ркових значень ρ –Спірмена наближається до t –розподілу, тому для перевірки використовується t –критерій).

Критичні значення коефіцієнтів кореляції ρ –Спірмена (r –Пірсона) для перевірки неспрямованих альтернатив наведено у табл. И.6.

Коефіцієнт кореляції знаків Фехнера γ базується на перевірці відмінності між імовірністю того, що спостережувані дані розташовані в тому ж самому порядку для двох величин (збіг), і ймовірністю того, що вони розташовані у іншому порядку (інверсія). Для обчислення цього коефіцієнта між елементами двох вибірок попарно визначається число збігів P і інверсій Q .

Коефіцієнт γ обчислюється за формулою

$$\gamma = \frac{P - Q}{P + Q}. \quad (9.38)$$

Кореляція τ –Кендалла є альтернативою кореляції Спірмена для рангів. В її основу покладено ідею про те, що про спрямування зв'язку можна судити, попарно порівнюючи між собою випробовуваних: якщо у пари випробовуваних зміна по x збігається за напрямком із зміною по y , то це свідчить про прямий зв'язок, якщо не збігається — то про зворотній.

Коефіцієнт τ –Кендалла є узагальненням коефіцієнта γ у випадку виникнення однакових рангів (*tied ranks*) у елементів. Формула для обчислення цього коефіцієнта містить у собі поправки до коефіцієнта γ , але принцип розрахунків залишається тим самим. Звичайно, значення коефіцієнтів ρ –Спірмена й τ –Кендалла різняться, тому що в них різні принципи і процедура обчислення. Ранговий коефіцієнт Кендалла вирішує ті ж задачі, проте більш строгий. Співвідношення між цими коефіцієнтами виражається нерівністю

$$-1 \leq 3\tau - 2\rho \leq 1. \quad (9.39)$$

Для оцінки силу зв'язку між двома змінними в номінативних шкалах (див. с. 351) найчастіше використовується коефіцієнт ϕ . Його обчислення засноване на статистиці χ^2 для таблиць 2×2

$$\phi = \sqrt{\frac{\chi^2}{n}}, \quad (9.40)$$

де n – загальна кількість пар спостережень.

Значення коефіцієнта ϕ змінюються від 0 (немає залежності між змінними; $\chi^2 = 0$) до 1 (абсолютна залежність між двома факторами).

Коефіцієнт V Крамера (Cramer's V) є більш загальним показником і використовується для таблиць більшого розміру, коли верхня межа коефіцієнта ϕ може перевищити 1 і інтерпретація результатів ускладнюється

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(k-1)}} \quad (9.41)$$

У цій формулі k відповідає найменшому значенні із числа рядків і колонок у таблиці спряженості [37].

9.3.2. Розрахунковий метод рангової кореляції Спірмена

Припустимо, наприклад, що при вивченні залежності чисельності y приходу відпочиваючих на обід у їдальню бази відпочинку від часу x відкриття були отримані наступні два ряди даних, наведені в табл. 9.21 відповідно у рядках **B1:K1** і **B2:K2**.

У рядках **B3:K3** і **B4:K4** ці дані наведені у ранжованому вигляді.

Далі обчислюють різниці рангів в сполучених парах x і y , які подано в рядку **B3:K3**. Отримані значення підставляють в формулу (9.37) для обчислення коефіцієнту рангової кореляції ρ –Спірмена.

Таблиця 9.21. Розрахунок коефіцієнту кореляції ρ –Спірмена												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	x	3	7	4	9	3	4	4	8	1	6	
2	y	15	4	12	6	8	10	8	0	25	4	
3	x	8.5	3	6	1	8.5	6	6	2	10	4	Обсяг вибірки
4	y	2	8.5	3	7	5.5	4	5.5	10	1	8.5	
5	x-y	6.5	-5.5	3.0	-6.0	3.0	2.0	0.5	-8.0	9.0	-4.5	
6	Коефіцієнт кореляції Спірмена $\rho = -0.7939$											
7	Критичне значення коефіцієнту кореляції $r_{кр} = 0.7941$											
<div><div>B5=B3-B4</div><div>L5=СЧЁТ(B5:K5)</div><div>L6=1-6*СУММКВ(B5:K5)/(СЧЁТ(B5:K5)*(СЧЁТ(B5:K5)^2-1))</div><div>L7=2.58*(1-0.69/(L5-1))/(L5-1)^0.5</div></div>												

У нашому прикладі показник кореляції становить $\rho = -0.794$. Він має від'ємне значення, тобто з часом тих хто запізнився на обід стає менше.

Перевірка значущості (достовірності) коефіцієнту кореляції виконується визначенням критичного значення за формулою (9.6).

Так як отримано $r_{xy} = -0.7939 < r_{кр} = 0.7941$, наявність кореляційного зв'язку вважається статистично недостовірною.

9.3.3. Визначення кореляційних залежностей у неметричних шкалах і побудова матриць

Для ілюстрації визначимо кореляційні залежності і побудуємо матриці рангової кореляції при представленні змінних у порядковій шкалі (див. с. 352). У файл ППП **Statistica** вставлені дані 2004 р., подані у порядковій шкалі взяті з табл. 9.22. Вони є власне ранговим поданням числових даних, наведених у чарунках **P3:S103** табл. 2.11 (с. 96), використовуваних у підрозділі **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica** при оцінці кореляції Пірсона.

Таким чином, як вихідні використовуються іменовані дані, які характеризуються нормальним статистичним розподілом. Це зроблено навмисне щоб порівняти одержані показники різних видів кореляційної оцінки.

У меню **Statistics** / **Анализ** (1) запускаємо модуль **Nonparametrics** / **Непараметрическая статистика** (2) (рис. 9.11) і потрапляємо на панель **Nonparametric Statistics: Непараметрическая статистика:**.

На ній вибираємо опцію **Correlations (Spearman, Kendall tau, gamma)** / **Корреляции Спирмена, тау Кендалла, гамма** (3) і натиснувши на **ОК** (4) потрапляємо на панель **Nonparametric Correlation: Ранговые корреляции:**, де задаємо необхідний рівень значущості (5), натискаємо **Variables: Переменные:** (6) і на відкритій панелі **Select the variables for the analysis / Выберите переменные для анализа** задаємо необхідний рівень значущості (7) і натискаємо **ОК** (8) знову потрапляємо на панель **Nonparametric Correlation: Ранговые корреляции:**.

Тут вибираємо вигляду матриці **Square matrix / Квадратная матрица** (9) (окрім цього є змога вибрати **Matrix of two lists / Матрица двух списков** і **Detailed report / Подробный отчет**) і на вкладці **Advanced / Дополнительно** почерговим натисненням клавіш **Spearman rank R / Спирмена R** (10), **Gamma / Гамма** (11) і **Kendall Tau / Тау Кендалла** (12) отримуємо відповідно табл. 9.23, 9.24 і 9.25.

Запуском процедури **Scatterplot matrix for all variables / Матричная диаграмма** (13) маємо графічне представлення кореляційної матриці, наведене на рис. 9.12. Варто звернути увагу, що на рис. 9.12 кореляційну матрицю подано у редагованому вигляді, що зроблено з метою зручності їх порівнювання між собою та з рис. 16.31 на с. 1015.

Таблиця 9.22 – Ранги середніх біометричних показників колекції у 2004 р.

№ п.п.	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.
1	25	45	43	30
2	-13	28	-8	27
3	49	50	23	38
4	26	43	33	44
...
96	-28	3	-7	1
97	-42	-45	-18	-28
98	-17	-21	-9	-40
99	-31	11	-20	21
100	-40	-39	21	-27
101	-6	8	16	31




Рис. 9.11. Вибір команд для квадратної кореляційної матриці при обчисленні непараметричних критеріїв

Таблиця 9.23. Величини коефіцієнтів рангової кореляції ρ –Спірмена

Перем.	Ранговые корреляции Спирмена (Биометрия-П) ПД попарно удалены Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$			
	Висота рослини-2004П	Висота штамбу-2004П	Кількість гілок-2004П	Кількість стручків на гілці-2004П
Висота рослини-2004П	1.000000	0.284496	0.313442	0.229517
Висота штамбу-2004П	0.284496	1.000000	-0.117321	0.244380
Кількість гілок-2004П	0.313442	-0.117321	1.000000	0.317030
Кількість стручків на гілці-2004П	0.229517	0.244380	0.317030	1.000000

Таблиця 9.24. Коефіцієнти γ для рангового представлення показників

Перем.	Статистика Гамма (Биометрия-П) ПД попарно удалены Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$			
	Висота рослини-2004П	Висота штамбу-2004П	Кількість гілок-2004П	Кількість стручків на гілці-2004П
Висота рослини-2004П	1.000000	0.198416	0.223366	0.160000
Висота штамбу-2004П	0.198416	1.000000	-0.079208	0.171881
Кількість гілок-2004П	0.223366	-0.079208	1.000000	0.218218
Кількість стручків на гілці-2004П	0.160000	0.171881	0.218218	1.000000

Таблиця 9.25. Величини коефіцієнтів рангової кореляції τ –Кендалла

Перем.	Тау корреляции Кендалла (Биометрия-П) ПД попарно удалены Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$			
	Висота рослини-2004П	Висота штамбу-2004П	Кількість гілок-2004П	Кількість стручків на гілці-2004П
Висота рослини-2004П	1.000000	0.198416	0.223366	0.160000
Висота штамбу-2004П	0.198416	1.000000	-0.079208	0.171881
Кількість гілок-2004П	0.223366	-0.079208	1.000000	0.218218
Кількість стручків на гілці-2004П	0.160000	0.171881	0.218218	1.000000

Порівнюючи табл. 9.23–9.25 та рис. 9.12, розраховані для кореляції ρ –Спірмена, γ й τ –Кендалла при непараметричних розподілах досліджуваних показників із результатами оцінки за кореляцією Пірсона у табл. 9.10 та на рис. 2.21, с. 119 (у редагованому вигляді це рис. 16.31, с. 1015), бачимо, що незважаючи на числові відмінності результатів, загальний характер взаємного впливу досліджуваних показників вибірки оцінюється у всіх однаково.

Командою **Matrix of two lists** / **Матрица двух списков** одержуємо прямокутні матриці, описані вище у підрозділі **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica**. Застосування команди **Detailed report** / **Подробный отчет** при виділенні однакових списків змінних (рис. 9.13) дає змогу мати статистичну оцінку коефіцієнту кореляції ρ –Спірмена, γ й τ –Кендалла у вигляді, поданому в табл. 9.26.




Рис. 9.12. Графічне відображення кореляційної прямокутної матриці, отриманої за ранговими показниками

Цінність інформації, наведеної в табл. 9.26 полягає у тому, що в ній представлено p — фактичний рівень значущості t -критерію, який слід наводити спільно з коефіцієнтом кореляції (див. с. 504).

При натисненні кнопки **Scatterplot matrix for all variables** / **Матричная диаграмма** видається матрична діаграма, аналогічна представлений на рис. 9.12, але прямокутного вигляду.




Рис. 9.13. Застосування команди **Detailed report** / **Подробный отчет**

Таблиця 9.26. Статистична оцінка коефіцієнтів кореляції ρ –Спірмена для рангових значень показників

Пара перем.	Ранговые корреляции Спирмена (Биометрия-П) ПД попарно удалены Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$			
	Число набл.	Спирмена R	t(N-2)	p-уров.
Висота рослини-2004П & Висота рослини-2004П				
Висота рослини-2004П & Висота штамбу-2004П	101	0.284496	2.95272	0.003934
Висота рослини-2004П & Кількість гілок-2004П	101	0.313442	3.28421	0.001414
Висота рослини-2004П & Кількість стручків на гілці-2004П	101	0.229517	2.34630	0.020954
Висота штамбу-2004П & Висота рослини-2004П	101	0.284496	2.95272	0.003934
Висота штамбу-2004П & Висота штамбу-2004П				
Висота штамбу-2004П & Кількість гілок-2004П	101	-0.117321	-1.17545	0.242636
Висота штамбу-2004П & Кількість стручків на гілці-2004П	101	0.244380	2.50758	0.013783
Кількість гілок-2004П & Висота рослини-2004П	101	0.313442	3.28421	0.001414
Кількість гілок-2004П & Висота штамбу-2004П	101	-0.117321	-1.17545	0.242636
Кількість гілок-2004П & Кількість гілок-2004П				
Кількість гілок-2004П & Кількість стручків на гілці-2004П	101	0.317030	3.32597	0.001237
Кількість стручків на гілці-2004П & Висота рослини-2004П	101	0.229517	2.34630	0.020954
Кількість стручків на гілці-2004П & Висота штамбу-2004П	101	0.244380	2.50758	0.013783
Кількість стручків на гілці-2004П & Кількість гілок-2004П	101	0.317030	3.32597	0.001237
Кількість стручків на гілці-2004П & Кількість стручків на гілці-2004П				

9.4. КОРЕЛЯЦІЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

Коефіцієнт кореляції якісних показників обчислюють за формулою Д. Юлла [4]

$$r = \frac{n_1 \cdot (N_2 - n_2) - n_2 \cdot (N_1 - n_1)}{\sqrt{N_1 \cdot N_2 \cdot (n_1 + n_2) \cdot [N_1 + N_2 - (n_1 + n_2)]}}, \quad (9.42)$$

де n_1, n_2 – кількість об'єктів без досліджуваного показника відповідно першої і другої вибірки;

N_1, N_2 – обсяг першої і другої вибірки.

Приклад. До заміни культиваторних лап на мірному гоні з 137 бур'янів непідрізнаними виявилось 39, після заточки — зі 103 бур'янів було непідрізнаними лишилось тільки 4.

Необхідно визначити, чи достовірна зв'язок між зміною культиваторних лап і підрізанням бур'янів.

Визначення коефіцієнту кореляції з використанням формули (9.42) та оцінки його статистичної достовірності наведено в табл. 9.27.

У ній також поданий розрахунок статистичної значущості кореляційної залежності, виконуваний з використанням формул (9.11) і (9.7) та статистичної функції MS Excel **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** (див. с. 495).

Таблиця 9.27. Визначення кореляції якісних показників

	А	В	С
1	Показник	До заміни	Після заміни
2	Обсяг вибірки N_i , шт.	137	103
3	Відсутність явища n_i , шт.	39	4
4	Коефіцієнт кореляції r	0.32	
5	Похибка коеф. корел. s_r	0.061	
6	Емпіричний t -критерій	5.162	
7	Емпірична значущість p	5.16E-07	

У результаті розрахунку бачимо, що між заміною культиваторних лап і підрізанням бур'янів спостерігається помірна ($r=0.32$) статистично значуща ($p=5.16 \cdot 10^{-7} < \alpha=0.01$) кореляційна залежність.

$B4=(B3*(C2-C3)-(B2-B3)*C3)/(B2*C2*(B3+C3)*(B2+C2-B3-C3))^0.5$
 $B5=((1-B4^2)/(B2+C2-2))^0.5$ $B6=B4/B5$
 $B7=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(B6;B2+C2-2)$

9.5. КОРЕЛЯЦІЯ БІНАРНИХ ДАНИХ

Розглянемо випадок кореляції двох бінарних змінних, які мають лише дві градації і зазвичай позначаються як 0 і 1. Приклади таких змінних: стать (чоловічий, жіночий), освіта (середня, вища), тривожність (низька, висока), успішність (низька, висока) і т.д.

При вивченні зв'язків між бінарними змінними зазвичай будують чотирьохчарункові таблиці спряженості (табл. 9.28).

Тут: a – кількість проявів нижчої ознаки X для нижчої ознаки Y ;

b – верхньої ознаки X для нижчої ознаки Y ;

c – нижньої ознаки X для верхньої ознаки Y ;

d – верхньої ознаки X для верхньої ознаки Y .

У цьому випадку допустимо застосування ρ -Пірсона (9.2) безпосередньо до вихідних даних — двох бінарних змінних, які приймають значення 0 або 1, виміряним для всіх членів вибірки обсягом N . Результат застосування ρ -Пірсона до двох бінарним змінним називається “ ϕ -коефіцієнт спряженості”. При цьому застосовується формула, що суттєво спрощує розрахунки, але дає аналогічний результат

Таблиця 9.28				
Таблиця спряженості 2×2 .				
		Ознака X		Сума
		0	1	
Ознака Y	0	a	b	$a + b$
	1	c	d	$c + d$
Сума		$a + c$	$b + d$	N

$$\phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(b+c)(a+c)(b+d)}}. \quad (9.43)$$

Формулу легко запам'ятати на основі табл. 9.28: вона є часткою від ділення дискримінанту значень ознак на середньгеометричне їхніх сум.

Так як формула (9.43) алгебраїчно еквівалентна формулі (9.1) ϕ -коефіцієнт спряженості є просто коефіцієнтом кореляції r -Пірсона, обчислений для бінарних даних і його інтерпретація подібна інтерпретації r -Пірсона [123].

Розглянемо приклад [123]. Досліджувався зв'язок впливу підкормки на вилов при вудінні риби (X : 0 – без підкормки, 1 – з підкормкою) та результат закидання вудки: (Y : 1 – риба спіймана, 0 – не спіймана). Результати 12 закидання вудок про кожному з варіантів подано в табл. 9.29.

Таблиця 9.29 – Результат вудіння риби

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Показник	Номер закидання вудки													X		Разом			
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		0 1					
3		Умови вудіння X	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1		1	Y	0	3	2	5
4		Результат Y	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0		1		1	3	4	7
5	Q3=СЧЁТ(В3:F3)-R3 N8=КОРРЕЛ(В3:M3;B4:M4)												Разом		6	6	12			
6	Q4=СЧЁТ(G4:M4)-R4 N7=(Q3*R4-R3*Q4)/(Q5*R5*S3*S4)^0.5																			
7	Коефіцієнт спряженості $\phi= 0.1690$														R3=СУММ(B4:F4) R4=СУММ(G4:M4) S7=СУММ(Q3:R3) Q5=СУММ(Q3:Q4)					
8	Коефіцієнт кореляції Пірсона $r= 0.1690$																			
9	Критерій Стюдента емпіричний $t= 0.5423$																			
10	Прийнятий рівень значущості $\alpha= 0.05$																			
11	Двосторон. табличн. критерій Стюдента $t_{\tau}= 2.2622$																			
12	Двостор. емпірич. рівень значущості $p= 0.5995$																			
N9=N8/(((1-N8^2)/(СЧЁТ(В3:L3)-1))^0.5)																				
N11=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(N10;СЧЁТ(В3:L3)-2)																				
N12=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(N9;СЧЁТ(В3:L3)-1)																				

У ній же наведено і спряженість цих даних та визначення ϕ -коефіцієнта спряженості, виконане за виразом (9.43), та коефіцієнта кореляції r -Пірсона розрахований статистичною функцією MS Excel **КОРРЕЛ** (див. Додаток А).

Відзначимо, що у обох випадках результат становить $\phi=r=0.16903$, тобто маємо слабкий прямий взаємозв'язок (за шкалою Чеддока, табл. 9.1 на с. 492): підкормка риби при вудінні позитивно впливає на вилов. Таким чином результат отриманий при застосуванні ϕ -коефіцієнта спряженості (9.43) за бінарними даними і коефіцієнтом кореляції r -Пірсона (9.2) безпосередньо за вихідними даними співпадає.

В цій таблиці також наведено значення емпіричного t -критерію Ст'юдента, отриманого на основі формули (9.10), двосторонній табличний критерій Ст'юдента та двосторонній емпіричний рівень значущості p , знайдений для рівня значущості з числом ступенів вільності $\nu = N - 1$.

Перевірку правильності даних визначень, тобто її відповідність розрахункам з використанням ППП **Statistica** виконаємо одержанням докладної характеристики кореляційного зв'язку квадратної матриці (аналогічно табл. 9.13 на с. 510), наведене в табл. 9.30.

Таблиця 9.30. Докладна характеристика ϕ -коефіцієнту спряженості при кореляції бінарних даних

Пер.Х и Пер.У	Корреляции (Таблица данных1) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ (Построчное удаление ПД)										
	Среднее	Стд.откл	$r(X,Y)$	r^2	t	p	N	Св.член завис.У	Наклон завис.У	Св.член завис.Х	Наклон завис.Х
Умови вудіння	0.583333	0.514929									
Умови вудіння	0.583333	0.514929	1.000000	1.000000			12	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
Умови вудіння	0.583333	0.514929									
Результат вилову	0.500000	0.522233	0.169031	0.028571	0.542326	0.599470	12	0.400000	0.171429	0.500000	0.166667
Результат вилову	0.500000	0.522233									
Умови вудіння	0.583333	0.514929	0.169031	0.028571	0.542326	0.599470	12	0.500000	0.166667	0.400000	0.171429
Результат вилову	0.500000	0.522233									
Результат вилову	0.500000	0.522233	1.000000	1.000000			12	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000

З табл. 9.29 і 9.30 видно що значення фактичного критерію t -Стьюдента і рівня значущості p у обох випадках співпадають.

Але використання ϕ -коефіцієнта суттєво обмежене. Чим більша асиметрія розподілу 0 і 1 за кожною змінною, тим менш точно ϕ -коефіцієнт відображає зв'язок між бінарними змінними. Інакше кажучи, застосування ϕ -коефіцієнта вимагає приблизної рівності кількості 0 і 1 по кожній змінній [123].

Даний результат можна згідно з [36] записати у вигляді: “При аналізі дванадцяти пар бінарних даних між досліджуваними ознаками є наявний слабкий позитивний ϕ -коефіцієнт спряженості, який становить $\phi = 0.16903$ при довірчій імовірності $p = 0.05995$ ”.

9.6. ПОРІВНЯННЯ ДВОХ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ

9.6.1. Порівняння кореляцій незалежних вибірок

9.6.1.1. Розрахункове порівняння кореляцій незалежних вибірок

Перевірка статистичних гіпотез про рівність коефіцієнтів кореляції (одного знаку), отриманих у різних групах об'єктів дослідження дозволяє визначити стабільність даного взаємозв'язку.

Як приклад порівняємо коефіцієнт кореляції висоти рослини і кількості стручків на центральній гілці у дослідженнях 2004 і 2005 рр., тобто визначимо, чи випадкові їх відмінності. Відповідно до табл. 9.10, с. 507 у 2004 р. коефіцієнти кореляції становив 0.2651 при 101 зразку, за даними 2005 р. ці величини відповідно були 0.2494 і 140.

Перевірку нульової гіпотези про рівність коефіцієнтів кореляцій, тобто $H_0: r_1 = r_2$, можна виконувати за інтервальною чи точковою оцінкою. Результати розрахунку, виконані з використанням MS Excel із залученням t -критерій Стьюдента наведені в табл. 9.31.

Якщо ми просто хочемо узнати наявності різниці між коефіцієнтами, використовуємо двобічний t -критерій, представлений статистичними функціями **Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** і **СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х** (див. Додаток А).

Таблиця 9.31. Порівняння двох кореляцій точковим і інтервальним оцінюванням за t -критерієм

	A	B	C
1	Коефіцієнт кореляції r	0.2651	0.2494
2	Кількість зразків n	101	140
3	Значення z	0.2716	0.2548
4	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
5	Табличний критерій Стюдента t_r	1.9845	1.9774
6	Точкове оцінювання		
7	Різниця z_1-z_2	0.0168	
8	Похибка різниць s_{z1-z2}	0.1323	
9	Емпіричний критерій z_e (Стюдента)	0.1271	
10	Емпіричний рівень значущості p	0.8990	
11	Інтервальне оцінювання		
12	Квадратична похибка коефіцієнта s_z	0.1010	0.0854
13	Похибка результату вимірювання $t_{\alpha(v)r} \cdot s_z$	0.2005	0.1689
14	Нижній довірчий рівень $z-t_{\alpha(v)r} \cdot s_z$	0.0711	0.0858
15	Верхній довірчий рівень $z+t_{\alpha(v)r} \cdot s_z$	0.4720	0.4237

B3=ФИШЕР(B1) B5=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2X(B4;B2-3) B7=B3-C3
B8=(1/(B2-3)+1/(C2-3))^0.5 B9=B7/B8
B10=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2X(B9;B2+C2-3) B12=1/(B2-3)^0.5
B13=B5*B12 B14=B3-B13 B15=B3+B13

Для перевірки гіпотези про те, що один з коефіцієнтів значно більше іншого, слід вибрати одnobічний t -критерій — **СТЬЮДЕНТ.ОБР** і **СТЬЮДЕНТ.РАСП**.

Ми використовуємо двобічний тест, так як немає теоретичного обґрунтування того, що один із коефіцієнтів кореляції свідо́мо більше іншого.

При статистичному тесті нульова статистична гіпотеза перевіряється на відсутність відмінностей між коефіцієнтами кореляції. Якщо нульова гіпотеза

відхиляється, то слід прийняти альтернативну гіпотезу про існування відмінностей між коефіцієнтами кореляції. [5]

За результатами табл. 9.31 отримуємо, що за точковою перевіркою гіпотези про відсутність відмінностей між зазначеними коефіцієнтами кореляції, виконаною на основі формули (9.20), маємо $p = 0.8990$, тобто $p > \alpha$ — різниця між вибірками статистично не значуща з імовірністю 95 %, нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між коефіцієнтами кореляції не відхиляється — даний взаємозв'язок стабільний.

З інтервального оцінювання, виконаного на основі формул (9.14), (9.17), (9.19) і виразу (9.23), бачимо, що довірчі інтер-

Таблиця 9.32. Порівняння двох кореляцій точковим і інтервальним оцінюванням за нормальним розподілом

	А	В	С
1	Коефіцієнт кореляції r	0.2651	0.2494
2	Кількість зразків n	101	140
3	Значення z	0.2716	0.2548
4	Прийнятий рівень значущості α	0.05	
5	Табличний критерій z	1.9600	
6	Точкове оцінювання		
7	Різниця $z_1 - z_2$	0.0168	
8	Похибка різниць s_{z1-z2}	0.1323	
9	Емпіричне значення критерію z_e	0.1271	
10	Емпіричний рівень значущості p	0.8989	
11	Інтервальне оцінювання		
12	Квадратична похибка коефіцієнта s_z	0.1010	0.0854
13	Похибка результату вимірювання $z_a \cdot s_z$	0.1980	0.1675
14	Нижній довірчий рівень $z - z_a \cdot s_z$	0.0736	0.0873
15	Верхній довірчий рівень $z + z_a \cdot s_z$	0.4696	0.4222

B5=НОРМ.СТ.ОБР(1-C4/2)
B10=2*(1-НОРМ.СТ.РАСП(C9;ИСТИНА))

вали обох коефіцієнтів кореляції мають ряд відтинки однакових значень, що дає змогу також не відхиляти нульову гіпотезу.

Перевірку нульової гіпотези про рівність коефіцієнтів із залученням нормального розподілу (Z -розподілу), який застосовується при величинах вибірки $n \geq 100$ (див. с. 36), виконані з використанням **MS Excel**, наведені в табл. 9.32.

У цьому разі критичний рівень значущості знаходиться як подвійна площа справа від емпіричного значення критерію під кривою нормального розподілу [123]. Тобто наявні відмінності у лише в результатах, наведених в рядках **10, 14 і 15** табл. 9.31 і 9.32.

9.6.1.2. Порівняння кореляцій незалежних вибірок з використанням ППП Statistica

При застосуванні t -критерію для порівняння двох коефіцієнтів кореляції з використанням для тестової оцінки ППП **Statistica** у меню **Statistics/Анализ** вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables / Основные статистики и таблицы** (рис. 7.9), де на виниклій однойменній панелі використовуємо опцію **Difference tests: r, %, means/ Другие критерии значимости** і виходимо також на однойменну панель **Difference tests: r, %, means/ Другие критерии значимости**.

На вкладці **Difference between two correlation coefficients/ Сравнение двух коэффициентов корреляции** задаємо дані 2004–2005 рр., які на рис. 9.14 позначені відповідно **(1)** і **(2)**. Якщо ми просто хочемо узнати наявність різниці між коефіцієнтами чи немає теоретичного обґрунтування того, що один із коефіцієнтів кореляції свідо-домо більше іншого, застосовуємо двобічний тест **Two-sided/ Двусторонний (3)**, якщо необхідно перевірити гіпотезу про те, що один з коефіцієнтів значно більше іншого, то слід вибрати односторонній тест **One-sided/ Односторонний (3)** і розраховуємо його значення **Compute/Вычислить (4)**.

Одержані результати можна інтерпретуються таким чином: якщо $p > \alpha$, то нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між коефіцієнтами кореляції не відхиляється; якщо $p \leq \alpha$ — нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна про те, що коефіцієнти кореляції різні. Тобто розрахункові результати табл. 9.31 і використання ППП **Statistica** (рис. 9.14) співпадають.

У результаті обчислення значення при перевірці гіпотези про відсутність відмінностей між зазначеними коефіцієнтами кореляції маємо $p = 0.8990$, тобто $p > \alpha$ — різниця між вибірками статистично не значуща з імовірністю 95 %, нульова гіпотеза про відсутність відмінностей між коефіцієнтами кореляції не відхиляється — даний взаємозв'язок стабільний.

Результат, наведений на рис. 9.14 дещо відмінний від даних табл. 9.31 і відповідає табл. 9.32, що пояснюється використанням для оцінки нормального розподілу.

Рис. 9.14. Діалогове вікно для порівняння двох коефіцієнтів кореляції.

При текстовому або табличному представленні результатів оцінки слід наводити обсяг вибірок, подавати значення коефіцієнтів кореляції, указувати точну величину рівня значущості p , знайдену при порівнянні коефіцієнтів кореляції. [5]

9.6.2. Порівняння кореляцій залежних вибірок

Перевірка статистичних гіпотез про рівність коефіцієнтів кореляції (одного знаку), отриманих для залежних вибірок у різних групах об'єктів дослідження дозволяє визначити стабільність даного взаємозв'язку. Нульова гіпотеза сформульована як твердження про рівність між собою обох кореляцій, тобто $H_0: r_1 = r_2$.

Для статистичної перевірки подібних гіпотез використовується z -критерій, емпіричне значення якого розраховується за формулою [123]

$$z_e = \frac{(r_{xy} + r_{xz})\sqrt{n}}{\sqrt{(1-r_{xy}^2)^2 + (1-r_{xz}^2)^2 - 2r_{yz}^3 - (2r_{yz} - r_{xy} \cdot r_{xz})(1-r_{xy}^2 - r_{xz}^2 - r_{yz}^2)}} \quad (9.44)$$

Причому у цьому разі можуть розглядатися кореляції одного показника вибірки з двома іншими, чи одного пари показників двох вибірок. Для цих випадків порівнюються коефіцієнти кореляції r_{xy} та r_{xz} , чи $r_{x_1y_1}$ та $r_{x_2z_2}$, тобто зміну коефіцієнти кореляції зі зміною умов.

Як приклад для першого випадку розглянемо дані табл. 2.11, с. 96, порівнюючи коефіцієнти кореляції кількості стручків на центральній гілці з висотою рослини та штамбу, величини яких представлені в табл. 9.10, с. 507.

Хід розрахунків для t - і Z -розподілу, виконуваний за виразом (9.44) та виразами, наведеними на полі табл. 9.33.

За її даними бачимо, що рівень значущості p як для t -розподілу, так і для нормального перевищує прийнятий α , таким чином коефіцієнти кореляції порівнюваних вибірок статистично не різняться. Також практично не різняться між собою і значущості p для t - і нормального розподілу.

Слід відмітити, що при застосуванні для цих даних порівняння кореляцій незалежних вибірок (див. підрозділ 9.6.1 Порівняння кореляцій незалежних вибірок) отримуються *більш грубі результати* — рівень значущості p для t -розподілу становить 0.9970, тобто він більше за отримане нами в табл. 9.33 значення 0.9961. Тобто застосування для оцінки кореляцій залежних вибірок для оцінювання кореляцій незалежних вибірок може призвести до помилкового прийняття нульової гіпотези.

Таблиця 9.33. Порівняння двох кореляцій залежних вибірок за точковим оцінюванням

	А	В
1	Кількість зразків n	101
2	Коефіцієнт кореляції $r_{\text{стручки-висота}}$	0.2851
3	Коефіцієнт кореляції $r_{\text{стручки-штамб}}$	0.2846
4	Коефіцієнт кореляції $r_{\text{висота-штамб}}$	0.3981
5	Емпіричне значення критерію z_e	0.0048
6	Рівень значущості p t -розподілу	0.996139
7	Рівень значущості p норм.розподілу	0.996136

$B5=((B2-B3)*B1^{0.5})/((1-B2^2)^2+(1-B3^2)^2-2*B4^3-(2*B4-B2*B3)*(1-B2^2-B3^2-B4^2))^{0.5}$
 $B6=\text{СТЮДЕНТ.РАСП.2X}(B5;B1^{3-4})$
 $B7=2*(1-\text{НОРМ.СТ.РАСП}(B5;\text{ИСТИНА}))$

9.7. ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ КРИВОЛІНІЙНОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ

9.7.1. Кореляційне відношення

Криволінійна кореляція характеризується *кореляційним відношенням* η_{YX} , яке при оцінці результатів дисперсійного аналізу представляє собою силу впливу фактору η_{YX} (с. 647) і розраховується за формулою [50]

$$\eta_{YX} = \frac{s_{\bar{y}_i}}{s_y}, \quad (9.45)$$

де $s_{\bar{y}_i}$ – середній квадратичний відхил групових середніх;

s_y – середній квадратичний відхил функціональної ознаки y .

При цьому передбачається, що ознаки мають нормальний розподіл і знаходяться в статистичній залежності.

Таким чином воно визначається за виразом (9.46) [4, 132]

$$\eta_{YX} = \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{y})^2 - (Y - \bar{y}_x)^2}{\sum (Y - \bar{y})^2}}, \quad (9.46)$$

де Y – значення функціональної ознаки;

\bar{y} – середнє значення функціональної ознаки.

Проте, для розрахунків краще використовувати формулу (10.47).

При функціональній залежності Y від X кореляційне відношення дорівнює одиниці; якщо воно дорівнює нулю, то показує відсутність кореляції Y з X ; при проміжному характері кореляційної залежності кореляційне відношення знаходиться у межах $0 < \eta_{YX} < 1$.

Чим ближче η_{YX} до одиниці, тим сильніша функціональна залежність Y від X і чим ближче η_{YX} до нуля, тим вона слабкіша, причому $\eta_{YX} \neq \eta_{XY}$.

Відношення сум квадратів групового варіювання до загального, тобто η_{YX}^2 , має самостійне значення. Воно показує частку варіювання ознаки Y , обумовленої коливанням ознаки X . Ця величина, яка називається **індексом детермінації**, визначає відсоток варіації Y під впливом X (див. підрозділ **10.10.2 Метод Плохінського оцінки сили впливу факторів**).

При аналізі зв'язку ознак перевіряється нульова гіпотеза про відсутність криволінійних кореляційних зв'язків ознак $H_0: \eta_{YX} = 0$ (тобто $\eta_{YX} = 0$ — кореляційне відношення відсутнє) і обчислюється величина рівня значущості p . У цьому разі якщо $p > \alpha$, то незалежно від значення кореляційного відношенням η_{YX} нульова гіпотеза про те, що його значення дорівнює нулю, не відхиляється; при $p \leq \alpha$ нульова гіпотеза відхиляється, і приймається альтернативна гіпотеза про те, що значення кореляційного відношенням η_{YX} не дорівнює нулю. У цьому випадку його значення можна піддати інтерпретації.

При вивченні криволінійних кореляційних зв'язків і перевірці нульової гіпотези $H_0: \eta_{YX} = 0$ розрахунки вибірових статистичних показників виконуються за формулами (9.47) [34], (9.48) [50].

Стандартна (середньоквадратична) похибка $s_{\eta_{YX}}$ для η_{YX} дорівнює

$$s_{\eta_{YX}} = \sqrt{\frac{1 - \eta_{YX}^2}{n - 2}}. \quad (9.47)$$

$$s_{\eta_{YX}} = \frac{1 - \eta_{XY}^2}{\sqrt{n}}. \quad (9.48)$$

Для перевірки нульової гіпотези про відсутність зв'язку між двома змінними $H_0: \eta_{YX} = 0$ проти альтернативи $H_0: \eta_{YX} \neq 0$, тобто чи значимо відрізняється від нуля кореляційне відношення, використовується t -критерій Стьюдента, обчислюваний за формулою (9.49) [34] чи (9.51) [60]:

$$t = \frac{\eta_{XY}}{s_{\eta_{XY}}}. \quad (9.49)$$

Таблиця 9.34. Дані для визначення кореляційного відношення			
Подача, кг/год.	Енергоємність, кВт·год/т		
	I	II	III
390	64.1	64.9	63.0
512	55.8	56.3	57.4
700	45.0	46.8	43.2
865	42.1	41.8	41.1
1100	38.7	38.5	39.8

Кореляційне відношення вважається статистично значущим за умови $t \geq t_{\alpha(v)}$. Табличне значення t_t знаходяться для відповідного рівня значущості α і ступенів вільності $v = n - 2$, де n – обсяг вибірки.

Також з достатньою впевненістю можна його вважати істотним, коли при обсязі вибірки $n > 100$ воно перевершує свою похибку в 3 і більше разів, тобто коли $\eta: s_{\eta} = 3$ [50].


Перевірка нульової гіпотези $H_0: \eta_{YX} = 0$ проти альтернативи $H_0: \eta_{YX} \neq 0$ виконується за виразом (9.50) за критерієм Фішера [82]:

$$F = \frac{n - m}{m - 1} \cdot \frac{\eta_{XY}^2}{1 - \eta_{XY}^2}. \quad (9.50)$$

За умови $F \geq F_{кр}$ нульова гіпотеза відхиляється. Табличне значення $F_{кр}$ знаходяться для рівня значущості α і ступенів вільності $v_1 = m - 1$ та $v_2 = m - n$.

Умова $t \geq t_{кр}$ чи $F \geq F_{кр}$ свідчить про наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами.

Для ілюстрації розглянемо декілька прикладів визначення кореляційного від-



ношення η_{yx} .

У прикладі, наведеному в [125] на с. 42, розглядається залежність енергоемності гранулювання сінного борошна від продуктивності подачі, представлене трьома повторностями (табл. 9.34 і рис. 9.15).

Визначення кореляційного відношення ґрунтується на попередньому отриманні кінцевої таблиці (див. табл. 10.6 на с. 571) дисперсійного аналізу даних, представлених у табл. 9.35.

Таблиця 9.35. Визначення криволінійної кореляції за допомогою дисперсійного аналізу

	A	B	C	D	E	F	G
1	Варіант	Повторення				Середній квадрат суми	Сума квадратів
2		I	II	III	IV		
3	A	64	65	63		12288	12290
4	B	56	56	57		9577	9578
5	C	45	47	43		6075	6081
6	D	42	42	41		5208	5209
7	E	39	39	40		4563	4564
8	Середній квадрат суми		36358.8		Сума	37711	37722
9	C22=(C14-C15)*C16^2/((C15-1)*(1-C16^2))						
10	Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _ф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F _т
11	Загальне (разом) C _y	1363	14				
12	Варіантів C _v	1352	4	338.07	303.289	2.177E-10	3.4780
13	Залишок (похибка) C _z	11	10	1.11			
14	Обсяг вибірки		15	α= 0.05		t _т = 2.2281	
15	Кількість груп		5	C14=C12+C13+1 C15=C12+1			
16	Кореляційне відношення η		0.996	C17=((1-C16^2)/(C14+1))^0.5			
17	Похибка кореляц.відношення s _η		0.025	C21=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(C19;C14-2)			
18	Розрахункове t		39.713	C23=F.ОБР.ПХ(C19;C15-1;C14-1)			
19	Прийнятий рівень значущості α		0.05	C24=F.РАСП.ПХ(C22;C15-1;C14-1)			
20	Критичне значення t _{кр}		2.1604	C16=(B12/(B12+B13))^0.5			
21	Розрахунк.рівень значущості p		5.882E-15	C18=C16/C17			
22	Розрахунковий F-критерій		303.289				
23	Табличний F-критерій		3.112				
24	Розрахунк.рівень значущості p		1.992E-13				

Результати, наведені на її полі, отримані за формулами (9.46), (9.47), (9.49) і (9.50) та відповідними статистичними формулами ПА MS Excel, показують, що виконуються обидві умови $t \geq t_{кр}$ і $F \geq F_{кр}$, що свідчить про наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами.

При цьому слід звернути увагу на те, що варіанти для зручності подальшого дисперсійного аналізу в стовбці “Варіант” табл. 9.35 позначаються великими латинськими літерами. При дисперсійному аналізі з використанням ППП Statistica чи ПА Excel групуючу ознаку слід брати за цим стовбцем.

Звісно краще не розраховувати дані дисперсійного комплексу, а використати для цього відповідні інструменти ПА MS Excel (див. підрозділ 10.4.2 Використання інструменту **ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ** MS Excel при

однофакторному експерименті) чи ППП Statistica (див. підрозділ 10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica).

Приклад використання для цієї мети таблиці результатів дисперсійного аналізу, отриманої ППП Statistica представлено в табл. 9.36.

Таблиця 9.36. Визначення криволінійної кореляції за допомогою таблиці дисперсійного аналізу отриманої ППП Statistica

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_{ϕ}	Рівень значущості p
Вільний член	36358.82	1	36358.82	32618.56	0.000000
Варіантів C_v	1352.27	4	338.07	303.29	0.000000
Залишок (похибка) C_z	11.15	10	1.11		
Обсяг вибірки		15			
Кількість груп		5			
Кореляційне відношення η		0.996			
Похибка кореляц. відношення s_{η}		0.023			
Розрахункове t		44.057			
Прийнятий рівень значущості α		0.05			
Критичне значення $t_{кр}$		2.1604			
Розрахунк. рівень значущості p		1.540E-15			
Розрахунковий F -критерій		303.289			
Табличний F -критерій		3.112			
Розрахунк. рівень значущості p		1.992E-13			

Аналізуючи табл. 9.36 бачимо, що перевірка нульової гіпотези $H_0: \eta_{YX}=0$ проти альтернативи $H_0: \eta_{YX} \neq 0$ виконується згідно [82] за виразом (9.50) з подальшою оцінкою за критерієм Фішера уже виконана при дисперсійному аналізі. Таким чином доречна умова, що кореляційне відношення η_{YX} варто визначати лише за умови статистичної значущості фактору, виявленої при дисперсійному аналізі.

У прикладі, наведеному в [4] на с. 306, розглядається залежність норми висіву гороху та урожай зелених бобів, представлена даними експерименту без повторень чи лише середніми значеннями (табл. 9.37).

Тут слід зупинитися на одній особливості розрахунків, наведених в табл. 9.37 та на рис. 9.16 а), отриманих за методикою, викладеною в [4], а також і в [132] та [133] — щоб виконати визначення кореляційного відношення (відповідно провести дисперсійний аналіз) слід мати повторення, тому варіаційний ряд розбивається на 4–7 груп — варіант диспер-

Таблиця 9.37. Дані для визначення кореляційного відношення

Норма висіву, ц/га	Урожайність, ц/га		
	загальні дані	I варіант	II варіант
0.8	44	44	
1.0	56		56
1.2	62	62	
1.4	74		74
1.6	88	88	
1.8	94		94
2.0	91	91	
2.2	79		79
2.4	69	69	
2.6	53		53

сійного аналізу (табл. 9.37), які, як сказано вище, для зручності подальшого дисперсійного аналізу позначаються великими латинськими літерами. У кожній з них за умови виконання дисперсійного аналізу повинно бути не менше двох спостережень (рис. 9.16 б).




Рис. 9.16. Характер кривих для визначення кореляційного відношення
а – загальні дані; б – дані розділені на два варіанти.

Далі, як і у попередньому прикладі, для розрахунку використовуємо таблиці результатів дисперсійного аналізу, отриманої ППП **Statistica** представлено в табл. 9.36. На відміну від табл. 9.36 розрахунки за виразом (9.50) з подальшою оцінкою за критерієм Фішера тут і далі вже не наводяться.

Результати розрахунків, наведені на її полі, показують, що виконуються обидві умови $t \geq t_{кр}$ і $F \geq F_{кр}$, що свідчить про наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами.

Таблиця 9.38. Визначення криволінійної кореляції за допомогою таблиці дисперсійного аналізу отриманої ППП **Statistica**

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ф	Рівень значущості p
Вільний член	50410.00	1	50410.00	696.2707	0.000001
Варіантів C_v	2292.00	4	573.00	7.9144	0.021705
Залишок (похибка) C_z	362.00	5	72.40		
Обсяг вибірки		10			
Кількість груп		5			
Кореляційне відношення η		0.929			
Похибка кореляц. відношення s_{η}		0.111			
Розрахункове t		8.345			
Прийнятий рівень значущості α		0.05			
Критичне значення $t_{кр}$		2.3060			
Розрахунк. рівень значущості p		3.217E-05			

Розглянемо ще один приклад ¹¹⁾.

Величина продуктивності гірничих комбайнів (розмір видобутку на один вихід) у залежності від довжини лави характеризується даними з параболічною залежністю, наведеними в табл. 9.39 і рис. 9.17 а).

Згрупувавши дані за довжиною лави у межах 55–95 і 105–145 м, оцінити тісноту взаємозв'язку параболічної залежності.

Тут слід звернути увагу, що на відміну від попереднього прикладу (табл. 9.37 і рис. 9.16 б) групування, тобто розбивка вибірки на повторення виконується простим діленням її на частини — варіанти повторення — у даному випадку два, як показано в табл. 9.39 і на рис. 9.17 б).

При визначенні кореляційного відношення η_{YX} , виконаного в табл. 9.40 шляхом отриманні кінцевої таблиці дисперсійного аналізу (див. табл. 10.6 на с. 571).

При цьому слід звернути увагу на різницю у формування табл. 9.40 і табл. 9.35.

Таблиця 9.39. Дані для визначення кореляційного відношення

Довжина лави, м	Продуктивність		
	загальні дані	I варіант	II варіант
55	1.74	1.74	
65	2.02	2.02	
75	2.12	2.12	
85	2.05	2.05	
95	2.17	2.17	
105	2.74		2.74
115	2.4		2.4
125	2.48		2.48
135	2.5		2.5
145	2.39		2.39




Рис. 9.17. Характер кривих для визначення кореляційного відношення
а – загальні дані; б – дані розділені на два варіанти.

Далі, як і у попередньому прикладі, для розрахунку використовуємо таблиці результатів дисперсійного аналізу, отриманої ППП **Statistica** представлено в табл. 9.41.

¹¹⁾ див. <http://allrefrs.ru/3-3501.html>

Результати розрахунків, наведені на її полі, показують, що виконуються обидві умови $t \geq t_{кр}$ і $F \geq F_{кр}$, що свідчить про наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами.

Додатково розглянемо тут ще два питання.

Перше про визначення криволінійної кореляції за допомогою багатфакторного дисперсійного аналізу.

Результати визначення криволінійної кореляції за допомогою трифакторного ДА з використанням **Statistica** представлено в табл. 9.42.

Для порівняння у нижній частині табл. 9.42 подано результати, отримані за однофакторними дисперсійними аналізами, у тому числі з табл. 9.43.

Таблиця 9.40. Визначення криволінійної кореляції за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу

Варіант	Повторення					Середній квадрат суми	Сума квадратів
	I	II	III	IV	V		
A	1.74	2.02	2.12	2.05	2.17	20.402	20.514
B	2.74	2.40	2.48	2.50	2.39	31.300	31.380
Середній квадрат суми		51.121			Сума	51.702	51.894

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_т
Загальне (разом) C_y	0.773	9				
Варіантів C_v	0.581	1	0.581	24.216	0.001163	6.6079
Залишок (похибка) C_z	0.192	8	0.024			
Обсяг вибірки		10	α= 0.05		t _т = 2.3060	
Кількість груп		2				
Кореляційне відношення η		0.867				
Похибка кореляц. відношення s _η		0.150				
Розрахункове t		5.770				
Прийнятий рівень значущості α		0.05				
Критичне значення t _{кр}		2.3060				
Розрахунк.рівень значущості p		4.191E-04				
Розрахунковий F-критерій		24.216				
Табличний F-критерій		5.117				
Розрахунк.рівень значущості p		8.236E-04				

З них бачимо, що результати, отримані за багатфакторними експериментом дає дещо завищені значення кореляційних відношень η_{yx} порівняно з результатами однофакторних дисперсійних аналізів. Це у першу чергу пояснюється меншою сумою квадратів похибки при дисперсійному аналізі багатфакторного експерименту.

Таблиця 9.41. Визначення криволінійної кореляції за допомогою таблиці дисперсійного аналізу отриманої ППП **Statistica**

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ф	Рівень значущості p
Вільний член	51.12121	1	51.12121	2131.383	0.000000
Варіантів C_v	0.58081	1	0.58081	24.216	0.001163
Залишок (похибка) C_z	0.19188	8	0.02399		
Обсяг вибірки		10			
Кількість груп		2			
Кореляційне відношення η		0.867			
Похибка кореляц. відношення s_η		0.150			
Розрахункове t		5.770			
Прийнятий рівень значущості α		0.05			
Критичне значення t_{кр}		2.3060			
Розрахунк. рівень значущості p		4.191E-04			

Таблиця 9.42. Визначення криволінійної кореляції за допомогою трифакторного дисперсійного аналізу

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ф	Рівень значущості p
Вільний член	47.10745	1	47.10745	13192.00	0.000000
Температура ґрунту	2.61412	2	1.30706	366.03	0.000000
Норма висіву насіння	0.50633	4	0.12658	35.45	0.000000
Ширина міжряддя	0.30865	2	0.15432	43.22	0.000000
Залишок (похибка)	0.12855	36	0.00357		
Показник	Температура ґрунту	Норма висіву насіння	Ширина міжряддя		
Обсяг вибірки	45	45	45		
Кількість груп	3	5	3		
Кореляційне відношення η	0.976	0.893	0.840		
Похибка кореляц. відношення s_η	0.032	0.066	0.080		
Розрахункове t	30.584	13.460	10.509		
Прийнятий рівень значущості α	0.05	0.05	0.05		
Критичне значення t_{кр}	2.0167	2.0167	2.0167		
Розрахунк. рівень значущості p	8.229E-31	5.110E-17	1.871E-13		
Результати за однофакторним дисперсійним аналізом					
Кореляційне відношення η	0.857	0.377	0.295		
Похибка кореляц. відношення s_η	0.076	0.137	0.141		
Розрахунк. рівень значущості p	1.919E-14	8.399E-03	4.253E-02		

Друге питання — визначення кореляційного відношення η_{yx} при статистичній незначущості фактору, виявленого при дисперсійному аналізі, як наприклад, у табл. 9.43.

Таблиця 9.43. Визначення криволінійної кореляції за допомогою таблиці дисперсійного аналізу отриманої ППП **Statistica**

Варіант	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ф	Рівень значущості p
Вільний член	47.10745	1	47.10745	617.5347	0.000000
Норма висіву насіння	0.50633	4	0.12658	1.6594	0.178465
Залишок (похибка)	3.05132	40	0.07628		
Обсяг вибірки		45			
Кількість груп		5			
Кореляційне відношення η		0.377			
Похибка кореляц. відношення s_{η}		0.137			
Розрахункове t		2.763			
Прийнятий рівень значущості α		0.05			
Критичне значення $t_{кр}$		2.0167			
Розрахунк. рівень значущості p		8.399E-03			

Її результати показують, що виконуються лише умова $t \geq t_{кр}$ — кореляційне відношення η_{YX} значимо відрізняється від нуля, а так як має місце $F < F_{кр}$ наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами не підтверджується.

При цьому слід звернути увагу, що з використанням за оцінкою η_{YX} з використанням багатфакторного дисперсійного аналізу має місце $F > F_{кр}$ — наявність суттєвого нелінійного зв'язку між досліджуваними факторами підтверджується.

Значення кореляційного відношення η_{YX} записується аналогічно поданому на с. 498, разом із його похибкою (похибкою середнього) у вигляді $\eta_{YX} \pm s_{\eta_{YX}}$ та рівнем значущості p [50], а при поданні *результатів* — $r \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{\eta_{YX}}$ з наведенням довірчого рівня значущості α [34].

9.7.2. Оцінка елементів криволінійного кореляційного зв'язку

При кореляційному аналізі характер зв'язку між ознаками часто вдається визначити по зміні групових середніх. Більш-менш правильне, систематичне зміна їх від групи до групи (тобто збільшення або зменшення) свідчить про лінійну залежність. У таких випадках необхідність в обчисленні η відпадає. Якщо ж характер зміни групових середніх вказує на криволінійну залежність, тоді для характеристики тісноти зв'язку обчислюється кореляційне відношення за різницею $\eta - r$; чим вона більша, тим, більша криволінійна залежність між ознаками.

Але так як ці обидва коефіцієнта отримані статистично і схильні до випадкових коливань, які можуть бути одно- і різнозначний, необхідно в кожному окремому випадку об'єктивно оцінити, наскільки η відрізняється від r , тобто, визначити можливі межі випадкових коливань різниці $\eta-r$ [50].

Таку перевірку проводять за допомогою *критерію криволінійності* [60] з використанням t -критерію

$$t = \frac{\eta_{XY}^2 - r^2}{s_{\eta^2-r^2}}. \quad (9.51)$$

де η_{YX}^2 – індекс детермінації;
 r^2 – коефіцієнт детермінації;
 $s_{\eta^2-r^2}$ – похибка різниці квадратів.

У формулі (9.51) подано показник криволінійності ξ , який служить *мірою нелінійності кореляційного зв'язку*, і похибку різниці квадратів $s_{\eta^2-r^2}$, які відповідно представлені формулами (9.52) і (9.53) [50]

$$\xi = \eta_{YX}^2 - r^2, \quad (9.52)$$

$$s_{\eta^2-r^2} = \frac{2\sqrt{[(\eta_{XY}^2 - r^2) - (\eta_{XY}^2 - r^2)^2](2 - \eta_{XY}^2 - r^2)}}{\sqrt{n}}. \quad (9.53)$$

За умови $t \geq t_{\alpha(v)}$ нульова гіпотеза про відсутність криволінійних кореляційних зв'язків $H_0: \eta_{YX} = 0$ відхиляється на прийнятому рівні значущості α .

Нижня η_{YX1} і верхня η_{YX2} межа довірчого інтервалу для η_{YX} становить

$$\eta_{YX1} = \eta_{YX} - t_{\alpha(v)} \cdot s_{\eta_{YX}} \quad \text{і} \quad \eta_{YX2} = \eta_{YX} + t_{\alpha(v)} \cdot s_{\eta_{YX}}, \quad (9.54)$$

де $t_{\alpha(v)}$ – значення t -критерію для числа ступенів вільності $v = n - 2$ і заданого рівня значущості α .

Для визначення ступеня наближення криволінійної залежності до прямолінійної використовується F -критерій, який розраховується за виразом [34]

$$F = \frac{\eta_{XY}^2 - r^2}{1 - \eta_{XY}^2} \cdot \frac{N - k}{k - 2}, \quad (9.55)$$

де N – обсяг вибірки;
 k – число груп розбивки.

Якщо число груп розбивки k попередньо не задано певними умовами, наприклад, виконанням дисперсійного чи регресійного аналізу, то воно визначається згідно підрозділу **1.2.1 Структурне групування значень варіаційного ряду** (зазвичай береться 4–7 груп) щоб кожна з них, як і при дисперсійному аналізі (див. підрозділ **10.1 Основні положення дисперсійного аналізу**), мала дві і більше градації.

У формулі (9.55) подано показник криволінійності ξ і похибку індексу детермінації s_{η^2} , які відповідно представлені виразами (9.52) [60] і (9.56) [34]

$$s_{\eta^2} = (1 - \eta_{XY}^2) \frac{k - 2}{N - k}. \quad (9.56)$$

Зв'язок практично можна прийняти лінійним (нульову гіпотезу $H_0: (\eta_{YX} - r) = 0$ про відсутність криволінійних кореляційних зв'язків ознак) при $F < F_T$, і визначати показники *для прямолінійної кореляції і регресії*. Кореляція нелінійна, якщо $F \geq F_T$ [34]. Табличне значення F_T знаходяться для відповідного рівня значущості α і ступенів вільності $\nu_1 = k - 2$ та $\nu_2 = N - k$.

Як приклад розглянемо залежність продуктивності (кг/год.) виробництва паливних брикетів від їх щільності (кг/м³), представлену в табл. 9.44. Обсяг вибірки складає 42 заміри ($N=42$), розбитого на 14 груп ($k=14$), тобто з триразовою повторністю.

Таблиця 9.44. Залежність продуктивності виробництва паливних брикетів від їх щільності.

№ п.п.	Щільність брикетів, кг/м ³	Продуктивність, кг/год.	Щільність брикетів, кг/м ³	Продуктивність, кг/год.	Щільність брикетів, кг/м ³	Продуктивність, кг/год.
1	395	210	539	260	655	282
2	395	198	549	235	655	269
3	395	192	549	251	693	287
4	459	207	549	271	693	316
5	459	220	572	278	693	275
6	459	237	572	257	740	306
7	480	249	572	241	740	289
8	480	232	611	288	740	266
9	480	218	611	263	745	307
10	526	241	611	258	745	283
11	526	223	636	285	745	275
12	526	255	636	267	801	311
13	539	233	636	253	801	273
14	539	236	655	245	801	282

За допомогою дисперсійного аналізу (див. нижче підрозділи **10.4.1 Розрахунковий метод із використанням пакету аналізу MS Excel**,

10.4.2 Використання інструменту ДИСПЕРСИОННИЙ АНАЛІЗ MS Excel при однофакторному експерименті та 10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica) і подальших розрахунків за формулою (10.47) визначаємо індекс детермінації η^2 та кореляційне відношення η (див. підрозділ **10.10 Оцінка сили впливу факторів**) та за формулами (9.47)–(9.56) інші статистичні показники (табл. 9.45).

Було отримано емпіричне значення F менше одиниці (чарунка B15), тому виконуються дії описані в підрозділі **10.5.1.1 Застосування пакету Excel при двофакторному ДА без повторення** на с. 589.

Так як умова $t_{(v)}_{\Phi} = 96.639 > t_{\alpha(v)} = 2.201$ виконується, нульова гіпотеза $H_0: (\eta_{YX} - r) = 0$ про рівність між η_{YX} і r відхиляється, криволінійний кореляційний зв'язок істотний і *кореляційне відношення* η_{YX} вважається статистично значущим на рівні $\alpha = 0.05$.

Значення кореляційного відношення η прийнято записувати аналогічно поданому на с. 504) разом із його похибкою (похибкою середнього) у вигляді $\eta \pm s_{\eta}$ та рівнем значущості p [50].

У даному випадку кореляційне відношення становить $\eta_{YX} = 0.898 \pm 0.019$ з фактичним рівнем значущості $p = 4.978 \cdot 10^{-49}$, тобто $p < \alpha$. Нульова гіпотеза відхиляється і приймається альтернативна про те, що значення кореляційного відношенням η_{YX} не дорівнює нулю.

Але з огляду на те, що $F = 1.855 < F_{\tau} = 2.426$, кореляційний зв'язок з рівнем значущості $\alpha = 0.05$ можна вважати лінійним і визначати показники для прямолінійної кореляції і регресії ¹²⁾.

¹²⁾ Тут і далі у підрозділах **11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатофакторного активного експерименту і 11.11.1 Отримання і оцінка математичної моделі багатофакторного активного експерименту** за приклад взяті дещо змінені для більшої наочності дані, наведені в роботі: Обоснование конструктивных параметров и режимов работы прессбрикетирующего для утилизации растительных материалов: дисс...канд. техн. наук: спец. 05.20.01 / Бакарджиев Роман Александрович / Мелитополь, 1997. – 168 с.

Таблиця 9.45. Визначення показників криволінійної кореляції за допомогою дисперсійного аналізу інструментом **Excel**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Источник вариации	SS	df	MS	F	P- Значение	F критическое	Индекс детерминации η^2	Кореляційне відношення η
1									
2	Между группами	2461376.68	1	2461376.679	343.509	4.678E-31	3.957388322	0.807289833	0.898493
3	Внутри групп	587561.357	82	7165.382404					
4	Итого	3048938.04	83						
5	Кількість замірів n	42		$\alpha = 0.05$		$t_{\alpha} = 2.0211$			
6	Кількість груп m	14							
7	Стандартна похибка s_{η}	0.0093							
8	Критерій Стюдента t	96.639							
9	Рівень значущості, p	4.978E-49							
10	Довірчий інтервал $t \cdot s_{\eta}$	0.019							
11	Коефіцієнт кореляції r	0.980							
12	Коефіцієнт детермінації D	0.961							
13	Показник криволінійності ξ	0.153							
14	Похибка індексу детермінації s_{η^2}	0.083							
15	Розрахунковий критерій Фішера F_p	1.855							
16	Табличний критерій Фішера F_t	2.118							
17	Рівень значущості, p	0.124							

$H2=B2/B4$
 $B7=2*((B13-B13^2)*(2-H2-B12)/B5^0.5)$
 $B9=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2X(B8;B5-2)$
 $B13=(H2-B12)$
 $B15=B13/B14$
 $B17=FRASP(B15;B6-2;B5-B6)$

$I2=(B2/B4)^0.5$
 $B10=B7*G5$
 $B12=B11^2$

$B8=I2/B7$
 $B10=B7*G5$
 $B12=B11^2$

$B14=(1-H2)*(B6-2)/(B5-B6)$
 $B16=FRASПОБР(E5;B5-2;B6-2)$

На рис. 9.18 представлено лінійну (1) функціональну залежність з довірчим еліпсом і довірчими межами та параболічну (2) залежність.




Рис. 9.18. Залежність продуктивності Q виробництва паливних брикетів від їх щільності ρ :

1 – лінійна; 2 – квадратична залежність.

З рис. 9.18 видно, що параболічна залежність для досліджуваних значень аргументу практично лежить в довірчих межах лінійної залежності, що саме і підтверджує зроблений вище висновок.

9.7.3. Оцінки криволінійності кореляційного зв'язку критерієм Блекмана

Слід мати на увазі, що F -критерій не універсальний і не у всіх випадках придатний для отримання цілком надійної інформації про форму зв'язку між корельованими ознаками.

Тому поряд з F -критерієм Фішера при перевірці гіпотези про форму зв'язку між змінними величинами застосовують більш прості критерії. Один з них ґрунтується на оцінці показника криволінійності ξ , (див. (9.52), яка виражена умовою (9.57))

$$\xi = \eta_{YX}^2 - r^2 \geq 0.1, \quad (9.57)$$

Зв'язок вважається криволінійним, якщо показник криволінійності ξ дорівнює чи перевищує 0.1 [134].

За даними попереднього підрозділу (табл. 9.45, чарунка **B12**) маємо $\xi=0.153$, тобто $\xi > 0.1$. Таким чином зв'язок вважається криволінійним на відміну від розрахунків за F -критерієм, отриманих у попередньому підрозділі.

Більш строгим є також досить простий критерій Блекмана [15, 134]

$$B = N(\eta_{YX}^2 - r^2) \geq 11.37. \quad (9.58)$$

При наявності лінійного зв'язку цей показник не перевищує 11.37, тобто $N \cdot \xi < 11.37$ таким чином нульову гіпотезу $H_0: (\eta_{YX} - r) = 0$ про лінійної зв'язку між досліджуваними ознаками не враховувати не можна.

Якщо ж зв'язок між ознаками нелінійний, то $N \cdot \xi \geq 11.37$, то нульова гіпотеза відхиляється.

Однак при застосуванні критерію Блекман і Фішера можна одержати два протилежних результату. У цьому разі для більш точної оцінки нульової гіпотези $H_0: (\eta_{YX} - r) = 0$ використовується регресійний аналіз [15] (див. розділ **11 Регресійний аналіз. Планування і обробка результатів експериментальних досліджень**).

Згідно більш точного критерію Блекмана за результатами табл. 9.45 маємо $B = 42 \cdot 0.153 = 6.246 < 11.37$, тобто нульова гіпотезу $H_0: (\eta_{YX} - r) = 0$ про лінійний зв'язок між досліджуваними ознаками не спростовується, що відповідає результатам розрахунків за F -критерієм, отриманим у попередньому підрозділі.

9.8. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

Для обґрунтування використання для статистичних оцінок більш надійних параметричних методів слід виконати перевірку показників колекції і сорту-стандарту на відповідність умовам нормального розподілу. Це виконується із застосуванням рекомендованого міжнародним-стандартом ІСО 3479–97 критерію Шапіро–Уїлка [74].

Результати оцінювання досліджуваних параметрів колекції сортозразків і сорту-стандарту за роки випробувань наведено у табл. 9.47.

З неї видно, що умовам нормальності для колекції не відповідають показники висоти рослин. Таким чином при оцінюванні його взаємодії з іншими показниками повинні використовуватися непараметричні методи.

Виходячи з того, що лінійна кореляція Пірсона є параметричною оцінкою, вона не може застосовуватися для колекції при кореляційній оцінці кількості гілок на рослині і стручків на центральній гілці з висотою рослини.

Тому у табл. 9.46 для колекції наведено крім величини лінійних кореляційних коефіцієнтів Пірсона також і коефіцієнти непараметричної рангової кореляції ρ -Спірмена та для сорту-стандарту величини лінійних кореляційних коефіцієнтів Пірсона. Всі вони представлені прямокутними матрицями, отриманими за допомогою ППП **Statistica** аналогічно табл. 9.12, с. 510 і табл. 9.23, с. 527. Так як у матриці рангової кореляції ρ -Спірмена статистична

оцінка не наводиться, вона подана окремо у табл. 9.48, отриманій аналогічно табл. 9.26 на с. 529.

Таблиця 9.47 – Результати оцінювання показників колекції і сорту–стандарту на відповідність нормальному розподілу.			
Найменування показника	Обєм вибірки	Критерій Шапіро–Уїлка	
		величина W	рівень значущості p
Колекція			
Висота рослини	239	0.9798	0.0018
Висота штамбу	239	0.9860	0.0614
Кількість гілок	239	0.9834	0.0612
Кількість стручків	239	0.9905	0.1185
Сорт–стандарт			
Висота рослини	27	0.9606	0.3817
Висота штамбу	27	0.9556	0.2918
Кількість гілок	27	0.9498	0.2122
Кількість стручків	27	0.9631	0.4342

Таблиця 9.46 – Показники кореляції взаємозалежності морфологічних показників колекції і сорту-стандарту		
Колекція		
лінійна кореляція Пірсона		
Variable	Correlations (Кореляція) Marked correlations are significant at $p < .05000$ N=239 (Casewise deletion of missing data)	
	Кількість гілок-К	Кількість стручків-К
Висота рослини-К	-.3300 $p=.000$	-.2724 $p=.000$
Висота штамбу-К	-.0461 $p=.478$.2864 $p=.000$
рангова кореляція ρ -Спірмена		
Variable	Spearman Rank Order Correlations (Кореляція) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at $p < .05000$	
	Кількість гілок-К	Кількість стручків-К
Висота рослини-К	-.0363764	-.0313649
Висота штамбу-К	-0.016054	0.309679
Сорт-стандарт		
лінійна кореляція Пірсона		
Variable	Correlations (Кореляція) Marked correlations are significant at $p < .05000$ N=27 (Casewise deletion of missing data)	
	Кількість гілок-С	Кількість стручків-С
Висота рослини-С	-.6984 $p=.000$	-.4248 $p=.027$
Висота штамбу-С	-.3631 $p=.063$.0604 $p=.765$

З табл. 9.46 видно відсутність статистично значущої кореляції кількості гілок з висотою штамбу як для колекції, так і для сорту-стандарту, та кількості стручків з висотою штамбу для сорту-стандарту. Між іншими показниками наявна пряма статистично значуща слабка та помірна кореляція між досліджуваними показниками колекції і помірна та помітна у сорту-стандарту.

Таблиця 9.48 – Статистична оцінка коефіцієнтів кореляції
 ρ –Спірмена для рангових значень показників

Pair of Variables	Spearman Rank Order Correlations (Кореляція) MD pairwise deleted Marked correlations are significant at $p < .05000$			
	Valid N	Spearman R	t(N-2)	p-level
Висота рослини-К & Кількість гілок-К	239	-0.363764	-6.01195	0.000000
Висота рослини-К & Кількість стручків-К	239	-0.313649	-5.08518	0.000001
Висота штамбу-К & Кількість гілок-К	239	-0.016054	-0.24718	0.804984
Висота штамбу-К & Кількість стручків-К	239	0.309679	5.01393	0.000001

Тому у табл. 9.49 наведено величини лінійних кореляційних коефіцієнтів Пірсона для взаємозалежностей біометричних нормально розподілених показників колекції і взаємозалежності між коефіцієнти непараметричної рангової кореляції ρ –Спірмена, отриманих за даними табл. 9.46 і 9.48.

Таблиця 9.49 – Показники кореляції Пірсона для взаємозалежності морфологічних показників колекції у 2014 р.

Найменування показника	Кількість гілок на рослині	Кількість стручків на центральній гілці
Висота рослини *)	-0.364 $p=6.878E-09$	-0.314 $p=7.462E-07$
Висота штамбу	-0.461 $p=0.478$	0.2864 $p=0.0001$
*) У даному рядку наведені значення кореляції Спірмена.		

Істотною відмінністю коефіцієнтів кореляції показників колекції за табл. 9.49 і сорту–стандарту за табл. 9.46 є суттєва відмінність за величиною і статистичною значущістю взаємодії показника кількості стручків на центральній гілці з висотою штамбу.

Порівняємо отримані результати перевіркою статистичних гіпотез про рівність коефіцієнтів кореляції, тобто визначимо, чи випадкові їх відмінності використовуючи ППП **Statistica**, який виконує точкову оцінку відмінності із застосуванням t –критерію Стьюдента при використанні ППП **Statistica**, як описано у підрозділі **9.6 Порівняння двох коефіцієнтів кореляції** і проілюстровано рис. 9.14 на с. 535.

За результатами порівняння відмінностей коефіцієнтів кореляції розрахунковий показник статистичної значущості становить 0.2754, тобто перевищує прийнятий нами p ’ятивідсотковий рівень значущості. Таким чином з імовірністю 95 % можна вважати що взаємозалежності між даними показниками сортозразків у колекції і сорту–стандарту не мають статистично значущих відмінностей, характер взаємозв’язків даних показників колекції можна вважати стабільними для всієї досліджуваної культури.

10. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

10.1. Основні положення дисперсійного аналізу

Дисперсійний аналіз (англійською мовою *Analysis Of Variance* або скорочено *ANOVA*), у нашому скороченні ДА — статистичний метод виявлення ймовірності дії факторів (чинників), які впливають на властивості досліджуваного об'єкта. Його метою є отримання загальної оцінки відмінності порівнюваних варіантів за досліджуваними показниками (факторами) [9].

Вперше дисперсійний аналіз (ДА) був розроблений американським статистиком Робертом Фішером (1925) для аналізу результатів агротехнічних дослідів і потім вдосконалений багатьма його послідовниками [135].

В основі ДА лежить припущення про те, що одні змінні можуть розглядатися як причини (фактори, незалежні змінні), а інші як наслідки (залежні змінні). Таким чином, виходячи з цього, при описі результатів ДА ми будемо говорити про наявність залежності між залежною і незалежною змінною.

Вихідним матеріалом для ДА є дані дослідження трьох і більше вибірок, які можуть бути як рівними, так і нерівними за чисельністю, як зв'язковими, так і незв'язними, але мати дві і більше градації.

Обов'язковою умовою ДА є представлення залежної змінної в шкалі відношень, інтервалів або порядковій, а чинники мали б нечислову природу (в номінальній або категоріальній шкалі). Залежна змінна розглядається як змінюється під впливом незалежних змінних.

Для з'ясування величини ймовірності дії фактору він повинен бути розбитим на **دوزи** або види впливу. У ДА, як методі математичної статистики, їх називають **рівнями**, або **градаціями**. У сільському господарстві такі розбивки називають **варіантами** дослідів. Кількість рівнів фактору, тобто варіантів дослідів, які представляють собою **повторення**, повинно бути не менше двох, де один із варіантів може розглядатися як контроль, або стандарт, але на розрахункову процедуру це не впливає. Таке виділення контролю робиться тільки для зручності інтерпретації результатів.

В об'єктів, що перебувають під впливом одного або декількох факторів, дослідником визначається ознака, яку називають **відгуком**. Відгук у ДА, як правило, один. Так як результат, отриманий за одиничним об'єктом був би частіше ненадійним, то кожний варіант реалізується з кількаразовою **повторністю** дослідів. Але можливе проведення ряду видів ДА без повторень.

У сукупності фактори з їхніми рівнями, розрахована ознака (відгук) і повторення складають дисперсійний комплекс.

Засновник методу дисперсійного аналізу Р. А. Фішер установив, що цей метод добре працює, якщо кількість **повторень** дорівнює числу **повторності**, причому точність ДА підвищується зі збільшенням кількісної переваги **повторності** над **повтореннями** [6].

Дисперсійний аналіз полягає у використанні критерію Фішера, який є відношенням дисперсії s_v^2 величини досліджуваного показника порівнюва-

них варіантів (вибірок) до дисперсії s_z^2 неконтрольованих в експерименті джерел мінливості, тобто дисперсії залишку (похибки). Таким чином на відміну від критерієм Фішера–Снедекора (**7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**) він може бути менше одиниці.

$$F = \frac{s_v^2}{s_z^2}. \quad (10.1)$$

Далі виконується зіставленням отриманого розрахункового значення з табличним, визначеним для заданого рівня значущості (порогового значення) α і відповідних ступенів вільності дисперсій варіантів v_v і похибки v_z .

Як параметрична оцінка, ДА вимагає виконання умов:

- формально чисельність вибірок не повинно бути менше двох об'єктів;
- залежні ознаки повинні бути кількісними, тобто бути виміряні в шкалі інтервалів або відношень;
- групи визначаються (детермінуються) якісною ознакою, тобто групуюча ознака може бути якісною [5].
- усі порівнювані вибірки повинні бути статистично *нормально розподілені* (див. підрозділ **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica**).

Проте, F –критерій (відношення дисперсій за виразом (10.1)) виявляється зовсім нечутливим до порушення нормальності при порівнянні між груповий дисперсії з внутрішньогрупової [51].

Однак це не жорстка вимога і тут важливо, щоб закон розподілу вибірок не надто відрізнявся від нормального [68].

У багатьох роботах з математичної статистики сказано, що при проведенні дисперсійного аналізу спочатку слід перевірити гіпотезу однорідності дисперсій за критерієм Кохрена (див. підрозділ **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**) чи Бартлетта (див. підрозділ **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта**) [51].

— вибірки повинні мати *статистично рівні (однорідності) дисперсії* для кожного значення залежної (прогностичної) ознаки y_i , тобто, всі повторення вимірів повинні належати до одної генеральної сукупності (див. підрозділ **11.9.4 Перевірка відтворюваності результатів**). Перевірка однорідності дисперсій вибірок також оцінюється за критерієм Левена, який служить для виявлення однорідності дисперсій і не вимагає нормальності розподілу вибірок (тобто якщо при проведенні тесту Левена, $p > \alpha$), значить ДА можна застосовувати;

— необхідна *відсутність сильної лінійної взаємної кореляції* незалежних ознак (див. підрозділ **9.2.1 Лінійна кореляційна залежність**), яка повинні бути не більше ніж 0.8.

Таким чином, проведенню ДА повинна передувати *перевірка нормальності розподілу* вибірок (див. підрозділ **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць** за допомогою ППП Statistica) і *перевірка рівності дисперсій* (підрозділи **7.3.7.12.2 Виконання двовибіркового t -тесту** із статистично однаковими дисперсіями пакетом аналізу Excel та **7.3.7.11 Виконання t -тесту** Стьюдента з використанням ППП Statistica) і визначення відсутності *відсутність сильної лінійної взаємної кореляції* незалежних ознак (див. підрозділ **9.2.1 Лінійна кореляційна залежність**).

Виконання допущення про *незалежність вибірок* є обов'язковим у будь-якому випадку.

Порушення *припущення про нормальність розподілу*, як показали численні дослідження, не робить істотного впливу на результати ДА. Порушення припущення про нормальність має для ДА невелике значення і не істотно впливає на результати ДА, тому фактична ймовірність помилки 1-го роду практично не відрізняється від встановлюваної експериментатором.

Отже, перед проведенням ДА немає потреби в перевірці відповідності вибірових розподілів нормальному закону [120, 123].

Порушення *припущення про статистичну рівність* (гомогенності) дисперсій, як показали дослідження, має істотне значення для ДА в тому випадку, якщо порівнювані вибірки відрізняються за чисельністю або малі за обсягом.

У цьому разі необхідна попередня перевірка гомогенності (однорідності) дисперсій. У комп'ютерних програмах це здійснюється за допомогою критерію Левена. Якщо вибірки помітно різняться за чисельністю і малі за обсягом, а дисперсії за критерієм Левена розрізняються статистично достовірно, то ДА до таких даних не застосовують, слід скористатися непараметричної альтернативою.

Коли ж дисперсії вибірових груп відрізняються не дуже значно, використовуються вибірки рівного чи великого обсягу, застосування ДА виявляється цілком коректним [120, 123].

Загалом ДА є розширенням t -тесту Стьюдента, придатного лише для двох вибірок.

Нульова гіпотеза в ДА містить твердження про рівність міжгрупової і внутрішньогрупової складових мінливості і має на увазі *спрямовану* альтернативу про те, що міжгрупова складова мінливості перевищує внутрішньогрупову мінливість.

Дисперсійний аналіз вирішує задачі порівняння середніх значень. Для цього створюється вибірка по кожному масиву даних, а потім досліджується, як кожна вибірка відрізняється від їхнього середнього за рівністю середніх, припускаючи, що всі середні рівні, тобто приймаючи нульову гіпотезу: $H_0: d=0$ (різниця між середніми дорівнює нулю). Тобто вибірові середні є оцінками однієї генеральної середньої і відмінності між ними неістотні. Ухва-

лення альтернативної гіпотези означає, що принаймні два середніх значення розрізняються (без уточнення, які саме градації фактору розрізняються).

Основним показником для прийняття рішення є F -критерій Фішера *спрямованої альтернативи* і, звичайно ж, його рівень достовірності. Якщо дисперсії є випадковими із загальної генеральної вибірки, то емпіричне значення критерію Фішера F не виходить за відповідні межі й не перевищує критичне теоретичне значення критерію F_T , який характеризує рівень можливих випадкових значень критерію Фішера, очікуваний для заданого рівня значущості α при відповідних ступенях вільності. За умови $F < F_T$ (тобто $p > \alpha$) нульова гіпотеза не відкидається, і це свідчить про те, що між усіма вибірковими середніми відсутні істотні статистичні відмінності, і на цьому перевірка закінчується; якщо генеральні параметри порівняльних груп різні, то $F \geq F_T$ (тобто $p \leq \alpha$) і нульова гіпотеза відкидається [34].

Суттю ДА є розкладання загальної суми квадратів відхилень (девідат) [15] і загального числа ступенів вільності на частини — компоненти, відповідно структурі експерименту, і оцінка значущості дії та взаємодії чинників.

Таким чином *однофакторний ДА* дозволяє перевірити гіпотезу про існування впливу досліджуваного фактору на залежну змінну.

Його математична модель передбачає виділення в загальній мінливості залежною змінною двох її складових: міжгрупова складова мінливості обумовлена відмінністю середніх значень під впливом фактору; внутрішньогруппова складова мінливості обумовлена впливом неврахованих причин. Співвідношення цих двох складових мінливості і є основний показник, що визначає статистичну значущість впливу фактору.

При цьому загальна мінливість результативної ознаки, вимірювана загальною варіацією (девідатою) D_Y , розкладаються на два компоненти: варіювання між вибірками D_V і всередині вибірок D_Z

$$D_Y = D_V + D_Z. \quad (10.2)$$

Тут варіювання між вибірками (варіантами дослідів D_V) представляє ту частину загальної дисперсії, яка обумовлена дією чинників, що вивчаються, а варіювання, яке представляє міру розсіювання випадкової величини навколо її середнього значення всередині вибірок, характеризує випадкове варіювання досліджуваної ознаки D_Z , тобто похибку експерименту.

Варто відмітити, що у таблицях результатів однофакторного ДА, отриманих за допомогою пакету **Excel**, це відповідно D_Y — **Итого**, D_V — **Внутри групп** і D_Z — **Между группами** (див. табл. 10.7, с. 573); для ППП **Statistica** — **C** — **Intercept/Св.член**, D_V — **Вариант** (з назвою фактору), D_Z — **Error/Ошибка** (див. табл. 10.9, с. 579).

Загальна кількість ступенів вільності ($N-1$) розкладаються на дві частини — ступінь вільності для варіантів ($k-1$) і ступінь вільності для випадкового варіювання ($N-k$), тобто

$$N-1 = (k-1) + (N-k), \quad (10.3)$$

де N – загальна кількість вимірів;
 k – кількість варіантів дослідів (порівнювальних вибірок, тобто повторень).

Виходячи із цього загальна ступінь вільності ν_Z , ступені вільності варіантів ν_V і випадкового варіювання (похибки) ν_Z розраховуються за виразами

$$\nu_Y = N-1; \quad (10.4) \quad \nu_V = k-1; \quad (10.5) \quad \nu_Z = N-k. \quad (10.6)$$

При n організованій повторності дослідів, загальна сума квадратів розкладається на три частини: варіювання даних повторності D_P , варіантів D_V і випадкове D_Z

$$D_Y = D_P + D_V + D_Z, \quad (10.7)$$

На відповідні ступені вільності розкладається і загальна ступінь $(N-1)$ — ступінь вільності для варіантів $(k-1)$, повторності $(n-1)$ і ступінь вільності для випадкового варіювання $(n-1) \cdot (k-1)$, тобто

$$N-1 = (n-1) + (k-1) + (n-k) \cdot (k-1). \quad (10.8)$$

Ступені вільності варіантів (повторень) ν_V , повторності ν_P і випадкового варіювання (похибки) ν_Z цьому разі розрахованих за виразами (10.10)–(10.12)

$$\nu_Y = N-1; \quad (10.9) \quad \nu_V = k-1; \quad (10.10)$$

$$\nu_P = (n-1); \quad (10.11) \quad \nu_Z = (n-1) \cdot (k-1) \quad (10.12)$$

Таким чином за результатами однофакторний дисперсійний аналіз не відрізняється від двофакторного без повторень (див. табл. 10.3 на с. 567 і табл. 10.17 на с. 588 чи табл. 10.18 на с. 591).

Суми квадратів відхилень за даними дослідів, статистичного комплексу з k варіантами (повтореннями) і n повторностями, знаходять таким чином. Спочатку визначають суми за повторностями P , повтореннями (варіантами дослідів) V і загальну суму всіх спостережень ΣX .

$$P = \sum_1^k x_i; \quad (10.13) \quad V = \sum_1^n x_i; \quad (10.14) \quad \sum x = \sum_1^n \sum_1^k x_i. \quad (10.15)$$

Потім обчислюється загальна кількість спостережень N і корегувальний чинник (поправка, чи вільний член) C

$$N = k \cdot n; \quad (10.16) \quad C = \frac{\left(\sum_1^n \sum_1^k x_i \right)^2}{k \cdot n}; \quad (10.17)$$

Далі визначається загальна (міжгрупова) девідата D_Y та девідата для повторностей D_P

$$D_Y = \Sigma(X)^2 - C; \quad (10.18) \quad D_P = \frac{\Sigma P^2}{n}; \quad (10.19)$$

Визначається також девідата для варіантів (повторень) факторна модель D_V і девідата для похибки (залишок) D_Z .

$$D_V = \frac{\Sigma V^2}{n} - C; \quad (10.20) \quad D_Z = D_Y - (D_P + D_V). \quad (10.21)$$

Відповідність англійських позначень D_Y — D_{total} ; D_V — D_{BG} (від *between groups* — міжгруповий); D_Z — D_{WG} (від *within groups* — внутрішньо груповий) [135].

Девідати ділять на відповідні їм ступені вільності, приводячи до порівнюваного виду — одного ступеня вільності варіації і отримують середні дисперсії — варіантів (повторень) s_V^2 , повторностей s_P^2 і залишку (похибки) s_Z^2

$$s_V^2 = \frac{D_V}{k-1}; \quad (10.22) \quad s_P^2 = \frac{D_P}{n-k}; \quad (10.23)$$

$$s_Z^2 = \frac{D_Z}{(n-1) \cdot (k-1)}. \quad (10.24)$$

Багатофакторний ДА призначений для вивчення впливу декількох незалежних факторів (змінних) на залежну змінну. Відмінною його особли-

вістю від однофакторного є можливість оцінити не тільки вплив кожної незалежної змінної окремо, а і взаємодія факторів — залежність впливу одних факторів від рівнів інших факторів.

Таким чином, в результаті ми отримуємо вплив першої незалежної змінної, вплив другої незалежної змінної і т.д.

Обмеженнями методу виступають однорідність дисперсій і вибірки не повинні помітно відрізнятися за чисельністю.

Дисперсійний аналіз багатфакторного експерименту виконується двома етапами. Спочатку за виразом (10.2) загальна варіація D_Y ознаки розкладається на варіювання варіантів (між вибірками) D_V і залишок (усередині вибірок) D_Z .

У таблицях результатів багатфакторного ДА, отриманих за допомогою ПА **MS Excel**, це відповідно D_Y — **Итого**, D_A — **Выборка**, D_B — **Столбцы**, D_{AB} — **Взаимодействие** і D_Z — **Внутри** (див. табл. 10.27, с. 600); для ППП **Statistica** — C — **Intercept/Св.член**, D_Z — **Error/Ошибка**, а D_A , D_B і D_{AB} наводяться з назвами факторів (див. табл. 10.28 на с. 602 і 10.30 на с. 603).

Відповідно у ПА **MS Excel** не виводиться C — **Intercept/Св.член**, а в ППП **Statistica** — **Итого**.

Потім девідата варіантів D_V розкладаються на компоненти у відповідності до джерел варіювання. У двофакторному досліді — на *головні ефекти* факторів D_A і D_B і їхню взаємодію D_{AB}

$$D_V = D_A + D_B + D_{AB}. \quad (10.25)$$

Аналогічно виразу (10.25) у трифакторному досліді на другому етапі девідата варіантів D_V розкладаються на компоненти

$$D_V = D_A + D_B + D_C + D_{AB} + D_{AC} + D_{BC} + D_{ABC}. \quad (10.26)$$

Їхні середні квадрати, тобто дисперсії, і використовують у ДА для оцінки значущості дії чинників за виразом (10.1).

Однак, умова $F \geq F_{\tau}$, яка вказує на наявність хоч би одного випадку достовірної різниці між варіантами, ДА не показує, яке із середніх насправді більше, тому виникає необхідність у проведенні поглибленого аналізу відмінності досліджуваних показників.

Порівняння за допомогою ДА дозволяє лише з'ясувати, чи можемо ми вважати їх рівними. У разі коли вони не рівні, становить інтерес з'ясування питання, які середні значення рівні між собою, а які відрізняються, а також які групи середніх значень рівні між собою, а які ні.

Якщо фактор складається з більше ніж двох градацій, то необхідно додатково проводити множинні порівняння середніх значень, щоб можна було зробити висновок про те, як відрізняються один від одного середні значення

для різних градацій фактору. Це стосується не тільки однофакторного ДА аналізу, а й інших його видів.

Постає необхідність порівняти між собою й оцінити не два значення середніх, а декілька, тобто перевірити гіпотезу про приналежність декількох середніх значень до однієї генеральної сукупності або виділення груп середніх значень, що належать до однієї сукупності.

Одним з актуальних питань на етапі множинних порівнянь стає вибір критерію. У програмі **Statistica** представлені наступні методи: **LSD** (*Least Significant Difference*) Fisher (**HIP** за критерієм Фішера), поправка Бонферроні, метод Шеффе (H. Scheffé), метод Тьюкі (Tukey) **HSD** (*Honestly Significant Differences*), метод **HSD** для нерівних розмірів вибірок, метод Стюдента–Ньюмена–Кейлса, метод Дункана і Дуннета (див. підрозділ **10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**).

Який саме метод множинного порівняння використовувати залежить від дослідника. Однак, необхідно відзначити наступні моменти. Так, серед дослідників поширені методи Шеффе і **LSD** Фішера (**HIP** за критерієм Фішера, який зазвичай використовується у сільськогосподарських дослідженнях). Тут необхідно враховувати те, що критерій Шеффе є грубим критерієм і особливо придатний в тих випадках, коли є підозра про нерівність дисперсій вибірок між собою, а при використанні критерію **LSD** Фішера виникає ймовірність помилки першого роду (тобто псевдопозитивний результат, виявлення відмінностей, навіть якщо їх немає). Та ж ситуація зі збільшенням помилки першого роду спостерігається і з використанням методу Тьюкі **HSD**. Метод Бонферроні працює, якщо число порівнянь невелике, зазвичай не більше 8. При більшому числі порівнянь критерій Ньюмена–Кейлса і Тьюкі дають більш точну оцінку довірчої ймовірності. Критерій Дункана, як і критерій Стюдента–Ньюмена–Кейлса, ґрунтується на статистиці розмаху. Відповідно, при використанні в аналізі нерівних вибірок, то вибрати можна метод **HSD** для нерівних розмірів вибірок [9].

10.2. РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ПРИ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ВИБІРОК

Виконання ДА за допомогою формул, представлених у [38, 34, 25], проілюстровано аналізом кількості стручків на центральній гілці колекції сортозразків із сортом–стандартом у 2004 р. тобто з виключенням показника сорту–стандарту (табл. 10.1). Числові дані колекції за 2004 р. взято з табл. 2.10, с. 95, чарунки **AR3:AR102**, а сорту–стандарту — з табл. 2.8, чарунки **DD3:DD13**, представленої на с. 93.

Для визначення критичного значення критерію Фішера F_t використовується табл. В.7–В.9, але краще однобічна функція **MS Excel F.ОБР.ПХ**

(див. Додаток А), де перше число пов'язується зі значенням $\alpha=0.05$ а друге та третє представляє собою відповідно меншу й більшу ступінь вільності.

Таблиця 10.1. Виконання ДА за допомогою формул

	AY	AZ	BA	BB
2			Стандарт-2004	Колекція-2004
	BA103=СЧЕТ(ВАЗ:ВА102) ВВ103=СЧЕТ(ВВЗ:ВВ102)		39.9	30.4
4	BA104=BA103-1 ВВ104=ВВ103-1		36.7	30.1
5	BA105=СЧЕТ(ВАЗ:ВВЗ)		31.3	32.2
	BA106=BA105-1		30.5	33.5
	BA107=СРЗНАЧ(ВАЗ:ВА102) ВВ107=СРЗНАЧ(ВВЗ:ВВ102)		33.3	30.0
	BA108=СРЗНАЧ(ВАЗ:ВВ102)		30.7	37.1
	BA109=ДИСПР(ВАЗ:ВА102)*ВА103+ДИСПР(ВВЗ:ВВ102)*ВВ103		21.0	31.6
	BA110=BA109/(BA104+ВВ104)		20.0	29.8
	BA111=BA103*(BA107-BA108)^2 ВВ111=ВВ103*(ВВ107-ВВ108)^2		20.0	25.1
	BA112=(BA111+ВВ111)/BA106		27.1	30.1
	BA113=BA112/BA100		28.4	23.2
	BA114=F.ОБР.ПХ(0.05;ВА107;(BA105+ВВ105))			27.6
	BA115=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(0.05;(BA105+ВВ105))			20.0
101	BA116=BA115*(BA112/BA103+BA112/ВВ103)^0.5			28.6
102				23.4
103	Кількість дослідів, шт.	n	11	100
104	Кількість ступенів свободи дослідів, шт.	df _д	10	99
105	Кількість повторень, шт.	k	2	
106	Кількість ступенів свободи повторень, шт.	df _п	1	
107	Середня дослідів, см	M _д	30.6	26.4
108	Середня повторення, см	M _п		26.9
109	Сума квадратів відхилень дослідів	SS _д	2628.55	
110	Середній квадрат похибки дослідів	MS _д	23.2	
111	Сума квадратів відхилень повторень	SS _п	153.9	16.9
112	Середній квадрат похибки повторень	MS _п	170.8	
113	Критерій Фішера розрахунковий	F _р	7.363031871	
114	Критерій Фішера табличний при 0.05	F _{05(1,109)т}	3.928195	
115	Критерій Стьюдента табличний	t _{05(109)т}	1.981967	
116	Найменша істотна різниця	HIP	8.228351	

Як результат маємо $F > F_t$, тому гіпотеза про рівність вибірок спростовується, це свідчить про те, що генеральні параметри порівняльних груп на прийнятому 0.05 рівні значущості різні [34].

10.3. Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента

ДИСПЕРСИОННИЙ АНАЛІЗ ПА MICROSOFT EXCEL

Виконання ДА цих же даних проілюстровано на рис. 10.1 за даними рис. 7.16, с. 411.

При натисненні **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) виникає панель **Анализ данных**, де вибираємо інструмент **Однофакторный дисперсионный анализ** (3), так як вибірки представляють собою один фактор — кількість стручків в центральній гілці, отриманих для двох повторень, тобто, колекції сортозразків і сорту-стандарту. Після натиснення кнопки **ОК** (4) з'являється панель **Однофакторный дисперсионный анализ**, де задаємо вид групування **по столбцам** (5).

Указуємо рівень статистичної значущості (порогові значення) **Альфа: 0.05** (7) (див. с. 339), для включення в дані заголовків активізуємо **Метки в первой строке** (6), указуємо виведення даних на **Новый рабочий лист:** (8), задаємо інтервал розташування даних **\$A\$3:\$A\$103** (9) і натискаємо **ОК** (10).

Створюється таблиця результатів аналізу (табл. 10.2, представлена редагованою. Критичне значення в ній називається *p-значенням*. Якщо воно менше ніж прийняте **Альфа: 0.05**, припущення про рівність середніх відхиляється й визнається, що аналізовані вибірки мають статистично істотні розходження на цьому рівні.

Аналогічно виконується ДА при порівнянні колекцій, за даними взятими з табл. 2.11 (с. 96) чарунки **S3:S102** і **W3:W141**. Результати ДА подано в нижній частині табл. 10.2.

З результатів табл. 10.2 видно, що генеральні параметри обох вибірок мають розходження (так як $F > F_{\tau}$ у першому випадку становить 7.36303187 проти 3.928194893 і у другому 158.0835147 проти 3.88066105).




Рис. 10.1. Порядок застосування інструменту

Однофакторный дисперсионный анализ

Таблиця 10.2. Результати перевірки відмінностей вибірок інструментом

Однофакторный дисперсионный анализ

Однофакторный дисперсионный анализ за 2004 г.						
Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Стандарт-2004	11	336.613037	30.6011852	24.9107206		
Колекція-2004	100	2644.95766	26.4495766	23.02472056		
Дисперсионный анализ						
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	170.8057585	1	170.805758	7.363031871	0.0077404	3.928194893
Внутри групп	2528.554542	109	23.1977481			
Итого	2699.3603	110				
Однофакторный дисперсионный анализ за 2004-2005 гг.						
Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Колекція-2004	101	2675.55885	26.4906817	22.96512537		
Колекція-2005	140	5076.27178	36.2590841	44.37253327		
Дисперсионный анализ						
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	5598.600207	1	5598.60021	158.0835147	3.646E-28	3.88066105
Внутри групп	8464.294662	239	35.4154588			
Итого	14062.89487	240				

Таким чином, прийнята нульова гіпотеза спростовується на прийнятому **Альфа: 0.05** рівні значущості, тобто статистично значущість відмінності підтверджується.

Як бачимо, результати, представлені в табл. 10.1 і 10.2 співпадають.

Тобто, у обох випадках підтверджено висновки підрозділу **7.3 Використання параметричних оціночних критеріїв**.

10.4. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ОДНОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ

10.4.1. Розрахунковий метод із використанням пакету аналізу MS Excel

10.4.1.1. Дисперсійний аналіз з урахуванням впливу повторень дослідів

В однофакторному досліді варіювання показників за повтореннями обумовлено розходженням впливу досліджуваних факторів, та інших причин випадкового характеру.

Як ілюстрацію розрахункового методу виконання ДА однофакторного досліді з урахуванням впливу повторень досліді розглянемо приклад, наведений в [39, с. 30–35] із дещо зміненими даними. Значення залежної змінної (варіанти) визначалося для сортів **St** (стандарт), **A**, **B**, **C** і **D** за чотирма повторностями I, II, III й IV, тобто *фактором є лише сорт*.

Для цього створюється вихідна таблиця, розташована в чарунках **A1:E7** (табл. 10.3, де значення варіант показника при повторенні замірів подано у чарунках **B3:E7**).

У колонці F1:F7 з числовими значеннями у чарунках F3:F7, представлено середні варіантів. Тут і далі вихідні таблиці слід формувати таким чином, щоб значення прийнятого стандарту (контролю) розташовувалося у верхньому рядку. Із правого боку до таблиці додається стільки ж колонок, як і повторень, у чарунки G3:I7 яких заносяться квадрати відповідних значень замірів. Під ними розташовано рядок G8:I8 із квадратами середніх значень повторень. За доданими колонками розміщується ще одна, у чарунках K3:K7 якої подані суми квадратів середніх значень варіанта показника.

Під доданими колонками розташовано рядок **G8:I8** із сумами квадратів середніх значень повторень, а під таблицею представлено середнє значення досліду, значення кількості варіантів досліджуваного показника і кількість повторень (відповідно чарунки **B8**, **B9** і **B10**).

Далі створюється таблиця визначення показників ДА (чарунки **A10:G15**), отримана за формулами (10.7)–(10.24). Вона також містить розрахунок за формулою (10.1) фактичного значення критерію Фішера F , його критичне значення F_{τ} та рівень значущості p .

Визначення критичного значення критерію Фішера F_{τ} (чарунки **G12** і **G13**) виконується статистичною функцією пакету **Excel**, **F.ОБР.ПХ** (див. Додаток А), рівень значущості наведено в чарунках **F12** і **F13**, він визначається функцією **1-F.РАСП**. Тут перше число пов'язується зі значенням F , а друге й третє зі ступенями вільності показника й похибки, у четвертому для отримання інтегральної функції розподілу взятє значення **истина**.

Нижче в чарунці **C18** розташовується результат визначення похибки різниці середніх, отриманої за виразом (10.35), знайденої для середнього квадрату залишку (похибки) і кількості повторень.

Знайденної для середнього квадрату залишку (похибки) і кількості повторень, у чарунці **E18** — прийнятий рівень значущості α , а у чарунці **G18** — критичне значення розподілу Стюдента для прийнятого рівня значущості і ступеня вільності залишку (похибки), розраховане за статистичною функцією **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** пакету **Excel**.

Так як отримане розрахункове (емпіричне) значення критерію Фішера для варіантів більше за критичне, тобто $F > F_{\tau}$, маємо статистично істотну відмінність між варіантами досліду на прийнятому рівні значущості $\alpha = 0.05$.

Для статистичної оцінки результатів із використанням **НПР** у чарунках **I12:M17** створюється таблиця, де по варіантах подано середнє значення показника, розрахунковий t -критерій та рівень значущості p , пов'язані залежностями із двома першими таблицями. У ній представлено **відхилення від стандарту**, **НПР** для варіантів, обчислений за формулою (10.36), значення критерію Стюдента t , знайдене за виразом (7.32) та фактичний рівень статистичної значущості p , розрахований за статистичною функцією **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** для відповідного значення табличного (критичного) критерію Стюдента t_{τ} і ступеня вільності похибки. З отриманих даних видно, що статично достовірними є результати варіантів **B**, **C** і **D**, у яких рівень значущості p менше прийнятого рівня **Дльфа: 0.05**, тобто $p < 0.05$.

Таблиця 10.3. Виконання ДА однофакторного експерименту за формулами

	A	B	C	D	E	F	G	H	III	J	K	L	M
1	Варіант	Повторення					Квадрати					<div>H3 =B3^2 D12 =B12/C12 C14 =C12*C13 J12 =F4-\$F\$3 E12 =D12/\$D\$1 C15 =(C12+1)*(C13+1)-1 K12 =\$C\$16*\$G\$16 K3 =(СУММ(B3:E3))^2 G3 =(СУММ(B3:B7))^2 C13 =CЧЁТ(G8:J8)-1</div>	
2		I	II	III	IV	Середнє варіанту	I	II	III	IV	Сума по варіантам		
3	St (Стандарт)	331	372	330	336	342	109561	138384	108900	112896	1874161		
4	A	379	364	384	349	369	143641	132496	147456	121801	2178576		
5	B	385	415	395	387	396	148225	172225	156025	149769	2502724		
6	C	407	391	409	450	414	165649	152881	167281	202500	2745649		
7	D	432	503	470	423	457	186624	253009	220900	178929	3341584		
8	Середня досліду $X_{cp}= 395,60$					Сума по повторенням	3740356	4182025	3952144	3783025			
9													
10	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_{ϕ}	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_{τ}						
11	Корегуючий фактор C	3129987,20											
12	Варіантів C_v	30686,30	4	7671,57	13,2350	0,000235	3,25917						
13	Повторення C_p	1522,80	3	507,60	0,8757	0,480787	3,49029						
14	Залишок (похибка) C_z	6955,70	12	579,64									
15	Загальне (разом) C_y	39164,80	19										
16	Похибка різниці середніх $S_{\sigma} = 17,02$			$\alpha= 0,05$		$tT= 2,1788$							

Варіант	Відхилення від стандарту	HIP_{05} (варіантів)	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
St	-	-	-	-
A	26,75	37,09	1,5713	0,142094
B	53,25		3,1279	0,008726
C	72,00		4,2293	0,001169
D	114,75		6,7404	0,000021

Варіант	Відхилення від стандарту	HIP_{05} (варіантів)	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
St	-	-	-	-
A	26,75	37,09	1,5713	0,142094
B	53,25		3,1279	0,008726
C	72,00		4,2293	0,001169
D	114,75		6,7404	0,000021

$B_8 = CPЗНАЧ(B3:E7)$ $F_3 = CPЗНАЧ(B3:E3)$
 $B_{13} = СУММ(G8:J8)/(C_{12}+1)-B_{11}$
 $F_{12} = 1-F.PACП(E_{12};C_{12};\$C\$14;ИСТИНА)$
 $G_{16} = СТЮДРАСПОБР(E_{16};C_{14})$

$B_{11} = (СУММ(B3:E7))^2/((C_{12}+1) \cdot (C_{13}+1))$
 $B_{14} = B_{15}-B_{12}-B_{13}$
 $G_{12} = FPACПOБP(\$E\$16;C_{12};\$C\$14)$
 $L_{12} = (F_4 - F_{F3})/\$C\$16$

$B_{12} = СУММ(K3:K7)/(C_{13}+1)-B_{11}$
 $B_{15} = СУММ(G3:J7)-B_{11}$ $C_{12} = CЧЕТ(F3:F7)-1$
 $C_{16} = (2 \cdot D_{14}/(C_{13}+1))^0,5$
 $M_{12} = СТЮДЕНТ.PACП.2X(L_{12};\$C\$14)$

Особливість цього розрахункового методу ДА полягає в урахуванні впливу повторень дослідів, тобто коли *дисперсія повторення не об'єднується з дисперсією похибки*, тобто повторення чи варіанти не розглядаються як одне ціле і розкладаються на фактори й повторення.

Практично це є ДА двофакторного експерименту без повторення. Тому результати табл. 10.3 ідентичні табл. 10.17, на с. 588, табл. 10.8 на с. 574, табл. 10.18 на с. 591, табл. 10.19 на с. 591, табл. 10.21 на с. 592 і табл. 10.22, на с. 592.

10.4.1.2. Дисперсійний аналіз без урахуванням впливу повторень дослідів

Розрахункового методу ДА без урахуванням впливу повторень дослідів, тобто коли *дисперсія повторення об'єднується з дисперсією похибки*, тобто коли повторення чи варіанти розглядаються як одне ціле і не розкладаються на фактори й повторення, представлено в табл. 10.4 [25], 10.5 [34] і 10.6 [125]. Хід розрахунків ілюстровано формулами, наведеними на їх полях.

Для статистичної оцінки результатів у чарунці **E13** (табл. 10.4) розташовується прийнятий рівень статистичної значущості α .

У чарунку **G13** заноситься значення розподілу Стюдента для прийнятого рівня значущості і ступеня вільності залишку (похибки), розраховане за функцією **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х** та додаються колонки **G1:K7**, у яких подано визначення **НІР**.

На відміну від розрахунків **НІР**, представлених в табл. 10.3, вона містить колонку **I1:I7** з визначенням похибка різниці середніх $S_{\bar{d}}$ для всіх варіантів, передбачаючи у ряді випадків нерівну їх кількість.

Відмінністю між табл. 10.3 і 10.4 та 10.5 є наявність у табл. 10.3 оцінки повторення. У табл. 10.4 і 10.5 дисперсія повторення додається до дисперсії похибки, відповідно додаються і їх ступені вільності. Згідно них для табл. 10.4 і 10.5 маємо $F > F_{\tau}$ — нульова гіпотеза спростовується — між усіма вибірковими середніми на прийнятому рівні значущості існують істотні статистичні відмінності [34]. Додатково можна сказати, що між стандартом **St** і варіантами **B**, **C** і **B** існують суттєві статистичні відмінності, про що свідчить рівень значущості p критерію Стюдента менше прийнятого 0.05. У той же час для варіанти **A** (табл. 10.3) маємо $p > \alpha$.

Варто звернути увагу, що в табл. 10.5 наведена відмінність всіх сортів включаючи і стандарт від середнього значення.

Слід відмітити, що ДА з об'єднанням дисперсії повторення з дисперсією похибки виконується ПА **MS Excel** і **ППП Statistica**.

Таблиця 10.4. Виконання ДА однофакторного експерименту за формулами

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Варіант	Повторення				Середній квадрат суми	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх S_d	HIP ₀₅ варіантів	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
2		I	II	III	IV						
3	St (Стандарт)	331	372	330	336	468540	-	-	-	-	-
4	A	379	364	384	349	544644	26.75	16.81	35.83	1.5912	0.132415
5	B	385	415	395	387	625681	53.25	16.81	35.83	3.1675	0.006374
6	C	407	391	409	450	686412	72.00	16.81	35.83	4.2829	0.000654
7	D	432	503	470	423	835396	114.75	16.81	35.83	6.8258	0.000006
8											
9	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_Φ	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_T	$F3=(\text{СУММ}(C4:F4))^2/C4\ddot{E}T(C4:F4)$ $F7=(\text{СУММ}(B7:E7))^2/C4\ddot{E}T(B7:E7)$ $B10=\text{СУММ}(F3:F7)-\text{СУММ}(B3:E7)^2/C4\ddot{E}T(B3:E7)$ $B11=B12-B10$ $B12=\text{СУММКВ}(B3:E7)-\text{СУММ}(B3:E7)^2/C4\ddot{E}T(B3:E7)$ $C10=\text{ЧСТРОК}(B3:B7)-1$ $C11=\text{C4}\ddot{E}T(B3:E7)-\text{ЧСТРОК}(B3:B7)$			
10	Варіантів C_v	30686.3	4	7671.575	13.57240	0.000071	3.0556				
11	Залишок (похибка) C_z	8478.5	15	565.233							
12	Загальне (разом) C_y	39164.8	19								
13				$\alpha=0.05$		$t_T=2.1314$					

$F10=1-F.\text{РАСП}(E10;C10;C11;\text{ИСТИНА})$ $G4=\text{CPЗНАЧ}(B4:E4)-\text{CPЗНАЧ}(\$B\$3:\$E\$3)$
 $G10=F.\text{РАСПОБР}(\$E\$13;C10;\$C\$11)$ $G7=\text{CPЗНАЧ}(B7:E7)-\text{CPЗНАЧ}(\$B\$3:\$E\$3)$
 $H4=(\$D\$11*(1/C4\ddot{E}T(\$B\$3:\$E\$3)+1/C4\ddot{E}T(B4:E4)))^0.5$ $H7=(\$D\$11*(1/C4\ddot{E}T(\$B\$3:\$E\$3)+1/C4\ddot{E}T(B7:E7)))^0.5$
 $K4=\text{СТЮДЕНТ.РАСП.2X}(J4;\$C\$11)$ $K7=\text{СТЮДЕНТ.РАСП.2X}(J7;\$C\$11)$

Таблиця 10.5. Виконання ДА однофакторного експерименту за формулами

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Варіант	Повторення					Варіант	Відхилення від середнього	HIP ₀₅ (варіантів)	Критерій Стюдента <i>t</i>	Рівень значущості <i>p</i>
2		I	II	III	IV	Сума варіанту					
3	St (Стандарт)	331	372	330	336	1369.0	St	-53.4	35.83	14.4755	0.000000
4	A	379	364	384	349	1476.0	A	-26.6		16.0667	0.000000
5	B	385	415	395	387	1582.0	B	-0.1		3.1675	0.006374
6	C	407	391	409	450	1657.0	C	18.7		4.2829	0.000654
7	D	432	503	470	423	1828.0	D	61.4		6.8258	0.000006
8	Середня досліду X _{ср} = 395.6		B8=CP3H4Ч(B3:E7) F3=СУММ(B3:E3)					G15=СТЬЮДРАСПОБР(E15;C13)			
9			G12=ФРАСПОБР(\$E\$15;C12;\$C\$13)					C15=(2*D13/(CЧЁТ(B3:E3)))^0.5			
10	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _φ	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F _τ	B11=(СУММ(B3:E7))^2/CЧЁТ(B3:E7) B12=СУММКВ(F3:F7)/CЧЁТ(B3:E3)-B11 B13=B14-B12 B14=СУММКВ(B3:E7)-B11 C12=CЧЁТ(F3:F7)-1 I3=\$C\$15*\$G\$15 C13=CЧЁТ(B3:E7)-CЧЁТ(F3:F7) C14=(C12+1)*CЧЁТ(B3:E3)-1 D13=B13/C13 D12=B12/C12 H3=F3/CЧЁТ(B3:E3)-\$B\$8 E12=D12/\$D\$13 F12=1-F.РАСП(E12;C12;\$C\$13;ИСТИНА)			
11	Корегуючий фактор C	3129987.20									
12	Варіантів C _v	30686.30	4	7671.57	13.5724	0.000071	3.05557				
13	Залишок (похибка) C _z	8478.50	15	565.23							
14	Загальне (разом) C _y	39164.80	19								
15	Похибка різниці середніх S _d = 16.81			α = 0.05		t _τ = 2.1314					

Таблиця 10.6. Виконання ДА однофакторного експерименту за формулами

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Варіант	Повторення					Середній квадрат суми	Сума квадратів	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх S_d	HIP ₀₅ варіантів	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
2		I	II	III	IV	Середнє варіанту							
3	St (Стандарт)	331	372	330	336	342.3	468540.3	469741	-	-	-	-	-
4	A	379	364	384	349	369.0	544644.0	545394	26.75	16.81	35.83	1.5912	0.132415
5	B	385	415	395	387	395.5	625681.0	626244	53.25	16.81	35.83	3.1675	0.006374
6	C	407	391	409	450	414.3	686412.3	688311	72.00	16.81	35.83	4.2829	0.000654
7	D	432	503	470	423	457.0	835396.0	839462	114.75	16.81	35.83	6.8258	0.000006
8	Середній квадрат суми			3129987.2			Сума		3160673.5		3169152		
9													
10	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _ф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F _т	G3=(СУММ(B3:E3))^2/(C4ЁТ(B3:E3)) G8=СУММ(G3:G7) H3=СУММКВ(B3:E3) C8=((СУММ(B3:E7))^2)/C4ЁТ(B3:E7) B11=H8-C8 B12=G8-C8 B13=H8-G8 C11=C4ЁТ(B3:E7)-1 C12=C4ЁТ(G3:G7)-1 C13=C4ЁТ(B3:E7)-C4ЁТ(G3:G7)					
11	Загальне (разом) C _y	39164.8	19										
12	Варіантів C _v	30686.3	4	7671.57	13.572	0.000071	3.0556						
13	Залишок (похибка) C _z	8478.50	15	565.23									
14				α= 0.05		t _т = 2.1314							

Проте, бувають випадки, коли для подальшої оцінки результатів ДА необхідно мати необ'єднану дисперсію похибки, тобто у “чистому вигляді” (див. підрозділи **14.2.4.3 Розрахунок коефіцієнту успадкування при однофакторному експерименті** і **14.2.4.4 Розрахунок коефіцієнту успадкування при двофакторному експерименті**).

Для отримання “чистої” дисперсії похибки застосовують опцію ППП **Statistica**, як подано у цих підрозділах та у табл. 10.21, с. 592, або опцію (табл. 10.23, с. 592, чи виконують ДА за фактором і за повторенням з об'єднанням даних, як це показано в табл. 10.8 на с. 574, а також прийняттям *повторення за фактор* і проведенням ДА на один фактор вище (див. табл. 10.17, с. 588 і 10.18, с. 591).

10.4.2. Використання інструменту **ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ** MS Excel при однофакторному експерименті

10.4.2.1. Застосування для ДА інструменту **Однофакторный ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ**

Застосування для ДА однофакторного дослідження інструменту **Excel** **Однофакторный дисперсионный анализ** (табл. 10.2, с. 565.) представляє результати відповідно всього фактору, тобто коли повторення чи варіанти розглядаються як одне ціле й показники дисперсії як і у табл. 10.4 і 10.5 не розкладаються на фактори й повторення.

Порядок аналізу вихідних даних, наведених у табл. 10.3 (с. 567), представлено на рис. 10.2 (початковий порядок дій подано на рис. 10.1, с. 564). Задіявши **Данные** (1) і **Анализ данных** (2) отримуємо панель **Анализ данных**, де вибираємо інструмент **Однофакторный дисперсионный анализ** (3), після натиснення кнопки **ОК** (4) на

	A	B	C	D	E
2		Повторення			
3	Вариант	I	II	III	IV
4	St (Стандарт)	331	372	330	336
5	A	379	364	384	349
6	B	385	415	395	387
7	C	407	391	409	450
8	D	432	503	470	423

Анализ данных

Инструменты анализа

- ☒ Однофакторный дисперсионный анализ
- ☐ Двухфакторный дисперсионный анализ с
- ☐ Двухфакторный дисперсионный анализ б
- ☐ Корреляция
- ☐ Ковариация
- ☐ Описательная статистика

Однофакторный дисперсионный анализ

Входные данные

Входной интервал:

Группирование: ☐ по столбцам ☒ по строкам

☒ Метки в первом столбце

Дельта:

Параметры вывода

☐ Выходной интервал:

☒ Новый рабочий лист

☐ Новая рабочая книга

Рис. 10.2. Аналіз однофакторного експерименту інструментом **Однофакторный дисперсионный анализ**

панелі **Однофакторный дисперсионный анализ** задаємо рівень значущості **Дальфа: 0.05** (5), для включення в дані заголовків активізуємо ☒ **Метки в первом столбце** (6), (хоч і виконуємо виведення за рядками) указуємо виведення результатів на ☒ **Новый рабочий лист:** (7), задаємо групування ☒ **по строкам** та інтервал розташування даних **\$A\$4:\$E\$8** (9) і натискуємо **ОК** (10). У результаті отримуємо табл. 10.7.

Верхня таблиця листа (чарунки **A1:E6**), яка є підсумковою, представляє собою статистичну характеристику варіантів (сортотразків) з наведеними статистичними показниками — кількістю повторень, сумою, середнім і дисперсією.

Для розрахунків **НІР** до неї нами додаються колонки **F1:J6**, з такими ж даними як і в колонках **G1:K7** табл. 10.4.

Нижня таблиця (чарунки **A8:G11**) містить результат ДА, де подані:

- **SS** — суми квадратів: міжгрупова, усередині груп — групова сума квадратів, разом — загальна (повна) сума квадратів;
- **ds** — число ступенів вільності (від англійського *degrees of freedom*);
- **MS** — середній квадрат (фактично дисперсія);
- **F** розрахункове значення критерію Фішера;
- **P-значення** — розрахунковий мінімальний рівень значущості;
- **F-критичне** — критичне (табличне) значення розподілу Фішера.

Під нею в чарунці **E13** нами розташовується прийнятий рівень значущості α , а у чарунці **G13** — значення розподілу Стюдента для прийнятого рівня статистичної значущості і ступеня вільності залишку (похибки), розраховане за статистичною функцією **СТЮДЕНТ.РАСП.2Х**.

Ми бачимо відсутність у табл. 10.7 оцінки повторення, вона повністю тотожна з табл. 10.4 та 10.5 і відповідно відмінна від 10.3.

Таблица 10.7. Результат ДА инструментом

Однофакторный дисперсионный анализ											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх S_d	HIP_{05} варіантів	Критерій Стюдента t	Рівень значущості p	
2	St (Стандарт)	4	1369	342.3	400.25	-	-	-	-	-	
3	A	4	1476	369.0	250.00	26.8	16.81	35.83	1.5912	0.132415	
4	B	4	1582	395.5	187.67	53.3	16.81	35.83	3.1675	0.006374	
5	C	4	1657	414.3	632.92	72.0	16.81	35.83	4.2829	0.000654	
6	D	4	1828	457.0	1355.33	114.8	16.81	35.83	6.8258	0.000006	
7	Дисперсионный анализ							$F3=D3-\$D\2 $H3=G3*\$G\12			
8	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	$I3=F3/G3$			
9	Между группами	30686.3	4	7671.5750	13.572404	0.000071	3.055568	$G12=СТЮДРАСПОБР(E12;C10)$			
10	Внутри групп	8478.5	15	565.2333				$G3=(\$D\$10/\$B\$2+\$D\$10/\$B3)^{0.5}$			
11	Итого	39164.8	19					$J3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(I3;\$C\$10)$			
12					$\alpha= 0.05$	$t_r= 2.1314$					

10.4.2.2. Дисперсійний аналіз подвійним використанням інструменту **Однофакторный дисперсионный анализ**

Для усунення цього недоліку пропонується для дисперсійного аналізу однофакторного дослід з повтореннями подвійне застосування інструменту **Дисперсионный анализ**, зокрема **Однофакторный дисперсионный анализ** (див. 10.3 Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента **ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПА Microsoft Excel**, зокрема, рис. 10.1) для чарунок **A4:E8** 10.3 (с. 567) при групуванні ☒ **по строкам** дає результат, наведений у чарунках **A9:G12** табл. 10.8. Згідно неї фактичне значення критерію Фішера (чарунка **E10**) не відрізняється від значень отриманих у табл. 10.3, с. 567, табл. 10.17, 588, табл. 10.8 на с. 574, табл. 10.18, с. 591, табл. 10.19, с. 591, табл. 10.21, с. 592 і табл. 10.22 на с. 592.

Дисперсійний аналіз, виконаний при групуванні ☐ **по столбцам** для чарунок **B4:E8** дає результат, представлений чарунками **A15:G18** табл. 10.8.

Об'єднавши, як показано на полі табл. 10.8, отримані у обох випадках дані і виконавши додатково ряд визначень, наведених за представленими також тут формулами, отримаємо результат (чарунки **E3:E4**), співпадаючий зі значеннями табл. 10.3, 10.17, 10.19, 10.21 і 10.22.

Таблиця 10.8. Виконання дисперсійного аналізу подвійним використанням інструменту **Однофакторный дисперсионный анализ**

	A	B	C	D	E	F	G
1	Дисперсионный анализ загальний						
2	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів свободи df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера Fф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера Fт
3	Варіантів, Cv	30686.30	4	7671.575	13.235030	0.000023454	3.259
4	Повторення, Cp	1522.80	3	507.600	0.875713	0.48078693	3.490
5	Залишок (похибка), Cz	6955.70	12	579.642			
6	Разом	39164.80	19				
7	B3=B10 D3=D10 B4=B16 D4=D16				$\alpha = 0.05$	B6=B12 C6=C12	
8	Дисперсионный анализ по строкам					E3=D3/\$D\$5 E4=D4/\$D\$5	
9	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
10	Между группами	30686.3	4	7671.575	13.5724	7.1291E-05	3.055568276
11	Внутри групп	8478.5	15	565.23333			
12	Итого	39164.8	19				
13	B5=B6-B3-B4 C5=C3*C4 D5=B5/C5				F3=1-F.РАСП(E3;C3;\$C\$5;ИСТИНА)		
14	Дисперсионный анализ по столбцам				F4=1-F.РАСП(E4;C4;\$C\$5;ИСТИНА)		
15	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
16	Между группами	1522.8	3	507.6	0.215759	0.88401532	3.238871517
17	Внутри групп	37642	16	2352.625			
18	Итого	39164.8	19				
					G3=FRASПОБР(\$E\$7;C3;\$C\$5)		
					G4=FRASПОБР(\$E\$7;C4;\$C\$5)		

Тут варто звернути увагу й не те, що критерій Фішера для повторень I, II, III й IV менше одиниці. Це свідчить про те, що вплив досліджуваного фактору менше впливу невідомих або неврахованих нами величин, а то й фальсифікації даних, що, власне, ми й зробили, прийнявши умовно повторність за повторення (фактор). Це також підтверджує, що повторення й фактори зовсім інші речі [136].

Так як розсіювання даних, викликане фактором дуже мале, можливо була фальсифікація експерименту чи неякісне його проведення (наявний невідомий фактор, або навіть декілька факторів), які не були враховані [25].

Подвійне застосування інструменту **Однофакторный дисперсионный анализ** дає змогу проводити дисперсійний аналіз однофакторного експерименту при відсутності деяких даних вибірки, а також двофакторного експерименту також при відсутності деяких даних вибірки, див .

Також при відсутності деяких даних при двофакторному експерименті ДА можна виконувати подвійним застосуванням інструменту **Однофакторный ДА** (див. підрозділ **10.8.2 Аналіз одно– і двофакторного експерименту інструментом ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ при пропусках даних**).

Альтернативою однофакторного ДА є порівняння незалежних вибірок за критерієм **Н–Краскела–Уоллеса**.

10.4.3. Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica

10.4.3.1. Особливості дисперсійного аналізу експериментів засобами ППП Statistica

Перелік видів ДА, які виконуються засобами **ППП Statistica** наведено на рис. 10.3. Особливістю їх застосування є те, що при однакових вихідних значеннях але різній організаційній формі їх представлення отримуються також різні представлення результатів.














Рис. 10.3. Види дисперсійного аналізу засобами **ППП Statistica**

До рис. 10.3 слід подати деякі пояснення. **Однофакторний ДА** використовується при вивченні впливу одного фактору на залежну змінну. При цьому перевіряється гіпотеза про вплив фактору на залежну змінну [123].



В ППП **Statistica** **Однофакторний ДА** а)  /  виконує тільки властиву йому функцію (див. підрозділ **10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**). У результаті отримується таблиця дисперсійного комплексу, де повторення чи варіанти розглядаються як одне ціле (див. табл. 10.9, с. 579). При цьому повторення повинні бути представлені одним стовбцем.



При застосування опції  /  з формуванням повторення окремим стовбцем, отримується таблиця у вигляді табл. 10.16, с. 586 і для одержання таблиця дисперсійного комплексу слід виконувати додаткові розрахунки (див. табл. 10.15, с. 584).

Методи  /  і  /  для однофакторного аналізу на можуть бути застосовані.

Аналіз б)  /  використовується при **багатофакторному ДА без повторень** (до чотирьох факторів включно) використовується (див. **10.5.1.2 Двофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**). У результаті отримується таблиця дисперсійного комплексу **без взаємодій ефектів**, див. табл. 10.18, с.591.

Цей спосіб використовується якщо ефект міжфакторної взаємодії не виявлений. він дає більш низький рівень нульових гіпотез і використовується для великих рівнях прийнятої статистичної значущості ($\alpha > 0.05$). [135]



При застосування для даного випадку опції  /  при формуванні відповідними стовбцями як факторів, так і числового масиву, отримується таблиця у вигляді табл. 10.22, с. 592.

Використання для цього опції  /  вимагає формування хоча б одного з факторів стовбцями за кількістю його рівнів. Результатом такого аналізу є, наприклад, табл. 10.16, с. 586.



Для одержання таблиць дисперсійного комплексу у обох випадках слід виконувати додаткові розрахунки (див. табл. 10.23, с. 592 і табл. 10.21, с. 592).

Багатофакторний (дво—...— чотирьохфакторний) ДА використовується при вивченні впливу двох і більше незалежних змінних (факторів) на залежну змінну. Він дозволяє перевіряти гіпотези не тільки про вплив кожного фактору окремо, але й про взаємодію факторів. Так, для двухфакторного ДА перевіряються три гіпотези:

- а) про вплив одного фактору;
- б) про вплив іншого фактору;
- в) про взаємодію факторів (про залежність ступеня впливу одного фактору від градацій іншого фактору). [123]

Опція в)  /  використовується для аналізу **багатофакторному ДА з повтореннями** до чотирьох факторів включно (див. підрозділ **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повтореннями при використанні ППП Statistica**), при формуванні відпові-



дними стовбцями як факторів, так і числового масиву. Отримана у результаті ДА таблиця дисперсійного комплексу має вигляд табл. 10.28, с. 602.

Використання для цього аналізу опції  /  вимагає формування числових значень повторень чи хоча б одного з факторів стовбцями за кількістю його рівнів. У результаті аналізу отримується представлення даних у вигляді табл. 10.32, с. 605.

Для одержання таблиці дисперсійного комплексу слід виконувати додаткові розрахунки (див. табл. 10.33, с. 606).

ДА з повторними вимірами застосовується, коли принаймні один з факторів змінюється за внутрішньогруповим планом, тобто різним градаціях цього чинника відповідає одна і та ж вибірка об'єктів (випробовуваних), тобто повторні виміри повинні містити повний комплекс повторів і повторень. Відповідно, в моделі ДА з повторними вимірами виділяються внутрішньогрупові і міжгрупові фактори. Для двухфакторного ДА з повторними вимірами по одному з факторів перевіряються три гіпотези:

- а) про вплив внутрішньогрупового фактору;
- б) про вплив міжгрупового фактору;
- в) про взаємодію внутрішньогрупового і міжгрупового факторів [123].

Для цього в ППП **Statistica** використання опції г)  /  з формуванням числових значень повторень чи хоча б одного з факторів стовбцями за кількістю його рівнів (див. підрозділ **10.5.4.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторними вимірами при використанні ППП Statistica**). Причому представлення колонками повторних вимірів чи факторів змінює результат оцінки довірчих параметрів. Про це саме свідчать результати табл. 10.43 на с. 613, отриманих у результаті ДА.

Цей спосіб слід застосовувати приймаючи повторним виміром фактор, на який ми не можемо впливати [123], наприклад, роки досліджень (див. табл. 10.42 на с. 613).

10.4.3.2. Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica

10.4.3.2.1. Використання опції **Однофакторный дисперсионный анализ**

При проведенні аналізу використовується табл. 10.3, с. 567, яка містить значення варіант показника при повтореннях замірів (чарунки **ВЗ:Е7**).

Дані цих чарунок заносяться в таблицю, *представивши одну колонку варіантом (фактором), яка будуть служити у якості коду, а другу — значеннями повторності експерименту*. Кількість рядків є добутком кількості варіантів на кількість повторень (рис. 10.4).




Рис. 10.4. Дисперсійний аналіз однофакторного дослідження опцією

One-way ANOVA / Однофакторный ДА

Для аналізу в меню **Statistics/Анализ** (1) використаємо модуль **ANOVA/Дисперсионный анализ (ДА)** (2), де на панелі процедур і установок **General ANOVA/MANOVA: / Общий ДА:** вибираємо вид аналізу **One-way ANOVA/Однофакторный ДА** (3), указуємо завдання **Quick specs dialog/Диалог** (4) і натиснувши **ОК** (5) переходимо на панель **General ANOVA/MANOVA: / Однофакторный ДА:**.

Натисненням кнопки **Variables/Переменные:** (6) на вкладці **Quick/Быстрый** панелі **General ANOVA/MANOVA: / Однофакторный ДА:** відкривається панель **Select dependent variables and optional categorical predictors (factors): / Выберите зависимые переменные и категориальные предикторы:**, де відмічаємо залежні змінні (7) і категоризований предиктор (8) та натиснувши **ОК** (9) повертаємося на панель **General ANOVA/MANOVA: / Однофакторный ДА:**. Коди **Factor codes: / Коды факторов:** (10) рівнів міжгрупових факторів, на панелі **Select codes for indep. vars (factors): / Выберите коды для независимых пере...** вибираємо всі (11) і натискаємо **ОК** (12).

Проте, задавати їх спеціально, виконуючи кроки (10–12) не потрібно, так як самою програмою передбачено використання в якості кодів міжгрупових факторів усіх значень вхідних змінних.

Таблица 10.9. Результаты ДА опцією Однофакторный ДА					
Эффект	Одномерный критерий значимости для Значення (Диспанализ) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	3129987	1	3129987	5537.513	0.000000
Вариант	30686	4	7672	13.572	0.000071
Ошибка	8479	15	565		

Далі натиснувши **ОК** (13) потрапляємо на вкладку **Quick/Быстрый** панелі **ANOVA Results / Результаты анализа**, де задіявши кнопку **All effects / Все эффекты** (14) одержуємо

табл. 10.9 з результатами ДА.

Англomовна версія **Statistica 8** на панелі **ANOVA Results / Результаты анализа** має кнопку **Effect sizes**, натисненням якої отримуємо табл. 10.10.

Таблица 10.10. Дополнительные показатели результатов ДА опцією

Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for Значення (Диспанализ.sta) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition								
Effect	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p	Partial eta-squared	Non-centrality	Observed power (alpha=0.05)
Intercept	3129987	1	3129987	5537.513	0.000000	0.997299	5537.513	1.000000
Вариант	30686	4	7672	13.572	0.000071	0.783517	54.290	0.999752
Error	8479	15	565					

Дані табл. 10.9 і 10.10 повністю відповідають даним табл. 10.7 на с. 573.

Таблиця 10.11. Статистична характеристика вибірових варіантів

N ячейки	Варіант; МНК средние (Диспаналіз) Текущ. эффект: $F(4, 15)=13.572$, $p=.00007$ Декомпозиция гипотезы					N
	Варіант	Значення Среднее	Значення Стд.ош.	Значення -95.00%	Значення +95.00%	
1	St	342.2500	11.88732	316.9128	367.5872	4
2	A	369.0000	11.88732	343.6628	394.3372	4
3	B	395.5000	11.88732	370.1628	420.8372	4
4	C	414.2500	11.88732	388.9128	439.5872	4
5	D	457.0000	11.88732	431.6628	482.3372	4

Перейшовши на вкладку **Comps** / **Контрасты** (15) і натиснувши **Display least squares means** / **МНК средние** (16) отримуюмо табл. 10.11 зі статистичною характеристикою вибірових варіантів, тобто, середнім, його похибкою та нижньою і верхньою

межами достовірного значення середнього, одержаних методом найменших квадратів (**МНК**).

Дисперсійний аналіз дозволяє перевірити лише гіпотезу про відсутність відмінностей між порівнюваними групами в цілому і за його допомогою неможливо дізнатися, які саме групи розрізняються між собою. Для цього слід скористатися методами множинних порівнянь, що є частиною так званого апостеріорного аналізу (повідомлення спеціального аналізу).

При їх роботі виконуються попарні порівняння середніх значень всіх груп, включених до дисперсійний аналіз.

ППП **Statistica** пропонує ряд тестів для множинних порівнянь, які розрізняються по потужності: **НІР** Фішера (**Fisher LSD**), Бонферроні (**Bonferroni**), Шеффе (**Scheffe**), Тьюкі (**Tukey HSD**), Ньюмена–Кейлса (**Newman–Keuls**), Дункана (**Duncan's**), Дуннета (**Dunnet**). Найчастіше використовуються тести Тьюкі і Ньюмена–Кейлса [120].

Для критеріальної оцінки розкриваємо панель **ANOVA Results** / **Результаты анализа** і натисненням кнопки **More results** / **Больше** (17), у вкладці **Post-hoc** / **Апостериорные** (18) для розрахунку **НІР** за критерієм Фішера активізуємо **Confidence intervals** / **Доверительные интервалы** (19) і натисненням **Fisher LSD** / **Фишера НЗР** (20) маємо матрицю даних для взаємних порівнянь варіантів (табл. 10.12 а).

Натиснувши кнопку **Bonferroni** / **Bonferroni** (23) одержуємо табл. 10.12 б) з даними за критерієм Бонферроні, кнопку **Scheffe** / **Шеффе** (24) — табл. 10.12 в) з даними оцінки за критерієм Шеффе.

Оцінка відмінності між варіантами за критерієм Тьюкі за довірчими інтервалами не виконується.


Варто зауважити, що номери чарунок в табл. 10.12 відповідають номерам чарунок табл. 10.11.

Сама величина **НІР** тут не наводиться. Тут подано величину істотних різниць (як різницю між значенням величин у першій і другій чарунці), стандартну похибку різниці, фактичний рівень статистичної значущості, межі довірчого інтервалу із для прийнятого рівня статистичної довірчої ймовірності **P**. Причому цей вибір не пов'язаний з вибором довірчого статистичного рівня значущості **α** (див. крок (14) на рис. 10.9, с. 601).


Таблиця 10.12 – Попарне порівняння даних за довірчими інтервалами

НЗР крит.; перем. Значення (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 565.23, cc = 15.000						
N ячейки	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	п	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-26.750	16.81121	0.132415	-62.582	9.0822
	3	-53.250	16.81121	0.006374	-89.082	-17.4178
	4	-72.000	16.81121	0.000654	-107.832	-36.1678
	5	-114.750	16.81121	0.000006	-150.582	-78.9178
2	3	-26.500	16.81121	0.135802	-62.332	9.3322
	4	-45.250	16.81121	0.016736	-81.082	-9.4178
	5	-88.000	16.81121	0.000101	-123.832	-52.1678
3	4	-18.750	16.81121	0.282261	-54.582	17.0822
	5	-61.500	16.81121	0.002336	-97.332	-25.6678
4	5	-42.750	16.81121	0.022516	-78.582	-6.9178



а) Критерій Фішера НІР (найменша істотна різниця)

 Fisher LSD /  Фишера НЗР

Bonferroni test; variable Значення (Диспаналіз) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 565.23, df = 15.000						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% LSD CL	+95.00% LSD CL
1	2	-26.750	16.81121	1.000000	-81.992	28.4923
	3	-53.250	16.81121	0.063737	-108.492	1.9923
	4	-72.000	16.81121	0.006540	-127.242	-16.7577
	5	-114.750	16.81121	0.000057	-169.992	-59.5077
2	3	-26.500	16.81121	1.000000	-81.742	28.7423
	4	-45.250	16.81121	0.167364	-100.492	9.9923
	5	-88.000	16.81121	0.001009	-143.242	-32.7577
3	4	-18.750	16.81121	1.000000	-73.992	36.4923
	5	-61.500	16.81121	0.023300	-116.742	-6.2577
4	5	-42.750	16.81121	0.225105	-97.992	12.4923



б) Критерій Бонферроні  Бонферроні /  Bonferroni





Scheffe test; variable Значення (Диспаналіз) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 565.23, df = 15.000						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-26.750	16.81121	0.646667	-85.523	32.0226
	3	-53.250	16.81121	0.086003	-112.023	5.5226
	4	-72.000	16.81121	0.012821	-130.773	-13.2274
	5	-114.750	16.81121	0.000167	-173.523	-55.9774
2	3	-26.500	16.81121	0.654372	-85.273	32.2726
	4	-45.250	16.81121	0.179199	-104.023	13.5226
	5	-88.000	16.81121	0.002411	-146.773	-29.2274
3	4	-18.750	16.81121	0.866157	-77.523	40.0226
	5	-61.500	16.81121	0.037972	-120.273	-2.7274
4	5	-42.750	16.81121	0.221609	-101.523	16.0226

в) Критерій Шеффе  Scheffe /  Шеффе





Величину НІР можна розрахувати, наприклад за табл. 10.12, чи подібними, як різницю **+95** % Дов. пред. і Середнє различий. Наприклад НІР між стандартом і варіантом А за табл. 10.12 становить 35.8322, що відповідає результатам табл. 10.7, с. 573.

У результатуючих таблицях статистично значущі на прийнятому рівні відмінності подано червоним кольором. Вони повністю співпадають із результатами табл. 10.3 (с. 567) і 10.4 (с. 569).

Для попарної оцінки за апостеріорними критеріями у вкладці **Post-hoc** / **Апостериорные** (**18**) активізуємо  Significant differences /  Значимые разности (**21**).

Далі кнопками  Fisher LSD /  Фишера НЗР (**20**) отримуємо табл. 10.13 а) — матрицю зі *p*-значущістю довірчих рівнів найменшої істотної різниці за критерієм Фішера (НІР) для оцінки відмінності між варіантами за критерієм Фішера,  Тьюкі /  Tukey HSD (**22**) — табл. 10.13 б) з

оцінкою достовірно значущої різниці (ДЗР) за критерієм Тьюкі [125].

Натиснувши кнопку  /  (23) одержуємо табл. 10.13 в) з даними за критерієм Бонферроні, кнопку  /  Шеффе (24) — табл. 10.13 г) з даними оцінки за критерієм Шеффе. У верхньому рядку таблиць наведені як і в табл. 10.11 середні арифметичні варіанту, а на перехрещенні варіантів подані довірчі рівні в формі шансів на користь нульової гіпотези — відсутності відмінності, причому, червоним кольором наведені значення статистично достовірних відмінностей на прийнятому рівні довірчої ймовірності $P = 95\%$. Ця величина, як показано на (див. крок (14) на рис. 10.9, с. 601), може задаватися довільно і не пов'язаний з вибором величини довірчого статистичного рівня значущості α .

Як бачимо отримані рівні p -значущості критеріїв множинних порівнянь за критерієм НІР Фішера у дані табл. 10.13 а і табл. 10.12 співпадають.

Таблиця 10.13 – Рівні значущості критеріїв результатів ДА (точкова оцінка)



НЗР крит.; перем. Значення (Диспаналіз) Вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 565.23, сс = 15.000						
N ячейки	Варіант	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
		342.25	369.00	395.50	414.25	457.00
1	St		0.132415	0.006374	0.000654	0.000006
2	A	0.132415		0.135802	0.016736	0.000101
3	B	0.006374	0.135802		0.282261	0.002330
4	C	0.000654	0.016736	0.282261		0.022510
5	D	0.000006	0.000101	0.002330	0.022510	

а) Критерій Фішера НІР (найменша істотна різниця)

 /  Фішера НЗР

Крит. Тьюки ДЗР; перем. Значення (Диспаналіз.sta) Приближенные вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 565.23, сс = 15.000						
N ячейки	Варіант	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
		342.25	369.00	395.50	414.25	457.00
1	St		0.524518	0.043181	0.005124	0.000183
2	A	0.524518		0.533140	0.102764	0.000935
3	B	0.043181	0.533140		0.796230	0.016991
4	C	0.005124	0.102764	0.796230		0.132914
5	D	0.000183	0.000935	0.016991	0.132914	

б) Достовірно значущої різниці (ДЗР) за критерієм

Тьюкі  /  Тукей ДЗР

Крит. Бонферроні; перем. Значення (Диспаналіз.sta) Вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 565.23, сс = 15.000						
N ячейки	Варіант	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
		342.25	369.00	395.50	414.25	457.00
1	St		1.000000	0.063737	0.006540	0.000057
2	A	1.000000		1.000000	0.167364	0.001009
3	B	0.063737	1.000000		1.000000	0.023300
4	C	0.006540	0.167364	1.000000		0.225105
5	D	0.000057	0.001009	0.023300	0.225105	

в) Критерій Бонферроні  /  Бонферроні

Крит. Шеффе; перемен. Значення (Диспаналіз) Вероятности для апостер. критериев Ошибка: Межгр. MS = 565.23, сс = 15.000						
N ячейки	Варіант	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}
		342.25	369.00	395.50	414.25	457.00
1	St		0.646667	0.086003	0.012821	0.000167
2	A	0.646667		0.654372	0.179199	0.002411
3	B	0.086003	0.654372		0.866157	0.037972
4	C	0.012821	0.179199	0.866157		0.221609
5	D	0.000167	0.002411	0.037972	0.221609	

г) Критерій Шеффе  /  Шеффе

Слід зауважити, що для оцінки значущих відмінностей між груповими середніми критерій **НІР** Фішера найменш консервативний; критерій Тьюкі більш консервативний за критерій Фішера, але менш консервативний за критерій Бонферроні, який застосовується для порівняння великого числа групових середніх.

Критерій Шеффе є одним із найконсервативніших апостеріорних критеріїв. За ним статистично достовірну відмінність зі стандартом виявлена в зразків **С** і **Д**. Відсутні відміни варіанта **А** зі стандартом (**St**) і **В** та **С**. Також виявилася відсутність достовірної відмінності між зразками **А** і **В** з **С** (табл. 10.13 г).

Оцінки за критеріями Тьюкі (табл. 10.13 б) і Бонферроні (табл. 10.13 в) у даному випадку співпадають з оцінками за критерієм Шеффе. У той час як за критерій **НІР** Фішера, (табл. 10.13 а) додатково статистично значущою є різниця зі стандартом і зразком **С** та у зразків **В** і **Д** з **С**.

У російськомовних версіях **Statistica** вона названа **НЗР** — *наименьшая значущая разность* (**LSD** у англomовній), у той час, як у російськомовній науковій літературі застосовується термін **НСР** — *наименьшая существенная разность*.

У [125] скорочення **НЗР** — стосується терміну *наименьший значущий ранг*.

Принцип розрахунку апостеріорних критеріїв Фішера і Шеффе подано відповідно в підрозділах **10.9.1 Множинний *t*-критерій Фішера (захисний *t*-критерій)** і **10.9.4 Основи розрахунку за тестом Шеффе**.

З розгляду даних наведених у табл. 10.3 на с. 567, табл. 10.4 на с. 569, табл. 10.7 (с. 573), 10.9 (с. 579) і табл. 10.10 на с. 579 видно, що їхні результати повністю співпадають.

Виходячи з цього повністю співпадають і результати розрахунку **НІР** за критерієм Фішера (табл. 10.14) з наведеними у цих таблицях.

Таблиця 10.14 – **НІР** за критерієм Фішера при відсутності деяких даних

N ячейки	НЗР крит.: перем. Значення (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 517.78, сс = 12.000					
	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-26.750	16.09013	0.122289	-61.807	8.3074
	3	-43.750	19.70631	0.046430	-86.686	-0.8136
	4	-60.083	17.37933	0.004742	-97.950	-22.2170
	5	-114.750	16.09013	0.000012	-149.807	-79.6926
2	3	-17.000	19.70631	0.405231	-59.936	25.9364
	4	-33.333	17.37933	0.079217	-71.200	4.5330
	5	-88.000	16.09013	0.000143	-123.057	-52.9426
3	4	-16.333	20.77227	0.446939	-61.592	28.9256
	5	-71.000	19.70631	0.003627	-113.936	-28.0636
4	5	-54.667	17.37933	0.008445	-92.533	-16.8004

10.4.3.2.2. Використання опції **ПОВТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

Однофакторний ДА із застосуванням опції **Repeated measures ANOVA** / **Повторные измерения ДА** створює табл. 10.15 з вихідними даними, розташованими в чарунках **A1:E7** (табл. 10.3). Вона містить значення варіант показника при повтореннях замірів (чарунки **B3:E7**).

Таблица 10.15. Дисперсійний аналіз з використанням опції

Repeated measures ANOVA / **Повторные измерения ДА**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Варіант	Повторення					Варіант	Показник	Критерій Стюдента <i>t</i>	Рівень значущості <i>p</i>	
2		I	II	III	IV						
3		St (Стандарт)	331	372	330						336
4		A	379	364	384						349
5		B	385	415	395						387
6	C	407	391	409	450		C	414	4.2829	0.000654	
7	D	432	503	470	423		D	457	6.8258	0.000006	
8											
9	Дисперсія		Сума квадратів <i>SS</i>	Число ступенів вільності <i>df</i>	Середній квадрат <i>MS</i>	Критерій Фішера <i>F_ф</i>	Рівень значущості <i>p</i>	H3=CP3HAЧ(B3:E3) I4=(H4-\$H\$3)/\$F\$16 F11=E11/\$E\$12 F16=(2*E12/С4ЁТ(B3:E3))^0.5			
10	Корегуючий фактор C	Св. член	3129987.2	1	3129987.2						
11	Варіантів C _v	Сорт	30686.3	4	7671.6	13.57240	0.000071				
12	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	8478.5	15	565.2						
13	C12=СУММ(C13:C15)	ПОХИБКА	1522.8	3	507.6						
14	D12=СУММ(D13:D15)	ПОХИБКА*Сорт	6955.7	12	579.6			J4=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(I4;\$D\$12)			
15	E12=C12/D12	Ошибка		0				G11=1-F.РАСП(F11;D11;\$D\$12;ИСТИНА)			
16	Похибка різниці середніх S _d = 16.81										

H3=CP3H4(B3:E3)
I4=(H4-\$H\$3)/\$F\$16
F11=E11/\$E\$12
F16=(2*E12/СЧЁТ(B3:E3))^0.5

J4=СТЮДЕНТ.РАСП.2Х(I4;\$D\$12)
G11=1-F.РАСП(F11;D11;\$D\$12;ИСТИНА)

Скопіюємо чарунки **A3:E7** табл. 10.15 в таблицю, представивши одну колонку варіантом (фактором), яка будуть служити у якості коду, а чотири колонки I–IV — значеннями повторності експерименту і перейменуємо колонки відповідно до її головки (рис. 10.5).




Рис. 10.5. Дисперсійний аналіз однофакторного досліджу опцією

Repeated measures ANOVA / Повторные измерения ДА

У меню **Statistics / Анализ** (1) використовуємо модуль **ANOVA / Дисперсионный анализ (ДА)** (2) і на панелі процедур і установок **General ANOVA/MANOVA:** / **Общий ДА:** вибираємо опцію **Repeated measures ANOVA / Повторные измерения ДА** (3) і **Quick specs dialog / Диалог** (4) та натискаємо **OK** (5). Натисненням кнопки **Variables / Переменные** (6) на вкладці **ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: / Повторные измерения ДА:** відкривається панель **Select dependent variables and optional categorical predictors (factors): / Выберите зависимые переменные и категориальные предикторы:**

Тут відмічаємо залежні змінні (7) і регресори (8) та натиснувши **OK** (9) повертаємося на панель процедур і установок **ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: / Повторные измерения ДА:**

При завданні факторів потрібно вказати, що залежні змінні містять значення одного фактору вимірів, який має чотири рівні (тобто повторення представити як повторність), інакше програма буде розглядати повторення I–IV як фактори й виконає багатомірний ДА.

Для того щоб визначити фактор, який нас цікавить, слід натиснути кнопку Within effects: / Внутригруп. ефекти: (10) панелі ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: / Задать фактор с повторными изм... і задати 4 рівні (11) вихідного фактору R1 (згідно кількості повторності) (12). Після натиснення **ОК** (13) знову повертаємося на панель ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: / Повторные измерения ДА.

Коди Factor codes: / Коды факторов, що визначають рівні міжгрупових факторів, задавати не потрібно, так як програма сама використовує в якості кодів міжгрупових факторів усі значення вхідних змінних.

Далі натиснувши **ОК** (14) переходимо на панель ANOVA Results 1: / Результаты анализа2: , де задіявши кнопку All effects: / Все эффекты (15) маємо

табл. 10.16 з результатами дисперсійного аналізу.

Недоліком застосування опції Repeated measures ANOVA / Повторные измерения ДА для однофакторного експерименту окрім громіздкості є неможливість оцінки результатів методом множинних порівнянь і обробки вибірки з пропущеними даними.

Копіюємо табл. 10.16 із заголовками із ППП **Statistica** у чарунки **B9:G15**. Нижче у чарунці **F16** розташовувана похибка різниці середніх, отриманої за виразом (10.35), визначеної для середнього квадрату залишку (похибки) і кількості повторень.

Для перевірки відмінності варіантами від стандарту у чарунках **G2:J7** створюється таблиця, де поваріантно подано середнє значення показника, критерій Стюдента та його рівень значущості, пов'язані залежностями із двома першими таблицями.

У чарунки **F11** і **F13** заноситься розрахункове значення критеріїв Фішера, виконане за формулою (10.1), у чарунки **G11** і **G13** — рівні їх значущості, для визначення яких використовується статистична функція пакету **Excel 1-F.PАСП** (див. Додаток А), беручи до уваги, що $p = 1 - p$. Тут перше число пов'язується зі значенням F , а друге і третє представляють собою ступені вільності показника і похибки, четвертим призначається **ИСТИНА**.

Результати табл. 10.4 на с. 569, табл. 10.5 на с. 570, табл. 10.7 на с. 573, табл. 10.9 на с. 579, табл. 10.10 на с. 579 і табл. 10.15 на с. 584 співпадають.

Таблица 10.16. Результаты ДА опцією

Повторные измерения ДА

Эффект	Дисперсионный анализ с повторными измерениями Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	3129987,2	1	3129987,2		
Сорт	30686,3	4	7671,6		
Ошибка		0			
ПОХИБКА	1522,8	3	507,6		
ПОХИБКА*Сорт	6955,7	12	579,6		
Ошибка		0			

10.5. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДВОФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ

10.5.1. Двофакторний експеримент без повторення

10.5.1.1. Застосування пакету Excel при двофакторному ДА без повторення

Розглянемо приклад застосування інструменту **Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений** на основі вихідних даних табл. 10.3, с. 567). Значення залежної змінної (варіанти) визначалося для сортів **St** (стандарт), **A**, **B**, **C** і **D** проведенням дослідів на чотирьох різних ділянках **I**, **II**, **III** й **IV**, тобто *факторами є як сорт, так і ділянка*.

Натиснувши **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) потрапляємо на панель **Анализ данных**, вибираємо інструмент **Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений** (3) і натисненням кнопки **ОК** (4) виводимо панель **Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений**, де задаємо значення

Альфа: 0.05 (5), ☒ **Метки** (6), указуємо виведення даних на ☒ **Новый рабочий лист:** (7), задаємо інтервал **\$A\$3:\$E\$8** (8) і натискаємо **ОК** (9) (рис. 10.6).

Результати у дещо редагованому виді представлена в табл. 10.17. Її особливістю є визначення **НІР** як при оцінці сортів, так і ділянок.




Рис. 10.6. Застосування інструменту

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений для аналізу двофакторного експерименту

Таблица 10.17. Результат ДА двофакторного експерименту без повторень відповідним інструментом

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений									
2	ИТОГИ	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх S_d	HIP ₀₅	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
3	St (Стандарт)	4	1369	342.3	400.25	-	-	-	-	-
4	A	4	1476	369.0	250.00	26.75	17.02	37.09	1.5713	0.142094
5	B	4	1582	395.5	187.67	53.25	17.02	37.09	3.1279	0.008726
6	C	4	1657	414.3	632.92	72.00	17.02	37.09	4.2293	0.001169
7	D	4	1828	457.0	1355.33	114.75	17.02	37.09	6.7404	0.000021
8										
9	I (Стандарт)	5	1934	386.8	1407.20	-	-	-	-	-
10	II	5	2045	409.0	3147.50	22.20	15.23	33.18	1.4580	0.170524
11	III	5	1988	397.6	2533.30	10.80	15.23	33.18	0.7093	0.491706
12	IV	5	1945	389.0	2322.50	2.20	15.23	33.18	0.1445	0.887518
13										
14	Дисперсионный анализ									
15	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	G20=СТЬЮДРАСПОБР(\$E\$20;\$C\$18) F4=D4-\$D\$3 F10=D10-\$D\$9 G4=(\$D\$18*(1/\$B\$3+1/B4))^0.5 G10=(\$D\$18*(1/\$B\$9+1/B10))^0.5 H4=G4*\$G\$20 H10=G10*\$G\$20 I4=F4/G4 J4=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2X(I4;\$C\$18) E23=1/E17 E24=E17 F23=1-F.РАСП(E17;\$C\$18;C17;ИСТИНА) F24=1-F.РАСП(E17;C17;\$C\$18;ИСТИНА) F25=1-F.РАСП(E17;C17;\$C\$18;ИСТИНА) G23=ФРАСПОБР(\$E\$20;\$C\$18) G24=ФРАСПОБР((1-\$E\$20/2);\$C\$18) G25=ФРАСПОБР(\$E\$20/2;\$C\$18)		
16	Строки	30686.3	4	7671.575	13.235030	0.000235	3.259167			
17	Столбцы	1522.8	3	507.600	0.875713	0.480787	3.490295			
18	Погрешность	6955.7	12	579.642						
19	Итого	39164.8	19							
20					$\alpha = 0.05$		$t_r = 2.1788$			
21										
22	Джерело варіації	Критеріальний показник			Критерій Фішера Fф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера Fт			
23	Варіанти	Обернене значення			1.1419261	0.628337	8.744640661			
24		Нижня критеріальна межа			0.875713	0.480787	0.069751777			
25		Верхня критеріальна межа			0.875713	0.480787	4.47418481			

G20=СТЬЮДРАСПОБР(\$E\$20;\$C\$18)
 F4=D4-\$D\$3 F10=D10-\$D\$9
 G4=(\$D\$18*(1/\$B\$3+1/B4))^0.5
 G10=(\$D\$18*(1/\$B\$9+1/B10))^0.5
 H4=G4*\$G\$20 H10=G10*\$G\$20
 I4=F4/G4
 J4=СТЬЮДЕНТ.РАСП.2X(I4;\$C\$18)
 E23=1/E17 E24=E17 E25=E17
 F23=1-F.РАСП(E17;\$C\$18;C17;ИСТИНА)
 F24=1-F.РАСП(E17;C17;\$C\$18;ИСТИНА)
 F25=1-F.РАСП(E17;C17;\$C\$18;ИСТИНА)
 G23=ФРАСПОБР(\$E\$20;\$C\$18;C17)
 G24=ФРАСПОБР((1-\$E\$20/2);C17;\$C\$18)
 G25=ФРАСПОБР(\$E\$20/2;C17;\$C\$18)

Дані табл. 10.17 складаються із трьох таблиць: верхня представляє собою статистичну характеристику рядків (чарунки **A2:E12**), де в колонках наведено статистичні показники варіантів — кількість повторень, сума, середнє й дисперсія; у середній частині листа (чарунки **A12:G19**) подано підсумкову таблицю зі статистичною характеристикою стовбців. У нижній таблиці одержані результати ДА, наведені у чарунках **A15:G19**. Її рядки показують саме яких джерела варіювання стосуються ці дані, тобто рядків (варіантів) і стовбців, похибки досліду (варіювання між групами) та суми всіх перелічених (корегуючого чинника, поправки).

Розглядаючи результат, бачимо, що для стовбців отримано $F < 1$. Так як при ДА в **Excel** перевіряється альтернативна гіпотеза: дисперсія чисельника більше дисперсії знаменника, тобто однобічна гіпотеза, яка подібні ситуації не враховує, тому одержані результати некоректні.

Тому для коректної перевірки слід або поміняти місцями чисельник і знаменник у формулі (10.1) та виходячи із цього знову обчислити розрахункове й критичне значення критеріїв Фішера та порівняти їх, або ж визначити нижню критеріальну межу (див. с. 341).

Розглянувши наш випадок, зокрема, значення чарунки **E17**, представимо його в чарунці **E23** як дріб $1/E17$, де нове критичне значення критерію Фішера, подане в **G23**, знаходиться за функцією **F.ОБР.ПХ** при зміні місць ступенів вільності чисельника й знаменника.

Так як нове розрахункове значення F менше нового критичного F_{α} , гіпотеза про рівність дисперсій виходячи також з однобічної перевірки відхиляється й приймається гіпотеза, що міжгрупова дисперсія більше за групову.

У цьому разі далі виконується порівняння із застосуванням нижньої й верхньої критеріальних меж, коли критичне значення не змінюється (див. чарунки **E24** і **E25**), але розраховуються нові значення для критеріальних меж: нижньої $1 - \alpha/2$ і верхньої $\alpha/2$, результати яких подано відповідно в чарунках **G24** і **G25**.

Недоліком інструменту Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений не дозволяє виконувати ДА вибірок із пропущеними значеннями.

У даному випадку розрахункове значення (чарунка **F17**) знаходиться всередині цих меж, тому гіпотеза про відсутність відмінності приймається.

Якщо розрахункове значення було б більше верхнього або менше нижнього, то слід було б приймати альтернативну гіпотезу з формулюванням: міжгрупова й групова дисперсія розрізняються із прийнятим рівнем статистичної значущості.

10.5.1.2. Двофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica

При проведенні даного аналізу вихідні дані, наведені на рис. 10.6, с. 587 у таблиці ППП **Statistica** формуються трьома колонками — варіант (сорт) і ділянка, які будуть служити у якості коду, та значеннями варіант показника. Кількість рядків є добутком кількості варіантів на кількість повторень (рис. 10.4).

Порядок проведення аналізу аналогічний представленому на рис. 10.4 за винятком того, що на панелі процедур і установок **General ANOVA/MANOVA:** / **Общий ДА:** вибираємо вид аналізу **Main effects ANOVA** / **Главные эффекты** (3) і на панелі **Select dependent variables and optional categorical predictors (factors):** /

Выберите зависимые переменные, де відмічаємо інші залежні змінні (7) і категоризовані предиктори (8) (рис. 10.7). Причому, усі види ДА, які виконуються ППП **Statistica** мають змогу обробляти вибірки із пропущеними даними.

Результати ДА наведені в табл. 10.18 і для англomовної версії **Statistica 8.0** в табл. 10.19.

Статистична характеристика вибірових варіантів, знайдених методом найменших квадратів (МНК), яка виводиться

натисканням **Display least squares means** / **МНК средние** (16) повністю співпадає з табл. 10.11.

Відповідно до табл. 10.9, с. 579, 10.10, с. 579 і 10.12 на с. 581 одержуємо табл. 10.18–10.20. Табл. 10.20 містить значення **НІР**, розраховані для сортів і для ділянок.

Порівнюючи відповідно дані табл. 10.9, 10.10 і 10.12 з даними табл. 10.18, 10.19 і 10.20 бачимо їх відмінність між собою, так як у першому випадку варіанти **I–IV** є повторністю, а в другому — повторенням (фактором).





Рис. 10.7. Дисперсійний аналіз двофакторного досліджу опцією **Main effects ANOVA** / **Главные эффекты**

Таблиця 10.18. Результати ДА опцією

 Главные эффекты


Эффект	Одномерный критерий значимости для Значення (Диспаналіз) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	3129987	1	3129987	5399.866	0.000000
Варіант	30686	4	7672	13.235	0.000235
Ділянка	1523	3	508	0.876	0.480787
Ошибка	6956	12	580		


Таблиця 10.19. Додаткові показники результатів ДА при використанні опції  Main effects ANOVA ППП Statistica 8.0

Effect	Univariate Tests of Significance, Effect Sizes, and Powers for Значення (Диспаналіз) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition							
	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p	Partial eta-squared	Non-centrality	Observed power (alpha=0.05)
Intercept	3129987	1	3129987	5399.866	0.000000	0.997783	5399.866	1.000000
Варіант	30686	4	7672	13.235	0.000235	0.815214	52.940	0.999209
Ділянка	1523	3	508	0.876	0.480787	0.179607	2.627	0.186582
Error	6956	12	580					

Порівнюючи результати, наведені в табл. 10.18, 10.19 і 10.20 та табл. 10.17, с. 588 бачимо що вони співпадають.

При застосуванні опції

 Repeated measures ANOVA /

 Повторные измерения ДА

для двофакторного ДА аналогічне описаній вище, з тою різницею, що у табл. 10.21 на відміну від табл. 10.15 на с. 584, дані при вставлені табл. 10.16 на с. 586 чарунок C12 і D12 відповідають чарункам C14 і D12.

Таблиця 10.20 – НЗР за критерієм Фішера

Сорт

N ячеек	НЗР крит.: перем. Значення (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 579.64, cc = 12,000					
	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная p	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-26.750	17.02413	0.142094	-63.842	10.3424
	3	-53.250	17.02413	0.008726	-90.342	-16.1576
	4	-72.000	17.02413	0.001166	-109.092	-34.9076
	5	-114.750	17.02413	0.000021	-151.842	-77.6576
2	3	-26.500	17.02413	0.145531	-63.592	10.5924
	4	-45.250	17.02413	0.020866	-82.342	-8.1576
	5	-88.000	17.02413	0.000235	-125.092	-50.9076
3	4	-18.750	17.02413	0.292333	-55.842	18.3424
	5	-61.500	17.02413	0.003563	-98.592	-24.4076
4	5	-42.750	17.02413	0.027350	-79.842	-5.6576

Ділянка

N ячеек	НЗР крит.: перем. Значення (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 579.64, cc = 12,000					
	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная p	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-22.2000	15.22684	0.170524	-55.3764	10.97644
	3	-10.8000	15.22684	0.491706	-43.9764	22.37644
	4	-2.2000	15.22684	0.887518	-35.3764	30.97644
2	3	11.4000	15.22684	0.468473	-21.7764	44.57644
	4	20.0000	15.22684	0.213584	-13.1764	53.17644
3	4	8.6000	15.22684	0.582619	-24.5764	41.77644

Таблиця 10.21. Дисперсійний аналіз з використанням опції

Повторные измерения ДА

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Повторення									
2	Варіант	I	II	III	IV		Варіант	Показник	Критерій Стьюдента t	Рівень значущості p
3	St (Стандарт)	331	372	330	336		St	342	-	-
4	A	379	364	384	349		A	369	1.5713	0.142094
5	B	385	415	395	387		B	396	3.1279	0.008726
6	C	407	391	409	450		C	414	4.2293	0.001169
7	D	432	503	470	423		D	457	6.7404	0.000021
8										
9	Дисперсія		Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _ф	Рівень значущості p			
10	Корегуючий фактор C	Св. член	3129987.20	1	3129987.20		H3=CP3HA4(B3:E3) I4=(H4-\$H\$3)/\$F\$16 F11=E11/\$E\$12 F13=E13/\$E\$12 E16=(2*E12/СЧЕТ(B3:E3))^0.5			
11	Варіантів C _v	Сорт	30686.30	4	7671.58	13.23503	0.000235			
12	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	6955.70	12	579.64					
13	Повторення C _p	ПОХИБКА	1522.80	3	507.60	0.87571	0.480787			
14	C12=C14 D12=D14	ПОХИБКА*Сорт	6955.70	12	579.64		G11=1-F.РАСП(F11;D11;\$D\$12;ИСТИНА) G13=1-F.РАСП(F13;D13;\$D\$12;ИСТИНА)			
15	E12=C12/D12	Ошибка		0						
16	Похибка різниці середніх S _d = 17.02									

Такі ж результати (табл. 10.22) отримуємо при застосуванні опції

Factorial ANOVA /

Факторный ДА

(табл. 10.23).

Особливості її застосування інтуїтивно зрозумілі на основі описаного нижче у підрозділі 10.5.2.3

Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica.

Таблиця 10.23. Дисперсійний аналіз з використанням опції

Факторный ДА / Factorial ANOVA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Повторення									
2	Варіант	I	II	III	IV		Варіант	Показник	Критерій Стьюдента, t	Рівень значущості, p
3	St (Стандарт)	331	372	330	336		St	342	-	-
4	A	379	364	384	349		A	369	1.5713	0.142094
5	B	385	415	395	387		B	396	3.1279	0.008726
6	C	407	391	409	450		C	414	4.2293	0.001169
7	D	432	503	470	423		D	457	6.7404	0.000021
8	C14=C13 D14=D13 E14=C14/D14 F11=E11/\$E\$14 F12=E12/\$E\$14									
9	Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p			
10	Корегуючий фактор, C	Св. член	3129987	1	3129987		G11=1-F.РАСП(F11;D11;\$D\$14;ИСТИНА) G12=1-F.РАСП(F13;D12;\$D\$14;ИСТИНА)			
11	Варіантів, C _v	Варіант	30686	4	7672	13.23503	0.030049			
12	Повторення, C _p	Ділянка	1523	3	508	0.87571	0.542152			
13	Взаємодія	Варіант*Ділянка	6956	12	580					
14	Залишок (похибка), C _z	Ошибка	6956	12	579.64					
15	F15=(2*E14/СЧЕТ(B3:E3))^0.5 Похибка різниці середніх, S _d = 17.02						J4=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(I4;\$D\$14) J7=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(I7;\$D\$14)			

10.5.2. Двофакторний експеримент із повторенням

10.5.2.1. Розрахунковий метод дисперсійного аналізу

Розглянемо також **Приклад 3** [34, с. 228] — дослідження при двох градаціях фактору **A** (число варіант $l_A = 2$) і трьох градаціях фактору **B** (число варіант $l_B = 3$, а разом 6 груп) проведене при чотирьох повтореннях ($n = 4$).

На полі табл. 10.24 представлено розрахунки, виконані за формулами [34] з використанням пакету **Excel**. Вихідна таблиця даних розташована в чарунках **B1:G8** листа, таблиця з результатами займає чарунки **A25:F30**.

Спеціальні розрахункові формули для обчислень наведені в підрозділі **10.1 Основні положення дисперсійного аналізу**. Емпіричне значення критерію Фішера **F** знаходиться за формулою (10.1), критичне — за статистичною функцією **Excel**, **F.ОБР.ПХ** (див. с. 562).

При цьому слід звернути увагу на помилкові результати розрахунків, виявлені нами в [34] (чарунки **L5**, **M5**, **L16**, **M16**, **L18** і **M18**), ці цифри виділені червоним кольором і взяті в рамку.

В табл. 10.25 наведено виконання ДА за цими ж формулами даних, представлених у [135] на с. 50, а виконання дисперсійного аналізу цих же даних способом, викладеним в [135] подано на полі табл. 10.26.

При цьому для вибірки, кожної з груп і факторів визначається середнє арифметичне і кількість елементів та загальна дисперсія $s_{\text{виб}}$ вибірки.

Далі знаходимо девідати: вільний член **C**, загальну суму квадратів — девідату **C_Г** за виразом

$$C_G = (n-1) \cdot s_{\text{виб}}^2, \quad (10.27)$$

міжгрупову (загальнофакторну) девідату **D_{BG}**

$$D_{BG} = \sum_{j=1}^k \frac{(\sum x_i)^2}{n} - \sum_{j=1}^k \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N}, \quad (10.28)$$

де **n** — число спостережень в кожній групі;
j — знак підсумовування середніх по **k** групам;
i — індекс підсумовування значень всіх спостережень окремо.

Фактично міжгрупова, або загальна факторна сума квадратів є оцінкою вкладу лінійної двофакторної моделі в загальну суму квадратів. Тому її іноді називають модельною.

Таблиця 10.24. Розрахунковий метод ДА для двофакторного експерименту

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Фактори		Повторність				Квадрати повторності				Сума	Квадрат суми
2		A	B	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
3		a0	b0	24,1	25,8	23,0	27,0	580,81	665,64	529,00	729,00	99,9	9980,01
4	J18=СУММ(J16:J17)	a0	b1	28,4	29,7	30,1	27,4	806,56	882,09	906,01	750,76	115,6	13363,36
5	a0	b2	28,7	30,4	32,0	17,0	823,69	924,16	1024,00	289,00	108,1	11685,61
6	M18=СУММ(M16:M17)	a1	b0	30,7	34,4	34,0	31,0	942,49	1183,36	1156,00	961,00	130,1	16926,01
7	M16=СУММ(J16:L16)	a1	b1	46,7	45,4	47,1	46,3	2180,89	2061,16	2218,41	2143,69	185,5	34410,25
8	M17=СУММ(J17:L17)	a1	b2	59,4	50,7	64,5	60,1	3528,36	2570,49	4160,25	3612,01	234,7	55084,09
9										Сума	35628,83	873,9	763701,21
10	Кількість дослідів	la	2	H3=D3^2									
11	Кількість дослідів	lb	3				L3=СУММ(D3:G3)					
12	Кількість повторень	np	4	K8=G8^2								
13	Загальна кількість спостережень	N	24	K9=СУММ(H3:K8)				L8=СУММ(D8:G8)					
14	Корегуючий фактор (поправка)	C	31820,88	M3=L3^2				L9=СУММ(L3:L8)					
15	Загальна сума квадратів	Dy	3807,95	M9=L9^2				C13=C10*C11*C12					
16	Сума квадратів повторень	Dp		C14=M9/C13									
17	Сума квадратів варіант	Dv	3541,45	C15=K9-C14									
18	Середній квадрат похибки	Dz	266,50	C17=СУММ(M3:M8)/C12-C14									
19	Сума квадратів фактора А	Da	2141,37	C18=C15-C17									
20	Сума квадратів фактора В	Db	813,25	C19=(M16^2+M17^2)/(C12*C11)-C14									
21	Сума квадратів взаємодії АВ	Dab	586,83	C20=(J18^2+K18^2+L18^2)/(C10*C12)-C14									
22	Критерій Стьюдента	t	2,101	C21=C17-C19-C20									
23	Найменша істотна різниця	HIP	5,716	C22=СТЮДРАСПОБР(0.05;C30)									
24				C23=C22*(2*D30/C12)^0.5									
25	Дисперсія	Сума квадратів	Ступінь свободи	Середній квадрат	Критерій Фішера, Fф	Критерій Фішера, Fт							
26	Загальна	3807,95	23	-	-	-							
27	Фактор А	2141,37	1	2141,37	144,63	4,41							
28	Фактор В	813,25	2	406,62	27,46	3,55							
29	Взаємодії АВ	586,83	2	293,42	19,82	3,55							
30	Залишок (похибка)	266,50	18	14,81	-	-							

Таблиця 10.25. Розрахунковий метод ДА для двофакторного експерименту

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	I3=СУММ(D3:H3) I9=СУММКВ(D3:H8) I10=(СУММ(D3:H8))^2 C10=СЧЁТ(D3;D6) C11=СЧЁТ(D3:D5) C12=СЧЁТ(D3:H3) C13=СЧЁТ(D3:H8)	Фактори		Повторення					Сума	G14=I3 H14=I4 I14=I5 G15=I6 H15=I7 I15=I8	
2		A	B	I	II	III	IV	V			
3		a1	b1	4.8	3.2	3.1	3.9	3.8	18.8		
4		a1	b2	5.3	4.1	3.9	4.7	5.0	23.0		
5		a1	b3	7.2	6.8	5.4	5.9	6.3	31.6		
6		a2	b1	7.5	7.8	9.2	7.3	5.8	37.6		
7		a2	b2	6.0	4.2	3.8	4.8	5.2	24.0		
8		a2	b3	3.8	3.2	4.8	3.7	3.3	18.8		
9	C14=I10/C13 C15=I9-C14						Сума квадратів		860.60		
10	Кількість дослідів	<i>nA</i>	2	Квадрат суми						23654.44	
11	Кількість дослідів	<i>nB</i>	3	F24=F.ОБР.ПЖ(\$E\$30;C24;\$C\$29)							
12	Кількість повторнь	<i>k</i>	5	B							
13	Загальна кількість спостережень	<i>N</i>	30	B24=C14			b1	b2	b3	Сума A	
14	Корегуючий фактор (поправка)	<i>C</i>	788.48	B25=C15	A	a1	18.8	23.0	31.6	73.4	
15	Загальна сума квадратів	<i>DY</i>	72.12	B26=C19		a2	37.6	24.0	18.8	80.4	
16	Сума квадратів повторень	<i>Dp</i>			Сума B		56.4	47.0	50.4	153.8	
17	Сума квадратів варіант	<i>Dv</i>	56.36	C17=СУММКВ(I3:I8)/C12-C14 C22=C17-C19-C20							
18	Середній квадрат помилки	<i>Dz</i>	15.76	C19=(J14^2+J15^2)/(C12*C11)-C14 C25=C13-1							
19	Сума квадратів фактора A	<i>DA</i>	1.63	C20=(G16*G16+H16*H16+I16*I16)/(C10*C12)-C14							
20	Сума квадратів фактора B	<i>DB</i>	4.53	B27=C20 B28=C21 B29=C18 C26=C10-1							
21	Сума квадратів взаємодії AB	<i>DAB</i>	50.19								
22											
23	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Емпіричний критерій Фішера Fe	Табличний критерій Фішера Fт	C27=C11-1 C28=C26*C27 C29=C25-C26-C27-C28 D24=B24/C24 E24=D24/\$D\$29 C18=C15-C17 C21=C17-C19-C20 J14=СУММ(G14:I14) G16=СУММ(G14:G15)				
24	Вільний член	788.48	1 —	788.48	1200.73	4.260					
25	Загальна варіація	72.12	29	-	-	-					
26	Фактор A	1.63	1	1.63	2.49	4.260					
27	Фактор B	4.53	2	2.27	3.45	3.403					
28	Взаємодії AxB	50.19	2	25.10	38.22	3.403					
29	Залишок (похибка)	15.76	24	0.66	-						
30				α=	0.05						

Таблиця 10.26. Розрахунковий метод ДА для двофакторного експерименту

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
26	Фактор А		a1	a2	a1	a2	a1	a2	<div>N35=СЧЁТ(N28:N32;P28:P32;S28:S32)T51=T49/T45</div> <div>N36=СУММ(N28:N32)+СУММ(P28:P32)+СУММ(R28:R32)</div> <div>T44=(СУММ(N28:S32))^2/СЧЁТ(N28:S32)U45=N39-1</div> <div>T47=СУММКВ(N38:S38)/(N33*СЧЁТ(N28:O28))-N40^2/N39</div> <div>T49=СУММКВ(N34:S34)/N33-N40^2/N39U48=U46*U47</div> <div>T52=(T47+T48)/(T50+T48+T47)U46=СЧЁТ(N28:O28)-1</div> <div>U47=СЧЁТ(N28;P28;R28)-1U49=(U46+1)*(U47+1)-1</div> <div>U50=N39-(U46+1)*(U47+1)V44=T44/U44</div> <div>W44=V44/\$V\$50X44=F.РАСП.ПХ(W44;U44;\$U\$50)</div> <div>Y44=F.ОБР.ПХ(\$W\$51;U44;U50)</div> <div>Z46=Z51*(2*V50/((U45+1)/(U46+1)))^0.5</div> <div>Z47=Z51*(2*V50/((U45+1)/(U47+1)))^0.5</div> <div>Z48=Z51*(2*V50/(((U45+1)/((U46+1)*(U47+1)))))^0.5</div>						
27	Фактор В		b1		b2		b3								
28		1	4.8	7.5	5.3	6.0	7.2	3.8							
29		2	3.2	7.8	4.1	4.2	6.8	3.2							
30		3	3.1	9.2	3.9	3.8	5.4	4.8							
31		4	3.9	7.3	4.7	4.8	5.9	3.7							
32		5	3.8	5.8	5.0	5.2	6.3	3.3							
33	За групами	Кількість <i>n</i>	5	5	5	5	5	5							
34		Сума	18.8	37.6	23.0	24.0	31.6	18.8							
35	За фактором А	Кількість <i>n</i> _А	15			15									
36		Сума	73.4			80.4									
37	За фактором В	Кількість <i>n</i> _В	10		10		10								
38		Сума	56.4		47.0		50.4								
39	Загалом	Кількість <i>N</i>	30												
40		Сума	153.8												
41		Дисперсія <i>s</i> _{заг}	2.49												
42															
43	<div>N33=СЧЁТ(N28:N32)</div> <div>N34=СУММ(N28:N32)</div> <div>N37=СЧЁТ(N28:O32)</div> <div>N38=СУММ(N28:O32)</div> <div>N39=СЧЁТ(N28:S32)</div> <div>N40=СУММ(N28:S32)</div> <div>N41=ДИСП.В(N28:S32)</div> <div>T45=N41*(N39-1)</div> <div>T48=T49-T46-T47</div> <div>T50=T45-T46-T47-T48</div>								Сума квадратів <i>SS</i>	Число ступенів вільності <i>df</i>	Середній квадрат <i>MS</i>	Критерій Фішера <i>Fe</i>	Рівень значущості <i>p</i>	Табличний критерій Фішера <i>F</i> _T	HIP ₀₅
44	Вільний член								788.48	1	788.48	1200.73	5.216E-22	4.260	
45	Загальна варіація								72.12	29	2.49				
46	Фактор А								1.63	1	1.63	2.49	0.128	4.260	0.611
47	Фактор В								4.53	2	2.27	3.45	0.048	3.403	0.748
48	Взаємодія АхВ								50.19	2	25.10	38.22	3.465E-08	3.403	1.058
49	Факторна модель								56.36	5	11.27	17.17	3.068E-07	2.621	
50	Залишок (похибка)								15.76	24	0.66				
51	Роботоздатність моделі								0.781		α= 0.05			t _r = 2.0639	
52	Роботоздатність моделі								0.776						

Внутрішньогрупова (або **залишкова**) девідата D_{WG} обчислюється як різниця між загальною факторною і груповий сумами квадратів:

$$D_{WG} = C_Y - D_{BG}. \quad (10.29)$$

Далі визначаємо суми квадратів відхилень для факторів **A** і **B**. При розрахунку D_A ми усереднювати дані за рівнями фактору **B**, а при розрахунку D_B – за рівнями фактору **A**.

$$D_A = \sum_1^a \frac{(\sum x_A)^2}{n \cdot b} - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N}, \quad (10.30)$$

де b – число рівнів фактору **B**;
 x_A – спостереження, зроблені по кожному рівню фактору **A** і усереднені по фактору **B**.

$$D_B = \sum_1^b \frac{(\sum x_B)^2}{n \cdot a} - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N}, \quad (10.31)$$

де a – число рівнів фактору **A**;
 x_B – спостереження, зроблені по кожному рівню фактору **B** і усереднені по фактору **A**.

Оскільки сума квадратів міжфакторної взаємодії входить третьої складової в міжгрупову (загальну факторну) суму квадратів поряд з внеском кожного з факторів, то ми її обчислюємо просто як різниця:

$$D_{AB} = D_{BG} - D_A - D_B \quad (10.32)$$

Далі переходимо до встановлення числа ступенів вільності для кожної суми квадратів:

1. Для загальної: $v_{\text{заг}} = N - 1$.
2. По фактору **A**: $v_A = a - 1$.
3. По фактору **B**: $v_B = b - 1$.
4. Для взаємодії факторів **A** і **B**: $v_{AB} = v_A \cdot v_B$.
5. Для внутрішньогрупової або залишкової: $v_{WG} = N - a \cdot b$.
6. Для міжгрупової або загальної факторної (модельної): $v_{BG} = a \cdot b - 1$.

Потім розраховуються оцінки дисперсій, що входять у F -відношення, поділивши суми квадратів на відповідні значення ступенів свободи і нареш-

ті, емпіричне значення критерію Фішера F знаходимо за формулою (10.1), критичне — за статистичною функцією **Excel**, **F.ОБР.ПХ** (див. с. 562).

Згідно табл. 10.26 *головні ефекти* впливу обох факторів і їх парна взаємодія значущі, так як для всіх $F_e > F$. і $p < \alpha$.

Відповідність дисперсійної моделі наявними даними (роботоздатність моделі) визначається відношенням вкладу загальної факторної компоненти в загальну дисперсію оцінок, тобто відношення суми квадратів, передбачених моделлю, до загальної суми квадратів [135].

Дана модель ДА добре відповідає отриманим даним, так як її роботоздатність становить 0.781 (чарунка **T51**), тобто модель пояснює 78.1% загальної суми квадратів.

У [135] не згадується що при розрахунку роботоздатності моделі використовуються лише статистично значущі девідати (див. [139]). У цьому разі роботоздатність моделі становить 0.7761 (чарунка **T52**).

10.5.2.2. Використання пакету Excel **Двофакторный дисперсионный анализ с повторениями**

В якості прикладу ДА даним інструментом пакету **Excel** розглянуто матеріал, представлений у *Прикладі 3* [34, с. 228].

Для цього у чарунках **B1:E10** створюється вихідна таблиця, де рядками представлено фактор A для всіх повтореннях дослідів, колонками — фактор B (див. рис. 10.8 та табл. 10.27). Числові значення подано в чарунках **C2:E10**. Значення a_0 і b_0 є контрольними для факторів A і B .

Одним з недоліків використання інструменту **Двухфакторный ДА с повторениями** пакету **Excel** є необхідність спеціального переформатування таблиць, дані яких, наприклад, при аналізі колекції сортотразків, можуть становити декілька сотень і навіть тисяч. Також його недоліком є неможливість обробки вибірок із пропущеними значеннями.

Спершу виконується розрахунок *міжгрупової й загальної суми квадратів та квадратів залишку* (рис. 10.8). При натисненні **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) виникає панель **Анализ данных**, вибирається інструмент **Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями** (3) і натискається кнопка **ОК** (4). З'являється панель **Двухфакторный дисперсионный анализ с повтор.**, на якій слід задати **Число строк для выборки: 4** (5), тобто повторності n (повторності фактору A).




Рис. 10.8. Порядок застосування інструменту

[Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями]

Задається значення **Альфа: 0.05** (6) — критичний рівень значущості, указується виведення даних на **Новый рабочий лист:** (7) і вхідний інтервал **\$B\$2:\$E\$12** (8) (чарунками **B2:E10** табл. 10.27), виділивши його (9) і натиснути **ОК** (10). Одержані на новому листі таблиці з результатами ДА слід відредагувати й скопіювати на відповідний лист.

Остаточні результати представлені в табл. 10.27, де подано результати оцінки факторів **A** і **B** та їх парної взаємодії **A×B**. З отриманих результатів видно, що кінцеві дані в табл. 10.24 і 10.27 повністю співпадають.

Таблиця 10.27. Результати ДА з використанням інструменту

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями								
A	B	C	df	E	F	G	H	I
1		Фактори В (стовбці)						
2	Фактори А (вибірка)	b1	b2	b3				
3	a1	4.8	5.3	7.2				
4	a1	3.2	4.1	6.8				
5	a1	3.1	3.9	5.4				
6	a1	3.9	4.7	5.9				
7	a1	3.8	5.0	6.3				
8	a2	7.5	6.0	3.8				
9	a2	7.8	4.2	3.2				
10	a2	9.2	3.8	4.8				
11	a2	7.3	4.8	3.7				
12	a2	5.8	5.2	3.3				
13								
14	Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями							
15	ИТОГИ	b0	b1	b2	Итого			
16	Фактор a0							
17	Счет	5	5	5	15			
18	Сумма	18.8	23	31.6	73.4			
19	Среднее	3.76	4.6	6.32	4.893333333			
20	Дисперсия	0.463	0.35	0.507	1.59352381			
21								
22	Фактор a1							
23	Счет	5	5	5	15			
24	Сумма	37.6	24	18.8	80.4			
25	Среднее	7.52	4.8	3.76	5.36			
26	Дисперсия	1.477	0.74	0.403	3.441142857			
27								
28	Итого							
29	Счет	10	10	10				
30	Сумма	56.4	47	50.4				
31	Среднее	5.64	4.7	5.04				
32	Дисперсия	4.78933	0.49556	2.22489				
33								
34								
35	Дисперсионный анализ							
36	Джерело варіації	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
37	Фактор А	Выборка	1.63333	1	1.63333	2.487309645	0.127858993	4.259677273
38	Фактор В	Столбцы	4.53067	2	2.26533	3.449746193	0.048207961	3.402826105
39	Взаємодія А х В	Взаимодействие	50.1947	2	25.0973	38.21928934	3.4652E-08	3.402826105
40	Залишок (похибка)	Внутри	15.76	24	0.65667			
41	Загальна варіація	Итого	72.1187	29				
42					$\alpha = 0.05$		$t_{\alpha} = 2.0639$	

$$H42 = \text{СТЮДЕНТ.ОБР.2X}(F42; D40)$$

$$I37 = H42 * (2 * E40 / ((D38 + 1) * C17))^{0.5}$$

$$I38 = H42 * (2 * E40 / ((D37 + 1) * C17))^{0.5}$$

$$I39 = H42 * (2 * E40 / C17)^{0.5}$$

10.5.2.3. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica

Для виконання даного аналізу використовується вихідна табл. 10.27 з числовими факторами *A* і *B*, розміщеними в чарунках **C2:E10**. Їх дані заносяться в таблицю ППП *Statistica*, представивши дві колонки (*Фактор А* і *Фактор В*), які будуть служити у якості коду, і третю колонку (I, II, III й IV) — їхніми значеннями, тобто повтореннями експерименту, причому контрольні значення *a*₀ і *b*₀ факторів *A* і *B* розташовуються у її першому рядку (рис. 10.9).

Для аналізу в меню **Statistics/Анализ** (1) використаємо модуль **ANOVA/Дисперсионный анализ (ДА)** (2), де на панелі процедур і установок **General ANOVA/MANOVA/Общий ДА:** вибираємо вид аналізу **Факторный ДА/Factorial ANOVA** (3), указуємо завдання **Quick specs dialog/Диалог** (4) і натиснувши **ОК** (5) переходимо на панель **General ANOVA/MANOVA: Однофакторный ДА:**




Рис. 10.9. Дисперсійний аналіз двофакторного дослідження з повтореннями опцією Факторный ДА / Factorial ANOVA

Натисненням кнопки Variables / Переменные (6) на вкладці **Quick** / **Быстрый** панелі **General ANOVA/MANOVA** / **Факторный ДА: Диспанализ** відкривається панель **Select dependent variables and optional categorical predictors (factors)** / **Выберите зависимые переменные и категориальные предикторы**, де відмічаємо за лежні змінні (7) і категоризовані предиктори (8) та натиснувши **ОК** (9) повертаємося на панель **General ANOVA/MANOVA** / **Факторный ДА: Диспанализ**

На панелі **Select codes for indep. vars (factors)** / **Выберите коды для независимых переменных** коди Factor codes / Коды факторов (10) визначення рівнів міжгрупових факторів вибираємо всі (11) і натискаємо **ОК** (12).

Проте, задавати їх спеціально, виконуючи кроки (10–12) не потрібно, так як самою програмою передбачено використання в якості кодів міжгрупових

вих факторів усіх значень вхідних змінних.

Далі натиснувши **ОК (13)** переходимо на вкладку **Quick / Быстрый** панелі **ANOVA Results / Результаты анализа**, задаємо довірчі межі і рівень значущості α **(14)**, задіявши кнопку **All effects / Все эффекты**

(15) одержуємо табл. 10.28 із результатами ДА.

Таблица 10.28. Результаты двофакторного ДА опцією Факторный ДА					
		Одномерный критерий значимости для I-V (Таблица данных1) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы			
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	788.4813	1	788.4813	1200.733	0.000000
Фактор А	1.6333	1	1.6333	2.487	0.127859
Фактор В	4.5307	2	2.2653	3.450	0.048208
Фактор А*Фактор В	50.1947	2	25.0973	38.219	0.000000
Ошибка	15.7600	24	0.6567		

Таблица 10.29. Статистическая характеристика выбіркових варіантів							
		Фактор А*Фактор В; МНК средние (Таблица данных1) Текущ. эффект: F(2, 24)=38.219, p=.00000 Декомпозиция гипотезы					
N ячейки	Фактор А	Фактор В	I-V Среднее	I-V Стд.ош.	I-V -95.00%	I-V +95.00%	N
1	a1	b1	3.760000	0.362399	3.012044	4.507956	5
2	a1	b2	4.600000	0.362399	3.852044	5.347956	5
3	a1	b3	6.320000	0.362399	5.572044	7.067956	5
4	a2	b1	7.520000	0.362399	6.772044	8.267956	5
5	a2	b2	4.800000	0.362399	4.052044	5.547956	5
6	a2	b3	3.760000	0.362399	3.012044	4.507956	5

Її дані повністю відповідають даним табл. 10.24 (с. 594) і 10.27 (с. 600).

Подальші дії відповідають (рис. 10.4, с. 578). Перейшовши на вкладку **Comps/Контрасты** **(15)** і натиснувши


Display least squares means / МНК средние **(16)** отримуємо

табл. 10.29 зі статистичною характеристикою вибіркових варіантів, тобто, середнім, його похибкою та нижньою і верхньою межами довірчого значення середнього, знайдених методом найменших квадратів (МНК).

Англomовна версія **Statistica 8.0** на панелі **ANOVA Results / Результаты анализа** має кнопку **Effect sizes**, при натисненні якої отримується табл. 10.30.



Перевірка гіпотези про приналежність декількох середніх значень до однієї генеральної сукупності або виділення груп середніх значень, що належать до однієї сукупності виконується методом множинних порівнянь. На панелі **ANOVA Results / Результаты анализа** натисненням кнопки **More results / Больше** **(17)** (рис. 10.4, с. 578), у вкладці **Post-hoc/Апостериорные** **(18)** активізуємо **Significant differences / Значимые разности** **(18)** і кнопками **Fisher LSD / Фишера НЗР** **(20)**, **Tьюки / Tukey HSD** **(21)**, **Бонферрони / Bonferroni** **(22)** і **Scheffe / Шеффе** **(23)** отримуємо таблиці аналогічні табл. 10.13 на с. 582 для факторів **A** і **B** та їхньої взаємодії.

Далі активізувавши **Confidence intervals / Доверительные интервалы** **(24)** і знову натиснувши кнопку **Fisher LSD / Фишера НЗР** **(20)** маємо табл. 10.31 з оцінкою **НІР** за критерієм Фішера для взаємних порівнянь всіх варіантів. Сама величина **НІР** тут не наводиться, проте істотні відмінності подано червоним кольором із казанням рівня їхньої значущості. Вони повністю співпадають із результатами даних табл. 10.24 (с. 594) і 10.27 (с. 600).









Таблиця 10.30. Додаткові показники результатів ДА опцією  Factorial ANOVA
ППП Statistica 8.0







Эффект	Одномерные критерии значимости, размеров эффекта и мощности для V (Таблица данных 1) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы							
	SS	Степени свободы	MS	F	p	Частичная эта-квадрат.	Нецентрированная	Наблюдаемая мощность. (альфа=0.05)
Св. член	788.4813	1	788.4813	1200.733	0.000000	0.980404	1200.733	1.000000
Фактор А	1.6333	1	1.6333	2.487	0.127859	0.093906	2.487	0.328137
Фактор В	4.5307	2	2.2653	3.450	0.048208	0.223288	6.899	0.590191
Фактор А*Фактор В	50.1947	2	25.0973	38.219	0.000000	0.761048	76.439	1.000000
Ошибка	15.7600	24	0.6567					

Слід звернути увагу, що номери чарунок парних взаємодій факторів у табл. 10.31 відповідають номерам чарунок табл. 10.29.

При застосуванні для ДА двофакторного експерименту з повторенням при використанні опції  Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА скопіюємо вихідну таблицю даних, розміщену в чарунках **B3:F8** (табл. 10.24) в таблицю ППП Statistica перейменуємо назви колонок виконуючи дії відповідно рис. 2.5, до досягнення вигляду згідно (рис. 10.10). Далі виконуємо дії (1–9) за рис. 10.5 і продовжуємо їх далі як представлено на рис. 10.10.

При виборі змінних слід виходити з плану експерименту 2×3×4 (2 міжгрупових факторів й один фактор з повторністю вимірів). Перший міжгруповий фактор **Фактор А** має 2 рівня, другий міжгруповий фактор – **Фактор В** має 3 рівня. Значення залежної змінної визначалося в чотирьох повторностях вимірів I, II, III й IV.

Для того щоб визначити фактор, який нас цікавить, слід натиснути кнопку  Within effects: /  Внутригруп. эффекты (10) панелі  ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: /  Задайте фактор с повторными из... і задати 5 рівнів (11) у відповідності до кількості вибраних змінних. У поле  Factor Name: /  Имя фактора: (12) можна ввести назву фактору, який обумовлює повторні виміри. За умовчужанням у це поле вводиться **R1**. Після натиснення **ОК** (13) знову повертаємося на панель  ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: /  Повторные измерения ДА.

Коди  Factor codes: /  Коды факторов (14), що визначають рівні міжгрупових факторів, задаємо всі коди (15). Коди можна не задавати, так як програма сама використовує в якості кодів міжгрупових факторів усі значення вхідних змінних. Натиснувши **ОК** (16) повертаємося на панель  ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: /  Повторные измерения ДА: де натискаємо кнопку **ОК** (17) і переходимо на панель на панелі  ANOVA Results /  Результаты анализа.

Тут натиснувши кнопку  All effects: /  Все эффекты (15) на рис. 10.5), отримуємо табл. 10.32 з результатами дисперсійного аналізу.

Потім в Excel створюємо таблицю результатів, аналогічну наведеній у табл. 10.27, додавши в кінці колонку для даних **НІР** (табл. 10.33).

У чарунку **E8** заноситься прийнятий рівень статистичної значущості $\alpha=0.05$ і використовується при розрахунку табличних значень критеріїв Стюдента **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** чи **СТЮДРАСПОБР** (див. С. 61) (чарунка **H8**) та Фішера **F.ОБР.ПХ** чи **FRASPOБР** (див. С. 562) (чарунки **G2:G6**).

Копіюємо табл. 10.32 разом із заголовками з ППП **Statistica**, вставляємо у таблицю **Excel** і пов'язуємо їх посиланнями (позначені жовтим). Далі пов'язуємо одні чарунки з іншими залежностями, наведеними на полі табл. 10.33.

Таблиця 10.31 – НІР за критерієм Фішера

— для фактору А

НЗР крит.: перем. I-V (Таблица данных1) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .65667, сс = 24.000						
N ячейки	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.466667	0.295898	0.127859	-1.07737	0.144037

— для фактору В

НЗР крит.: перем. I-V (Таблица данных1) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .65667, сс = 24.000						
N ячейки	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	0.940000	0.362399	0.015925	0.19204	1.687956
	3	0.600000	0.362399	0.110816	-0.14796	1.347956
2	3	-0.340000	0.362399	0.357493	-1.08796	0.407956

— для взаємодії факторів А і В

НЗР крит.: перем. I-V (Таблица данных1) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .65667, сс = 24.000						
N ячейки	сравн.с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.84000	0.512510	0.114260	-1.89777	0.21777
	3	-2.56000	0.512510	0.000042	-3.61777	-1.50223
	4	-3.76000	0.512510	0.000000	-4.81777	-2.70223
	5	-1.04000	0.512510	0.053666	-2.09777	0.01777
	6	0.00000	0.512510	1.000000	-1.05777	1.05777
2	3	-1.72000	0.512510	0.002626	-2.77777	-0.66223
	4	-2.92000	0.512510	0.000007	-3.97777	-1.86223
	5	-0.20000	0.512510	0.699804	-1.25777	0.85777
	6	0.84000	0.512510	0.114260	-0.21777	1.89777
3	4	-1.20000	0.512510	0.027846	-2.25777	-0.14223
	5	1.52000	0.512510	0.006730	0.46223	2.57777
	6	2.56000	0.512510	0.000042	1.50223	3.61777
4	5	2.72000	0.512510	0.000019	1.66223	3.77777
	6	3.76000	0.512510	0.000000	2.70223	4.81777
5	6	1.04000	0.512510	0.053666	-0.01777	2.09777




Рис. 10.10. Розрахунок ДА двофакторного дослідження опцією

Repeated measures ANOVA / Повторные измерения ДА

Таблица 10.32. Результати ДА опцією

Повторные измерения ДА

Дисперсионный анализ с повторными измерениями (Таблица данных1) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы					
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	788.4813	1	788.4813		
Фактор А	1.6333	1	1.6333		
Фактор В	4.5307	2	2.2653		
Фактор А*Фактор В	50.1947	2	25.0973		
Ошибка		0			
R1	3.2087	4	0.8022		
R1*Фактор А	3.8167	4	0.9542		
R1*Фактор В	4.1293	8	0.5162		
R1*Фактор А*Фактор В	4.6053	8	0.5757		
Ошибка		0			

Таблиця 10.33. Розрахунок загальної суми квадратів факторів і парної взаємодії при застосуванні опції

Repeated measures ANOVA / Повторные измерения ДА

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера Fф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера Fт	НІР₀₅
2	Вільний член	788.4813	1.0000	788.4813	1200.73	5.2157E-22	4.260	
3	Загальна варіація	72.12	29	2.49				
4	Фактор А	1.63	1	1.63	2.49	0.1279	4.260	0.611
5	Фактор В	4.53	2	2.27	3.45	0.0482	3.403	0.748
6	Взаємодія А х В	50.19	2	25.10	38.22	3.4652E-08	3.403	1.058
7	Залишок (похибка)	15.76	24	0.66				
8	B2=B11 ... D2=D11 D3=B3/C3			$\alpha = 0.05$		t_r = 2.0639		
10	Джерело варіації	SS	Степени свободы	MS	B4=B12 ... D4=D12 D7=B7/C7 B5=B13 ... D5=D15 E2=D2/\$D\$7 B6=B14 ... D5=D14 B3 =СУММ(B4:B7) C3 =СУММ(C4:C7) B7=СУММ(B15:B20) C7=СУММ(C15:C20) F2=ФРАСП(E2;C2;\$C\$7) G2=Ф.ОБР.ПХ(\$E\$8;C2;\$C\$7)			
11	Св. член	788.4813	1	788.4813				
12	Фактор А	1.6333	1	1.6333				
13	Фактор В	4.5307	2	2.2653				
14	Фактор А*Фактор В	50.1947	2	25.0973				
15	Ошибки		0					
16		3.21	4	0.8022				
17	R1*Фактор А	3.82	4	0.9542				
18	R1*Фактор В	4.13	8	0.5162				
19	R1*Фактор А*Фактор В	4.61	8	0.5757				
20	Ошибки		0					
H4=\$H\$8*(2*\$D\$7/(((\$C\$3+1)/(C4+1))))^0.5					H5=\$H\$8*(2*\$D\$7/(((\$C\$3+1)/(C5+1))))^0.5			
H6=H8*(2*\$D7/(((C3+1)/(C4+1)*(C5+1))))^0.5					H8=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(E8;C7)			

Результати табл. 10.33 повністю співпадають з табл. 10.24 (с. 594) і табл. 10.27 (с. 600), проте найменш трудомістким і найбільш інформативним є ДА з використанням модуля ANOVA / Дисперсионный анализ (ДА) ППП Statistica.

10.5.3. Оцінка простих ефектів

Простим ефектом (на відміну від терміну *головний ефект* – оцінювання впливу одного фактора незалежно від рівнів інших, також використовують термін *простий ефект* — коли ми розглядається вплив одного фактора лише на одному з рівнів іншого [135]) фактору на відміну від основного ефекту називається ефект одного фактору, що розглядається тільки на одному з рівнів іншого чинника. Аналіз простих факторних ефектів буває дуже корисним для більш ретельного і детального аналізу причин вже встановленого в ході ДА міжфакторної взаємодії, коли дослідник хоче відповісти на питання, в чому ж виражається конкретно його ефект. Оскільки він може проявитися в більшій чи меншій мірі лише на одному з рівнів іншого чинника, то цілком резонно подивитися, на якому з них це взаємодія має місце і в якій мірі. Ту ж задачу виконує і використання множинного порівняння середніх за критеріями Фішера, Бонферроні, Шеффе [135].

Таблиця 10.34. Результати ДА простих ефектів для факторів А і В

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
54	Джерело варіації								Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера Fe	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера Ft	
55	А за умови b1								35.34	1	35.34	53.82	1.411E-07	4.260	
56	А за умови b2								0.10	1	0.10	0.15	0.6998	4.260	
57	А за умови b3								16.38	1	16.38	24.95	4.210E-05	4.260	
58	В за умови a1								17.03	2	8.51	12.97	1.520E-04	3.403	
59	В за умови a2								37.70	2	18.85	28.70	4.312E-07	3.403	

$T55 = \text{СУММКВ}(N34;O34)/N33-N38^2/N37$
 $T57 = \text{СУММКВ}(R34;S34)/R33-R38^2/R37$
 $T59 = \text{СУММКВ}(O34;Q34;S34)/O33-Q36^2/Q35$
 $U55=U46$ $U56=U46$ $U57=U46$
 $X55=F.\text{РАСП.ПХ}(W55;U55;\$U\$50)$

$T56 = \text{СУММКВ}(P34;Q34)/P33-P38^2/P37$
 $T58 = \text{СУММКВ}(N34;P34;R34)/N33-N36^2/N35$
 $V55=T55/U55$ $W55=V55/\$V\50
 $U56=U47$ $U56=U47$
 $Y55=F.\text{ОБР.ПХ}(\$W\$51;U55;\$U\$50)$

Розглянемо на нашому прикладі (табл. 10.26, с. 600), як виявляється взаємодія фактору *A* окремо на кожному з рівнів фактору *B* — b_1 , b_2 і b_3 та фактору *B* на рівнях фактору *A* — a_1 і a_2 .

Особливості ДА (табл. 10.34) при цьому полягають у розрахунку суми квадратів за середніми значеннями груп і їх кількості, а залишкова похибка середнього квадрату береться із загального ДА (табл. 10.26, с. 600).

Таблиця 10.35. Вихідні дані для однофакторного ДА

B	A	
	a1	a2
b1	4.8	7.5
b2	5.3	6.0
b3	7.2	3.8
b1	3.2	7.8
b2	4.1	4.2
b3	6.8	3.2
b1	3.1	9.2
b2	3.9	3.8
b3	5.4	4.8
b1	3.9	7.3
b2	4.7	4.8
b3	5.9	3.7
b1	3.8	5.8
b2	5.0	5.2
b3	6.3	3.3

A	B		
	b1	b2	b3
a1	4.8	5.3	7.2
a1	3.2	4.1	6.8
a1	3.1	3.9	5.4
a1	3.9	4.7	5.9
a1	3.8	5.0	6.3
a2	7.5	6.0	3.8
a2	7.8	4.2	3.2
a2	9.2	3.8	4.8
a2	7.3	4.8	3.7
a2	5.8	5.2	3.3

Таблиця 10.36 – Результати однофакторного ДА для показника *A*— *A* за умови b_1

Ефект	Одномерный критерий значимости для b1 (Таблица-2) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	318.0960	1	318.0960	327.9340	0.000000
A	35.3440	1	35.3440	36.4371	0.000311
Ошибка	7.7600	8	0.9700		

— *A* за умови b_2

Ефект	Одномерный критерий значимости для b2 (Таблица-2) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	220.9000	1	220.9000	405.3211	0.000000
A	0.1000	1	0.1000	0.1835	0.679694
Ошибка	4.3600	8	0.5450		

— *A* за умови b_3

Ефект	Одномерный критерий значимости для b3 (Таблица-2) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	254.0160	1	254.0160	558.2769	0.000000
A	16.3840	1	16.3840	36.0088	0.000323
Ошибка	3.6400	8	0.4550		

Як впливає з результатів, представлених у табл. 10.34, вплив фактору *B* виявилося достовірно значущим на обох рівнях фактору *A*, та високу вірогідність впливу фактору *A* на b_1 і b_3 рівнях фактору *B*. Проте для рівня b_2 вплив фактору *A* статистично незначущий.

Це досить цікавий результат сам о собі, оскільки не виявлено основного ефекту фактору *A* по експерименту в цілому, а, розклавши його на складові, знайшли значущі впливи. Результати аналізу простих ефектів фактору *A* можуть в даному випадку змусити експериментатора замислитися про можливі прояви досліджуваних явищ, тоді як

проста формальна констатація відсутності основного ефекту фактору **A** може “замаскувати” наявні результати [135].

Виконавши однофакторний ДА із застосуванням ППП Statistica (див. **10.4.3 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням**

ППП Statistica) за результатами табл. 10.35, отриманої на основі всіх даних табл. 10.24, с. 594 отримуємо дані для фактору **A**, наведені в табл. 10.36 і для фактору **B**, подані в табл. 10.37.

У них також підтверджується висновок зроблений за даними табл. 10.34, що вплив фактору **B** виявилося достовірно значущим на обох рівнях фактору **A**, та високу вірогідність впливу фактору **A** на b_1 і b_3 рівнях фактору **B**. Проте для рівня b_2 вплив фактору **A** статистично незначущий.

Таблиця 10.37 – Результати однофакторного ДА для показника **B**

— **B** за умови a_1

Одномерный критерий значимости для a_1 (Таблица-2) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы					
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	359.1707	1	359.1707	816.2970	0.000000
B	17.0293	2	8.5147	19.3515	0.000176
Ошибка	5.2800	12	0.4400		

— **B** за умови a_2

Одномерный критерий значимости для a_2 (Таблица-2) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы					
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	430.9440	1	430.9440	493.4473	0.000000
B	37.6960	2	18.8480	21.5817	0.000106
Ошибка	10.4800	12	0.8733		

10.5.4. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторними вимірами

10.5.4.1. Загальні положення

Досить часто виникає ситуація коли сама повторність представлена певним масивом даних. Тобто виникає як би подвійне повторення (див. табл. 10.38, чарунки **A1:F42**).

В одному разі, наприклад, при вивченні біометричних характеристик, показники рослин з однієї ділянки які розподілені нормально, можна замінити середнім значенням; у іншому разі, наприклад, при агротехнологічних дослідженнях, отримані дані контрастних за погодними умовами років, навики слід нейтралізувати виключенням із загальної дисперсії даних.

Звичайно, ці вибірки можна розглядати як незалежні і застосовувати звичайний варіант ДА (див. підрозділ **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica**), але краще використовувати ДА з повторними вимірами, який дозволяє виключити з загальної дисперсії даних ту її частину, яка обумовлена

індивідуальними відмінностями в рівні залежної змінної. За рахунок цього метод виявляється більш чутливим до впливу досліджуваних факторів і дозволяє з більшою надійністю виявляти їх ефекти [123].

Таким чином, специфіка дисперсійного аналізу з повторними вимірами полягає в тому, що із залишкової мінливості (внутрішньогрупової) віднімається компонент, обумовлений індивідуальними відмінностями. Тим самим зменшується дисперсія похибки факторної моделі і підвищується чутливість методу до впливу факторів на залежну змінну. В іншому, зокрема — щодо перевірки гіпотез, даний варіант дисперсійного аналізу зберігає схожість з іншими методами дисперсійного аналізу.

Структура вихідних даних: градація внутрішньогрупового фактору відповідає неодноразове вимірювання залежної змінної для однієї і тієї ж групи об'єктів. Допускається наявність міжгрупових факторів, а також кількох внутрішньогрупових факторів. [123]

Таблиця 10.38. Вихідна таблиця двофакторного експерименту з повторними вимірами

Повто- рення	Рік	Фактор А	Фактор В		
			b0	b1	b2
I	2011	a0	24.6	29.3	27.3
I	2012	a0	23.6	27.6	30.2
I	2013	a0	25.1	29.8	26.1
I	2014	a0	23.2	27.0	31.5
I	2015	a0	24.0	28.3	28.4
II	2011	a0	27.3	31.8	26.5
II	2012	a0	24.3	27.8	34.9
II	2013	a0	27.9	32.4	25.2
II	2014	a0	23.9	27.2	36.6
II	2015	a0	25.6	29.3	28.8
III	2011	a0	25.3	33.4	25.3
III	2012	a0	20.9	27.2	40.5
III	2013	a0	25.8	34.0	24.0
III	2014	a0	20.5	26.6	42.7
III	2015	a0	22.5	29.3	27.5
IV	2011	a0	30.8	31.5	12.1
IV	2012	a0	23.7	23.8	23.9
IV	2013	a0	31.3	32.1	11.4
IV	2014	a0	23.3	23.4	25.4
IV	2015	a0	25.9	26.2	12.2
I	2011	a1	28.2	43.4	68.3
I	2012	a1	33.5	50.3	51.6
I	2013	a1	31.9	49.0	54.1
I	2014	a1	29.5	44.5	65.3
I	2015	a1	30.4	46.3	57.7
II	2011	a1	36.3	48.5	44.1
II	2012	a1	32.5	42.4	58.3
II	2013	a1	37.2	49.5	42.1
II	2014	a1	31.9	41.7	61.1
II	2015	a1	34.1	44.9	47.9
III	2011	a1	37.3	52.3	51.0
III	2012	a1	30.9	42.4	81.6
III	2013	a1	38.1	53.2	48.4
III	2014	a1	30.4	41.7	86.0
III	2015	a1	33.3	45.9	55.5
IV	2011	a1	35.3	53.1	42.7
IV	2012	a1	27.2	40.3	84.6
IV	2013	a1	36.0	54.2	40.3
IV	2014	a1	26.7	39.6	89.7
IV	2015	a1	29.8	44.3	43.2

10.5.4.2. Результати ДА без врахування повторних вимірів (за усіма даними вибірки)

10.5.4.2.1. Особливості використання пакету Microsoft Excel

Розглянемо дані, які представляють двофакторний експеримент (фактор **A** при двох градаціях і фактор **B** з трьома градаціями. Прийнято було чотири повторності **I, II, III** і **IV**, тобто дослідження виконувалися на 24-х статистично однорідних ділянках протягом для п'яти років (табл. 10.38). Власне, табл. 10.38 створена на вихідних даних табл. 10.24, с. 594, наведених у чарунках **B1:G8**. Середньорічні значення відповідають значенням табл. 10.24.

В наведених нижче розрахунках використовувалися не середні арифметичні значення вибірки, як у табл. 10.24 (с. 594), 10.27 (с. 600) і 10.28 (с. 602), а натуральні значення всіх отриманих даних.

Дисперсійний аналіз даної вибірки виконується інструментом Excel **[Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями]** у відповідності з діями, описаними у підрозділі **10.5.2.2 Використання пакету Excel Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями**.

У результаті отримується таблиці ДА (табл. 10.39).

Таблица 10.39. Дисперсійний аналіз з використанням інструменту

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями

ИТОГИ	b0	b1	b2	Итого
a0				
Счет	20	20	20	60
Сумма	499.5	578	540.5	1618
Среднее	24.975	28.9	27.025	26.96667
Дисперсия	7.625132	8.77368	70.11039	30.47175
a1				
Счет	20	20	20	60
Сумма	650.5	927.5	1173.5	2751.5
Среднее	32.525	46.375	58.675	45.85833
Дисперсия	11.77987	21.1536	249.0262	206.8384
Итого				
Счет	40	40	40	
Сумма	1150	1505.5	1714	
Среднее	28.75	37.6375	42.85	
Дисперсия	24.06974	92.8814	412.3287	

Дисперсионный анализ


Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	HIP ₀₅
Выборка, a	10706.85	1	10706.85	174.3461	1.0182E-24	3.9243	2.834
Столбцы, b	4066.238	2	2033.119	33.1065	4.6107E-12	3.0759	3.471
Взаимодействие a×b	2934.154	2	1467.077	23.8893	2.1631E-09	3.0759	4.909
Внутри	7000.908	114	61.41147				
Итого	24708.15	119					
				a= 0.05	tr= 1.9810		

Таким чином не зважаючи на те, що кожна ділянка була представлена декількома даними, тобто даними кожного з п'яти років досліджень, дисперсія всередині вибірок визначалася загалом для всього масиву даних.

Результати табл. 10.39 і 10.27 (с. 600) свідчать про відмінність результатів при проведенні ДА за всією вибіркою (табл. 10.39) і за її середніми (табл. 10.27).

10.5.4.2.2. Використання ППП Statistica

Дані результати аналогічні отриманим багатфакторним аналізом  Factorial ANOVA /  Факторный ДА у ППП Statistica (табл. 10.40), проведення якого подано у підрозділі **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експери-**




Таблиця 10.40. Результати ДА опцією  Факторный ДА

Effect	Univariate Tests of Significance for Урожай (Урожай-А) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition				
	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p
Intercept	159104.4	1	159104.4	2590.793	0.0000E-01
Фактор А	10706.9	1	10706.9	174.346	0.0000E-01
Фактор В	4066.2	2	2033.1	33.106	4.6108E-12
Фактор А*Фактор В	2934.2	2	1467.1	23.889	2.1631E-09
Error	7000.9	114	61.4		

менту з повторенням при використанні ППП Statistica, а саме на (рис. 10.9, с. 601).

Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера для взаємних порівнянь всіх варіантів і їхніх поєднань наведені в табл. 10.41 (статистично значущі відмінності наводяться червоним кольором).

Порядок розрахунку НІР за даними табл. 10.41 представлено в підрозділі **10.9.2.2 Визначення НІР Фішера застосуванням ППП Statistica**, а саме в табл. 10.69.

Порівнюючи результати табл. 10.40 і 10.39 (с. 610) бачимо повне співпадання отриманих результатів. У обох випадках за повторення вважаються всі п'ять рослин з усіх чотирьох ділянок. Тобто при використанні інструменту Excel  та  Factorial ANOVA /  Факторный ДА ППП Statistica не має змоги виключити особливості стану самих рослин у повторних вимірів.

Вичленити цей вплив можна було б проведенням трифакторного ДА, де третім фактором виступали самі б ділянки, проте, як буде показано нижче, використання для цієї мети інструменту Excel надто трудомістке.

Порівнюючи результати табл. 10.40 з табл. 10.28 (с. 602) бачимо відмінність результатів при проведенні ДА за всією вибіркою (табл. 10.40) і за її середніми (табл. 10.28).

Таблиця 10.41. Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера

LSD test; variable Урожай (Урожай-А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 61.411, df = 114.00						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-18.8917	1.430751	0.00	-21.7260	-16.0574



для фактору **A**

LSD test; variable Урожай (Урожай-А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 61.411, df = 114.00						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-3.9250	2.478134	0.115997	-8.8342	0.9842
	3	-2.0500	2.478134	0.409832	-6.9592	2.8592
	4	-7.5500	2.478134	0.002876	-12.4592	-2.6408
	5	-21.4000	2.478134	0.000000	-26.3092	-16.4908
	6	-33.7000	2.478134	0.000000	-38.6092	-28.7908
2	3	1.8750	2.478134	0.450840	-3.0342	6.7842
	4	-3.6250	2.478134	0.146275	-8.5342	1.2842
	5	-17.4750	2.478134	0.000000	-22.3842	-12.5658
	6	-29.7750	2.478134	0.000000	-34.6842	-24.8658
3	4	-5.5000	2.478134	0.028436	-10.4092	-0.5908
	5	-19.3500	2.478134	0.000000	-24.2592	-14.4408
	6	-31.6500	2.478134	0.000000	-36.5592	-26.7408
4	5	-13.8500	2.478134	0.000000	-18.7592	-8.9408
	6	-26.1500	2.478134	0.000000	-31.0592	-21.2408
5	6	-12.3000	2.478134	0.000002	-17.2092	-7.3908


LSD test; variable Урожай (Урожай-А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 61.411, df = 114.00						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-8.8875	1.752305	0.000002	-12.3588	-5.4162
	3	-14.1000	1.752305	0.000000	-17.5713	-10.6287
2	3	-5.2125	1.752305	0.003581	-8.6838	-1.7412


для фактору **B**для взаємодії факторів **A×B**

10.5.4.3. Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторними вимірами при використанні ППП Statistica

Більш зручним для виконання ДА експерименту з повторними вимірами є застосування ППП Statistica є опція  Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА.

Подано приклад організації формату таблиці, так як у ППП Statistica повторні виміри — дані років представляються колонками, (табл. 10.42). Проте, при необхідності ніщо не завадить колонками подати фактор **A** чи **B**.

Дані табл. 10.42 вносяться у файл ППП Statistica (див. підрозділ 10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica) і відповідно опису, наведеного у підрозділі 2.2.3 Одержання основних статистичних показників за допомогою ППП Statistica перейменовано назви колонок, виконуючи дії відповідно рис. 2.5 (с. 102) і перейменувати **R1** на “**PIK**” відповідно рис. 10.10 (с. 605). При цьому задаються колонками фактори **A** на двох, **B** на трьох рівнях п'ять рівнів вихідного фактору (років) при наведені всіх колонками. Далі виконуються ДА з повтореннями  Repeated measures ANOVA /

 Повторные измерения ДА], описаний у підрозділі **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica**, а саме на рис. 10.10, с. 605.

У результаті отримується табл. 10.43, яка представляє результати двофакторному експерименті з повтореннями, а в табл. 10.44 — Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера.

Дисперсійна таблиця табл. 10.43 має дві частини: верхня — результати ДА досліджуваних факторів, нижня — ДА повторних вимірів.

Порядок розрахунку НР за даними табл. 10.44 представлено в підрозділі **10.9.2.2 Визначення НР Фішера застосуванням ППП Statistica**, а саме в табл. 10.69.

Порівнюючи результати, наведені у табл. 10.43 з табл. 10.39 (с. 610), 10.40 (с. 611) і 10.41 (с. 612) бачимо, ряд відмінностей у рівнях значущості показників та значень НР, які саме викликані окремим ви členенням у дисперсійному комплексі самих рослин і ділянок. Причому вимоги до прийняття нульової гіпотези у ДА з повторними вимірами більш строгі.

Таблиця 10.43. Результати ДА опцією  Повторные измерения ДА]


Таблиця 10.42. Формат представлення розрахункової таблиці

Фактори А	Фактори В	Рік				
		2011	2012	2013	2014	2015
a0	b0	24.6	23.6	25.1	23.2	24.0
a0	b0	27.3	24.3	27.9	23.9	25.6
a0	b0	25.3	20.9	25.8	20.5	22.5
a0	b0	30.8	23.7	31.3	23.3	25.9
a0	b1	29.3	27.6	29.8	27.0	28.3
a0	b1	31.8	27.8	32.4	27.2	29.3
a0	b1	33.4	27.2	34.0	26.6	29.3
a0	b1	31.5	23.8	32.1	23.4	26.2
a0	b2	27.3	30.2	26.1	31.5	28.4
a0	b2	26.5	34.9	25.2	36.6	28.8
a0	b2	25.3	40.5	24.0	42.7	27.5
a0	b2	12.1	23.9	11.4	25.4	12.2
a1	b0	28.2	33.5	31.9	29.5	30.4
a1	b0	36.3	32.5	37.2	31.9	34.1
a1	b0	37.3	30.9	38.1	30.4	33.3
a1	b0	35.3	27.2	36.0	26.7	29.8
a1	b1	43.4	50.3	49.0	44.5	46.3
a1	b1	48.5	42.4	49.5	41.7	44.9
a1	b1	52.3	42.4	53.2	41.7	45.9
a1	b1	53.1	40.3	54.2	39.6	44.3
a1	b2	68.3	51.6	54.1	65.3	57.7
a1	b2	44.1	58.3	42.1	61.1	47.9
a1	b2	51.0	81.6	48.4	86.0	55.5
a1	b2	42.7	84.6	40.3	89.7	43.2

Effect	Repeated Measures Analysis of Variance (Урожай А) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition				
	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p
Intercept	159104.4	1	159104.4	2149.273	0.0000E-01
Фактор А	10706.9	1	10706.9	144.634	4.8711E-10
Фактор В	4066.2	2	2033.1	27.465	3.3990E-06
Фактор А*Фактор В	2934.2	2	1467.1	19.818	2.8261E-05
Error	1332.5	18	74.0		
РІК	251.2	4	62.8	2.294	0.067489
РІК*Фактор А	93.0	4	23.2	0.849	0.498853
РІК*Фактор В	3023.5	8	377.9	13.807	6.1999E-12
РІК*Фактор А*Фактор В	330.0	8	41.2	1.507	0.170002
Error	1970.8	72	27.4		

Результати дисперсійного аналізу

Таблиця 10.44. Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера для повторення за роками опцією

 Повторные измерения ДА

LSD test; variable DV_1 (Урожай А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 74.027, df = 18.000						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-18.8917	1.570850	0.000000	-22.1919	-15.5914

LSD test; variable DV_1 (Урожай А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 74.027, df = 18.000						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-8.8875	1.923890	0.000213	-12.9294	-4.8456
	3	-14.1000	1.923890	0.000001	-18.1419	-10.0581
2	3	-5.2125	1.923890	0.014363	-9.2544	-1.1706

для фактору А

для фактору В

LSD test; variable DV_1 (Урожай А) Simultaneous confidence intervals Error: Between MS = 74.027, df = 18.000						
Cell No.	versus Cell No.	Mean Differ.	Standard Error	p	-95.00% Cnf.Lmt	+95.00% Cnf.Lmt
1	2	-3.9250	2.720792	0.166311	-9.6412	1.7912
	3	-2.0500	2.720792	0.460918	-7.7662	3.6662
	4	-7.5500	2.720792	0.012489	-13.2662	-1.8338
	5	-21.4000	2.720792	0.000000	-27.1162	-15.6838
	6	-33.7000	2.720792	0.000000	-39.4162	-27.9838
2	3	1.8750	2.720792	0.499524	-3.8412	7.5912
	4	-3.6250	2.720792	0.199374	-9.3412	2.0912
	5	-17.4750	2.720792	0.000005	-23.1912	-11.7588
	6	-29.7750	2.720792	0.000000	-35.4912	-24.0588
3	4	-5.5000	2.720792	0.058357	-11.2162	0.2162
	5	-19.3500	2.720792	0.000001	-25.0662	-13.6338
	6	-31.6500	2.720792	0.000000	-37.3662	-25.9338
4	5	-13.8500	2.720792	0.000076	-19.5662	-8.1338
	6	-26.1500	2.720792	0.000000	-31.8662	-20.4338
5	6	-12.3000	2.720792	0.000265	-18.0162	-6.5838



для взаємодії факторів А × В

При цьому слід звернути увагу, що при виконанні ДА за середньорічними показниками урожайності (табл. 10.45).


Таблиця 10.45.

Середньо-
річна
урожайність


Фактор А	Фактор В	Урожай
a0	b0	24.1
a0	b1	28.4
a0	b2	28.7
a1	b0	30.7
a1	b1	46.7
a1	b2	59.4
a0	b0	25.8
a0	b1	29.7
a0	b2	30.4
a1	b0	34.4
a1	b1	45.4
a1	b2	50.7
a0	b0	23.0
a0	b1	30.1
a0	b2	32.0
a1	b0	34.0
a1	b1	47.1
a1	b2	64.5
a0	b0	27.0
a0	b1	27.4
a0	b2	17.0
a1	b0	31.0
a1	b1	46.3
a1	b2	60.1

При виконанні багатфакторного аналізу /  у ППП **Statistica** отримуємо табл. 10.46, яка за своїми показниками відмінна від табл. 10.43,

Таблиця 10.46. Результати ДА опцією



Univariate Tests of Significance for Середньорічний (Урожай А) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition					
Effect	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p
Intercept	31820.88	1	31820.88	2149.273	0.0000E-01
Фактор А	2141.37	1	2141.37	144.634	4.8711E-10
Фактор В	813.25	2	406.62	27.465	3.3990E-06
Фактор А*Фактор В	586.83	2	293.42	19.818	2.8261E-05
Error	266.50	18	14.81		

Проте, у результаті подальшого розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера опцією  отримуються результати, повністю тотожні даним, наведеним в табл. 10.44.

Також тотожні між собою оціночні показники сили впливу факторів і поєднань та роботоздатності моделі (див. підрозділ **10.10.3 Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі**), представлені табл. 10.47.

Таблиця 10.47. Сила впливу факторів і поєднань та роботоздатність моделі

Джерело варіації	Сила впливу, %
Організовані фактори	93.0
- з них одинарні	77.6
Фактор А	56.2
Фактор В	21.4
Фактор А × Фактор В	15.4
Похибка	7.0
Роботоздатність моделі	0.930

10.6. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДІВ З БАГАТОРІЧНИМИ КУЛЬТУРАМИ

При дисперсійному аналізі результатів дослідів з багаторічними культурами (багаторічні трави, фруктові дерева, виноград, ягідники та ін.), які не міняють місця розташування протягом ряду років, за [34] виконують ДА даних за кожен рік і обробку сумарних врожаїв за весь період дослідів (не зрозуміло чому використовуються саме сумарні дані, адже обробка середніх даних дасть такі ж самі результати).



У якості прикладу, де визначається істотність відмінності врожаїв за варіантами кожного року і за середніми всього період дослідів, розглянемо вихідні дані, наведені в [34] на с. 239 (табл. 10.48).

Таблиця 10.48 – Урожай сіна багаторічних трав, т/га						
Роки	Варіанти (сорт)	Ділянки				
		I	II	III	IV	V
1968	A (st)	4.02	4.74	3.07	5.14	5.10
	B	4.14	4.67	3.24	5.07	5.24
	C	5.24	5.47	4.12	5.94	6.14
1969	A (st)	3.12	3.64	2.81	3.47	3.01
	B	3.00	3.54	2.99	3.70	3.24
	C	4.02	4.88	3.47	5.44	5.01

У табл. 10.49 наведено вихідний вигляд представлення цих показників у таблиці даних ППП Statistica.

Хоч насправді показники як років, так і сумарні представляють собою дані для однофакторного аналізу з повторенням, причому розраховані за обома річними вибірками, тобто колонками 6 і 9 у

Таблиця 10.49. Формат представлення розрахункової таблиці в ППП Statistica									
	1 Сорт	2 Ділянка	3 Урожай-68	4 Урожай-69	5 Урожай середній	6 Сорт	7 Ділянка	8 Рік	9 Урожай подільниковий
1	A	I	4.02	3.12	3.57	A	I	1968	4.02
2	B	I	4.14	3.00	3.57	B	I	1968	4.14
3	C	I	5.24	4.02	4.63	C	I	1968	5.24
4	A	II	4.74	3.64	4.19	A	II	1968	4.74
5	B	II	4.67	3.54	4.11	B	II	1968	4.67
6	C	II	5.47	4.88	5.17	C	II	1968	5.47
7	A	III	3.07	2.81	2.94	A	III	1968	3.07
8	B	III	3.24	2.99	3.12	B	III	1968	3.24
9	C	III	4.12	3.47	3.79	C	III	1968	4.12
10	A	IV	5.14	3.47	4.30	A	IV	1968	5.14
11	B	IV	5.07	3.70	4.38	B	IV	1968	5.07
12	C	IV	5.94	5.44	5.69	C	IV	1968	5.94
13	A	V	5.10	3.01	4.05	A	V	1968	5.10
14	B	V	5.24	3.24	4.24	B	V	1968	5.24
15	C	V	6.14	5.01	5.57	C	V	1968	6.14
16						A	I	1969	3.12
17						B	I	1969	3.00
18						C	I	1969	4.02
19						A	II	1969	3.64
20						B	II	1969	3.54
21						C	II	1969	4.88
22						A	III	1969	2.81
23						B	III	1969	2.99
24						C	III	1969	3.47
25						A	IV	1969	3.47
26						B	IV	1969	3.70
27						C	IV	1969	5.44
28						A	V	1969	3.01
29						B	V	1969	3.24
30						C	V	1969	5.01

табл. 10.49. Ця таблиця (табл. 10.50) отримується за опцією  One-way ANOVA/  Однофакторный ДА ППП Statistica (див. підрозділ **10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**).

Таблиця 10.50. Результати однофакторного ДА розраховані за обома річними вибірками

Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай подільнянковий (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	534.9274	1	534.9274	708.7085	0.000000
Сорт	8.4702	2	4.2351	5.6110	0.009166
Ошибка	20.3794	27	0.7548		



— результати дисперсійного аналізу;

N ячейки	НЗР крит.; перем. Урожай подільнянковий (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .75479, сс = 27.000					
	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная p	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.388534	0.856369	-0.86821	0.726205
	3	-1.16100	0.388534	0.005915	-1.95821	-0.363795
2	3	-1.09000	0.388534	0.009205	-1.88721	-0.292795

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячейки	Сорт; Взвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 27)=5.6110, p=0.00917 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	Урожай подільнянковий Среднее	Урожай подільнянковий Стд.ош.	Урожай подільнянковий -95.00%	Урожай подільнянковий +95.00%	N
1	A	3.812000	0.281862	3.174384	4.449616	10
2	B	3.883000	0.268556	3.275484	4.490516	10
3	C	4.973000	0.273622	4.354024	5.591976	10

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

Проте для них за [34] виконується двофакторний аналіз без повторень за середніми даними дворічних вибірок — табл. 10.51 (ділянка виступає як фактор, щоб її варіювання не об'єднувалося з похибкою, тобто використовуються колонки 1, 2 і 5 у табл. 10.49). Отримання табл. 10.51 виконується за опцією  Main effects ANOVA/  Главные эффекты (див. **10.5.1.2 Двофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**).

При статистичній значущості фактору повторення виключення його з оцінки при аналізі результатів дисперсійного аналізу є грубою помилкою [127] і зазначений спосіб для дисперсійного аналізу результатів багаторічних досліджень непридатний.

Проте, нічого не заважало автору виконати за обома річними вибірками двофакторні дисперсійні аналізи з повтореннями, як поданий у табл. 10.52, яка отримана за даними колонок 6, 7 і 9 у табл. 10.49 та в табл. 10.53,

одержаній з використанням колонок 7, 8 і 9, чи навіть, прийнявши рік за фактор, — трифакторний без повторень (табл. 10.54), одержана з використанням колонок 6, 7, 8 і 9 у табл. 10.49.

Таблиця 10.51. Результати двофакторного ДА без повторень, розраховані за сумарними даними [34]

Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай середній (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	267.4637	1	267.4637	9986.355	0.000000
Сорт	4.2351	2	2.1176	79.064	0.000005
Ділянка	4.5888	4	1.1472	42.834	0.000019
Ошибка	0.2143	8	0.0268		





— результати дисперсійного аналізу;

N ячеек	НЗР крит.; перем. Урожай середній (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .02678, сс = 8.0000					
	сравн. с N ячеек	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.103504	0.512123	-0.30968	0.167682
	3	-1.16100	0.103504	0.000004	-1.39968	-0.922318
2	3	-1.09000	0.103504	0.000006	-1.32868	-0.851318

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячеек	Сорт; Взвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 8)=79.064, p=.00001 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	Урожай середній Среднее	Урожай середній Стд.ош.	Урожай середній -95.00%	Урожай середній +95.00%	N
1	A	3.812000	0.251389	3.114032	4.509968	5
2	B	3.883000	0.236276	3.226992	4.539008	5
3	C	4.973000	0.348040	4.006687	5.939313	5

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

Тут табл. 10.52 отримується використанням опції  Факторный ДА /  Factorial ANOVA (див. підрозділ 10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica), а табл. 10.54 — опції  Main effects ANOVA /  Главные эффекты.

Таблиця 10.52. Результати двофакторного ДА з повтореннями, розраховані за обома річними вибірками за факторами сорту і ділянки

Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай поділянковий (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	534.9274	1	534.9274	744.8030	0.000000
Сорт	8.4702	2	4.2351	5.8967	0.012896
Ділянка	9.1777	4	2.2944	3.1946	0.043777
Сорт*Ділянка	0.4285	8	0.0536	0.0746	0.999536
Ошибка	10.7732	15	0.7182		

— результати дисперсійного аналізу;

N ячейки	НЗР крит.; перем. Урожай поділянковий (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .71821, сс = 15.000					
	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.379002	0.853909	-0.87882	0.736824
	3	-1.16100	0.379002	0.007886	-1.96882	-0.353176
2	3	-1.09000	0.379002	0.011543	-1.89782	-0.282176

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячейки	Сорт; Взвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 15)=5.8967, p=.01290 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	Урожай поділянковий Среднее	Урожай поділянковий Стд.ош.	Урожай поділянковий -95.00%	Урожай поділянковий +95.00%	N
1	A	3.812000	0.281862	3.174384	4.449616	10
2	B	3.883000	0.268556	3.275484	4.490516	10
3	C	4.973000	0.273622	4.354024	5.591976	10

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

Таблиця 10.53. Результати двофакторного ДА з повтореннями,
розраховані за обома річними вибірками за факторами сорту і
року проведення досліджень

Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай поділянковий (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	534.9274	1	534.9274	1105.477	0.000000
Рік	8.5333	1	8.5333	17.635	0.000318
Сорт	8.4702	2	4.2351	8.752	0.001398
Рік*Сорт	0.2327	2	0.1164	0.240	0.788126
Ошибка	11.6133	24	0.4839		

— результати дисперсійного аналізу;

N ячейки	НЗР крит.; перем. Урожай поділянковий (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .48389, сс = 24.000					
	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.311091	0.821402	-0.71306	0.571060
	3	-1.16100	0.311091	0.001034	-1.80306	-0.518940
2	3	-1.09000	0.311091	0.001825	-1.73206	-0.447940

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячейки	Сорт; Взвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 24)=8.7522, p=.00140 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	Урожай поділянковий Среднее	Урожай поділянковий Стд. ош.	Урожай поділянковий -95.00%	Урожай поділянковий +95.00%	N
1	A	3.812000	0.281862	3.174384	4.449616	10
2	B	3.883000	0.268556	3.275484	4.490516	10
3	C	4.973000	0.273622	4.354024	5.591976	10

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

Таблиця 10.54. Результати трифакторного ДА без повторення, розраховані за обома річними вибірками

Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай подільянковий (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	534.9274	1	534.9274	4410.295	0.000000
Сорт	8.4702	2	4.2351	34.917	0.000000
Ділянка	9.1777	4	2.2944	18.917	0.000001
Рік	8.5333	1	8.5333	70.354	0.000000
Ошибки	2.6684	22	0.1213		

— результати дисперсійного аналізу;

N ячеек	НЗР крит.; перем. Урожай подільянковий (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .12129, сс = 22.000					
	сравн.с N ячеек	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.155750	0.652960	-0.39401	0.252006
	3	-1.16100	0.155750	0.000000	-1.48401	-0.837994
2	3	-1.09000	0.155750	0.000001	-1.41301	-0.766994

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячеек	Сорт; Взвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 22)=34.917, p=.00000 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	Урожай подільянковий Среднее	Урожай подільянковий Стд.ош.	Урожай подільянковий -95.00%	Урожай подільянковий +95.00%	N
1	A	3.812000	0.281862	3.174384	4.449616	10
2	B	3.883000	0.268556	3.275484	4.490516	10
3	C	4.973000	0.273622	4.354024	5.591976	10

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

Аналіз результатів ДА, наведених у табл. 10.50–10.54 представлений у табл. 10.55, показує, що обраний автором спосіб аналізу дослідів з багаторічними культурами (табл. 10.51), характеризується найбільшими похибками середніх для всіх сортів, порівняно з іншими способами (табл. 10.50, 10.52–10.54) показники яких рівні між собою.

Обраний в [34] спосіб має найменшу **НІР**, що свідчить про його низьку оціночну якість, хоч цей спосіб і має найбільшу ступінь впливу сорту, як фактору, у той час як всі порівнювані практично рівні між собою.



Крім того вплив варіювання факторів ділянки і року досліджень на урожайність навіть перевищує вплив від досліджуваних сортів (табл. 10.52–10.54).

Таблиця 10.55. Зведені дані результатів дисперсійного аналізу

Сорт	Середнє	Похибка середнього					
		Двофакторний (сорт і ділянка) без повторень за середніми	Однофакторний за вибірками	Двофакторний (сорт і ділянка) з повтореннями за вибірками	Двофакторний (сорт і рік) з повтореннями за вибірками	Трифакторний без повторення за вибірками	Однофакторний з повторними вимірами за вибірками
A	3.812	0.698	0.638				0.616
B	3.883	0.656	0.608				
C	4.973	0.966	0.619				
HP ₀₅		0.797	0.239	0.808	0.524	0.323	0.872
Ступінь впливу фактору η²		0.294	0.469	0.294	0.296	0.294	0.469

Загалом, викладений в [34] дисперсійний аналіз дослідів з багаторічними культурами (табл. 10.51), а також порівнювані з ним (табл. 10.50, 10.52–10.54) не дає змогу вичленити з результатів вплив погодних умов року, а також ділянок, за якими проводилися дослідження.

За останні роки розроблено однофакторний і багатофакторний дисперсійний аналіз з повтореннями і повторними вимірами. Прийняття за повторні виміри показники років саме й дає змогу вичленити їх вплив з результатів.

Тому при дослідженнях з багаторічними культурами слід виконати дисперсійний аналіз однофакторного експерименту з повторними вимірами опцією ППП **Statistica**  Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА (колони 1, 3 і 4 у табл. 10.49), приймаючи за повторні виміри саме роки дослідження. Ці результати наведені в табл. 10.56.

Аналіз результатів, наведених у табл. 10.56 представлений у табл. 10.55, показує, що ДА з повторними вимірами характеризується найменшими (причому постійними для всіх сортів) похибками середніх порівняно з іншими способами (табл. 10.50–10.54), що свідчить про найвищий оціночний показник даного способу. Крім того його ступінь впливу фактору такий же як і у способу, прийнятого автором, тобто більші за інші.

Таким чином дисперсійний аналіз з повторними вимірами має найкращі оціночні показники і повинен використовуватися для аналізу відповідних даних, зокрема, для дослідів з багаторічними культурами.

З результатів табл. 10.54 бачимо переважаючий вплив варіювання показників ділянки і року над сортом, а також статистично значущу відмінність сорту **C** не лише від сорту–стандарту **A**, та від сорту **B** (10.50–10.54 і 10.56).

Таблиця 10.56. Результати однофакторного ДА з повторними вимірами, розраховані за обома річними вибірками

Эффект	Дисперсионный анализ с повторными измерениями (Повтори) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	534.9274	1	534.9274	668.2291	0.000000
Сорт	8.4702	2	4.2351	5.2905	0.022523
Ошибка	9.6062	12	0.8005		
PIK	8.5333	1	8.5333	51.0179	0.000012
PIK*Сорт	0.2327	2	0.1164	0.6957	0.517765
Ошибка	2.0071	12	0.1673		

— результати дисперсійного аналізу;

N ячеек	НЗР крит.; перем. DV_1 (Повтори) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = .80051, сс = 12.000					
	сравн.с N ячеек	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-0.07100	0.400129	0.862120	-0.94281	0.800806
	3	-1.16100	0.400129	0.013288	-2.03281	-0.289194
2	3	-1.09000	0.400129	0.018466	-1.96181	-0.218194

— оцінки різниці середніх за критерієм Фішера;

N ячеек	Сорт; Невзвеш. средние (Повтори) Текущ. эффект: F(2, 12)=5.2905, p=.02252 Декомпозиция гипотезы					
	Сорт	ЗП_1 Среднее	ЗП_1 Стд.ош.	ЗП_1 -95.00%	ЗП_1 +95.00%	N
1	A	3.812000	0.282934	3.195540	4.428460	5
2	B	3.883000	0.282934	3.266540	4.499460	5
3	C	4.973000	0.282934	4.356540	5.589460	5

— статистична характеристика вибірових варіантів (сортів).

10.7. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ТРИФАКТОРНОГО ДОСЛІДУ

10.7.1. Послідовне застосування інструменту **ДИСПЕРСИОННИЙ АНАЛІЗ** пакету Excel

Для ілюстрації ДА трифакторного експерименту із застосуванням методу **ДИСПЕРСИОННИЙ АНАЛІЗ** пакету **Excel** розглянуто приклад, представлений [39, с. 56–61]. Фактори: **Фон** — два варіанти ($l_{\phi} = 2$), **Строк** — три ($l_{\epsilon} = 3$), **Добрива** — чотири ($l_d = 4$), виконані в чотирикратній ($n = 4$) повтореності, звідки загальна кількість замірів — 96.

Для цього створюється таблиця результатів, розташована у чарунках **П1:Р11**. До неї додано необхідні рядки для одного фактору, двох парних і одного потрійного факторів. Вихідна таблиця даних займає чарунки **А1:G25**, а її цифровий матеріал представлений чотириразовим повторенням, розміщено в чарунках **D1:G25**.

Спершу виконується розрахунок *міжгрупової, загальної суми квадратів і квадратів залишку* (рис. 10.11).






Рис. 10.11. Заповнення вихідної таблиці даних при розрахунку корегуючого фактору, загальної суми квадратів і квадратів залишку.

Натисненням **Данные** (2), потім **Анализ данных** (3) переходимо на панель **Анализ данных**, вибираємо **Однофакторный дисперсионный анализ** (4) і натискаємо **ОК** (5). На панелі **Однофакторный дисперсионный анализ** відмічаємо ☒ **по строкам** (6) і не активізуємо включення в заголовки ☐ **Метки в первой строке** (7).

При цьому слід ввести значення параметра $\alpha = 0.05$ (8) — критичний (пороговий) рівень статистичної значущості, і вказати виведення даних на  (9), задати вхідний інтервал $\$D\$2:\$G\25  (10), виділивши його (11) і натиснути кнопку **ОК** (12). Отриману на новому робочому листі таблицю з результатами ДА слід скопіювати в робочий лист і відредагувати, прибравши пусті рядки. Потім, указавши зв'язки, вставити дані в таблицю результатів (рис. 10.11, на листі).

Далі створити на цьому листі допоміжну таблицю факторів **Фон**, прийнявши середні кожного повторення трьох даних фактору **Строк** і **Добрива**. Вона розташована в чарунках **C29:G31**, а цифрові дані в **D30:G31** (рис. 10.12).

Після застосування для неї методу ДА, копіювання даних із результатами з нового листа в робочий, як описано вище, і обчислення за формулами, наведеними на полі рисунка, у таблиці результатів отримується значення, представлені на рис. 10.12.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Однофакторный дисперсионный анализ							Эффект	Кількість значень, шт.	Взято з розрахунку	Сума квадратів	Число ступенів свободи	Середній квадрат	Критерій Фішера Fф	Критерій Фішера F05
1	Входные данные														
2	Выходной интервал: \$D\$30:\$G\$31														
3	Группирование: <input type="radio"/> по столбцам <input checked="" type="radio"/> по строкам														
4	<input type="checkbox"/> Метки в первом столбце														
5	Альфа: 0.05														
6															
7	Параметры вывода														
8	<input type="radio"/> Выходной интервал:														
9	<input checked="" type="radio"/> Новый рабочий лист:														
10	<input type="radio"/> Новая рабочая книга														
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															

Однофакторный дисперсионный анализ

Входные данные

Выходной интервал: \$D\$30:\$G\$31

Группирование: ☐ по столбцам ☒ по строкам

☐ Метки в первом столбце

Альфа: 0.05

Параметры вывода

☐ Выходной интервал:

☒ Новый рабочий лист:

☐ Новая рабочая книга

Эффект

Кількість значень, шт.

Взято з розрахунку

Сума квадратів

Число ступенів свободи

Середній квадрат

Критерій Фішера Fф

Критерій Фішера F05

Міжгрупова варіація

Загальна варіація

Фон

Строк

Добрива

Фон x Строк

Фон x Добрива

Строк x Добрива

Фон x Строк x Добрива

Залишок (похибка)

2318333.49

2382616.74

29505.09

23

95

29505.09

33.05

3.98

J4=C4*ET(D\$2:\$G\$25)/C4*ET(D30:G31)

L4=J4*K4

N4=L4/M4

O4=N4/N\$11

P4=FRASPOB(P(0.05;M4;\$M\$11))

Дисперсионный анализ - Фон

Источники вариации

SS

df

MS

F

P-Значение

критическое

Между группами

Внутри групп

Итого

2458.758

402.6163

2861.374

1

6

7

2458.75781

67.1027199

36.641701

0.0009208

5.987377584

Фон	I	II	III	IV
Стерня	258	268	275	265
Оранка	232	222	244	229

Рис. 10.12. Заповнення і розрахунок при визначенні параметрів одинарного фактору.

У чарунку **J4** заноситься кількість даних, тобто добуток кількості факторів **Строк** і **Добрива**, тобто $l_c \times l_d = 12$; у чарунку **K4** вставляються посилання на міжгрупову дисперсію середніх значень фактору **Фон**, тобто на чарунку **J30**, добуток чарунок **J4** і **K4** суму квадратів фактору **Фон**, представлений чарункою **L4**. Середній квадрат (чарунка **N4**) є часткою від ділення значень чарунок **L4** на **M4**, причому значення чарунки **M4** відповідає чарунці **K30** (ступеню вільності між групами). Тут **F** (чарунка **O4**) є часткою від ділення даних чарунок **N4** на **N11**. У чарунки колонки **P** заносяться відповідні табличні значення критерію Фішера для **Альфа: 0.05** рівня значущості (згідно (8) рис. 10.11) для відповідних ступенів вільності чисельника — досліджуваного фактору (чарунка **M4**) і знаменника **M11**.

Аналогічно створюються на цьому листі допоміжна таблиця факторів **Строк**, потім таблиця **Добрива**, і обробляються результати їхнього аналізу.

Далі створюються допоміжні таблиці взаємодії парних залежностей, зокрема, **Фон**×**Строк**, як представлено на рис. 10.13).

Однофакторный дисперсионный анализ											
Входные данные											
Входной интервал: \$D\$48:\$G\$53											
Группирование: <input type="radio"/> по столбцам <input checked="" type="radio"/> по строкам											
<input type="checkbox"/> Метки в первом столбце											
Дельта: 0.05											
Параметры вывода											
<input checked="" type="radio"/> Выходной интервал:											
<input checked="" type="radio"/> Новый рабочий лист:											
<input type="radio"/> Новая рабочая книга											
Эффект											
Кількість значень, шт.											
Взято з розрахунку											
Сума квадратів											
Число ступенів свободи											
Середній квадрат											
Критерій Фішера Fф											
Критерій Фішера Fп											
Міжгрупова варіація											
Загальна варіація											
Фон											
Строк											
Добрива											
Фон х Строк											
Фон х Добрива											
Строк х Добрива											
Фон х Строк х Добрива											
Залишок (похибка)											
Дисперсійний аналіз - Фон х Строк											
Источники вариации											
Между группами											
Внутри групп											
Итого											
L7 = J7*K7-L4-L5											
M7 = M4*M5											
N7 = L7/M7											
O7 = N7/N\$11											
P7 = FPASPOBP(0.05;M7;M\$11)											
J5 = CЧЕТ(\$D\$2:\$G\$25)/CЧЕТ(D36:G38)											
J6 = CЧЕТ(\$D\$2:\$G\$25)/CЧЕТ(D42:G45)											
J7 = CЧЕТ(\$D\$2:\$G\$25)/CЧЕТ(D48:G53)											
Фон											
Строк											
I											
II											
III											
IV											
Стерня Перший											
Стерня Другий											
Стерня Третій											
Оранка Перший											
Оранка Третій											

Рис. 10.13. Заповнення і розрахунок параметрів взаємодії парних факторів.

Отримана на новому робочому листі таблиця з результатами ДА також у відредагованому виді копіюється в робочий лист. Їхні дані зв'язків вставляються в таблицю результатів (рис. 10.13).

Після застосування для неї методу ДА й виконання обчислень за виразами, наведеними на полі рисунка, у таблиці результатів буде подано дані стосовно парної взаємодії факторів **Фон**×**Строк**. Таким самим чином визначаються параметри парної взаємодії **Фон**×**Добрива**.

Визначення параметри парної взаємодії факторів **Строк**×**Добрива** виконується за відповідною додатковою таблицею (рис. 10.14).

Далі вставляються результати її ДА й за виразами, наведеними на полі рисунка, обчислюються параметри парної взаємодії **Строк**×**Добрива** і потрійної взаємодії **Фон**×**Строк**×**Добрива**.

Результати рис. 10.14 показують, що для взаємодій **Фон**×**Строк**×**Добрива** і **Фон**×**Добрива** має місце $F < F_T$, таким чином нульова гіпотеза $H_0: d = 0$ (різниця між середніми дорівнює нулю) на Δ льфа: 0.05 рівні значення не відкидається, тобто ефект даних взаємодій відсутній — між усіма вибірковими середніми немає істотних відмінностей. Для інших випадків маємо $F > F_T$ — нульова гіпотеза відкидається, і слід додатково провести оцінку істотності частинних відмінностей за **НІР** і визначити, між якими середніми є значущі різниці.

В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	І	Ј	К	Л	М	Н	О	Р
1	Однофакторный дисперсионный анализ						Эффект	Кількість значень, шт.	Взято з розрахунку	Сума квадратів	Число ступенів свободи	Середній квадрат	Критерій Фішера Fф	Критерій Фішера Fп
2	Входные данные						Міжгрупова варіація			2318333.49	23	100797.11	112.90	1.68
3	Входной интервал: \$D\$66:\$G\$77						Загальна варіація			2382616.74	95			
4	Группирование: <input type="radio"/> по столбцам <input checked="" type="radio"/> по строкам						Фон	12	2861.37	4336.49	1	33048.49	33.048	3.98
5	<input type="checkbox"/> Метки в первом столбце						Строк	8	133157.9479	1065263.583	2	532631.79	596.57	3.13
6	Дельта: 0.05						Добрива	6	164442.8524	986657.1146	3	328885.70	368.37	2.74
7	Параметры вывода						Фон x Строк	4	277533.48	1365.255	2	7682.62	8.60	2.35
8	<input checked="" type="radio"/> Выходной интервал:						Фон x Добрива	3	341004.55	6851.45	3	2283.82	2.56	2.74
9	<input checked="" type="radio"/> Новый рабочий лист:						Строк x Добрива	2	1130918.31	209915.92	6	4985.99	39.19	2.23
10	<input checked="" type="radio"/> Новая рабочая книга						Фон x Строк x Добрива			4775.08	6	795.86	0.89	2.23
11							Залишок (похибка)			64283.25	72	892.82		
12							Дисперсионный анализ Строк x Добрива							
64							Источники вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	Фактическое	
65	Строк	Добрива	I	II	III	IV	Между группами	130918	11	102810.7552	181.70408	4.279E-28	2.066608478	
66	Перший	Відсутнє	104	101	133	130	Внутри групп	20369.31	36	565.8142361				
67	Перший	N60	319	429	397	433	Итого	1151288	47					
68	Перший	N180	495	462	507	460	L9 = J9*K9-L5-L6 M9 = M5*M6 N9 = L9/M9 O9 = N9/\$N11							
69	Перший	N180P60	566	535	510	535	L10 = L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8-L9 M10 = M4*M5*M6 N10 = L10/M10 O10 = N10/\$N11							
70	Другий	Відсутнє	74	75	90	99	J8 = C4ET(\$D\$2:\$G\$25)/C4ET(D56:G63) P8 = FPAСПОБР(0.05;M8;\$M\$11)							
71	Другий	N180P60	337	322	362	319	J9 = C4ET(\$D\$2:\$G\$25)/C4ET(D66:G77) P9 = FPAСПОБР(0.05;M9;\$M\$11)							
72	Третій	Відсутнє	47	36	47	50	P10 = FPAСПОБР(0.05;M10;\$M\$11)							
73	Третій	N180P60	169	162	171	170								

Рис. 10.14. Заповнення і розрахунок взаємодії парних і потрійних факторів.

Таблица 10.57. Порівняння результатів аналізу		
Дисперсія	Критерій Фішера Fф	
	за розрахунками	згідно прикладу
Фон	33.05	33.48
Строк	596.57	604.35
Добрива	368.37	373.17
Фон x Строк	8.60	8.72
Фон x Добрива	2.56	2.59
Строк x Добрива	39.19	39.70

Порівняння одержаних результатів ДА й даних, наведених у [39], представлено в табл. 10.57. З неї видно деяку відмінність між ними, що пояснюється тим, що у [39] з аналізу виключено повторність.

10.7.2. Використання ППП Statistica для дисперсійного аналізу трифакторного експерименту з повторенням

Програма Excel не має інструменту для розрахунку трифакторного ДА, проте його має ППП Statistica.



Виконавши операції за опцією  , описані у підрозділі 10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторно-



Таблица 10.58. Результаты ДА трифакторного эксперимента опцією 					
Одномерный критерий значимости для I-IV (Диспанализ) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы					
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	5954586	1	5954586	6669.392	0.000000
Фон	29505	1	29505	33.047	2.0187E-7
Строк	1065264	2	532632	596.570	0.00000000
Добрива	986657	3	328886	368.366	0.00000000
Фон*Строк	15365	2	7683	8.605	0.000446
Фон*Добрива	6851	3	2284	2.558	0.061766
Строк*Добрива	209916	6	34986	39.186	0.000000
Фон*Строк*Добрива	4775	6	796	0.891	0.505934
Ошибка	64283	72	893		

го експерименту з повторенням при використанні ППП **Statistica**, маємо табл. 10.58 результатів ДА.

Перевірка гіпотези про приналежність декількох середніх значень до однієї генеральної сукупності або виділення груп середніх значень, що належать до однієї сукупності виконується методом множинних порівнянь Фішера, Тьюкі, Бонферроні й Шеффе.

Розрахункові результати, наведені в табл. 10.58 і 10.57, повністю співпадають, проте використання ППП **Statistica** для ДА трифакторного експерименту з повторенням незрівнянно простіше, більш інформативне й практично виключає можливість допущення помилок.

Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера для взаємних порівнянь всіх варіантів представлені в табл. 10.60. Також ППП **Statistica** має змогу порівнювати парні по **НІР** парні взаємодії. Порядок розрахунку **НІР** за даними табл. 10.60 представлено в підрозділі **10.9.2.2 Визначення НІР Фішера застосуванням ППП Statistica**, а саме в табл. 10.69, с. 642.

При застосуванні опції  Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА скопіюємо вихідну таблицю даних (чарунки **A2:G25**, рис. 10.11) в таблицю ППП **Statistica** і перейменуємо назви колонок виконуючи дії відповідно рис. 2.5, до досягнення вигляду аналогічно рис. 10.10. Далі виконуємо дії (**1–6**) за рис. 10.5 і продовжуємо їх далі як представлено на рис. 10.15.

При виборі змінних слід виходити з плану експерименту $3 \times 3 \times 4$ (3 міжгрупових факторів і один фактор з повторністю вимірів). Міжгруповий фактор **Фон** має два рівня, **Строк** — три, **Добрива** — чотири рівня. Значення залежної змінної визначалося в чотирьох повторностях вимірів I, II, III й IV.










Для того щоб визначити фактор, який нас цікавить, слід натиснути кнопку  Within effects /  Внутригрупп. эффекты (**10**) панелі  ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: /  Задать фактор с повторными из... і задати 4 рівні (**11**) вихідного фактору (згідно повторності), залишивши назву **R1** (**12**). Клавішею **OK** (**13**) повертаємося на панель  ANOVA/MANOVA Repeated Measures ANOVA: /  Повторные измерения ДА.

Таблица 10.59. Результаты ДА трифакторного эксперимента опцією

 Повторные измерения ДА

Эффект	Диспанализ с повторными измер. Сигма-ограниченная параметриз. Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	5954586	1	5954586		
{1}Фон	29505	1	29505		
{2}Строк	1065264	2	532632		
{3}Добрива	986657	3	328886		
Фон*Строк	15365	2	7683		
Фон*Добрива	6851	3	2284		
Строк*Добрива	209916	6	34986		
Фон*Строк*Добрива	4775	6	796		
Ошибка		0			
{4}ВІДКЛИК	3471	3	1157		
ВІДКЛИК*Фон	1360	3	453		
ВІДКЛИК*Строк	4914	6	819		
ВІДКЛИК*Добрива	15211	9	1690		
ВІДКЛИК*Фон*Строк	8773	6	1462		
ВІДКЛИК*Фон*Добрива	5146	9	572		
ВІДКЛИК*Строк*Добрива	17143	18	952		
4*1*2*3	8265	18	459		
Ошибка		0			

Натиснувши кнопку  **All effects** /  **Все эффекты** (16) на рис. 10.5), отримуємо табл. 10.58 з результатами ДА.

У чарунки **G11** заноситься прийнятий довірчий рівень статистичної значущості $\alpha=0.05$ і використовується при визначенні табличних критеріїв Стьюдента **СТЮДЕНТ.РАСП.2X** (див. с. 61) (чарунка **H11**) та Фішера **F.ОБР.ПХ** (див. с. 562) (чарунки **G2:G9**), у чарунку **B11** — повторність при дослідах, тобто чотири.

На створюємо таблицю результатів (табл. 10.61), аналогічну представлений на рис. 10.11, додавши в кінці колонку для даних **HIP**.

Копіюємо в цей лист з заголовками зі ППП **Statistica** табл. 10.58 і пов'язуємо посиланнями блок чарунок **C3:E9** з блоком **C17:E23**. Далі пов'язуємо чарунки залежностями, наведеними на полі цієї таблиці.

Результати табл. 10.61 і рис. 10.14 повністю співпадають, проте, ДА з використанням ППП **Statistica** менш трудомісткий.

Таблиця 10.60 – Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера

— для фактору **Фон**

НЗР крит.; перем. I-IV (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 892.82, сс = 72.000						
N ячейки	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	35.06250	6.099259	0.000006	22.90385	47.22115

— для фактору **Строк**

НЗР крит.; перем. I-IV (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 892.82, сс = 72.000						
N ячейки	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	141.3125	7.470036	0.00	126.4213	156.2037
	3	257.6250	7.470036	0.00	242.7338	272.5162
2	3	116.3125	7.470036	0.00	101.4213	131.2037

— для фактору **Добрива**

НЗР крит.; перем. I-IV (Диспаналіз) Одновременные доверит. интервалы Ошибка: Межгр. MS = 892.82, сс = 72.000						
N ячейки	сравн. с N ячейки	Среднее Различ.	Стандарт Ошибка	ная р	-95.00% Дов.пред	+95.00% Дов.пред
1	2	-176.833	8.625654	0.000006	-194.028	-159.638
	3	-227.292	8.625654	0.000006	-244.487	-210.097
	4	-264.417	8.625654	0.000006	-281.612	-247.222
2	3	-50.458	8.625654	0.000006	-67.653	-33.263
	4	-87.583	8.625654	0.000006	-104.778	-70.388
3	4	-37.125	8.625654	0.000052	-54.320	-19.930





Рис. 10.15. Розрахунок ДА трифакторного дослідження опцією

 Повторные измерения ДА

Таблиця 10.61. Дисперсійний аналіз трифакторного експерименту з використанням опції **Repeated measures ANOVA**/

Повторные измерения ДА ППП Statistica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Ефект	Кількість значень, шт.	Сума квадратів SS	Число ступенів свободи df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера Fф	p-рівень	Критерій Фішера Fn	HIP05
2	Загальна варіація		2382616.74	95	25080.18	28.09	0.0000E+00	1.45	
3	Фон	12	29505.09	1	29505.09	33.05	2.0187E-07	3.97	6.079
4	Строк	8	1065263.58	2	532631.79	596.57	0.0000E+00	3.12	4.964
5	Добрива	6	986657.11	3	328885.70	368.37	0.0000E+00	2.73	4.299
6	Фон × Строк	4	15365.25	2	7682.63	8.60	0.000446	3.12	17.195
7	Фон × Добрива	3	6851.45	3	2283.82	2.56	0.061766	2.73	14.891
8	Добрива × Строк	2	209915.92	6	34985.99	39.19	0.0000E+00	2.23	12.159
9	Фон × Строк × Добрива	1	4775.08	6	795.85	0.89	0.505934	2.23	42.119
10	Залишок (помилка)		64283.25	72	892.82				
11	Повторність дослідів	4				$\alpha = 0.05$		$t_r = 1.9935$	
12									
13	Добрива		SS	Степени свободы	MS	$B3=(D3+1)$ $B4=(D4+1)$ $B5=(D5+1)$ $B6=(D3+1)*(D4+1)$ $B7=(D3+1)*(D5+1)$ $B8=(D4+1)*(D5+1)$ $B9=(D3+1)*(D5+1)*(D4+1)$ $B11=(D2+1)/(B3*B4*B5)$ $C2=СУММ(C3:C10)$ $D2=СУММ(D3:D10)$ $E2=СУММ(E3:E10)$ $C10=СУММ(C22:C31)$ $D10=СУММ(D22:D31)$ $E10=C10/D10$ $G2=1-F.PACП(F2;D2;D$10;ИСТИНА)$ $G9=1-F.PACП(F9;D9;D$10;ИСТИНА)$			
14	Св. член		5954586.26	1	5954586.26	$F2=E2/E$10$ $F9=E9/E$10$ $C3=C15$ $E9=E21$			
15	Фон		29505.09	1	29505.09				
16	Строк		1065263.58	2	532631.79				
17	Добрива		986657.11	3	328885.70				
18	Фон*Строк		15365.25	2	7682.63				
19	Фон*Добрива		6851.45	3	2283.82				
20	Строк*Добрива		209915.92	6	34985.99				
21	Фон*Строк*Добрива		4775.08	6	795.85				
22	Ошибка			0					
23	ВІДКЛИК		3471.03	3	1157.01				
24	ВІДКЛИК*Фон		1360.36	3	453.45				
25	ВІДКЛИК*Строк		4914.25	6	819.04				
26	ВІДКЛИК*Добрива		15210.76	9	1690.08				
27	ВІДКЛИК*Фон*Строк		8773.42	6	1462.24				
28	ВІДКЛИК*Фон*Добрива		5146.26	9	571.81				
29	ВІДКЛИК*Строк*Добрива		17142.58	18	952.37				
30	ВІДКЛИК*Фон*Строк*Добрива		8264.58	18	459.14				
31	Ошибка			0					
						$H2=FRACПОВР(F$11;D2;D$10)$ $H9=FRACПОВР(F$11;D9;D$10)$ $I3=I11*(2*E10/(B4*B5*B11))^0.5$ $I3=I11*(2*E10/(B4*B5*B11))^0.5$			
						$I4=I11*(2*E$10/(B3*B5*B$11))^0.5$ $I5=I11*(2*E$10/(B3*B4*B$11))^0.5$ $I6=I11*(2*E$10/(B5*B$11))^0.5$ $I7=I11*(2*E$10/(B4*B11))^0.5$ $I8=I11*(2*E$10/(B3*B11))^0.5$ $I9=I11*(2*E$10/(B$11))^0.5$			

Таблиця 10.62

Вибірка з пропущеними даними

	A	B	C	D	E
2	Варіант	Повторення			
3		I	II	III	IV
4	St (Стандарт)	331	372	330	336
5	A	379	364	384	349
6	B	385			387
7	C	407	391	409	
8	D	432	503	470	423

10.8. ОСОБЛИВОСТІ ДА ВИБІРОК З ПРОПУЩЕНИМИ ТА ВІДНОВЛЕНИМИ ДАНИМИ

10.8.1. Однофакторний ДА вибірок нерівного розміру

Хоч найчастіше планується експеримент з вибірками рівного розміру (для однофакторного ДА вибірок з однаковими повтореннями), в силу ряду причин це не завжди можливо — кількість зразків може змінитися [135].

Розглянемо ДА вибірки з пропущеними даними (табл. 10.62), тобто, зі штучно вилученими значеннями B_{II} , B_{III} і D_{IV} (чарунки **C5**, **D5** і **E6** табл. 10.3 на с. 567).

Таблиця 10.63 – Однофакторний ДА вибірок нерівного розміру

— розрахунковий спосіб

Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_ϕ	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_T
Варіантів C_v	29300.1	4	7325.028	14.14686	0.000171	3.2592
Залишок (похибка) C_z	6213.4	12	517.785			
Загальне (разом) C_y	35513.5	16				
$\alpha = 0.05$				$t_T = 2.1788$		

— допомогою ППП Statistica опцією  Однофакторный ДА

Одномерный критерий значимости для Значения (Диспанализ) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы					
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Эффект					
Св. член	2417822	1	2417822	4669.551	0.000000
Вариант	29300	4	7325	14.147	0.000171
Ошибка	6213	12	518		

— за допомогою ПА MS Excel

Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	29300.11	4	7325.0282	14.14686	0.0001707	3.259166727
Внутри групп	6213.417	12	517.78472			
Итого	35513.53	16				

Результати ДА за розрахунками, виконані на основі табл. 10.4 на с. 569 та 10.5 на с. 570, отримані за допомогою ППП Statistica аналогічно табл. 10.9 на с. 579, та ПА MS Excel (табл. 10.7 на с. 573) наведені в табл. 10.63.

У разі з однофакторного ДА вибірки з пропущеними даними проблем не виникає, всі результати ДА ідентичні.

10.8.2. Аналіз одно– і двофакторного експерименту інструментом дисперсионный анализ при пропусках данных

Якщо при пропусках даних у разі з однофакторним ДА проблем не виникає, то з багатофакторним ДА виникають складності [135].

Звичайно, як рекомендується в ряді посібників, можна вирівняти кількість випробовуваних в групах, відкинувши випадковим чином “зайві” з ко-

жної групи. Однак, іноді це нерозумно або взагалі неможливо в силу вихідної нечисленності вибірок.

Складнощі виникають в зв'язку з тим, що при вибірках нерівного розміру рядки, стовпці і ефекти міжфакторної взаємодії вже не є незалежними. Найкращим виходом з цього є використання статистичних систем, де ця проблема знаходить своє рішення [135], наприклад, усі види ДА, які виконуються ППП **Statistica** мають змогу обробляти вибірки із пропущеними даними, у той час, як інструмент **Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений** ПА **MS Excel** не дозволяє виконувати ДА вибірок із пропущеними значеннями.

Хоч наведений у підрозділі **10.4.2.2 Дисперсійний аналіз подвійним використанням інструменту Однофакторный ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ** метод дещо громіздкий, проте він дає змогу проводити дисперсійний аналіз однофакторного експерименту і двофакторного експерименту без повторень при відсутності деяких даних вибірки.

Розглянемо аналіз даних, розташованих в чарунках **B4:E8** однофакторного експерименту або двофакторного без повторень табл. 10.15 зі штучно вилюченими значеннями в чарунках **C6**, **D6** і **E7**, представленого на рис. 10.16.

Після виконавши згідно рис. 10.1 однофакторний дисперсійний аналіз чарунок **A4:E8**, тобто дії **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2), виникає панель **Анализ данных** після вибору інструменту

Однофакторный дисперсионный анализ (3) і натиснення кнопки **ОК** (4) на панелі

Однофакторный дисперсионный анализ (рис. 10.16) вводиться значення **Альфа: 0.05** (5) (див. с. 339) – імовірність найменш сприятливого типу похибки. Для включення в дані заголовків слід активізувати **Метки в первом столбце** (6) (хоч






Рис. 10.16. Застосування інструменту **Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений** для аналізу експерименту з пропусками даних

ми і виконуємо виведення за рядками), вказати виведення даних на  (7), задати інтервал даних $\$A\$4:\$E\8 (9) і натиснути **ОК** (10).

Далі виконуємо однофакторний дисперсійний аналіз чарунк **B3:E8** при групуванні по , тобто $\$B\$3:\$E\8 . У результаті дисперсійного аналізу отримуємо відповідні листи виведення результатів. З даних наведених на них формуємо таблицю (табл. 10.64) аналогічну за формою табл. 10.17, вставляючи підсумкові і дисперсійні таблиці отриманих листів виведення результатів.

Об'єднавши, як показано на полі табл. 10.64, отримані у обох випадках дані в кінцеву таблицю (чарунки **A15:G19**) розрахунку дисперсій і виконавши додатково ряд визначень, наведених за представленими також на полі формулами, маємо результат визначення критерію Фішера **F** для варіантів і повторень (відповідно чарунки **E16** і **E17**). Знизу до неї додано рядок для визначення критичного критерію Стюдента, використовуваний при розрахунку **НІР**.

Таблиця 10.64. Результат дисперсійного аналізу з використанням інструменту **Однофакторный дисперсионный анализ**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Однофакторный дисперсионный анализ							
2	ИТОГИ	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх Sd	НІР.05 (варіантів)
3	St (Стандарт)	4	1369	342.3	400.25	-	-	-
4	A	4	1476	369.0	250.00	26.75	24.62	53.64
5	B	2	772	386.0	2.00	43.75	20.10	43.80
6	C	3	1207	402.3	97.33	60.08	22.79	49.67
7	D	4	1828	457.0	1355.33	114.75	24.62	53.64
8								
9	I	5	1934	386.8	1407.20	F4=D4-\$D\$3 F7=D7-\$D\$3 G4=(\$D\$18/(1/\$B\$3+1/B4))^0.5 G7=(\$D\$18/(1/\$B\$3+1/B7))^0.5 H4=G4*\$G\$20 H7=G7*\$G\$20		
10	II	4	1630	407.5	4181.67			
11	III	4	1593	398.3	3374.92			
12	IV	4	1495	373.8	1546.25			
13								
14	Дисперсионный анализ загальний							
15	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів свободи df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера Fф	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера Fт	
16	Варіантів, Cv	29300.11	4	7325.028	18.976757	0.00003999	6.388	
17	Повторення, Ср	2576.23	3	858.743	2.224723	0.13789460	3.490	
18	Залишок (похибка), Cz	3637.19	12	303.099				
19	Разом	35513.53	16					
20					$\alpha = 0.05$	$t_T = 2.1788$		
21	Дисперсионный анализ по строках							
22	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	
23	Между группами	29300.11	4	7325.028	14.146860	0.000171	3.259167	
24	Внутри групп	6213.417	12	517.785				
25	Итого	35513.53	16					
26								
27	Дисперсионный анализ по столбцах							
28	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	
29	Между группами	2576.229	3	858.743	0.338937	0.797559	3.410534	
30	Внутри групп	32937.3	13	2533.638				
31	Итого	35513.53	16					

Для оцінки даних експерименту за **НІР** праворуч до таблиці додано стовбець, де в чарунках **F4:F7** наводяться відхилення середньої величини

відповідного сортозразка від середньої величини стандарту, тобто різниця між значеннями чарунок від **D4** до **D7** і значенням чарунки **D3**.

Після нього додається стовбець **G** з розрахунком похибки різниці середніх відповідно до кожної пари порівняння результатів, занесених у чарунки **G4:G7**. Так як кількість повторень варіантів не постійна й не однакова, то використовується формула (10.37). Потім додається стовбець **H** з розрахунком **HIP** (чарунки **H4:H7**).

Взаємне пов'язання даних таблиць та розрахункові формули подано на полі табл. 10.64.




Застосуванням ППП **Statistica** при використанні опції  Main effects ANOVA /  Главные эффекты дає

Таблица 10.65. Результаты ДА при відсутності деяких даних опцією  Главные эффекты

Эффект	Одномерный критерий значимости для Значения (Диспанализ) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	2373685.58	1	2373685.58	5470.718	0.000000
Вариант	29032.30	4	7258.07	16.728	0.000338
Ділянка	2308.41	3	769.47	1.773	0.222015
Ошибка	3905.00	9	433.89		

змогу виконувати ДА з пропущеними даними, тобто аналізу даних зі штучно вилученими значеннями в чарунках **C6**, **D6** і **E7** із вихідних даних, наведених на рис. 10.2, с. 572 і позначених жовтим кольором. Результат дисперсійного аналізу представлено в табл. 10.65.

10.9. АПОСТЕРІОРНІ КРИТЕРІЇ. ПОРІВНЯННЯ ГРУПОВИХ СЕРЕДНІХ ДИСПЕРСІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Після того як достовірно встановлено вплив регульованого фактору або факторів на результативну ознаку, при необхідності звертаються до порівняння групових середніх один з одним або з будь-якої іншої величиною, наприклад з контролем, стандартом, встановленою нормою і т. п.

Різниця між середніми величинами, як описано вище, оцінюють за t -критерієм Стюдента, тобто за відношенням зазначеної різниці до її похибки. Цей спосіб, проте, непридатний до порівняльної оцінки середніх в дисперсійному комплексі, так як поряд з груповий дисперсією на величину похибки різниці $s_{\bar{d}}$ між груповими середніми комплексу впливає внутрішньогрупова дисперсія s_z , величина якої залежить і від чисельності варіант в групах, і від кількості груп, що входять в даний комплекс [15].

При використанні критерію Стюдента зі збільшенням кількості порівнюваних середніх в силу випадковості вибірки в принципі зростає ймовірність зробити помилку 1-го роду і однорідність всієї сукупності, що оцінюється за декількома вибіровим середнім, виявляється сильно залежною від

середньої всього лише однієї вибірки. Тому для вирішення цього завдання використовується інший підхід, коли в оцінку значущості відмінностей між середніми вносять вклад відразу всі вибіркові середні і проводиться оцінка: чи не занадто велика дисперсія середніх, щоб припустити, що всі вони є середніми вибірок, взятих з однієї генеральної сукупності? [135]

Для деталізації ефектів, статистичне значення яких підтверджено багатомірними критеріями використовуються одномірні, зокрема у якості похибки різниці між груповими середніми дисперсійного комплексу прийнятий корінь квадратний з відносини внутрішньогрупової, або залишкової, дисперсії до числа варіант, що входять до складу градацій фактору, тобто

$$s_{\bar{d}} = s_z \sqrt{n}. \quad (10.33)$$

10.9.1. Множинний t -критерій Фішера (захищений t -критерій)

Одна з таких процедур була запропонована Р. А. Фішером і отримала назву множинного t -критерію або тесту мінімально значимих розходжень Фішера (іноді званого *захищеним t -критерієм*).

Використання t -коефіцієнта Фішера (t_F) виконується якщо в результаті дисперсійного аналізу критерій Фішера F виявиться значущим, а також при однорідності дисперсій порівнюваних вибірок. Розрахунок множинного t -критерію схожий на обчислення t -критерію Стьюдента, проте замість оцінки дисперсії кожної вибірки окремо, як у формулах (7.9)–(7.11), викори-

Таблиця 10.66. Аналіз множинним t -критерієм Фішера

	DC	DD	DE
2		Стандарт-2004	Колекція-2004
3		39.9	30.4
4		36.7	30.1
13		28.4	23.2
14			27.6
15			29.4
101			28.6
102			23.4
103	Середнє \bar{x}	30.6	26.4
104	Обсяг вибірок n	11	100
105	Різниця середніх Δ	4.15	
106	Дисперсія s^2	24.911	23.025
107	Ступінь вільності v	10	99
108	Рівень значущості α	0.05	
109	Захищений t -критерій Фішера t_F	1.7735	
110	Табличний критерій Стьюдента t_T	1.982	
111	Кількість порівнюваних груп k	2	
112	Табличний критерій Фішера F_T	2.5889	
113	Табличний критерій Шеффе t_{sh}	1.6090	

DD109=DD105/(W43*(1/DD104+1/DE104))

DD110=СТЬЮДРАСПОБР(DD109;(DD107+DE107))

DD112=F.ОБР.ПХ(DD109;DE107;DD107)

DD113=(DD112*(DD111-1))^0.5

стана оцінка внутрішньогрупової дисперсії s_z^2 , яка залежить від варіабельності даних усередині всіх груп [135]

$$t_F = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_z^2 \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}. \quad (10.34)$$

де n_1 і n_2 – обсяги порівнюваних вибірок.

Для ілюстрації у табл. 10.66 наведено порівняльний аналіз експериментальних середніх. Її дані взяті з табл. 7.8 на с. 360. Нульова і альтернативна гіпотези відповідно мають вигляд $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2$ і $H_A: \bar{x}_1 \neq \bar{x}_2$.

За умови $t_F \geq t_{\alpha/2}(v_1+v_2)$, тобто *двостороннього t*–критерію Стьюдента, нульова гіпотеза відкидається.

Однорідності дисперсій порівнюваних вибірок підтверджена у підрозділі 7.3.3 Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій, а значущість критерію Фішера F — дисперсійним аналізом (див. табл. 10.2, с. 565). Значення внутрішньогрупової дисперсії, взятої з табл. 10.2 становить $s_z^2 = 23.1977$.

У табл. 10.66 розрахунки з 103 по 107 рядок виконуються відповідно табл. 7.14 на с. 375.

За результатами оцінки захищеним t –критерієм маємо $t_F < t_{\alpha/2}(v_1+v_2)$, тобто порівнювані вибірки за захищеним t –критерієм не мають статистично значущих відмінностей.

10.9.2. Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми дисперсійного комплексу

10.9.2.1. Основи статистичної оцінки за НІР. Розрахунковий метод

Якщо загальна оцінка за критерієм F встановлює наявність варіантів, що істотно відрізняються від інших ($F \geq F_T$), і нульова гіпотеза про рівність параметрів досліджуваних сукупностей відкидається, то треба визначити, до яких варіантів належать істотні різниці. За [34] якщо $F < F_T$, тобто $p > \alpha$ то нульова гіпотеза не відкидається і оцінку частинних розходжень не проводять. У цьому випадку всі різниці між будь-якими парами лежать у межах похибки досліду [34] (див. табл. 10.18 і 10.20 на с. 591).

Проте за [127] коли нульова гіпотеза за F -критерієм, слід досліджувати різні оцінювані функції, щоб з'ясувати, які з них відповідальні за це. Їх можна розглядати як головний статистичний апарат, а F -критерій виступає як попередній прийом, за допомогою якого вирішується, чи варто продовжувати дослідження іншими методами. Його пропонується застосовувати замість побудови індивідуальних інтервальних оцінок за даними з використанням верхнього 2.5 % (двосторонній 5 %) межі t -розподілу. Гарантований 90 % довірчий коефіцієнт краще номінального 95%, якщо, звісно ж, невідомо, наскільки далеко справжнє значення від 95%.

Перевага цього методу полягає ще в тому, що він нечутливий до порушення припущень про нормальність і рівність дисперсій [127]

Висновок про істотність розходжень, зроблений на основі F -оцінки, порушує питання: “які середні по варіантах розрізняються істотно?”.

Оскільки методи дослідження середніх в дисперсійному аналізі виводяться в припущеннях, що містять умову рівності дисперсій, іноді рекомендується перевіряти цю умову за допомогою якого-небудь статистичного критерію. Стандартний критерій (Бартлетта, див. підрозділ **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта**) при перевірці рівності дисперсій в разі $\gamma_2 < 0$ кілька затушовує їх різницю, коли вона існує, а в разі $\gamma_2 > 0$ знаходить цю різницю, коли її немає [127].

Для з'ясування цього питання використовується додатковий аналіз, наприклад, при дослідженні сільськогосподарських процесів використовують *найменшу істотну різницю (НІР)* (див. підрозділ **7.3.7.8 Найменша істотна різниця (НІР)**). Тому для цього приводяться середні значення для кожної градації і виконується оцінка істотності частинних відмінностей та визначається між парами якими середніх є значущі різниці [34].

Із цією ж метою використовуються методи множинних порівнянь, наприклад, метод Тьюкі (підрозділ **10.9.3 Попарне порівняння даних за методом Тьюкі**), метод Стюдента–Ньюмена–Кейлса, Шеффе (підрозділ **10.9.4 Основи розрахунку за тестом Шеффе**) та інші, наведені у підрозділі **10.4.3 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**.

Оцінка відмінностей за допомогою НІР, а вірніше t -оцінка кожної різниці d , веде до такого ж статистичного висновку, як і F -оцінка тих же різниць. Тому не слід перевіряти істотність відмінностей на основі всіх трьох оцінок — усі вони дадуть однаковий результат [38].

Якщо фактична різниця двох вибірових середніх $d \geq \text{НІР}$, то вона істотна, статистично значуща, а якщо $d < \text{НІР}$ — неістотна, не значуща.

Найменшу істотну різницю можна виразити також і в процентах, поділивши її на середню з усіх порівнюваних середніх і помноживши на 100 [29].

У дослідній роботі найчастіше проводять попарні поваріантні порівняння (залежних вибірок). Дисперсійний аналіз припускає рівність оцінок дисперсій $s_1^2 = s_2^2$ і рівність вибірок $n_1 = n_2$, а похибку кожної із середніх визначають

за величиною залишкової дисперсії s_z^2 (решта дисперсій не є випадковою), тому похибку різниці середніх у цьому разі обчислюють за формулою

$$s_d = \sqrt{\frac{2s_z^2}{n}}, \quad (10.35)$$

звідки маємо

$$\text{НІР} = t_T \sqrt{\frac{2s_z^2}{n}}, \quad (10.36)$$

де n – обсяг вибірки (повторність вибірки).

Тут число ступенів свободи визначається виразом $\nu = n - 1$.

У випадку порівняння двох варіантів з різною повторністю виконується порівняння середніх незалежних вибірок за формулою (10.37)

$$\text{НІР}_\alpha = t_{\alpha(n_1+n_2-2)} \sqrt{\frac{s_z^2}{n_1} + \frac{s_z^2}{n_2}}, \quad (10.37)$$

де n_1 і n_2 – обсяги порівнюваних вибірок.

Тут число ступенів свободи визначається виразом $\nu = n_1 + n_2 - 2$.

Індексами при **НІР** і t записують показники рівня значущості (10, 5 і 1 %–й), тобто — 10 %–му рівню значущості відповідає 90 %–й, 5 %–му рівню — 95 %–й рівень імовірності, 1 %–му — 99 %–й.

Різниці між середніми, які більше **НІР**₀₅ вважаються істотними з 5 %–м рівнем значущості. У цьому разі дані в таблицях позначаються однією зірочкою (*); більше **НІР**₀₁, тобто з істотними 1 %–м рівнем значущості, позначаються двома зірочками (**). Іноді застосовується й три зірочки (***) для позначення 0.1 % рівня. Значення показників записується під таблицею [34].

На наш погляд ця вимога застаріла, так як разом із величиною **НІР** визначається і її значущість чи середньоквадратична похибка, а за сучасними нормами [5, 36, 20] його величину слід записувати разом із похибкою аналогічно запису середньої (див. с. 68), чи з представленням p –рівня значущості (див. с. 504), причому саме такі дані отримуються при застосуванні ППП **Statistica**.

Слід мати на увазі, що **НІР** може визначатися виходячи з результатів будь якого дисперсійного комплексу.

Визначення **НІР** для однофакторного експерименту за формулами (7.32) та (10.35)–(10.37), виконане на основі ДА, отриманих як розрахунком, так і за допомогою програми **Excel**, наведено в табл. 10.3, с. 567). Визначення **НІР** при застосуванні ППП **Statistica** викладено у підрозділі **10.4.3 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**, результат подано в табл. 10.12 на с. 581.

Визначення **НІР** для двофакторного експерименту з повторностями на основі програми **Excel** із подальшим використанням розрахункових формул (7.32) та (10.35)–(10.37) наведено в табл. 10.27, с. 600; чи поєднання застосування ПА **Excel** з ППП **Statistica** в табл. 10.33, с. 606 і табл. 10.61 на с. 630 (трифакторного ДА).

Більш зручний спосіб розрахункового визначення, наведений у [39]. При цьому визначають внутрішньогрупові квадрати вибірки (для ілюстрації взято рис. 10.11 на с. 580, додавши стовбець **Q1:Q10** для даних розрахунку **НІР**, та заповнивши у чарунки **I12**, **L12** і **O12**, відповідно, повторність досліду, рівень значущості та критичний критерій Стюдента. Далі застосовуються формули, які при визначенні **НІР** для фактору, наприклад, **Добрива**, взаємодій **Фон×Добрива** і **Фон×Строк×Добрива** (10.38), відповідно мають вигляд

$$\text{НІР}_д = t_{\tau} \sqrt{\frac{2s^2}{l_{\phi} l_c n}}; \quad \text{НІР}_{\phi \times д} = t_{\tau} \sqrt{\frac{2s^2}{l_c n}}; \quad \text{НІР}_{\phi \times c \times д} = t_{\tau} \sqrt{\frac{2s^2}{n}}. \quad (10.38)$$

Розрахунок **НІР** при порівнянні двох вибірок поданий у табл. 10.1, але його зручніше виконувати, використовуючи дані розрахунків аналізу за критерієм Фішера (підрозділ **10.3 Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПА Microsoft Excel**, табл. 10.2, с. 565).

Таблиця 10.67. Розрахунок $НІР$ при багатofакторному аналізі

	I	J	K	L	Q
1	Ефект	Кількість значень I, шт.	Взято з розрахунку	Сума квадратів	$НІР_{05}$
2	Міжгрупова варіація			2318333,49	
3	Загальна варіація			2382616,74	
4	Фон	12	2458,76	29505,09	6,079
5	Строк	8	133157,95	1065263,58	4,964
6	Добрива	6	164442,85	986657,11	4,299
7	Фон x Строк	4	277533,48	15365,25	17,195
8	Фон x Добрива	3	341004,55	6851,45	14,891
9	Строк x Добрива	2	1130918,31	209915,92	12,159
10	Фон x Строк x Добрива	1		4775,08	42,119
11	Залишок (похибка)			64283,25	
12	Повторність дослідів	4		0,05	1,99346
13	Дисперсійний аналіз - Загальний				
14	Источник вариации	SS	df	MS	
15	Между группами	2318333,49	23	100797,11	
16	Внутри групп	64283,25	72	892,82	
17	Итого	2382616,74	95		

$J12 = \text{СЧЁТ}(D2:G2)$
 $Q12 = \text{СТЫОДРАСПОБР}(L12;K16)$
 $Q4 = Q12 * (2 * L16 / (J5 * J6 * J12))^{0,5}$
 $Q5 = Q12 * (2 * V16 / (J4 * J6 * J11))^{0,5}$
 $Q6 = Q12 * (2 * L16 / (J4 * J5 * J11))^{0,5}$
 $Q7 = Q12 * (2 * L16 / (J6 * J12))^{0,5}$
 $Q8 = Q12 * (2 * L16 / (J5 * J12))^{0,5}$
 $Q9 = Q12 * (2 * L16 / (J4 * J12))^{0,5}$
 $Q10 = Q12 * (2 * L16 / (J12))^{0,5}$

Процес розрахунку ілюстровано (табл. 10.68).

У табл. 10.68 критичне значення критерію t_t розраховане з застосуванням статистична функція **СТЫОДЕНТ.ОБР.2X** пакету **Excel** (див. с. 61).

Таблиця 10.68. Розрахунок $НІР_{05}$ на основі табл. 10.2

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
67	Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
68	Колекція-2004	101	2675.55885	26.4906817	22.96512537		
69	Колекція-2005	140	5076.27178	36.2590841	44.37253327		
70	Дисперсионный анализ						
71	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
72	Между группами	5598.600207	1	5598.60021	158.0835147	3.646E-28	3.88066105
73	Внутри групп	8464.294662	239	35.4154588			
74	Итого	14062.89487	240				
75	Визначення найменшої істотної різниці						
76	Різниця вибірових середніх d			9.76840246	=AW69-AW68		
77	t критичне двустороннє t ₀₅ (239)				1.969939	=СТЫОДРАСПОБР(0.05;AU73)	
78	НІР ₀₅			1.56049921	=AW77*(AV73/AT68+AV73/AT69)^0.5		

10.9.2.2. Визначення $НІР$ Фішера застосуванням ППП Statistica

Отримані значень $НІР$ Фішера для даних двофакторного експерименту з повторністю при використанні ППП **Statistica** продано в табл. 10.60, с. 629.

Так як ППП **Statistica** не визначає саму величину $НІР$, а лише значущість та довірчі межі різниці, як це ілюстровано в табл. 10.12 на с. 581, 10.13 а) на с. 582, 10.20 на с. 591), 10.31 на с. 604), 10.43 на с. 613), 10.60 на с. 629), розглянемо його отримання спеціально для дослідників, які звикли обов'язково мати цифрове значення цієї величини.

Як видно, спосіб ДА, описаний у підрозділі **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica**, більш зручний для багатфакторних експериментів, до того ж за його результатами можна досить легко визначити саму величину НІР.

Для цього табл. 10.28 і 10.31 (с. 602–604) вставляємо в лист **Excel**, як це подано у табл. 10.69.

До вставлених табл. 10.31 з правого боку додаються колонки для занесень значень **НІР**. Подальший його розрахунок наведений формулами на полі табл. 10.69.

Слід *завжди контролювати взаємне розташування факторів при їх поєднаннях* відстежуючи їх розміщення за кроком (**11**) на рис. 10.9 (с. 601), чи краще за таблицями статистичних характеристика даних (табл. 10.29, с. 602), особливо це важливо при ДА багатфакторних експериментів.

Нами пропонується використовувати більш компактне представлення різниць середніх. Воно проілюстровано даними парної взаємодії представлених у табл. 10.69, поданням у вигляді табл. 10.70, тобто, сформованою аналогічно табл. 10.60, с. 629.

Тут з табл. 10.69 використані дані стовпця різниць середніх парної взаємодії і наведена розрахована величина **НІР**. Величина, представлена в її чарунці є різницею середніх відповідного стовпця і рядка. Різниці середніх, які перевищують **НІР** є статистично значущими, отже виділені червоним.

Такі таблиці вміщують частіше у додатках.

Слід зауважити, що в разі наявності *пропущених даних* чи *нерівній кількості* повторень призводить до *непостійності значень НІР*, отриманих із застосуванням ППП **Statistica** у той час як розрахунки **НІР** за формулами (7.32) та (10.35)–(10.37) при поєднанні застосування **Excel** і **Statistica** (у цьому випадку ДА засобами **Excel** неможливий) в табл. 10.33, с. 606 і табл. 10.61, с. 630 це не відмічається — *значення постійні*.

При текстовому представленні **НІР** за наведеними у табл. 10.69 результатами можна подавати як порівняння групових середніх арифметичних вживаючи запис виду $\bar{d} \pm s_{\bar{d}}$ з наведенням рівня значущості p , наприклад для рядка **21**: різниця результатів при поєднанні контрольних варіантів та режимів a_1 і b_1 факторів **A** і **B** становить 33.7 зі стандартним відхиленням ± 2.72 при рівні значущості $p = 0.0000001$. При поданні їх як результатів вимірювання можна наводити: ... становить 33.7 з **НІР**_{.05} = 5.72, чи ... лежить у межах від 24.06 до 35.49 (тут рівень статистичної значущості α чи довірчій ймовірності $P = 1 - \alpha$ не вказується, так як вони при ДА прийняті раніше).

Для оцінки різниці між груповими середніми дисперсійного комплексу також застосовують спеціальні методи, створені на базі критеріїв Стюдента і Фішера. З них найбільш підходящими вважають методи множинних порівнянь, розроблені Дж. Тьюкі (1949) і Г. Шеффе (1953) [15].

Таблиця 10.69. Розрахунок НІР застосуванням ППП Statistica

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Джерело варіювання		Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F_{ϕ}	Рівень значущості p	Сила впливу фактора h^2	Ступінь впливу фактора h
2		Вільний член		31820.88	1	31820.88	2149.273	0.000000		
3		Фактор A		2141.37	1	2141.37	144.634	0.000000	0.562	0.750
4		Фактор B		813.25	2	406.62	27.465	0.000003	0.214	0.462
5		Фактор A*Фактор B		586.83	2	293.42	19.818	0.000028	0.154	0.393
6		Залишок (похибка)		266.50	18	14.81			0.070	0.265
7										
8		Фактор A		Різниця середніх d	Стандартна похибка різниці s_d	Рівень значущості p	-95 % довірчої межі різниці	+95 % довірчої межі різниці	Найменша істотна різниця HIP_{05}	
9		a0	a1	-18.9	1.57	4.871E-10	-22.19	-15.59	3.30	
10										
11		Фактор B		Різниця середніх d	Стандартна похибка різниці s_d	Рівень значущості p	-95 % довірчої межі різниці	+95 % довірчої межі різниці	Найменша істотна різниця HIP_{05}	
12		b0	b1	-8.9	1.92	0.000213	-12.93	-4.85	4.04	
13		b0	b2	-14.1	1.92	0.000001	-18.14	-10.06	4.04	
14		b2	b2	-5.2	1.92	0.014363	-9.25	-1.17	4.04	
15										
16		Парна взаємодія факторів A і B		Різниця середніх d	Стандартна похибка різниці s_d	Рівень значущості p	-95 % довірчої межі різниці	+95 % довірчої межі різниці	Найменша істотна різниця HIP_{05}	
17		a0 × b0	a0 × b1	-3.9	2.72	0.166311	-9.64	1.79	5.72	
18		a0 × b0	a0 × b2	-2.1	2.72	0.460918	-7.77	3.67	5.72	
19		a0 × b0	a1 × b0	-7.6	2.72	0.012489	-13.27	-1.83	5.72	
20		a0 × b0	a1 × b1	-21.4	2.72	0.000000	-27.12	-15.68	5.72	
21		a0 × b0	a1 × b2	-33.7	2.72	0.000000	-39.42	-27.98	5.72	
22		a0 × b1	a0 × b2	1.9	2.72	0.499524	-3.84	7.59	5.72	
23		a0 × b1	a1 × b0	-3.6	2.72	0.199374	-9.34	2.09	5.72	
24		a0 × b1	a1 × b1	-17.5	2.72	0.000005	-23.19	-11.76	5.72	
25		a0 × b1	a1 × b2	-29.8	2.72	0.000000	-35.49	-24.06	5.72	
26		a0 × b2	a1 × b0	-5.5	2.72	0.058357	-11.22	0.22	5.72	
27		a0 × b2	a1 × b1	-19.4	2.72	0.000001	-25.07	-13.63	5.72	
28		a0 × b2	a1 × b2	-31.7	2.72	0.000000	-37.37	-25.93	5.72	
29		a1 × b0	a1 × b1	-13.9	2.72	0.000076	-19.57	-8.13	5.72	
30		a1 × b0	a1 × b2	-26.2	2.72	0.000000	-31.87	-20.43	5.72	
31		a1 × b1	a1 × b2	-12.3	2.72	0.000265	-18.02	-6.58	5.72	

$I9=ABS(D9-G9)$
 $I31=ABS(D31-G31)$

Таблиця 10.70 – НІР за критерієм Фішера

Взаємодія факторів	Різниця середніх d					Найменша істотна різниця НІР ₀₅
	a0 × b0	a0 × b1	a0 × b2	a1 × b0	a1 × b1	
a0 × b1	-3.9					5.72
a0 × b2	-2.1	1.9				
a1 × b0	-7.6	-3.6	-5.5			
a1 × b1	-21.4	-17.5	-19.4	-13.9		
a1 × b2	-33.7	-29.8	-31.7	-26.2	-12.3	

10.9.3. Попарне порівняння даних за методом Тьюкі

Спеціальні дослідження показали, що при числі варіантів в досліді більше трьох оцінка відмінностей між середніми за допомогою t -критерію дає перебільшене число істотних різниць. Тому Тьюкі запропонував інший метод порівняння середніх, заснований на зіставленні попарних різниць між ними з величиною [50]

Цей метод застосовується для перевірки нульової гіпотези при порівнянні групових середніх \bar{x}_1 і \bar{x}_2 рівновеликих груп $n_1=n_2=n$. Критерієм оцінки служить відношення різниці порівнюваних середніх до її похибки [15]

$$t_Q = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s_z} \sqrt{n}. \quad (10.39)$$

Величину t_Q порівнюють з критичною точкою Q_T для відповідного рівня значимості α з урахуванням числа ступенів свободи залишкової дисперсії v_z таблиці дисперсійного аналізу і числа n варіантів в досліді. Критичні значення Q_T містяться в табл. Е.31. Величина Q залежить від

Нульову гіпотезу відкидають, якщо $t_Q \geq Q_T$ чи $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| \geq s_d Q_T$.

Зрозуміло, що перевірку тестом Тьюкі розрахунковим методом, ґрунтуючись на даних уже проведеного ДА проводити недоцільно. Виконання тесту Тьюкі за допомогою ППП **Statistica** подано в табл. 10.13 б) на с. 582 (підрозділ **10.4.3.2.1 Використання опції Однофакторний дисперсійний аналіз**).

10.9.4. Основи розрахунку за тестом Шеффе

Для більш суворої оцінки відмінностей між середніми використовується універсальний тест Шеффе, при якому вимога статистичної достовірності F -критерію не є обов'язковою. Він також не настільки чутливий до порушення нормальності розподілів, тому часто використовується на практиці.

Цей метод множинних порівнянь однаково застосуємо і до одно-, і до нерівновеликих за складом груп. Критерієм достовірності відмінностей, що спостерігаються між груповими середніми дисперсійного комплексу, слугують відношення (10.40) при $n_1 = n_2$ і $n_1 \neq n_2$ (10.41) [15]

$$t_{sh} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s_z} \cdot \sqrt{\frac{n}{2}}; \quad (10.40)$$

$$t_{sh} = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s_z} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}. \quad (10.41)$$

При оцінці відмінностей за Шеффе (t_{sh}) використовується та ж сама формула (10.34) множинного t -критерію. Однак, достовірність відмінності між середніми оцінюється інакше. Отримане значення t_{sh} порівнюється з критичним t_{sh_T} , яке, в свою чергу, знаходиться на основі критичних значень F -критерію [135]

$$t_{sh_T} = \sqrt{F_T \cdot (k - 1)}, \quad (10.42)$$

де k – кількість порівнюваних груп (порівнюються дві групи $k=2$).

Нульову гіпотезу відкидають, якщо $t_{sh} \geq t_{sh_T}$. Значення t_{sh_T} визначають за допомогою табл. В.7–1060 чи за відповідною статистичною функцією **MS Excel** для прийнятого рівня значущості α і чисел ступенів свободи $v_1 = k - 1$ і $v_2 = N - k$, де N – обсяг дисперсійного комплексу [15].

Обмеження на застосування методу Шеффе: дисперсії в порівнюваних вибірках, що відповідають рівням фактору, не повинні статистично достовірно розрізнятися. Для перевірки однорідності дисперсії застосовується критерій Левена [123].

При розрахунку за тестом Шеффе при порівнянні груп 1 і 2 величина t_{sh} буде дорівнювати t_F , тобто маємо $t_F > t_{sh_T}$. Таким чином за тестом Шеффе різниця між вибірками статистично значуща з імовірністю 95 %, таким чином існує істотна відмінність між колекцією й сортом-стандартом [135].

Також запропоновано оцінку критерію Шеффе за виразом $t^2 > 2F$ [137].

Метод оцінки парних відмінностей між середніми за захищеним t -критерієм більш ліберальний порівняно з методом Шеффе [135].

Ясно, що перевірку тестом Шеффе розрахунковим методом, ґрунтуючись на даних уже проведеного ДА проводити недоцільно. Виконання цього тесту за допомогою ППП **Statistica** подано в табл. 10.13, б) на с. 582 (підрозділ **10.4.3.2.1 Використання опції Однофакторный дисперсионный анализ**).

Отримання апостеріорних критеріїв Шеффе за допомогою ППП **Statistica** проілюстровано у підрозділі **10.4.3.2.1 Використання опції Однофакторный дисперсионный анализ**, а саме відповідно в табл. 10.12, в) на с. 581 і 10.13, г) на с. 582.

Метод Шеффе вигідно відрізняється від методу Тьюкі, оскільки останній не застосуємо до оцінки групових середніх дисперсійного комплексу, обчислених на різних обсягах груп. Однак при порівнянні середніх \bar{x}_1 і \bar{x}_2 рівновеликих груп перевагу слід віддавати методу Тьюкі [15].

10.10. ОЦІНКА СИЛИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

10.10.1. Оцінка сили впливу факторів за методом Снедекора

Метод, запропонований Дж. У. Снедекором, ґрунтується на використанні дисперсій [15]. Показник сили впливу h_x^2 визначають за виразом

$$h_v^2 = \frac{s_v^2 - s_z^2}{s_v^2 + (n-1)s_z^2}, \quad (10.43)$$

де s_v^2, s_z^2 – відповідно, дисперсія варіантів (міжгрупова) і дисперсія залишку (внутрішньогрупова);
 n – число дослідів.

Статистичну значущість оцінки сили впливу фактору встановлюють за допомогою критерію Фішера як у звичайному ДА [15].

Маючи отримане раніше (табл. 10.71) значення дисперсій, за формулою (10.43) в чарунці **AT95** розраховуються h_x^2 — показник сили впливу, так як розрахунковий критерій Фішера вже визначено (чарунка **AY87**).

За результатами в 57.05 % від загального варіювання кількості гілок на рослині залежить від висоти штамбу. Так як $F > F_T$ (135.131695 проти 3.888374535) нульова гіпотеза спростовується на прийнятому 0.05 рівні значущості, тобто статистична значущість висновків підтверджується.

10.10.2. Метод Плохінського оцінки сили впливу факторів

Після того як установлена статистично значуща дія варійованого фактору, можна визначити *силу його впливу на результативну ознаку*. Її визначають як частку міжгрупової варіації в загальному варіюванні результативної ознаки. Для визначення сили впливу запропоновано ряд методів. Метод М. О. Плохінського базується на рівності девідат $D_Y = D_V + D_Z$ [15, 60].

Показник сили впливу, що позначається символом h_x^2 , визначають

$$\eta_x^2 = \frac{D_x}{D_z}. \quad (10.44)$$

Критерієм статистичної значущості цього показника служить відношення показника сили впливу h_x^2 до своєї похибки $S_{h_x^2}$ репрезентативності вибіркового показника ступеня впливу визначається за формулою [60]

$$s_{h_x}^2 = (1 - h_x^2) \frac{k - 1}{N - k}, \quad (10.45)$$

де k – кількість градацій регульованого чинника;
 N – обсяг дисперсійного комплексу.

Таким чином це дає змогу наводити отримані результати відповідно вимог останнього часу — з їх абсолютними похибками, представленими виразом $\pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{\eta^2}$. Тут критерій Стюдента визначається для прийнятого довірчого рівня значущості α і ступеня вільності $v = n - m$.

Далі використовуючи результати (10.44) і (10.45) за критерієм Фішера (10.46) оцінюється достовірність сили впливу [60]

$$F_{\Phi} = \frac{h_x^2}{s_{h_x}^2}. \quad (10.46)$$

Нульову гіпотезу відкидають якщо $F \geq F_T$ для прийнятого рівня значущості α і чисел ступенів вільності $v_1 = k - 1$ (знаходиться у верхньому рядку таблиць) і $v_2 = N - k$ (знаходиться в першій колонці таблиць) [15].

При застосуванні методу Плохінського для визначення сили впливу факторів, наприклад, впливу висоти штамбу на кількість гілок за числовими даними 2004 р., (колонки **R** і **S** табл. 2.11, с. 96), спочатку виконується **Однофакторный дисперсионный анализ** (див. підрозділ **10.3 Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента «Дисперсионный анализ» ПА Microsoft Excel**, рис. 10.1), отримана таблиця результатів редагується до відповідного вигляду, поданого на с. 565. Редагована табл. 10.71, представлена в чарунках **AS82:AY89**.

Таблиця 10.71. Результати визначення сили впливу факторів методами Плохінського і Снедекора

	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
81	Однофакторный дисперсионный анализ, 2004 р.						
82	Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
83	Висота штамбу, см	101	1459.528448	14.45077672	35.73726458		
84	Кількість гілок, шт.	101	742.7676563	7.35413521	1.904492092		
85	Дисперсионный анализ						
86	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
87	Между группами	2543.297193	1	2543.297193	135.1316951	3.3607E-24	3.888374535
88	Внутри групп	3764.175667	200	18.82087834			
89	Итого	6307.47286	201				
90	Метод Плохінського						
91	Показник сили впливу h^2			0.403319681	AV91=AT87/AT89		
92	Помилка сили впливу s_{h^2}		0.006028084	AU=(1-AV91)*AU87/(AT83-AU87-1)			
93	Розрахунковий критерій Фішера F_p			66.89018909	AV93=AV91/AU92		
94	Метод Снедекора						
95	Показник сили впливу h^2	0.570453486	AT95=(AV87-AV88)/(AV87+(AT83-1)*AV88)				

Далі використовуючи одержані значення девідат за формулами (10.44) і (10.45) визначаються h_x^2 — показник сили впливу, його похибка $s_{h_x^2}$ й розрахунковий критерій Фішера (чарунки **AS90:AY93**).

За результатами більше як 40.33 % від загального варіювання кількості гілок на рослині залежить від висоти штамбу. Так як $F > F_T$ (66.8902 проти 3.888374535) нульова гіпотеза спростовується на прийнятому 0.05 рівні значущості, тобто статистична значущість висновків підтверджується.

Метод Плохінського дозволяє визначити ступінь впливу у загальній дисперсії ознаки, яку приймають рівній одиниці. Відношення внутрішньогрупової дисперсії до загальної суми квадратів показує *частку загальної дисперсії*, обумовленої впливом фактору і чим вище вплив фактору.

Для оцінки *сили впливу* η^2 і *ступеня впливу* η фактору використовуються відповідно формули [6, 138].

$$\eta_{ф.п.п}^2 = SS_{ф.п.п} / SS_{\Sigma} \quad \text{і} \quad \eta_{ф.п.п} = \sqrt{SS_{ф.п.п} / SS_{\Sigma}}, \quad (10.47)$$

де $SS_{ф.п.п}$ — квадрат відповідного фактору, поєднання та похибки;
 SS_{Σ} — загальна сума квадратів.

Відповідно до (10.2) і (10.7) повинна виконуватися умова $\sum \eta_{ф.п.п}^2 = 1$.

Так як результати, знайдені за методами Плохінського й Снедекора не однакові, тому завжди слід указувати, який із методів було застосовано [15].

Безумовно, розрахункові методи ДА ніхто використовувати не буде, наведені вони лише для ознайомлення. Порівнюючи застосування **Excel** і **Statistica**, бачимо, що другий менш трудомісткий, особливо при підготовці таблиць вихідних даних і розрахунку **НІР**, та більш інформативний, у тому числі автоматизовує розрахунок **НІР** із його оцінкою, може застосовуватися для аналізу три— і більше факторних експериментів, обробляє вибірок дво— і більше факторних експериментів із пропущеними даними.

10.10.3. Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі

Хоч показник сили впливу η^2 факторів, знайдений за методом Плохінського, характеризується суттєвим зміщенням оцінки [15], проте, ступінь впливу фактору η представляє собою *кореляційне відношення*, яке характеризує тісноту зв'язку результуючої ознаки з фактором і змінюється від 0 до 1, а η^2 — *індекс детермінації* при оцінці криволінійної кореляції [34] (див. підрозділ **9.7.2 Оцінка елементів криволінійного кореляційного зв'язку**).

Він відображає вплив фактору на дисперсію залежної змінної, чим сильніше цей вплив, тим ближче $\eta^2_{ф.п.п}$ до одиниці.

Похибка s_{η^2} репрезентативності вибіркового показника ступеня впливу визначається за формулою (10.45), а оцінка достовірності впливу виконується за критерієм Фішера (10.46).

Узгодження $\eta^2_{\text{мод}}$ дисперсійної моделі з експериментальними даними характеризує *роботоздатність моделі*, тобто показує не скільки дана закономірність описує досліджуване явище. Воно визначається відношенням суми квадратів факторів і поєднань (без похибки) до загальної суми квадратів [135]

$$\eta^2_{\text{мод}} = \sum SS_{ф.п} / SS_{\Sigma}. \quad (10.48)$$

Ілюстрація визначення сили впливу η^2 і ступеня впливу фактору η на основі табл. 10.39, с. 610 (одержаної за допомогою **MS Excel**), наведені відповідно в табл. 10.72 та в табл. 10.73, основою якої є табл. 10.58 на с. 627, одержана ППП **Statistica** (відмічено жовтим кольором).

При текстовому і табличному представленні результат визначення сили впливу записується разом з абсолютною похибкою $\eta^2 \pm t_{\alpha(v)} \cdot s_{\eta^2}$ з наведенням довірчого рівня значущості α (див. табл. 10.71).

Ступінь впливу фактору η^2 кінцево записуються (здебільше у %) під таблицею результатів ДА [6], беручи до уваги *лише статистично значущі* показники (див. табл. 10.74, пов'язану з табл. 10.73). Також рекомендується представляти силу впливу η^2 факторів круговими діаграмами, створюваними в **MS Excel** [139] (див. підрозділ **15.4.2 Графічне представлення результатів дисперсійного аналізу** та рис. 15.8 на с. 964).

Таблиця 10.72. Визначення сили η^2 і ступеня η та оцінки ω^2 впливу двох факторів і їх поєднань.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	Ступінь впливу η^2	Сила впливу η	Оцінка ω^2
2	Фон	10706.85	1	10706.85	174.346	1.018E-24	3.924330	0.433	0.658	0.432
3	Рік	4066.238	2	2033.119	33.1065	4.611E-12	3.075853	0.165	0.406	0.160
4	Взаимодействие	2934.154	2	1467.077	23.8893	2.163E-09	3.075853	0.119	0.345	0.114
5	Внутри	7000.908	114	61.41147				0.283	0.532	
6	Итого	24708.15	119			Узгодження моделі		0.717		

H2=B2/\$B\$6

H6=СУММ(B2:B4)/B6

I2=H2^0.5

J2=(B2-C2*\$D\$5)/(\$B\$6-\$D\$5)

H5=B5/\$B\$6

I5=H5^0.5

J4=(B4-C4*\$D\$5)/(\$B\$6-\$D\$5)

Таблиця 10.73. Визначення сили η^2 і ступеня η та оцінки ω^2 впливу трьох факторів і їх поєднань.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Джерело варіації	Сума квадратів <i>SS</i>	Число ступенів вільності <i>df</i>	Середній квадрат <i>MS</i>	Критерій Фішера <i>F</i> _ф	Табличний критерій Фішера <i>F</i> _т	Рівень значущості <i>p</i>	Сила впливу η^2	Ступінь впливу η	Оцінка ω^2
2	Загальна варіація	2382616.74	95	25080.18	28.091	1.45	1.171E-34			
3	Вільний член	5954586	1	5954586	6669.392	3.97	1.007E-72			
4	Фон	29505	1	29505	33.047	3.97	2.019E-07	0.012	0.111	0.012
5	Строк	1065264	2	532632	596.570	3.12	1.538E-45	0.447	0.669	0.446
6	Добрива	986657	3	328886	368.366	2.73	1.369E-43	0.414	0.644	0.413
7	Фон × Строк	15365	2	7683	8.605	3.12	0.000	0.006	0.080	0.006
8	Фон × Добрива	6851	3	2284	2.558	2.73	0.062	0.003	0.054	0.002
9	Строк × Добрива	209916	6	34986	39.186	2.23	8.775E-21	0.088	0.297	0.086
10	Фон × Строк × Добрива	4775	6	796	0.891	2.23	0.506	0.002	0.045	2.44E-04
11	Похибка	64283	72	893				0.027	0.164	
12	B2=СУММ(B4:B11)		C2=СУММ(C4:C11)		α= 0.05		t _т = 1.9935		H4=B4/\$B\$2	
13	D3=B2/C2		E3=D2/D11		Роботоздатність моделі		0.973		I4=H4^0.5	
F3=ФРАСПОБР(E12;C2;C11) G3=ФРАСП(E2;C2;C11) G12=СТЮДРАСПОБР(E12;C11)										
J4=(B4-C4*\$D\$11)/(\$B\$2-\$D\$11) G13=СУММ(B4:B6;B9)/СУММ(B4:B6;B9;B11)										

Слід зауважити, що у разі визначення сили впливу факторів та поєднань і оцінки роботоздатності дисперсійної моделі з повторними вимірами (див. табл. 10.43 на с. 613) виконується оцінка зазначених показників для верхньої частини таблиці і при необхідності за даними нижньої таблиці оцінюються сили впливу повторного вимірювання та його парні поєднання з факторами.

Таблиця 10.74. Значення сили впливу

	A	B
15	Джерело варіації	Сила впливу, %
16	Організовані фактори	96.2
17	- з них одинарні	87.4
18	Фон	1.2
19	Строк	44.7
20	Добрива	41.4
21	- з них поєднання	8.8
22	Фон × Строк	*=100*H47
23	Фон × Добрива	*=100*H48
24	Строк × Добрива	8.8
25	Фон × Строк × Добрива	*=100*H50
26	Похибка	2.7
27	Роботоздатність моделі	0.973
B16=(1-H4)*C3/(\$C\$2+1-C3)		
B17=СУММ(B18:B20)		B19=100*H5
B20=100*H6		B18=100*H4
B22=100*H7		B26=100*H11
B21=СУММ(B22:B25)		
B27=(B57+B61)/(B57+B61+B66)		

10.10.4. Використання статистики ω^2 (омега квадрат)

Показник ступеня впливу η^2 , як показують спеціальні розрахунки, часто переоцінюються. Більш точною оцінкою є статистика ω^2 (омега квадрат)

$$\omega^2 = \frac{SS_{\text{ф.п.п}} - v_{\text{ф.п.п}} \cdot MS_{\text{пох}}}{SS_{\Sigma} - MS_{\text{пох}}}, \quad (10.49)$$

де $MS_{\text{пох}}$ – середній квадрат похибки;
 $\nu_{\text{ф.п.п}}$ – ступінь вільності відповідного фактору, поєднання чи похибки.

Ілюстрація визначення статистики ω^2 виконуються за формулами, наведені відповідно на полі табл. 10.72 на с. 648 і 10.73 на с. 649. З їх результатів видно, що величина статистики ω^2 менше ступеня впливу η^2 [135].

10.11. НЕПАРАМЕТРИЧНІ РАНГОВІ ВИДИ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ

10.11.1. Дисперсійний аналіз χ^2 -Фрідмана

10.11.1.1. Розрахунковий метод ДА χ^2 -Фрідмана

Непараметричний ДА Фрідмана (*Friedman ANOVA*) використовується для зв'язаних вибірок не лише у тому випадку, коли закон розподілу досліджуваних вибірок не є нормальним, а й коли вибірки не мають статистично рівні дисперсії і між незалежними ознаками наявна сильна лінійна кореляція.

У ході аналізу перевіряється гіпотеза про те, що зазначені ознаки отримані з однієї і тієї ж генеральної сукупності або з різних генеральних сукупностей з рівними медіанами.

При цьому випадкові величини взаємно незалежними, дані кожної вибірки повинні бути розподілені по одному закону розподілу, проте, закон розподілу кожної вибірки може відрізнятися від закону розподілу інших.

Нульова гіпотеза представляється як $H_0: \bar{x}_1 = \bar{x}_2 = \dots = \bar{x}_i = \bar{x}_n$ — середні значення всіх вибірок рівні, тобто ознаки отримані з однієї генеральної сукупності або генеральних сукупностей з рівними медіанами.

Вихідні дані подаються у вигляді таблиці з n рядків, що представляють собою елементи вибірки, що позначаються i і k колонок, в яких представлені вибірки, що позначаються j .

Далі замість значень змінних ставиться їх ранг при ранжируванні по рядах. Для ранжирування використовується функція MS Excel **РАНГ.СР** і розраховується значення критерію

$$\chi_e^2 = \frac{12}{kn(k+1)} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k R_{ij}^2 \right) - 3n(k+1) \quad (10.50)$$

де R_{ij} – відповідні значення рангів.

Якщо емпіричне значення χ_e^2 буде більше критичного, взятого із заданим рівнем значущості і $(k-1)$ ступенем свободи, тобто $\chi_e^2 < \chi_{\alpha(1-k)}^2$ гіпотеза про відмінність між партіями відхиляється. При малих значеннях k і n це дає

занадто грубе наближення і може призвести до прийняття невірної рішення. Тому критерій $\chi^2_{\alpha(1-k)}$ застосовується в тому випадку, коли виконуються наступні умови: $k=3$ і $n>9$ або $k>4$ і $n>4$. або $k>4$, $n>9$. Якщо умови $k=3$, $n<10$ чи $k=4$, $n<5$ не виконуються, то перевірка здійснюється за таблицями критичних значень χ^2 –Фрідмана [123] (див. Додаток И) [5, 25, 79].

Для прикладу розглянемо дані вологості метрового шару ґрунту для 10 замірів ($k=10$), визначені в кінці вегетації при трьох ($n=3$) різних поверхневих обробках (табл. 10.75).

Таблиця 10.75. Виконання непараметричного ДА Фрідмана

	A	B	C	D	E	F	G
1	Глибина	Фактичне значення			Ранг		
2		Дискування	Чизелювання	Оранка	Дискування	Чизелювання	Оранка
3	10	11.944	12.058	12.796	3	2	1
4	20	11.549	12.009	12.855	3	2	1
5	30	15.809	12.242	12.860	1	3	2
6	40	12.501	11.853	12.809	2	3	1
7	50	12.087	11.655	12.547	2	3	1
8	60	11.761	11.927	12.039	3	2	1
9	70	9.928	11.635	11.910	3	2	1
10	80	11.565	11.450	12.657	2	3	1
11	90	11.878	11.771	12.953	2	3	1
12	100	12.082	11.996	12.845	2	3	1
13	E3=РАНГ.СР(B3;B3:D3)				Сума	23	26
14				Сума квадратів сум		1326
15	G12=РАНГ.СР(D12;B12:D12)				Кількість елементів (повторення), k		10
16	E13=СУММ(E3:E12)				Кількість вибірок, n		3
17				Значення критерію, χ^2		12.600
18	G13=СУММ(G3:G12)				Рівень значущості, α		0.05
19				Критичне значення χ_{α}^2		5.991
20	G14=СУММКВ(E13;F13;G13)				Фактичний рівень значущості p		0.00184

G15=ЧСТРОК(E3:E12)

G16=ЧИСЛСТОЛБ(E3:G3)

G17=12*G14/(G15*G16*(1+G16))-3*G15*(1+G16)

G20=ХИ2.РАСП.ПХ(G17;G16-1)

G19=ХИ2.ОБР.ПХ(G18;G16-1)

Таким чином вибірки є залежними. Критерій Шапіро–Уїлка навіть при їх об'єднанні в одну сукупність становить $SW-W=0.7831$ з рівнем значущості $p=0.00003$, тобто розподіл статистично відмінний від нормального.

Необхідно з'ясувати, значимо чи впливає зміна основного обробітку ґрунту на вологість його метрового шару. Розрахунки та їх результати наведені на полі табл. 10.75.

Оскільки розрахункове критеріальне значення (12,6) більше критичного (5.991), то нульова гіпотеза відкидається і приймається гіпотеза про наявність значущого впливу погодних умов на результати експерименту з рівнем значущості $p=0.00185$.

Нульова гіпотеза також відхиляється за даними табл. И.11, так як $\chi^2 > S_{05(10, 3)} = 6.1$.

У зв'язку з тим, що таблиці розподілу розглянутого критерію складені для невеликого діапазону значень, широко застосовуються різні апроксимації, найуживаніші з яких наведено у [79].

10.11.1.2. Дисперсійний аналіз Фрідмана за допомогою ППП Statistica

Дисперсійний аналіз Фрідмана за допомогою ППП **Statistica** виконується за вибірками (табл. 10.76), аналогічно наведеному у табл. 10.75.

Таблиця 10.76 – Формування даних за вибірками

	1 Дискування	2 Чизелювання	3 Оранка
0-10 см	11.9	12.1	12.8
10-20 см	11.5	12.0	12.9
20-30 см	15.8	12.2	12.9
30-40 см	12.5	11.9	12.8
40-50 см	12.1	11.7	12.5
50-60 см	11.8	11.9	12.0
60-70 см	9.9	11.6	11.9
70-80 см	11.6	11.4	12.7
80-90 см	11.9	11.8	13.0
90-100 см	12.1	12.0	12.8

Для аналізу на рис. 10.17 в меню **Statistics** / **Аналіз** (1) використаємо модуль **Nonparametrics** /

Непараметрическая статистика (2), де на панелі процедур і установок

Nonparametric Statistics: Диспаналіз / **Непараметрическая статистика: Диспаналіз** виби-

раємо вид аналізу **Comparing multiple dep. samples (variables)** /

Сравнение нескольких зависимых переменных (3), натискаємо **OK** (4). З виниклої панелі

Friedman ANOVA by Ranks: / **Ранговый дисперсионный анализ (ДА) и к**

натиснувши клавішу **Variables:** / **Переменные:** (5) переходимо на панель

Select the variables for the analysis / **Выберите переменные для анализа**, де

задаємо вибірки для проведення аналізу (6) і натиснувши **OK** (7) повертаємося на панель **Friedman ANOVA by Ranks:** / **Ранговый дисперсионный анализ (ДА) и к**.

Тут натиснувши клавішу **Summary: Friedman ANOVA & Kendall's concordance** / **Ранговый ДА и конкордация Кендалла** (8) чи **Summary** / **OK** (8) отримаємо

табл. 10.77 з даними аналізу.




Рис. 10.17. Непараметричний ДА Фрідмана за допомогою ППП Statistica

У таблиці наведена величина похибки p для нульової гіпотези. Ця величина знаходиться в заголовку табл. 10.77. При $p < 0.05$ (як у нашому випадку) можна зробити висновок про наявність статистично значущих відмінностей між групами.

У цьому ж заголовку наводиться так званий коефіцієнт узгодженості Кендалла. Він відображає ступінь зв'язку ознак і розраховується шляхом

усередненням коефіцієнтів кореляції Спірмена (див. підрозділ **9.3.1 Показники непараметричної кореляції**) для кожної пари, які беруть участь в аналізі груп. Чим більше розходження між групами, тим ближче коефіцієнт Кендалла до одиниці [120].

Величини похибки p визначені розрахунковим методом ДА Фрідмана (табл. 10.75, с. 651) і з допомогою **Statistica** (табл. 10.77) співпадають.

Представляючи результати слід навести число об'єктів дослідження для кожної з груп, медіани і квартилі для кожної групи, назва тесту, точне значення p . [5]

Таблиця 10.77. Результати ДА Фрідмана				
Перем.	Ранговий ДА и конкордация Кендалла (Диспаналіз) ДА хи-кв.(N = 10, cc = 2) = 12,60000 p < ,00184 Коефф. конкордации = ,63000 Средн.ранг r = ,58889			
	Средний ранг	Сумма рангов	Среднее	Ст. откл
Дискування	1,700000	17,00000	12,11040	1,468667
Чизелювання	1,400000	14,00000	11,85960	0,235474
Оранка	2,900000	29,00000	12,62710	0,363454

10.11.2. Дисперсійний H -аналіз Краскала–Уоллеса

10.11.2.1. Основані положення критерію H –Краскала–Уоллеса

Непараметричний дисперсійний аналіз Краскала–Уоллеса (або H -тест) (**Kruskal–Wallis ANOVA**) є непараметричним аналогом однофакторного ДА для незалежних вибірок і дозволяє перевіряти гіпотези про різницю більше двох незв'язаних вибірок за рівнем вираження досліджуваної ознаки. Він і має дещо меншою потужністю в порівнянні з параметричним варіантом.

За ідеєю він подібний до критерію U –Манна–Уїтні. Як і останній, він оцінює ступінь збігу кількох рядів значень вимірної ознаки. Чим менше збігів, тим більше різняться ряди, відповідні порівнюваним вибіркам. Основна ідея критерію H –Краскала–Уоллеса ґрунтується на представленні всіх значень порівнюваних вибірок у вигляді однієї загальної послідовності впорядкованих (ранжируваних) значень, з подальшим обчисленням середнього рангу для кожної з вибірок. Якщо виконується статистична гіпотеза про відсутність відмінностей, то можна очікувати, що всі середні ранги приблизно рівні і близькі до загальної середньої рангу.

Емпіричне значення критерію H –Краскала–Уоллеса обчислюється після ранжирування всіх значень порівнюваних вибірок за формулою:

$$H = \frac{12}{\sum_{i=1}^k n_i \left(\sum_{i=1}^k n_i - 1 \right)} \sum_{i=1}^k \left(\frac{R_i^2}{n_i} \right) - 3 \left(\sum_{i=1}^k n_i - 1 \right), \quad (10.51)$$

де n_i – обсяг i -ої вибірки;
 k – кількість порівнюваних вибірок;
 R_i – сума рангів i -ої вибірки.

Чим сильніше розрізняються вибірки, тим більше розрахований значення H і тим менше p –рівень значимості.

Для визначення p -рівня користуються таблицями критичних значень (табл. И.12). Якщо параметри експерименту виходять за наведені в (табл. И.12), то емпіричне значення критерію порівнюється з χ^2 (табл. В.10) чи визначається статистичною функцією Excel **ХИ2.РАСП.ПХ** (див. Додаток А) для ступеня вільності $k-1$.

При відхиленні нульової статистичної гіпотези про відсутність відмінностей приймається альтернативна гіпотеза про статистично достовірних відмінностях вибірок по досліджуваному ознакою — без конкретизації на-
правленості відмінностей.

Для тверджень про те, що рівень вираження ознаки в якийсь із порівнюваних вибірок вище або нижче, необхідно парне співвідношення вибірок за критерієм U–Манна–Уїтні [123].

10.11.2.2. Розрахунковий метод визначення критерію *H*-Краскала–Уоллеса

Для прикладу визначення критерію ***H***–Краскала–Уоллеса розглянемо приклад [123] (табл. 10.78). Порядок розрахунків, виконаний за формулою (10.51) наведений на її полі.

За отриманим результатом визначається p -рівень значимості. За табл. И.12 для $n_1=8$, $n_2=5$ і $n_3=3$

	A	B	C	D	E	F	G
1		Вибірка 1		Вибірка 2		Вибірка 3	
2		Кількість проявів	Ранг	Кількість проявів	Ранг	Кількість проявів	Ранг
3		3	1	5	3	14	12
4		4	2	9	7	16	14
5		6	4	12	10	17	15
6		7	5	15	13		
7		8	6	19	16		
8		10	8				
9		11	9				
10		13	11				
11	Сумарна чисельність вибірок	16					
12	Середнє квадрата суми рангів	264.5		480.2		560.3	
13	Емпіричний критерій <i>H</i>	6.575					
14	Рівень значущості за χ^2 -квадрат	0.0373					

$C3=РАНГ.РВ(B3;(\$B\$3:\$B\$10;\$D\$3:\$D\$10;\$F\$3:\$F\$10);1)$
 $B11=C4\ddot{E}T(B3:B10;D3:D10;F3:F10)$
 $C12=(СУММ(C3:C10))^2/C4\ddot{E}T(C3:C10)$
 $B13=12*(C12+E12+G12)/(B11*(B11+1))-3*(B11+1)$
 $B14=ХИ2.РАСП.ПХ(B13;C4\ddot{E}T(C12:G12)-1)$

маємо що емпіричне значення H знаходиться між критичними для $p=0.05$ і

$p=0.01$. Отже, $p < 0.05$ — на рівні $\alpha = 0.05$ нульова гіпотеза H_0 відхиляється, таким чином порівнювані вибірки розрізняються статистично достовірно за рівнем вираження ознаки ($p < 0.05$).

З використанням χ^2 критерію маємо $p=0.0373$.

Відзначимо, що на підставі такої перевірки ми не можемо зробити конкретний висновок про направлення відмінностей і про те, в який вибірці ознака приймає більші чи менші значення. Для цього необхідно парне співвідношення вибірок за відповідним критерієм (U –Манна–Уїтні).

10.11.2.3. Визначення критерію H –Краскала–Уоллеса із застосуванням ППП Statistica

При виконанні дисперсійного аналізу Краскала–Уоллеса в ППП **Statistica** необхідно сформувати групуючу і залежну величину двома стовбцями (табл. 10.79), потім в меню **Statistics/Анализ** (1) (рис. 10.17) запустити модуль **Nonparametrics / Непараметрическая статистика** (2), вийти на панелі процедур і установок **Nonparametric Statistics: Диспаналіз / Непараметрическая статистика: Диспаналіз** (рис. 10.16), вибирати вид аналізу **Comparing multiple indep. samples (groups) / Сравнение нескольких независимых групп** (1) і натиснути **OK** (2) (рис. 10.18).

Далі з панелі **Kruskal-Wallis ANOVA and Median Test / ДА Краскала-Уоллиса и медианный тест:** натиснувши клавішу **Variables / Переменные** (3) перейти на панель **Select dep. variables and an indep. (grouping) variable / Выберите группирующую переменную и зависимые переменные** і задати вибірки для проведення аналізу (4) та натиснувши **OK** (5) повернутися на панель **Kruskal-Wallis ANOVA and Median Test / ДА Краскала-Уоллиса и медианный тест:**. Тут натискаємо **Codes / Коды** (6) і на панелі **Select codes for grouping variable / Выберите коды для группирующей пере...** вибираємо всі (7) і натискаємо **OK** (8) для повернення на панель **Kruskal-Wallis ANOVA and Median Test / ДА Краскала-Уоллиса и медианный тест:**.

Натиснувши **Summary: Kruskal-Wallis ANOVA & Median test / ДА Краскала-Уоллиса и медианный тест** (9) чи **Summary / OK** (9) отримаємо табл. 10.80 з даними аналізу і результати так званого медіанного тесту (табл. 10.81).

Таблиця 10.79 Формування даних за вибірками	
Вибірка	Кількість проявів
Вибірка 1	3
Вибірка 1	4
Вибірка 1	6
Вибірка 1	7
Вибірка 1	8
Вибірка 1	10
Вибірка 1	11
Вибірка 1	13
Вибірка 2	5
Вибірка 2	9
Вибірка 2	12
Вибірка 2	15
Вибірка 2	19
Вибірка 3	14
Вибірка 3	16
Вибірка 3	17




Рис. 10.18. Непараметричний ДА Крассела–Уоллеса за допомогою ППП Statistica

Порівнюючи результати табл. 10.78 і 10.80 бачимо повне співпадання результатів. Слід відмітити, що використання ППП Statistica для визначення критерію H –Крассела–Уоллеса незрівнянно зручніше порівняно з розрахунковим методом.

Таблиця 10.80. Результати рангового ДА Краскела–Уоллеса

Зависим.: Кількість явищ	Ранговый ДА Краскела-Уоллиса; Кількість явищ (Таблица данных) Группирующая переменная: Вибірка Кр.Краскела-Уоллиса: $H(2, N=16) = 6,575000$ $p = ,0373$		
	Код	Допуст N	Сумма Ряды
Вибірка 1	102	8	46,00000
Вибірка 2	103	5	49,00000
Вибірка 3	104	3	41,00000

Цей тест перевіряє ту ж нульову гіпотезу, що і **H**-тест Краскела–Уоллеса, проте є менш потужним [120].

Таблиця 10.81. Результати виконання медіанного тесту

Зависимые: Кількість явищ	Медианный тест, общ. медиана = 10,5000; Кількість явищ (Таблица данных) Группирующая переменная: Вибірка Хи-квадрат = 5,200000 $ss = 2$ $p = ,0743$			
	Вибірка 1	Вибірка 2	Вибірка 3	Всего
<= Медиана: наблюд.	6,00000	2,000000	0,00000	8,00000
ожидаемые	4,00000	2,500000	1,50000	
набл.-ожд.	2,00000	-0,500000	-1,50000	
> Медиана: наблюд.	2,00000	3,000000	3,00000	8,00000
ожидаемые	4,00000	2,500000	1,50000	
набл.-ожд.	-2,00000	0,500000	1,50000	
Сумма: наблюд.	8,00000	5,000000	3,00000	16,00000

Узагальнюючи розділ слід сказати, що при текстовому поданні результатів ДА спочатку слід підтвердити дотримання умов застосовності ДА, указати яким чином перевірялися незалежні ознаки на взаємозв'язок і представити отримані результати.

Далі слід навести:

- число об'єктів дослідження;
- описову статистику (\bar{x} і s) для залежної і кожної незалежної ознак;
- узгодження моделі, розраховане за виразом (10.48);
- ступені впливу факторів, визначене згідно виразу (10.47) з указуванням точних значення **p** текстово, або краще у вигляді таблиці.

Навести значення **НІР** досліджуваного показник текстово для факторів впливу (див. с. 641) і таблично для їхніх поєднань (див. табл. 10.70 на с. 642) [5].

11. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ. ПЛАНУВАННЯ І ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

11.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Регресійний аналіз (РА) — статистичний метод дослідження залежності між залежною змінною і однією або декількома незалежними, який дає змогу передбачити, чому в середньому буде дорівнювати значення однієї ознаки при заданому значенні іншої. Його метою є пошук таких комбінацій незалежних ознак, які “краще” (у певному статистичному сенсі з більш високим значенням *коефіцієнта детермінації* R^2 , меншим значенням дисперсії похибок і т.д.), прогнозують значення залежної ознаки.

Регресійний аналіз, як і дискримінантний аналіз, факторний, кластерний та інші, відноситься до методів математичного статистичного моделювання. *Моделлю* в даному випадку є рівняння регресії, параметри (коефіцієнти) якого й розраховуються в ході регресійного аналізу. Вони наводяться рівнянням або системою рівнянь, що пов’язують *функції відгуку*, які також називаються *критеріями оптимізації*, *цільовими функціями*, з незалежними змінними.

Незалежні змінні прийнято називати *факторами*, *факторами впливу*, *регресорами* або *предикторами*, а залежні змінні — *критеріальними*.

Регресійний аналіз тісно пов’язаний з іншими статистичними методами — методами кореляційного й дисперсійного аналізу.

На відміну від ДА, за допомогою якого досліджується залежність кількісної ознаки від однієї або декількох якісних ознак, у РА зазвичай досліджується залежність (кількісної або якісної) ознаки від одної або декількох кількісних ознак. Крім того, ДА є одним з етапів його процедури.

На відміну від КА, який вивчає напрям і силу статистичного зв’язку, РА вивчає вид залежності ознак, тобто параметри функції залежності однієї ознаки від однієї або декількох інших незалежних ознак.

Якщо в результаті КА встановлено тісний зв’язок між показниками, тобто, коли зміна однієї ознаки на відповідну одиницю виміру викликає зміну другої ознаки чітко на визначену величину у всіх об’єктах вибірки, проводять РА, обчислюючи коефіцієнт регресії R_{xyz} . Його результатом є побудова математичної моделі залежності між певними показниками (факторами).

Існують різні види регресійного аналізу — одномірний і багатовимірний, лінійний і нелінійний, параметричний і непараметричний. Розрахунки виконуються методом найменших квадратів.

Цінність регресійного аналізу полягає в тому, що він:

- по-перше, дає інформацію про вплив факторів;
- по-друге, дозволяє кількісно визначити значення функцій відгуку при заданому режимі ведення процесу;
- по-третє, може служити основою для оптимізації.

Математичні моделі, одержані за допомогою методів планування екс-

перименту — вибору плану експерименту, який відповідає поставленим вимогам, прийнято називати **експериментально-статистичними** [140].

Умовами застосовності методу є:

— між кожною з незалежних ознак x і залежною y повинні бути причинно-наслідкові залежності;

— число об'єктів дослідження повинно бути в кілька разів більше числа прогностичних (пояснюючих) ознак, тобто обсяг вибірки повинен бути не менше ніж в 3–5 рази більше кількості факторів (див. Додаток К).

— усі аналізовані ознаки, як незалежні, так і залежна, повинні бути кількісними, тобто бути виміряні в шкалі інтервалів або відношень;

— залежна ознака y повинна мати нормальний розподіл (див. підрозділ

6 Перевірка нормальності статистичного розподілу оцінюваних вибірок). Однак це не жорстка вимога і тут важливо, щоб закон розподілу вибірок не надто відрізнявся від нормального [68].

— повинні бути статистично рівні дисперсії для кожного значення незалежної (прогностичної) ознаки x_i , тобто, всі повторення вимірів повинні належати до одної генеральної сукупності (див. підрозділ **11.9.4 Перевірка відтворюваності результатів**);

— взаємозв'язки між кожною з незалежних ознак x і залежною y в інтервалі досліджуваних значень описується функцією одного показника;

— кожне значення y незалежне від іншого для кожного значення x_i ;

— аналіз асоціацій залежної ознаки з кожною із незалежних виконується шляхом оцінки коефіцієнта парної кореляції. Він повинен бути більшим ніж 0.7, тобто високим за шкалою Чеддока (див. табл. 9.1, с. 492);

— у разі множинного регресійного аналізу необхідна відсутність сильної лінійної взаємної кореляції незалежних ознак (див. підрозділ **9.2.1 Лінійна кореляційна залежність**), які повинні бути не більше ніж 0.8. Якщо будь-які з незалежних ознак **сильно** або **середньо** корельовані між собою (за шкалою Чеддока, див. табл. 9.1, с. 492), то необхідно залишити для регресійного аналізу ті з них, які мають більш сильну кореляцію із залежною ознакою (див. табл. 9.10, с. 507)¹³⁾;

— величина ϵ_i — різниця між фактичним і прогнозованим значенням залежної змінної, є випадкова величина з нормальним розподілом і нульовим математичним сподіванням (див рис. 11.56, с. 744);

— усі значення ϵ_i не корельовані між собою і мають однакову дисперсію s^2 (див рис. 11.65, с. 751) [5].

За фактор оптимізації приймають контрольовану величину об'єкта (виробу, процесу, операції), тобто величину, що характеризує ту чи іншу властивість об'єкта або режим технологічного процесу. Ця величина, числове значення якої вимірюється у відповідних межах зміни, повинна впливати

¹³⁾ Це стосується лише пасивного експерименту, при активному експерименті з використанням матриць планування проведення такого аналізу недоцільне.

на параметр оптимізації.

Розмір інтервалу варіювання ε визначається багатьма факторами, але спрощено можна обмежитися наступним:

- якщо інтервал становить менше 10 % від області визначення, він вважається вузьким;
- якщо не більше 30 % — середнім;
- більше 30 % — широким.

Точність фіксування (визначення) чинників визначається точністю приладів і стабільністю в ході досліджу. Спрощено можна вважати, що якщо похибка становить:

- менше 1 % — висока точність;
- менше 5 % — середня точність;
- більше 10 % — низька точність експерименту [32].

При виконанні досліджень по'язаних з плануванням експерименту перед початком обробки експериментальних даних всі можливі випадкові і систематичні помилки повинні бути виявлені і видалені [141].

Вимоги до факторів оптимізації:

- вони повинні бути керованими чи контрольованими;
- мати якомога більшу точність заміру;
- повинні бути сумісні (всі їх комбінації здійсненні і безпечні);
- повинні бути однозначні;

Параметр оптимізації повинен відповідати наступним вимогам. Він повинен:

- вимірюватися при будь-якій зміні (комбінації) режимів технологічного процесу;
- бути статистично ефективним, тобто вимірюватися з найбільшою точністю;
- бути інформаційним, тобто всебічно характеризувати технологічний процес (операцію);
- мати фізичний зміст, тобто має бути присутня можливість досягнення корисних результатів при відповідних умовах процесу;
- бути однозначним, тобто повинна мінімізуватися або максимізуватися тільки одна цільова функція.

У тих випадках, коли оптимізуватися повинні дві цільові функції, наприклад, P і W , їх можна об'єднати в один параметр оптимізації допомогою лінійної комбінації.

У цьому випадку цільова функція (*функція відгуку*) набуває вигляду

$$Y = \psi_P P + \psi_W W, \quad (11.1)$$

де ψ_P, ψ_W — вагові коефіцієнти [32].

Дослідження виконуються у вигляді *активного експерименту* за планом, що передбачає поєднання декількох одночасно варійованих факторів. В

ході експерименту дослідник має можливість змінювати та/або підтримувати на заданому рівні як завгодно довго значення параметрів, які задають умови проведення експерименту. Активний експеримент називають **планованим**.

Експеримент, в якому реалізуються всі можливі поєднання рівнів факторів, називається **повним факторним експериментом**.

Таким чином, для отримання лінійної моделі з проведенням експерименту на двох рівнях варіювання число точок експерименту становитиме 2^k ; для отримання моделі другого порядку, яка вимагає трьох рівнів варіювання — 3^k , де k – число факторів. Для отримання лінійних моделей зазвичай виконують **повнофакторний експеримент** (ПФЕ).

Для проведення лінійного регресійного аналізу залежна змінна повинна мати інтервальну (або порядкову) шкалу. В той же час, бінарна логістична регресія виявляє залежність дихотомічної змінної від якоїсь іншої змінної, що відноситься до будь-якої шкалою. Якщо залежна змінна є категоріальною, але має більше двох категорій, то тут підходящим методом буде поліноміальний логістична регресія.

Порядкову регресію можна використовувати, коли залежні змінні відносяться до порядкової шкалою. І, звичайно ж, можна аналізувати і нелінійні зв'язки між змінними, які відносяться до інтервальної шкалою. Для цього призначений метод нелінійної регресії.

Простий регресійний аналіз призначений для виявлення взаємозв'язку однієї залежної змінної і однієї незалежної змінної. Аналогом простої регресії є однофакторний ДА за умови, що незалежна змінна буде виміряна в **номінативній шкалі** (*nominal scale*) шкалі.

Слід звернути увагу на зв'язок між моделями регресійного аналізу і тими моделями дисперсійного аналізу, де змінним приписуються фіксовані рівні. При такій постановці завдання дисперсійний аналіз можна розглядати як окремий регресійний, коли область незалежних змінних - кінцеве безліч точок [51].

11.2. ВИБІР ФОРМУЛИ ДЛЯ ОПИСУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

Практично всі зв'язки між змінними досить повно описуються функціями п'яти видів [96]:

1) Лінійною ¹⁴⁾

$$y = a + bx, \quad (11.2)$$

¹⁴⁾ Розраховується у пакеті **Excel** з наведенням рівняння, лінії тренду та коефіцієнту детермінації R^2 .

де y і x – аналізовані ознаки;
 a – вільний член рівняння;
 b – коефіцієнт регресії, що відображає кут нахилу лінії регресії.

2) Степеневою

$$y = ax^{b^{14)}}. \quad (11.3)$$

Степеневою функцією, наприклад визначається залежність потрібної площі кузова автотранспорту від маси тварини [60].

3) Показниковою

$$y = ae^{bx^{14)}}. \quad (11.4)$$

4) Поліноміальною (ПА **Excel** розраховує до $n=6$). Функцією третього порядку описується залежність маси тварин від їх лінійних розмірів

$$y = a + bx + cx^2^{14)} \quad y = a + bx + cx^2 + \dots + dx^n^{14)}. \quad (11.5)$$

5) Гіперболічною функцією, наприклад, відображається зміна швидкості морських безхребтових у залежності від їх розмірів [60], чи зміна швидкості витання від розміру часток (див. с. 697)

$$y = a + bx + \frac{c}{x}. \quad (11.6)$$

Досить часто, зокрема в біології, використовуються зростаюча та спадаюча асимптотична функція [60]

$$y = a - b \cdot e^{-kx} \quad \text{і} \quad y = a(1 - e^{-kx}), \quad (11.7)$$

де a – значення, до якого прямує асимптота;
 b – загальна величина зростання за період спостережень;
 k – константа темпу зміни.

Перша з них описує, наприклад зростання маси тварини з її віком, друга — зменшення маси від тривалості стресової ситуації [60].

Також для опису явищ живого світу використовується спадаюча чи зростаюча логістична функція, яка описує їх зміну у межах двох асимптот (рівняння Ферхюльста) [60]

$$y = \frac{a-d}{1+e^{b+cx}} + d, \quad (11.8)$$

де a і d – відповідно верхня і нижня асимптота;
 b і c – параметри які визначають нахил, згин і точку перегину лінії регресії. При $b > 0$ функція зростаюча, при $b < 0$ — спадаюча.

Зростаюча функція описує, наприклад, зміну загальної кількості птахів з урахуванням повернення птахів з вирію, спадаюча — з їх відльотом.

Деякі біологічні явища, наприклад, зміна популяції характеризуються періодичністю. Таким функціям властиві закономірності, які досить близько виражаються тригонометричними залежностями, зокрема [60]

$$y = a + b \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{x_i}{r}\right) + c \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{x_i}{r}\right), \quad (11.9)$$

де a – вільний член;
 b і c – коефіцієнти;
 r – число вимірів за період циклу;
 x_i – порядковий номер виміру, починаючи з $x_1 = 0$.

Вибір формули, яка описує отриману при дослідженнях закономірність, залежить лише від інтуїції. Єдині вказівки, що дозволяють орієнтуватися у виборі, можуть бути отримані з аналізу кривої, яка представляє y функціональну залежність від x .

Якщо крива мало відрізняється від прямої, крім лінійної функції (11.2) пробують степеневу (11.3) і гіперболічну (11.6).

Якщо зростання або падіння функції $y = f(x)$ пропорційно y , то ми маємо закон складних відсотків, тобто якщо $\frac{dy}{dx} = ky$, тоді застосовується показникові залежність (11.4). У цьому випадку графічне представлення залежності краще подавати у напівлогарифмічних координатах, де вона представляється прямою лінією.

Якщо $\frac{dy}{dx}$ змінюється пропорційно x , то використовують параболічну залежність (11.5).

Якщо $\frac{dy}{dx}$ змінюється як $\frac{x}{y}$, то звертаються до степеневі формули (11.3). Її зображення в логарифмічних координатах дає пряму лінію.

Слід також пробувати такі формули:

$$y = \frac{a+x}{b-x}, \quad y = a^{n+bx}, \quad y = a + b \ln x^{14)}, \quad y = a + bc^x, \quad \ln y = a + bx, \quad \text{тощо.} \quad (11.10)$$

Якщо ж жодна з формул не дає задовільного результату, слід застосувати розкладання в ряд Маклорена за зростаючими ступенями

$$y = a + bx + cx^2 + dx^3 + \dots \quad (11.11)$$

Ця формула не має ніякого фізичного сенсу і представляє лише спосіб обчислення величини y для значенні x у межах досліджуваного інтервалу [42].

Для визначення параметрів функціональних залежностей, відсутніх у пакеті **Excel**, варто виконувати за допомогою ППП **Statistica**.

Модифікація деяких нелінійних функцій лінійною подана в табл. 11.1 [57].

Таблиця 11.1 - Модифікація деяких нелінійних функцій лінійною

Вихідна специфікація	Перетворення $x \rightarrow x^*$	Перетворення $y \rightarrow y^*$	Обчислення b по b^*	Обчислення a по a^*
$y = a + \frac{b}{x}$	$x^* = \frac{1}{x}$	$y^* = y$	$b = b^*$	
$y = \frac{1}{a + bx}$	$x^* = x$	$y^* = \frac{1}{y}$		
$y = \frac{1}{a + be^{-x}}$	$x^* = e^{-x}$			
$y = \frac{x}{a + bx}$	$x^* = \frac{1}{x}$		$b = a^*$	$a = b^*$

11.3. ОЦІНКА ПОПЕРЕДНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ОЦІНКА РІВНЯННЯ ЛІНІЙНОЇ ПАРНОЇ РЕГРЕСІЇ

Досить часто зв'язок між ознаками має лінійний характер, що, як відомо, можна виразити у вигляді рівняння (11.2).

Чим більше коефіцієнт b , який характеризує тангенс кута нахилу лінії регресії до осі OX , відрізняється від нуля, тим сильніше зв'язок між аналізованими ознаками. При $b = 0$ отримуємо $y = a$, тобто a (вільний член рівняння регресії) – це точка, в якій лінія регресії перетинається з віссю OY (цю точку називають також "*у-перетинанням*", або "*Intercept*").

Навіть якщо зв'язок між ознаками носить нелінійний характер (наприклад, експонентний), практично завжди можна виділити ділянки, які добре апроксимуються лінійною регресією (11.2).

Наведене вище рівняння можна використовувати для опису зв'язку між двома чи кількома ознаками лише при виконанні таких умов:

— залежність між ознаками носить лінійний характер;

— обидві ознаки розподілені нормально. Данна вимога може бути застосована лише для неорганізованих вибірок, адже факторна ознака з фіксованим кроком зміни фактора при активному експерименті не відповідатиме нормальному розподілу.

Парна регресія характеризує зв'язок між двома ознаками: факторною та результативною.

Завдання побудови рівняння регресії для однієї факторної і однієї результативної ознаки формулюється так: нехай є набір значень двох змінних — результативної ознаки y_i і факторної ознаки x_i . Між ними існує об'єктивна зв'язок виду $y_i = f(x_i) + \varepsilon_i$. Необхідно за даними спостереження $(y_i, x_i, i = \overline{1, n})$ підібрати функцію $\hat{y}_i = F(x)$, яка найкращим чином описує існуючий зв'язок.

При підборі функції послідовно вирішуються дві задачі:

1. Визначається вид функціональної залежності, тобто проводиться специфікація моделі.

2. Розраховуються значення параметрів рівняння регресії.

У парній регресії вибір виду математичної функції може бути здійснений різними методами:

— аналітичним, виходячи з матеріальної природи зв'язку;

— графічним, на основі лінії емпіричної регресії;

— на основі показників якості рівняння регресії.

Оцінка параметрів рівнянь регресії може бути проведена різними методами. Класичний підхід до оцінювання параметрів ґрунтується на методі найменших квадратів (МНК). При цьому зазвичай наводиться теорема, яка стверджує, що оцінки коефіцієнтів регресії, отримані за методом найменших квадратів, є незміщеними тільки для моделі зі строго фіксованими змінними і фіксованим порядком полінома, тобто для активного експерименту [51].

Рівняння лінії регресії на площині в декартових координатах має вигляд виразу (11.2).

У результаті визначення параметрів a і b рівняння (11.2) методом найменших квадратів отримуються рівняння

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad (11.12)$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n y_i \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^n (x_i y_i) \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2} = \bar{y} - b \cdot \bar{x}. \quad (11.13)$$

У лінійному рівнянні регресії параметр a показує усереднене вплив на результативну ознаку неврахованих факторів. Формально $a = \bar{y}$ у при $x=0$. Інтерпретація параметра a як середнього значення результативної ознаки можливо лише за умови, що серед спостережуваних значень факторної ознаки є значення, рівні або близькі до 0.

Параметр видання b рівнянні лінійної регресії називається коефіцієнтом регресії. Коефіцієнт регресії показує, на скільки в середньому зміниться значення результативної ознаки при збільшенні факторного на одиницю власного виміру.

Для отримання якісного рівняння регресії необхідно щоб дані спостереження відповідали наступним вимогам:

— число спостережень має в 6–7 разів перевищувати число розраховуються параметрів при змінних x . Таким чином, *відшукувати лінійну регресію маючи менше 7 спостережень не має сенсу*;

— розподіл одиниць спостереження за факторною ознакою має бути однорідним і підлягати нормальному закону розподілу.

Перш ніж підбирати відповідну математичну функцію і будувати рівняння регресії, необхідно перевірити якість вихідної інформації, а саме:

1. Виключити з первинної інформації аномальних значень факторної ознаки (див. підрозділ **5.12 Виключення результатів з грубими похибками**).

2. Перевірити розподіл одиниць спостереження за факторною ознакою на відповідність закону нормального розподілу (див. розділ **6 Перевірка нормальності статистичного розподілу оцінюваних вибірок**).

3. Перевірити сукупність на однорідність за факторною ознакою, використовується коефіцієнт варіації (див. підрозділ **1.4.5.5.1 Визначення і оцінювання коефіцієнту варіації**). Умовою однорідності є $V_x > 33\%$ [3].

Перед виконанням регресійного аналізу сукупність повинна бути ранжована за факторною ознакою, яка має найбільший вплив на результуючу, причому це стосується і організованих багатофакторних експериментів, виконуваних за матричними планами, які послідовно ранжуються за усіма факторними ознакам, починаючи з тієї, яка має найбільший вплив на результуючу і долі за зниженням цього впливу (див. табл. 11.101, с. 838).

При регресійному аналізі виконується зазвичай дві оцінки вибірових коефіцієнтів регресії:

— оцінку величини відхилень від лінії регресії;

— оцінку істотності коефіцієнта b лінійної залежності, тобто значимість відхилення його від нуля [50].

Показником якості рівняння регресії є величина залишкової дисперсії:

$$s_{y-\hat{y}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2}{n - 1}, \quad (11.14)$$

Цей показник розраховується для рівнянь регресії, побудованих за різними математичними функціями. Кращим за якістю є рівняння, для якого $s_{y-\hat{y}}^2 \rightarrow \min$ [3].

З цієї позиції квадратне рівняння краще за лінійне, кубічне — за квадратне і т.д. (див. рис. 11.7 і рис. 11.8 на с. 688). Але ж показник ступеня повинен бути обґрунтований.

Перевірка адекватності регресійної моделі має своєю метою з'ясування правильності вибору виду рівняння регресії. ППП **Statistica** програмно виконує цю перевірку за вихідними даними без вилучення незначущих коефіцієнтів регресії. Нас же оцінка адекватності **математичної моделі із відібраними значущими коефіцієнтами регресії** (див. підрозділ **11.11.1.3 Особливості оцінки результатів регресійного аналізу**).

При з'ясуванні адекватності моделі використовується принцип зіставлення із шумом, тобто при перевірці її здатності достовірно описувати поверхню відгуку, залишкова дисперсія зіставляється з будь-якою незалежною оцінкою дисперсії шуму. Для адекватної моделі відмінність між ними повинна бути випадковою; для неадекватної моделі залишкова дисперсія повинна бути значуще (невипадково) більше незалежної оцінки дисперсії шуму. Таким чином, для адекватної моделі залишкова дисперсія є оцінкою дисперсії шуму, для неадекватної вона оцінює дисперсію шуму плюс додатковий компонент розсіювання, обумовлений неадекватністю.

У якості оцінки точності застосовують незміщену оцінку дисперсії залишкової компоненти, яка представляє собою відношення суми квадратів рівнів залишкової компоненти до величини $(n-k-1)$, де k — кількість факторів, включених в модель. Квадратний корінь з цієї величини називається стандартною помилкою оцінки.

Для перевірки значущості моделі регресії використовується F значення, що обчислюється як відношення дисперсії вихідного ряду і незміщеної дисперсії залишкової компоненти. Якщо розрахункове значення F -критерію з $\nu_2 = n-1$ і $\nu_1 = n-k-1$ ступенями свободи більше табличного при заданому рівні значущості, то модель вважається значущою [142]

$$F = \frac{R^2}{k(1-R^2)(n-k-1)}. \quad (11.15)$$

Таблична величина F -критерію визначається за табл. В.7 чи статистичною функцією **MS Excel F.ОБР.ПХ** (див. Додаток А).

Значення F при лінійній парній регресії також може бути обчислене за виразом [57]

$$F = \frac{R^2}{1-R^2}(n-2). \quad (11.16)$$

Тут таблична величина F -критерію визначається з числами ступенів свободи $\nu_1=1$ і $\nu_2=n-2$.

Якщо існує k незалежних змінних, то буде $k+1$ коефіцієнтів регресії (включно з постійним), звідси число ступенів свободи становитиме $n-(k+1)$.

Подібне зіставлення двох оцінок дисперсій проводиться за допомогою F -критерію Фішера–Снедекора. Модель вважається адекватною, якщо вона **представляє дослідні дані з похибкою, яка не перевищує похибки досліду**, тобто якщо його розрахункове значення критерію Фішера не перевищує табличного із прийнятим рівнем імовірності й числом ступенів вільності.

Якщо гіпотеза адекватності відкидається, то модель визнається неадекватною експериментальним даним. Неадекватність моделі не означає її не правильності. Неадекватність моделі може означати, що не весь перелік факторів, що впливають був прийнятий до уваги, або що необхідно перейти до більш складній формі рівняння зв'язку, або вибрати інший крок варіювання по одному або декільком фактором і т.п. Однак всі досягнення неадекватною моделі (відсів незначущих факторів, оцінка дисперсії експерименту та інші) залишаються в силі [32].

Статистичну значимість лінійної регресії можна оцінити за лінійним коефіцієнтом кореляції. Значення t -критерію для нього визначається на основі формул (9.11) і (9.12) за виразом (11.29) [3]

$$t_{r_{yx}} = r_{yx} \sqrt{\frac{n-2}{1-r_{yx}^2}}. \quad (11.17)$$

Модель визнається значущою, якщо розрахункове значення t -критерію для лінійного коефіцієнта кореляції перевищує табличне, тобто $t_{r_{yx}} > t_{\alpha(n)}$.

Оцінка відхилення від регресії має наступний сенс. Так як всі величини, що становлять рівняння регресії, отримані в результаті вибіркового спостереження, то і \hat{y} схильне до випадкових коливань, тобто вони обчислені з якоюсь помилкою. З попереднього відомо, що помилку спостережень найкраще характеризує середньоквадратичне відхилення, яке в даному випадку визначається як відхилення від регресії за формулою [50]:

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum d_{y/x}^2}{n-2}}. \quad (11.18)$$

Величина $s_{y/x}$ або $s_{x/y}$ буде тим менше, чим менше розбіжність між фактичними і розрахунковими груповими середніми.

Для оцінки близькості нелінійного рівняння емпіричному ряду застосовується F -критерій Фішера, який порівнюється з теоретичним (табличним) значенням [3]

$$F = \frac{\eta_T^2}{1 - \eta_T^2} \cdot \frac{n - k}{k - 1}, \quad (11.19)$$

де n – обсяг вибірки;

k – число параметрів рівняння;

η_T^2 – теоретичний коефіцієнт детермінації, $\eta_T^2 = 1 - \frac{\sigma_{y-\hat{y}}^2}{\sigma_y^2}$;

$\sigma_{y-\hat{y}}^2$ – залишкова дисперсія, $\sigma_{y-\hat{y}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \hat{y})^2}{n}$;

σ_y^2 – загальна дисперсія, $\sigma_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y - \bar{y})^2}{n}$.

Для визнання моделі адекватною необхідне дотримання умови $F > F_{\alpha(k-1; n-k)}$ [3].

Крім розглянутих вище характеристик, доцільно використовувати коефіцієнт множинної кореляції (індекс кореляції) R , а також характеристики суттєвості моделі в цілому і окремих її коефіцієнтів (11.20) [142]

$$R = \sqrt{\frac{\sum (\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum (y_t - \bar{y})^2}}. \quad (11.20)$$

Даний коефіцієнт є універсальним, так як відображає тісноту зв'язку і точність моделі, а також може використовуватися при будь-якій формі зв'язку змінних. При побудові однофакторної кореляційної моделі коефіцієнт множинної кореляції рівний коефіцієнту парної кореляції (11.21) [142]

$$R^2 = \frac{\sum (\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum (y_t - \bar{y})^2}. \quad (11.21)$$

Коефіцієнт множинної кореляції (індекс кореляції), зведений в квадрат R^2 , називається коефіцієнтом детермінації.

Він показує частку варіації результативної ознаки, що знаходиться під впливом чинників, що вивчаються, тобто визначає, яка частка варіації ознаки Y врахована в моделі і обумовлена впливом на нього факторів.

У багатофакторній регресії додавання додаткових пояснюючих змінних збільшує коефіцієнт детермінації. Отже, коефіцієнт детермінації повинен бути скоректований з урахуванням числа незалежних змінних. Скориго-

ваний \bar{R}^2 (**Нормированный R-квадрат**) за табл. 11.4) розраховується за виразом (11.22) [142, 57].

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-k-1}, \quad (11.22)$$

де n – число спостереження;
 k – число незалежних змінних.

Визначення вихідного параметру й забезпечення заданого рівня значущості факторів здійснюється з деякою похибкою. Статистичний аналіз рівняння регресії при заданій імовірності α визначає істотність впливу даного фактор на функцію відклику. **Якщо величина коефіцієнта вище його похибки, то фактор має відповідний вплив.** Якщо вплив статистично незначний, то величина коефіцієнту буде незначно відрізнятися від нуля, тобто зміна функції відклику при зміні відповідного фактору є одного порядку з похибкою його визначення, і він може бути виключений із рівняння регресії.

Перевірка значущості оцінок коефіцієнтів регресії за t -критерієм Стьюдента зводиться до послідовної перевірки нульових гіпотез. Деякі з коефіцієнтів регресії можуть виявитися нехтувано малими — незначущими. Для цього слід обчислити оцінку середньостатистичну похибку i -го коефіцієнта регресії s_{b_i} . Прийнято вважати, що коефіцієнт регресії значущий при виконанні умови [142] ¹⁵⁾

$$|b_i| \geq s_{b_i} \cdot t_{\alpha(n-k-1)}. \quad (11.23)$$

У протилежному разі коефіцієнт регресії незначущий і повинні бути виключений з моделі.

Статистична незначущість коефіцієнта b_i може бути обумовлена наступними причинами:

- рівень базового режиму близький до точки приватного екстремуму по змінної x_i або за добутком змінних;
- крок варіювання Δx_i обраний малим;
- дана змінна (або добуток змінних) не має функціонального зв'язку з вихідним параметром;
- велика помилка експерименту внаслідок наявності некерованих і неконтрольованих змінних.

Таким чином оцінка істотності коефіцієнта регресії дозволяє переконатися в тому, що залежність між зіставляється ознаками виник не випад-

¹⁵⁾ Перевірка значущості оцінок коефіцієнтів регресії виконується ППП **Statistica** програмно, тому докладно дане питання нами не розглядається.

ково, а статистично значуща.

Критерій істотності коефіцієнта регресії

$$t = b/s_b. \quad (11.24)$$

при числі ступенів вільності $\nu = n - 2$.

Квадратична похибка коефіцієнта лінійної регресії b становить [50]

$$s_b = \frac{s_{y/x}}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2}}, \quad (11.25)$$

тобто квадратичній похибці коефіцієнта кореляції, помноженої на відношення середніх квадратичних відхилів [54].

Значимість параметрів лінійної моделі визначається за допомогою t -критерію Стюдента. Для кожного з параметрів рівняння регресії обчислюються розрахункові (фактичні) значення t -критерію:

— для параметра a [3]

$$t_{a=0} = a \frac{\sqrt{n-2}}{\sigma_{y-\hat{y}}}; \quad (11.26)$$

— для параметра b [3]

$$t_b = b \sqrt{n-2} \cdot \frac{s_x}{s_{y-\hat{y}}}, \quad (11.27)$$

де $s_{y-\hat{y}}$ — залишковий середньоквадратичний відхил результативної ознаки y від вирівняних значенні \hat{y} , розрахованих за моделлю,

$$s_{y-\hat{y}} = \sqrt{\frac{\sum (y - \hat{y})^2}{n-1}};$$

s_x — середній відхил факторної ознаки x_i від загальної середньої \bar{x} ,

$$s_x = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1}}.$$

Обчислені значення t -критеріїв порівнюються з критичними значеннями $t_{\alpha(n)}$ визначеними з урахуванням прийнятого рівня значущості α і числа ступенів свободи варіації $\nu = n - 2$.

Параметр визнається значущим, якщо виконується нерівність $t > t_{\alpha(n)}$ [3].

В цьому випадку знайдені значення параметрів не є випадковими, а рівняння регресії визнається істотним і математична модель об'єкта при *ортogonalьному плануванні* подається у вигляді рівняння зв'язку вихідного параметра \hat{y} і *тільки значущих змінних* x_i [32].

Аналіз працездатності регресійної моделі дозволяє з'ясувати практичну можливість її використання. Необхідність такого аналізу обумовлена тим, що часто навіть адекватне рівняння регресії, що містить значущі коефіцієнти, виявляється із практичної точки зору непридатним у силу своєї низької точності.

Перевірка *інформаційну спроможності моделі* ґрунтується на основах дисперсійного аналізу [151, 135].

Формулюється нульова гіпотеза $H_0: s_c^2 = s_{\text{на}}^2$, де s_c^2 – дисперсія загального розсіювання результатів вимірювань по відношенню до загальної середнього значення по всьому експерименту; $s_{\text{на}}^2$ – дисперсія неадекватності.

Якщо для критерію Фішера, визначеного згідно виразу (11.28)

$$F_{\text{ін}} = s_c^2 / s_{\text{на}}^2 \quad (11.28)$$

виконується умова $F_{\text{ін}} \geq F_{\text{т}}$, то нульова гіпотеза буде відхилена за умови прийнятого рівня значущості, зазвичай при $\alpha=0.05$. Це свідчить, що модель описує результати експерименту краще, ніж найпростіша модель — пряма лінія $\hat{y} = \bar{y} = \text{const}$, в якій при будь-якому наборі значень x_i вихід є константа, рівна середньому значенню \bar{y} даних експерименту. Якщо $F_{\text{ін}} < F_{\text{т}}$, то така модель, незважаючи на складний вигляд і витрати на її побудову, не має інформаційної цінності.

Слід звернути увагу на необхідність техніко-економічного осмислення результату у випадку відхилення нульової гіпотези. Точність статистичного аналізу полягає у тому, що при великому числі вимірювань n така гіпотеза буде відхилятися при малих значеннях $F_{\text{ін}}$. Однак її техніко-економічна цінність може бути вельми сумнівна, через мале зниження похибки математичного, тобто інформаційного рівняння регресії \hat{y} порівняно з моделлю $\bar{y} = \text{const}$, яке розраховується за виразом (11.29)

$$\theta_{\text{ін}} = 100 \cdot (\sqrt{F_{\text{ін}}} - 1). \quad (11.29)$$

Мінімальна величина $\theta_{\text{ін}}$, при якій математична модель вважається корисною (спроможною) становить $\theta_{\text{ін}}=30\text{--}50\%$ (залежно від задачі). Це дозволяє уникнути невиправданого отримання складних поліноміальних моделей.

Варто відмітити, що перевірки на адекватність і на інформаційну спроможність моделі відмінні між собою і не взаємозамінні — адекватність моделі не гарантує її інформаційну спроможності, і навпаки [121].

Хоч коефіцієнти регресійної моделі відіграють важливу роль при оцінці впливу факторів, безпосередньо з їх допомогою не можна зіставити фактори за ступенем їх впливу на залежну змінну через відмінності одиниць виміру і різного ступеня коливання. Для цього застосовуються середні частинні коефіцієнти еластичності E і β -коефіцієнти, які розраховуються відповідно за формулами [142]

$$E_i = a_i \cdot \bar{x} / \bar{y}; \quad (11.30)$$

$$\beta_i = a_i \cdot S_{x_i} / S_y, \quad (11.31)$$

де S_{x_i} — середньоквадратичне відхилення фактору i .

Коефіцієнт еластичності E_i показує, на скільки відсотків змінюється залежна змінна при зміні фактору i на 1 %. Однак він не враховує ступінь коливання факторів.

β -коефіцієнт показує, на яку частину величини середнього квадратичного відхилення S_y , зміниться залежна змінна Y зі змінами відповідної незалежної X_i , на величину свого середнього квадратичного відхилення при фіксованому на постійному рівні значенні інших незалежних змінних.

Зазначені коефіцієнти дозволяють проранжувати фактори за ступенем впливу чинників на залежну змінну.

Частку впливу фактору в сумарному впливі всіх факторів можна оцінити за величиною дельта-коефіцієнтів Δ_i [142]

$$\Delta_i = \frac{r_{y_i} \cdot \beta_i}{R^2}, \quad (11.32)$$

де r_{y_i} — коефіцієнт парної кореляції між фактором i ($i = 1, \dots, m$) і залежною змінною.

Довірчий інтервал U для лінійної моделі парної регресії розраховується за формулою (11.33) [142]

$$U = s_{\hat{y}} \cdot t_{\alpha(v)} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}. \quad (11.33)$$

Коефіцієнт довірчої ймовірності $t_{\alpha(v)}$ є табличним значенням t -статистики Стюдента (квантилем розподілу) при заданому рівні значущості α і ступені вільності $v = n - 2$.

Як видно з формули (11.33) величина U прямо пропорційно залежить від точності моделі $s_{\hat{y}}$, довірчої ймовірності $t_{\alpha(v)}$, ступеня видалення прогнозованої оцінки фактору x_i від середнього значення і обернено пропорційна обсягу спостережень n .

У свою чергу визначається за виразом (11.34) [142]

$$s_{\hat{y}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n - 2}}. \quad (11.34)$$

Аналіз працездатності моделі містить у собі кілька процедур (див. підрозділ **11.11.1.3 Особливості оцінки результатів регресійного аналізу**):

1. Дослідження різниць (залишків) між фактичними значеннями відклику, тобто спостережуваної випадкової змінної, яка припустимо залежить від факторів, і тими, що передбачаються за рівнянням регресії. Це дозволяє з'ясувати, чи не суперечать властивості залишків тим передумовам про шум, на яких заснований регресійний аналіз.

2. Якщо в регресії число спостережень мало перевершує кількість коефіцієнтів, то для аналізу якості моделі слід провести додаткові експерименти.

3. Обчислення коефіцієнта детермінації D при відібраних значущих коефіцієнтах регресії з наведенням нижньої межі значень коефіцієнта детермінації r_{\min}^2 , виходячи з того, що лише при $r^2 \geq r_{\min}^2$ рівняння регресії має практичний інтерес для цілей прогнозування.

Граничне значення може визначатися за умови, що похибка передбачення за рівнянням регресії $y_i - \hat{y}_i$ була б у два рази менше за похибку передбачення лише за середнім значенням $y_i - \bar{x}_i$ відклику. За цієї умови, якщо не звертати уваги на вплив факторів, при $r_{\min}^2 < 0.75$ слід сумніватися у працездатності рівняння регресії [76].

При поданні результатів регресійного аналізу (як і в кореляційному) у роботі слід наводити не лише отримані математичні моделі (значення коефіцієнтів регресії), але й похибки коефіцієнтів і їхньої ймовірності. Недостовірні коефіцієнти регресії повинні вилучатися з моделі [36].

11.4. ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

11.4.1.1. Використання інструментів пакету MS Excel при лінійному регресійному аналізі

11.4.1.1.1. Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом

Використовуючи дані некерованого масиву біометричних показників рослин рижію ярого — аналізу досліджень біометричних показників рослин рижію ярого, виконаних у 2004 р. (табл. 2.11 на с. 96) як однофакторного експерименту визначимо залежність кількості стручків на центральній гілці від висоти рослини. При цьому для оцінки параметрів a і b рівняння однофакторної лінійної регресії (11.2) застосовуємо метод найменших квадратів (МНК), використовуючи формули (11.12) і (11.13). Самі розрахунки наведені на полі табл. 11.2.

За результатами досліджень показники 101 сортотразка лежать у межах: висота рослини (факторна ознака) H від 58.4 до 85.3 см і кількість стручків на центральній гілці (результуюча ознака) Z від 13.7 до 39.9 шт. (див. табл. 2.17, с. 111).

У факторних дослідженнях при контрольованому некерованому масиві даних, тобто, пасивному експерименті рівні факторів лише реєструються, а не задаються дослідником [17].


Таблиця 11.2. Оцінка попередніх даних і розрахункове отримання рівняння однофакторної лінійної регресії

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	№ п.п.	№ ділянки	Висота рослини	Кількість стручків	\bar{x}	\bar{y}	$(x-\bar{x})(y-\bar{y})$	Розрахунок y_T	Різниця $y-y_T$	Різниця y_T-y_{cp}	Різниця залишків	Перша різниця із середнім	Друга різниця із середнім	Добуток різниць із середнім	Відхил від лінії регресії
2	1	134	58.4	20.2	-12.5	-6.3	78.6	23.9	-3.6	-2.6					2.759
3	2	19	59.8	20.9	-11.2	-5.6	62.8	24.1	-3.3	-2.3	0.4	-3.3	-3.6	12.0	2.620
4	3	133	60.9	13.7	-10.0	-12.8	128.0	24.4	-10.7	-2.1	-7.4	-10.7	-3.2	34.7	2.509
5	4	131	61.1	17.5	-9.8	-8.9	88.1	24.4	-6.9	-2.1	3.8	-6.9	-10.6	73.6	2.493
99	98	64	81.6	26.9	10.7	0.4	4.4	28.7	-1.8	2.2	5.6	-1.9	-7.4	13.8	2.569
100	99	9	83.8	29.8	12.9	3.3	42.6	29.2	0.6	2.7	2.4	0.6	-1.8	-1.0	2.792
101	100	4	84.7	32.2	13.8	5.7	78.6	29.4	2.8	2.9	2.2	2.8	0.6	1.8	2.889
102	101	8	85.3	31.6	14.3	5.1	73.2	29.5	2.1	3.0	-0.7	2.1	2.8	5.9	2.950
103	Сума		7164.7	2675.4			770.3	2675.4			5.7			179.1	
104	Сума квадратів		N114=-N112		3675.4	2295.1			2133.6	161.4	3891.6	2120.3	2129.1		
105	Сума добутоків		N115=СКОС(I2:I102)											179.079	
106	Обсяг вибірки n		101		E2=C2-\$C\$109 F2=D2-\$D\$109 G2=E2*F2							Емпіричний критерій d		1.824	
107	Нижня довірча межа $x_{н.дов.}$		58.9	17.0	H2=E119*C2+E120 I2=D2-H2							Нижня межа істотності d_L		1.650	
108	Мінімальне значення x_{min}		58.4	13.7	M3=I2-CPЗНАЧ(I2:I101) N3=L3*M3							Верхня межа істотності d_U		1.690	
109	Середнє значення x_{cp}		70.9	26.5	C113=СТАНДОТКЛОН.В(C2:C102)							4- d_U		2.310	
110	Максимальне значення x_{max}		85.3	39.9	J2=H2-\$D\$109 K3=I3- I2							4- d_L		2.350	
111	Верхня довірча межа $x_{в.дов.}$		83.0	36.0	L3=I3-CPЗНАЧ(I3:I102)							Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0880	
112	Довірча значущість α		0.05		E119=G103/E104 C127=C126^2							Нижня межа коеф. автокор.		-0.1974	
113	Середньоквадрат. відхил s		6.063	4.791	C114=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(C112;C106-1)							Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0843	
114	Критерій Стюдента $t_{\alpha,n-1}$		1.984		C103=СУММ(C2:C102) E104=СУММКВ(E2:E102) N105=СУММ(N3:N102)							Верхня межа коеф. автокор.		0.1974	
115	Коефіцієнт варіації V		8.5	18.1	C106=СЧЁТ(C2:C102) C107=C109-C114*C113 C108=МИН(C2:C102)							Асиметрія As		0.042	
116	Асиметрія As		0.244	-0.591	C109=CPЗНАЧ(C2:C102) C110=МАКС(C2:C102) C111=C109+C114*C113							Оцінка нормальності		Нормальн.	
117	Похибка асиметрії s_{As}		0.238		O2=\$C\$114*(((\$I\$104/(\$C\$106-2))*(E2^2)/\$E\$104+1+1/\$C\$106)^0.5										
118	Оцінка нормальності		Нормальн.	Нормальн.	C116=СКОС(C2:C102) C117=(6*(C106-1)/((C106+1)*(C106+3)))^0.5										
119	Вільний член регресії a		N110=4-N107		C118=ЕСЛИ((C116/C117-C114)<0;"Нормальн."; "Hi") C115=C113*100/C109										
120	Коефіцієнт регресії b		N109=4-N108		E120=D109-E119*C109 E121=E119*(C106-2)^0.5/I113										
121	Розрахунковий критерій $t_{a=0}$		N106=K104/I104		E122=E120*C113*(C106-2)^0.5/I113 C123=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(C112;C106-2)										
122	Розрахунковий критерій t_b				C124=КОРРЕЛ(C2:C102;D2:D102) C125=C124*((C106-2)/(1-C124^2))^0.5										
123	Критерій Стюдента $t_{\alpha,n-2}$		1.984		C126=(J104/F104)^0.5 I112=СТАНДОТКЛОН.В(I2:I102)										
124	Коеф. лінійн. кореляції r		0.265												
125	Розрахунковий критерій t_r		2.737												
126	Індекс кореляції R		0.2652												
127	Коефіцієнт дебермінації R^2		0.0703												

N116=ЕСЛИ((N115/C117-C114)<0;"Нормальн."; "Hi") **N111=1-N106/2** **N112=-C114/C106^0.5** **N113=N105/(L104*M104)^0.5**

Спочатку виконаємо перевірку вихідних даних.

1. Виключення з первинної інформації аномальних значень з факторної та результуючої ознаки виконуємо за підрозділом **5.12.1.3 Оцінка за t -критерієм Стьюдента**.



Для цієї мети з використанням статистичних функцій MS Excel (**СЧЕТ**, **МИН**, **СРЗНАЧ**, **МАКС**, див. Додаток А) визначаємо обсяг вибірки n , мінімальне значення x_{\min} , середнє значення \bar{x} , максимальне значення x_{\max} .

Довірчий інтервал сукупності (результатів спостереження) знаходиться в інтервалі $\bar{x} \pm t_{\alpha(v)}s$, де СКВ визначається статистичних функцій MS Excel **СТАНДОТКЛОН.В**, а квантиль розподілу t -критерію — формулою **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** для рівня значущості α і ступеня вільності $v=n-1$.

Хоч за даними табл. 11.2 деякі показники сукупності виходять за межі довірчого інтервалу, проте, виключити їх не можна — вони є не грубими помилками, а показниками певних сортотразків.

2. Перевірка розподілу одиниць спостереження на відповідність закону нормального розподілу виконується з використанням показника асиметрії **As** **СКОС** та його похибки s_{As} визначеної за виразом (1.128). Якщо їхнє відношення у табл. 11.3 більше за квантиль розподілу t -критерію Стьюдента, визначеного формулою **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х** для прийнятого рівня значущості α і ступеня вільності $v=n-2$, розподіл є нормальним, як саме у нашому разі.

3. Значення коефіцієнт варіації визначене за виразом (1.100) у табл. 11.3 менше за критичне 33 % — сукупності однорідні.

Одержання індексу кореляції R , виконуваного за виразом (11.20), коефіцієнт детермінації R^2 (11.21) та відхилу від лінії регресії U за виразом (11.33) виконується за формулами наведеними на полі табл. 11.2.

У результаті розрахунків отримується рівняння лінійної регресії залежності кількості стручків від висоти рослини

Таким чином, отримане рівняння має вигляд (11.35)

$$Z=11.6219+0.2096H. \quad (11.35)$$

Коефіцієнт детермінації при цьому становить $R^2 = 0.0703$, тобто дана закономірність лише на 7.03 % описує досліджуване явище.

Графічне представлення цього рівняння з наведенням вихідних точок (колонка **D**) та пояс довірчих меж, який представляє собою дві гіперболи (для лінійної залежності), розраховані за даними колонок **H** і **O** згідно виразу (11.35), і розташовані по обидві сторони від графіку лінійної регресії

$$y_{i_{\min, \max}} = \hat{y}_i \pm U \quad (11.36)$$

подано на рис. 11.1.

11.4.1.1.2. Застосування інструменту **РЕГРЕССИЯ** MS Excel

Інструмент аналізу **Регрессия** пакету аналізу **Excel** виконують розрахунки лише для *лінійної* регресії при кількості змінних не більше 16 [57]. Розглянемо його застосування для аналізу контрольованого некерованого масиву даних отриманих у 2004 р. (табл. 2.11 на с. 96), як однофакторного експерименту досліджень біометричних показників рослин рижію ярого, а саме, визначимо залежність кількості стручків на центральній гілці від висоти рослини (табл. 11.3).

Оцінка попередньої інформації та оцінка рівняння регресії аналогічна наведених в підрозділі **11.4.1.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом** на полі табл. 11.2, проте на відміну від неї розрахункові дані \hat{y} в колонку E2:E102 та значення a в чарунку E118 і b в чарунку E119 заносяться за результатами дії інструменту **РЕГРЕССИЯ** MS Excel згідно табл. 11.4 (\hat{y} у нашому прикладі в табл. 11.4 не наведено).

Порядок дії й отримані результати наведено на полі рис. 11.2 червоними цифрами. При виконанні тесту слід натиснути **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) (рис. 2.4, с. 100), на панелі **Анализ данных** з **Инструменты анализа** вибрати **Регрессия** (3) і натиснути **ОК** (4).

На відкритій панелі **Регрессия** у **Входные данные** треба активізувати **Метки** (5) — якщо вибірки даних підписані (стоїть номер вибірки, її назва, тощо), то для включення в дані заголовків, у даному пункті слід поставити маркер. Якщо ж виділялися тільки числові дані, даний пункт не відмічається. Далі слід задати рівень статистичної значущості (порогові значення) α **Альфа: 0.05** (6) (див. с. 339), окремо указати **Входной интервал Y:** (7) і **Входной интервал X:** (8), причому якщо факторів декілька — виділити всі разом, у **Параметры вывода** призначити вивід результатів на **Новый рабочий лист:** (9).

Таблиця 11.3. Оцінка попередніх даних та рівняння регресії з допомогою інструменту **РЕГРЕССИЯ** MS Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	№ п.п.	№ ділянки	Висота рослини	Кількість стручків	Розрахунок y_T	$y - y_{cp}$	Різниця $y - y_T$	Різниця $y_T - y_{cp}$	Різниця залишків	Перша різниця із середнім	Друга різниця із середнім	Добуток різниць із середнім
2	1	134	58.4	20.2	23.9	-6.3	-3.6	-2.6				
3	2	19	59.8	20.9	24.1	-5.6	-3.3	-2.3	0.4	-3.3	-3.6	12.0
4	3	133	60.9	13.7	24.4	-12.8	-10.7	-2.1	-7.4	-10.7	-3.2	34.7
5	4	131	61.1	17.5	24.4	-8.9	-6.9	-2.1	3.8	-6.9	-10.6	73.6
98	97	54	81.6	21.3	28.7	-5.2	-7.5	2.2	-3.1	-7.5	-4.3	32.4
99	98	64	81.6	26.9	28.7	0.4	-1.8	2.2	5.6	-1.9	-7.4	13.8
100	99	9	83.8	29.8	29.2	3.3	0.6	2.7	2.4	0.6	-1.8	-1.0
101	100	4	84.7	32.2	29.4	5.7	2.8	2.9	2.2	2.8	0.6	1.8
102	101	8	85.3	31.6	29.5	5.1	2.1	3.0	-0.7	2.1	2.8	5.9
103				Сума квадратів		2295.1	2133.6	161.5	3891.6	2120.3	2129.1	
104				Сума добутоків								179.081
105	Обсяг вибірки n		101						Емпіричний критерій d		1.824	
106	Нижня довірча межа $x_{н.дов.}$		58.9	17.0					Нижня межа істотності d_L		1.650	
107	Мінімальне значення x_{min}		58.4	13.7					Верхня межа істотності d_U		1.690	
108	Середнє значення x_{cp}		70.9	26.5					$4 \cdot d_U$		2.310	
109	Максимальне значення x_{max}		85.3	39.9					$4 \cdot d_L$		2.350	
110	Верхня довірча межа $x_{в.дов.}$		83.0	36.0					Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0880	
111	Довірча значущість α		0.05						Нижня межа коеф. автокор.		-0.1974	
112	Середньоквадрат. відхил s		6.063	4.791	4.619				Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0843	
113	Критерій Стюдента $t_{\alpha, n-1}$		1.984						Верхня межа коеф. автокор.		0.1974	
114	Коефіцієнт варіації V		8.5	18.1					Асиметрія As		0.042	
115	Асиметрія As		0.244	-0.591					Оцінка нормальності		Нормальн.	
116	Похибка асиметрії s_{As}		0.238									
117	Оцінка нормальності		Нормальн.	Нормальн.								
118	Вільний член регресії a				0.2096							
119	Коефіцієнт регресії b				11.6219							
120	Розрахунковий критерій $t_{a=0}$				0.451							
121	Розрахунковий критерій t_b				151.8							
122	Критерій Стюдента $t_{\alpha, n-2}$		1.984									
123	Коеф. лінійн. кореляції r		0.265									
124	Розрахунковий критерій t_r		2.737									
125	Індекс кореляції R		0.2652									
126	Коефіцієнт дебермінації R^2		0.0704									




Рис. 11.2. Порядок застосування інструменту **Регрессия**

мітити ☒ **График нормальной вероятности** (13), ☒ **График остатков** (14), ☒ **График подбора** (15) і натиснути **ОК** (16).

Результати проведеного аналізу представлені у табл. 11.4 і на рис. 11.3.

Найбільш важливими є **Множественный R** (коефіцієнт множинної кореляції r) — коефіцієнт кореляції. Якщо його значення нижче помірного (див. табл. 9.1, с. 492), то подальший розгляд результатів не має сенсу. Втім, це підтвердиться іншим аналізом.

R-квадрат (Коефіцієнт детермінації r^2 , (D)) — значення коефіцієнта детермінації, який показує залежність мінливості відгуку системи від розглянутих факторів впливу (див. с. 491).

Нижче у **Дисперсионный анализ** наведено значущості розрахованого рівняння регресії. Дані дисперсійного аналізу розраховані за формулами, представленими в табл. 11.6.

Якщо має місце $F \geq F_T$, чи **Значимость F** менше за прийнятий рівень статистичної значущості α , то рівняння регресії значуще (адекватне). Саме це і отримано у нашому випадку. У іншому випадку, — вибрані для моделювання фактори *не мають жодного впливу* на результат експерименту.

У верхній частині табл. 11.4 **Регрессионная статистика** подано аналіз впливу факторів на результат експерименту.

При “включенні”

☐ **Константа - ноль** (10)

Excel проводить нормування (с. 61) так, що змодельоване рівняння регресії пройде через нуль осей координат, тобто b_0 .

За допомогою пунктів ☒ **Остатки** (11) і ☒ **Стандартизованные остатки** (12) можна прорахувати передбачені, тобто розраховані по побудованому рівнянню регресії значення Y , а також різницю між фактичними і передбаченими значеннями.

Слід зазначити, що графік підбору не завжди досить наочний, тут треба покладатися на інтуїцію дослідника. Для ілюстрації слід від-

Таблиця 11.4. Представлення результатів регресійного аналізу

Вывод Итогов	
Регрессионная статистика	
Множественный R	0.265217571
R-квадрат	0.07034036
Нормированный R-квадрат	0.060949859
Стандартная ошибка	4.64238623
Наблюдения	101

Дисперсионный анализ					
Джерело варіювання	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	1	161.4352398	161.4352398	7.490586	0.00735326
Остаток	99	2133.623241	21.55174991		
Итого	100	2295.058481			

Показник	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95.0%	Верхние 95.0%
Y-пересечение	11.62192737	5.451663676	2.131812976	0.035497	0.80464389	22.43921	0.80464	22.43921
Висота рослини	0.209578385	0.076575279	2.736893526	0.007353	0.05763642	0.36152	0.05764	0.36152

Її дані розраховані за формулами, представленими в табл. 11.5.






Рис. 11.3. Графічне представлення оцінки результатів регресійного аналізу.

Результати дисперсійного аналізу також дають змогу визначити **роботоздатність моделі**, яка розраховується як відношення значення **SS** показника **Регрессия** до значення **SS** показника **Итого** [135].

У нашому разі роботоздатність моделі становить лише $R = 0.07$.

У третій частині, без назви, наводяться значення коефіцієнтів регресійної моделі (в стовпці **Коэффициенты**), **Стандартная ошибка** (Довірча похибка вибіркового середнього) оцінка їх значущості (стовпець

t-статистика), яка використовується для перевірки значущості коефіцієнтів регресії, та ін.

Рядок таблиці *Y-пересечение* дає розрахунки для коефіцієнта b_0 ; рядки *Переменная* — для коефіцієнтів факторів впливу b_1, b_2, b_3, \dots . Для оцінки значущості коефіцієнтів слід знайти критичне значення розподілу Стюдента, Якщо **t-статистика** менша за прийнятий рівень статистичної значущості α , то вплив даного то досліджуваній коефіцієнт рівняння регресії значущий.

Таблиця 11.5. Пояснення показників регресійної статистики

Назва показника		Формула
Прийняте в Excel	Загальноприйняте	
Множинний R	Коефіцієнт множинної кореляції r	$R = \sqrt{R^2}$
R -квадрат	Коефіцієнт детермінації $r^2, (D)$	$R^2 = \frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2}{\sum(y_t - \bar{y})^2} \quad (11.21)$
Нормований R -квадрат	Скорегований r^2	$R^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-k-1} \quad (11.22)$
Стандартна похибка	Вибіркова похибка оцінки	$R = \sqrt{\frac{\sum e(t)^2}{n-k-1}} \quad (11.37)$
Спостереження	Кількість спостережень (обсяг вибірки)	N

Таблиця 11.6. Пояснення показників дисперсійного аналізу

Показник	Df – число ступенів вільності	SS –сума квадратів	MS – середній квадрат похибки	F –критерій Фішера
Регресія	$k = 2$	$\sum(\hat{y} - \bar{y})^2$	$\sum(\hat{y} - \bar{y})^2 / k$	$\frac{R^2}{k(n-1-k)}$
Залишок	$n - k - 1 = 13$	$\sum e(t)^2$	$\sum e(t)^2 / (n-1-k)$	
Разом	$n - 1 = 15$	$\sum(y_t - \bar{y})^2$		

У іншому випадку, в кінцевому записі рівняння регресії даний коефіцієнт *не враховується*.

Таким чином, отримане рівняння має вигляд (11.26)

$$Z = 11.6219 + 0.2096H. \quad (11.38)$$

Також як результат розрахунків таблично наведено залишки між експериментальними і розрахунковими значеннями функції.

Графік залишків наведено на рис. 11.4.




Рис. 11.4. Графік неранжованих залишків

Перевірка інформаційної спроможності моделі за виразом (11.28) та визначення її роботоздатності (11.29) (див. с. 682) наведена в табл. 11.7.

Таблиця 11.7. Перевірка інформаційної спроможності моделі

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіювання	Число ступенів вільності df	Сума квадратів SS	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F	Зростання показника прогнозу θ , %
2	Регресія	1	161.43524	161.43524	7.490586	0.0073533	$H5=100*(E5^{0.5}-1)$	
3	Остаток	99	2133.62324	21.55175	$D4=C4/B4$	$E5=D4/D3$	$C6=C2/C4$	
4	Итого	100	2295.05848	22.951				
5	Інформаційна спроможність моделі				1.065	0.377	1.393	3.2
6	Роботоздатність моделі	0.070	$F5=F.PACП.ПХ(E5;B4;B3)$			$G5=F.OБР.ПХ(0.05;B4;B3)$		

Тут рівень значущості і критичне значення критерію Фішера визначається статистичними функціями **Excel**.

Так як має місце $F_{\text{ин}} \geq F_{\text{т}}$, нульова гіпотеза відхиляється. Це свідчить, що модель інформаційно спроможна і описує результати експерименту на 3.2 % краще, ніж найпростіша модель — пряма лінія.

Адекватність отриманої математичної моделі підтверджується також відповідністю залишків законі нормального розподілу.

Ця перевірка виконана також з використанням показника асиметрії **Ас** **СКОС** та його похибки $s_{\text{Ас}}$. За її результатами бачимо, що розподіл є нормальним. Таким чином отримане рівняння адекватне.

В табл. 11.3 як і в табл. 11.2 наведено також визначення автокореляції в регресійних залишках за критерієм Дарбіна–Уотсона (див. **11.12.1 Визначення критерію Дарбіна–Уотсона**) і коефіцієнт автокореляції першого порядку (див. підрозділ **11.12.2 Використання коефіцієнта автокореляції першого порядку**).

Для цього визначаються різниці (нев'язка) між експериментальними та розрахунковими значеннями результуючої ознаки (колонка **G2:G102**). Причому розрахункові значення результуючої ознаки, представлені колонкою **E2:E102**, беруться із даних, отримуваних при одержанні табл. 11.4 (нами вони не наведені) чи розраховуються за рівнянням регресії (зазвичай, при використанні лінії тренду, див. підрозділ **11.4.1.1.3 Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel**).

За результатами розрахунків маємо $d_\Phi = 1.824$ (табл. 11.3), а для числа дослідів $n=101$ і число незалежних змінних першого порядку рівняння регресії (без постійного члена) $k=1$ згідно табл. E.30 становлять $d_{L_{05}(1,101)} = 1.65$ і $d_{U_{05}(1,101)} = 1.69$, звідки маємо $d_{U_{05}(1,101)} = 1.69 < d_\Phi = 1.824 < 4 - d_{U_{05}(3,101)} = 2.31$ — автокореляція відсутня. Про це свідчить і рис. 11.105 на с. 839 та коефіцієнти серіальної кореляції¹⁶⁾, за табл. 11.3, розраховані двома способами, вони становлять $r_1 = 0.0843$ і $r_1 = 0.0880$, так як вони знаходяться у межах, визначених виразом (11.92), тобто $\pm t_{05(100)} / \sqrt{n}$, а саме від $-1.984 / \sqrt{101} = -0.197$ до 0.197 .

Згідно табл. 11.4 за критерієм Фішера адекватність рівняння регресії підтверджена ($F = 7.490586 > F_{05(1,99)} = 3.9371169$ — рівняння регресії (11.26) значуще (адекватне). Табличне значення розраховане функцією **=F.ОБР.ПХ(0.05;1;99)**).

Проте за [3] статистичну значимість лінійної регресії можна оцінити за лінійним коефіцієнтом кореляції між результуючою і факторною ознакою з використанням формули (11.29).

У результаті маємо $t = 2.737 > t_{05(99)} = 1.984$, таким чином рівняння регресії (11.26) значуще (адекватне).

Таким чином, з імовірністю в 95 % можна стверджувати чисельні значення лінійного коефіцієнта кореляції не є випадковою величиною, а рівняння регресії у (11.26) є статистично значущим.

11.4.1.1.3. Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel

Тренд (лінія тренду) — це додана в діаграму лінія, що відображає загальну закономірність зміни даних, рівняння регресії, отриманого мінімізацією суми квадратів різниць між значеннями кожної точки даних і відповідними значеннями тренду. Іншими словами, тренд — це лінія, яка найкраще

¹⁶⁾ Серіальним коефіцієнтом кореляції є ордината автокореляційної функції випадкового процесу, представленого дискретною послідовністю [51].

вкладається на ряд даних.

У деяких випадках за допомогою лінії тренду можна передбачити зміну даних в майбутньому.

Лінію тренду можна додати в діаграму будь-якого з наступних типів:

- точкова;
- з областями;
- лінійчата;
- гістограма;
- графік;
- біржова;
- бульбочкова.

У загальному випадку дані, які підходять для додавання лінії тренду, можна об'єднати у дві категорії:

— порівнянні числові дані, що відображаються зазвичай в точковій діаграмі, де обидві осі є осями значень.


— дані, що змінюються в часі та показаних зазвичай в точкових діаграмах, графіках, гістограмах і діаграмах з областями.

При використанні лінії тренду передбачається, що вісь категорій розбита на рівномірні інтервали значень. Це завжди справедливо для точкових, бульбочкових діаграм і діаграм інших типів, для яких вісь категорій відображає час чи лінійні показники.

Якщо ряд даних містить нульові або від'ємні значення, лінії тренду **Експоненціальна/Степенева недоступні**.

Розрахуємо коефіцієнти лінійного регресійного аналізу залежності кількості стручків на центральній гілці з висотою рослини за даними 2004 р. (табл. 11.3).

Виконання перевірку вихідних даних та оцінки результатів докладно представлені у підрозділі **11.4.1.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом**.

При одночасній побудові діаграми і лінії тренду за допомогою **MS Excel** в табл. 11.3 слід виділити чарунки **C1:D102** і натиснути **Вставка** (1) (рис. 11.5), далі **Точечная** (2),  (3), активізувати точки діаграми і натиснувши праву кнопку миші у випадному меню вибрати **Добавить линию тренда...** (4). Дії по додаванню до діаграми лінії тренду слід починати з пункту (4). Після виконання пункту (4) виникає діалогове вікно **Формат линии тренда** додавання тренду в ряд даних і установки її параметрів (рис. 11.6).

Для додавання тренду у вікні **Формат линии тренда** в меню **Параметры линии тренда** вибрати тип і параметри тренду (1), відмітити ☒ **показывать уравнение на диаграмме** (2) та ☒ **поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (R^2)** (3) і клацнути на кнопці **Заккрыть** (4).




Рис. 11.5. Дії по створенню лінії тренду

рующей (сглаженной) кривой. Якщо вибрати перемикач **Другой**, то в розташованому правіше поле введення можна задати заголовок тренду. Він буде виводитися в легенді. Якщо його не задати, то в тексті легенди будуть виведені тип тренду і ім'я ряду в дужках.

Прогноз. За допомогою розкриття списків цієї групи можна продовжити лінію тренду вперед або назад (або в обох напрямках) на задану кількість періодів.

Пересечение кривой с осью Y в точке. У цьому полі




Рис. 11.6. Дії по вибору виду і параметрів лінії тренду

можна задати точку на осі значень, в якій її буде перетинати лінія тренду.




Рис. 11.7. Діаграма з лінійним трендом

Показувати ур-
нение на диаграмме. Якщо цей прапорець встановлений, то на діаграму буде виведено рівняння тренду.

Поместить на диаграмме величину достоверности аппроксимации (R^2). При встановленому прапорці на діаграмі буде виведено коефіцієнт детермінації R^2 .

рмінації, який є показником визначеності тренду. Коефіцієнт детермінації R^2 знаходиться в діапазоні від нуля до одиниці. Воно показує, наскільки близький тренд до ряду даних, тобто наскільки він надійний. Чим ближче тренд до ряду даних, тим ближче середньоквадратичне значення до одиниці.

З одними даними можна асоціювати декілька ліній тренду. Наприклад, можна додати два тренди різних типів, щоб визначити, який з них краще описує дані (рис. 11.8).

Якщо задати виведення рівняння або коефіцієнт детермінації, то до лінії тренду додається текстовий елемент — підпису тренду, що відображає цю інформацію (рис. 11.7 і рис. 11.8).

Слід враховувати, що текст підпису тренду можна змінити, проте при зміні даних **Excel** більше не буде оновлювати відредагований підпис, таким чином будуть виведені неправильні рівняння і коефіцієнт детермінації R^2 .




Рис. 11.8. Діаграма з двома трендами

Редагування експериментальних точок діаграми, лінії тренду і підпису викладене у підрозділі **16.1.1 Редагування графічних залежностей**.

У діаграмі, показаної на рис. 11.7, наведено рівняння і середньоквадратичне значення тренду. Рівняння має вигляд

$$Z = 0.2095 \cdot H + 11.628. \quad (11.39)$$

11.4.1.2. Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії за допомогою ППП Statistica

Розрахуємо коефіцієнти лінійного регресійного аналізу залежності кількості стручків на центральній гілці з висотою рослини за даними 2004 р., наведені в табл. 11.3).

Перевірка вихідних даних докладно представлена у підрозділі **11.4.1.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом.**

Розрахунок коефіцієнтів регресійних рівнянь можна виконати в декількох модулях ППП Statistica. Ми скористаємося модулем **Multiple Regression/Множественная регрессия** меню **Statistics/Анализ**. Для виконання регресійного аналізу необхідно із меню **Statistics/Анализ** (1) запустити модуль **Multiple Regression/Множественная регрессия** (2) у результаті чого виникне панель **Multiple Linear Regression/Множественная регрессия** (рис. 11.9).




Рис. 11.9. Вибір даних для аналізу

На ній у вкладці **Advanced/Дополнительно** натиснути на кнопку **Variables/Переменные:** (3) і на виниклій панелі **Select dependent and independent variable lists/**

Списки зависимых и независимых переменных указати, яка із аналізованих змінних є залежною **Dependent var. [or list for batch]** / **Зависимые переменные** (4), а яка — незалежною **Independent variable list** / **Независимые переменные** (5) і повернутися на панель **Multiple Linear Regression** / **Множественная регрессия** натиснувши **ОК** (6) та ще раз **ОК** (7).

У результаті з'явиться вікно **Multiple Regression Results** / **Результаты множественной регрессии** (рис. 11.10), яке вже на даному етапі аналізу містить деякі важливі результати:

- **Dependent/Зав. перем.** — ім'я залежної змінної;
- **NNot. of cases/Число набл.** — число спостережень;
- **Intercept/Своб. член** — вільний член регресійного рівняння;
- **Std. Error/Стандартная ошибка оценки** — стандартна похибка вільного члена регресійного рівняння;




Рис. 11.10. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка **Advanced** / **Дополнительно**)

- **Multiple R/Множеств. R** — коефіцієнт множинної кореляції;
- **R²** — коефіцієнт детермінації. Це дуже важливий показник в регресійному аналізі. Він змінюється від нуля до одиниці і відображає “якість” розрахованої регресії, показуючи частку (%) загального розкиду вибірових точок, яка “пояснюється” побудованої регресією (наприклад, при $R^2 = 0.85$,

впливає висновок про те, що 85 % дисперсії залежної змінної y пояснюється варіацією незалежної змінної x);

— **Adjusted R²/Скоррект. R²** — скоригований на число ступенів свободи коефіцієнт детермінації, який визначається за формулою (11.22).

— **Standard error of estimate/Стандартная ошибка оценки** — параметр, що відображає ступінь розкиду вибірових значень щодо лінії регресії;

— **F**, **df** і **p/F**, **cc** і **p** — F -критерій, число ступенів свободи, прийняте при його розрахунку, і ймовірність помилки для нульової гіпотези F -тесту. F -тест в регресійному аналізі застосовується для оцінки статистичної значущості моделі. При $p \leq 0.05$ можна прийняти, що розрахована регресія задовільно описує зв'язок між досліджуваними ознаками; — **t(df)** і **p/t(cc)** і **p** — критерій Стюдента (t -критерій) використовується для перевірки нульової гіпотези про рівність нулю вільного члена регресійного рівняння, p — ймовірність помилки для цієї нульової гіпотези;

— **beta/бета** — стандартизований коефіцієнт регресії — це коефіцієнт регресії, який ми отримали б у разі попередньої стандартизації обох змінних (тобто при такому перетворенні, коли їх середні значення стали б рівні нулю, а стандартні відхилення одиниці). Розрахунок **beta** дозволяє оцінити, якою мірою значення залежної змінної визначаються значеннями незалежної змінної. **Beta** може виявитися особливо корисним показником при включенні в аналіз декількох незалежних змінних, що виражаються в різних одиницях виміру — в такому випадку коефіцієнт відображав би питомий внесок кожної з цих змінних в варіацію залежної змінної. При наявності однієї незалежної змінної коефіцієнт **beta** ідентичний **Multiple R/Множеств. R** — коефіцієнту множинної кореляції.

На вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (рис. 11.10) натиснувши **Summary: Regression results** / **Итоговая таблица регрессии** (1) отримуємо табл. 11.8, де представлена характеристика рівняння регресії і табл. 11.9 з її підсумковою статистикою.

Таблиця 11.8. Сумарна характеристика залежної змінної (рівняння регресії)

N=101	Итоги регрессии для зависимой переменной:Кількість стручків на гілці-2004(Біометрія) R= ,26505053 R2= ,07025179 Скорректир. R2= ,06086039 F(1,99)=7,4804 p<,00739 Станд. ошибка оценки: 4,6441					
	БЕТА	Стд.Ош. БЕТА	В	Стд.Ош. В	t(99)	p-уров.
Св.член			11,62838	5,453650	2,132219	0,035463
Висота рослини-2004	0,265051	0,096909	0,20951	0,076603	2,735040	0,007392

В табл. 11.8 міститься такі результати аналізу:

— **Beta/Бета** — стандартизований коефіцієнт регресії;

— **Std. err. of beta/Ст. Ош. Бета** — стандартна похибка стандартизованого коефіцієнта регресії;

— **B** — один з найважливіших стовпців в цій таблиці, оскільки саме він містить шукані значення вільного члена регресійного рівняння (у рядку **Intercept**) і коефіцієнта регресії (нижня рядок таблиці);

— **Std.err. of B**/**Ст. Ош. B** — стандартна похибка коефіцієнтів рівняння регресії;

— **t(df)**/**t(cc)** — значення *t*-критерію Стюдента, який використовується для перевірки гіпотези про рівність коефіцієнтів рівняння нулю;

— **p-level**/**p-уров.** — ймовірність помилки для нульової гіпотези про рівність коефіцієнтів рівняння нулю.

З табл. 11.8 видно, що хоч обидва коефіцієнта регресії статистично значимо відрізняються від нуля ($p < 0.05$), регресійна модель описує зв'язок між кількістю досліджуваними факторами лише на рівні $R^2 = 7\%$.

Саме ж рівняння записується таким чином (11.40)

$$Z = 0.20951 \cdot H + 11.62838. \quad (11.40)$$

Важливою частиною регресійного аналізу є аналіз залишків, які являють собою різниці між спостережуваними значеннями залежної змінної і тими її значеннями, які передвіщаються регресійною моделлю). Для цього переходимо на вкладку **Residuals/assumptions/prediction** / **Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения** (2) і натисненням кнопки **Perform residual analysis** / **Анализ остатков** потрапляємо на панель **Residual Analysis** / **Анализ остатков** (3) (рис. 11.11).

Таблиця 11.9. Підсумкова статистика рівняння регресії

Статистика	Итоговые статистики; ЗП:Кількість стручків гілці-2004 (Біометрія)
	Значение
Множест. R	0,265051
Множест. R2	0,070252
Скорр. R2	0,060860
F(1,99)	7,480441
p	0,007392
Стд. Ош. Оценки	4,644078




Рис. 11.11. Панель аналізу залишків (вкладка **Quick**/Быстрый)


Спершу потрібно перевірити залишки на нормальність їх розподілу.

На вкладці **Quick** / **Быстрый** (рис. 11.11) при натисканні **Summary: Residuals & predicted** / **Остатки и предсказанные** (1) отримуємо табл. 11.10 передбачуваних значень і залишків, а **Normal plot of residuals** / **Нормальный график остатков** (2) — рис. 11.12. Після цього переходимо на вкладку **Scatterplots**/Диаграммы рассеяния (3).

Якщо точки на цьому графіку досить тісно укладаються уздовж теоретично очікуваної прямій, то можна зробити висновок, що залишки розподіляються нормально (рис. 10.11). Інакше лінійна регресійна модель для аналізованих змінних буде непридатна.

Таблиця 11.10. Залишки по повторностях (рядкам)

Набл. No.	Предсказанные значения и остатки (Биометрия) Зависимая перемен.: Кількість стручків на гілці-2004								
	Наблюд. Значение	Предск. Значение	Остатки	Станд. предск.	Станд. Остатки	Стд.Ош. предск.	Махалан. расст.	Удален. остатки	Кука расст.
1	30,35000	27,42563	2,9244	0,73608	0,62970	0,574801	0,541818	2,9699	0,003132
2	30,05000	25,94857	4,1014	-0,42680	0,88315	0,502818	0,182159	4,1501	0,004681
3	32,20000	29,37410	2,8259	2,27010	0,60849	1,151081	5,153355	3,0109	0,012911
4	33,52632	27,46313	6,0632	0,76560	1,30557	0,583057	0,586143	6,1603	0,013867
96	26,30000	25,47717	0,8228	-0,79793	0,17718	0,592334	0,636699	0,8364	0,000264
97	23,27778	24,75784	-1,4801	-1,36426	-0,31870	0,784189	1,861195	-1,5235	0,001534
98	20,77778	25,82868	-5,0509	-0,52119	-1,08760	0,521655	0,271637	-5,1154	0,007654
99	28,58824	25,30832	3,2799	-0,93086	0,70626	0,632790	0,866506	3,3420	0,004807
100	23,40000	24,88355	-1,4835	-1,26529	-0,31945	0,747545	1,600952	-1,5230	0,001393
101	30,60118	26,21106	4,3901	-0,22015	0,94532	0,473278	0,048465	4,4362	0,004738
Минимум	13,72727	23,86159	-12,9564	-2,06987	-2,78988	0,462152	0,000208	-13,2644	0,000000
Максим.	39,90000	29,48934	12,5267	2,36082	2,69736	1,189789	5,573479	12,7140	0,105961
Среднее	26,49068	26,49068	0,0000	-0,00000	0,00000	0,630979	0,990099	-0,0079	0,010858
Медиана	26,22222	26,31891	0,0079	-0,13523	0,00170	0,568629	0,509098	0,0081	0,003247

Друга умова щодо залишків полягає в тому, що їх дисперсія повинна залишатися незмінною у всьому діапазоні значень аналізованих змінних. Для перевірки цієї умови на закладці **Scatterplots/Диаграммы рассеяния** (рис. 11.11) слід натиснути кнопку  **Predicted vs. residuals/Предсказанные и остатки** (4).

Створюється графік залежності значень залишків від прогнозованих моделлю значень залежної змінної (рис. 11.13). Якщо умова застосування лінійного регресійного аналізу виконується, то точки на цьому графіку будуть розташовуватися хаотично, не проявляючи ніякої закономірності (рис. 11.13). Якщо ж в розташуванні точок є тенденція (розкид збільшується зліва направо, точки тісно укладаються вздовж прямої, і т.п.), лінійний регресійний аналіз також непридатний.




Рис. 11.12. Нормальний ймовірнісний графік залишків






Рис. 11.13. Результати перевірки однорідності дисперсії

У розглянутому прикладі обидві умови відносно залишків виконуються, що ще раз підтверджує адекватність розрахованої регресійної моделі для опису зв'язку між кількістю стручків Z на центральній гілці і висотою H рослини.

Статистичний аналіз Дарбіна–Уотсона автокореляції залишків виконано ранжованими за аргументом рівняння (див. рис. 11.104, с.839).

Запустивши  **Durbin-Watson statistic** /  **Статистика Дарбіна-Уотсона**

(1) (рис. 11.36 на с. 723) одержуємо результати аналізу регресійних залишків функції відклику за методом Дарбіна–Уотсона (табл. 11.11). Вона містить значення статистики d Дарбіна–Уотсона і серіальну кореляцію (тобто кореляцію між сусідніми залишками).

У даному випадку $d=1.824$ (табл. 11.11), а для числа дослідів $n=101$ з повторністю $k=1$ згідно табл. Е.30 становлять $d_{L05(1,101)}=1.65$ і $d_{U05(1,101)}=1.69$, таким чином маємо $d_{U05(1,101)}=1.69 < d=1.824 < 4-d_{U05(3,101)}=2.31$. За рис. 11.105 на с. 839 визначаємо, що автокореляція відсутня.

Про це свідчить і коефіцієнт серіальної кореляції, за табл. 11.11 рівний $r_1=0.0841$, так як він знаходиться у межах від $-1.983971519/\sqrt{100}=-0.197413$ до 0.197413 .

Розрахунки при перевірці інформаційної спроможності моделі наведені в табл. 11.12, дані якої співпадають з даними табл. 11.7 на с. 11.7.

Отримані результати аналогічні табл. 11.7 на с. 684.

Результати, отримані у підрозділах **11.4.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом**, **11.4.1.2 Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ MS Excel**, **11.4.1.3 Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel** і **11.4.1.2 Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії за допомогою ППП Statistica**, співпадають між собою.

Таблиця 11.12. Перевірка інформаційної спроможності моделі

	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н
1	Джерело варіювання	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F	Зростання показника прогнозу θ , %
2	Регресс.	161.435	1	161.4352	7.490586	0.007353	H5=100*(E5^0.5-1)	
3	Остатки	2133.623	99	21.5517	D4=B4/C4 E5=D4/D3 C6=B2/B4			
4	Итого	2295.058	100	22.951				
5	Інформаційна спроможність моделі				1.065	0.377	1.393	3.2
6	Роботоздатність моделі 0.070				F5=F.РАСП.ПХ(E5;C4;C3)		G5=F.ОБР.ПХ(0.05;C4;C3)	

Також співпадає оцінка автокореляції залишків, виконана за критерієм Дарбіна–Уотсона та за коефіцієнтом автокореляції (див. відповідно підрозді-

Таблиця 11.11. Статистичний аналіз Дарбіна–Уотсона

	Durbin-Watson d (R-Біома) and serial correlation of residuals	
	Durbin-Watson d	Serial Corr.
Estimate	1.823920	0.084072

ли **11.12.1** Визначення критерію Дарбіна–Уотсона і **11.12.2** Використання коефіцієнта автокореляції першого порядку.

Викладена у підрозділі **11.4** Визначення лінійної функціональної залежності при активному і пасивному експерименті методика визначення і оцінки коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії може бути використана для обробки даних при процесах, лінійно чи нелінійно нестационарних за математичним очікуванням.

11.5. ОДНОФАКТОРНЕ НЕЛІНІЙНЕ РІВНЯННЯ

11.5.1. Отримання коефіцієнтів рівняння однофакторної нелінійної залежності з використання ППП Statistica

В якості прикладу використаємо результати досліджень при визначенні залежності швидкості V_s витання часток стебел кукурудзи від їхньої довжини l , виконані Ю. В. Хоменком¹⁷⁾. У табл. 11.13 представлені отримані ним експериментальні та оброблені данні.

Таблиця 11.13 – Залежність швидкості витання часток від довжини

Довжина часток l , мм	0	10	20	40	60
Експериментальна швидкість витання V_{s2} , м/с	0	7.1	10.1	12.5	12.7
Розрахункова швидкість витання V_s , м/с	0	7.32	9.94	12.11	13.06

Побудувавши діаграму рис. 11.14 засобами пакету **Excel**, аналогічно представлений на рис. 15.3 (с. 958), і отримавши лінії тренду для типів рівнянь, наявних у даній програмі (див. рис. рис. 11.6 на с. 687 та рис. 16.9, с. 997), які подано в табл. 11.14, бачимо, що ці рівняння (за винятком степеневого) достовірно не описують аналізовані числові закономірності.

Автор досліджень пропонує для функціональної залежності використати параболу, подавши її у вигляді, наведеному у виразі (11.41) і представлену також на рис. 11.14

$$V_s = \frac{l}{a + b \cdot l}, \quad (11.41)$$

¹⁷⁾ Хоменко Ю. В. Скорость витания частиц измельченной растительной массы / Технологические свойства кукурузы и измельченной массы силосных культур // Труды ВИСХОМ. – Вып.41. – М., 1963. – С.33–44.

де a і b – емпіричні коефіцієнти, за дослідженнями автора воно відповідно дорівнюють $a = 0.52$ і $b = 0.068$.

Таблиця 11.14. Рівняння залежності швидкості витання часток стебел кукурудзи від їх довжини

Характер залежності	Вигляд рівняння	Коефіцієнт детермінації
1 Параболічна	$V_s = -0.0064 \cdot l^2 + 0.573 \cdot l + 0.8426$	$R^2 = 0.9683$
2 Логарифмічна	$V_s = 0.8846 \cdot \ln l + 7.7951$	$R^2 = 0.8965$
3 Степенева	$V_s = 3.8119 \cdot l^{0.3063}$	$R^2 = 0.9924$
4 Лінійна	$V_s = 0.1865 \cdot l + 3.6319$	$R^2 = 0.7306$
5 Експонентна	$V_s = 0.0297 \cdot e^{0.1362 \cdot l}$	$R^2 = 0.4028$




Рис. 11.14. Графічні представлення рівнянь залежності швидкості витання часток стебел кукурудзи від їх довжини:

1 – параболічна; 2 – логарифмічна; 3 – степенева; 4 – лінійна;
5 – експонентна; 6 – розрахункові значення

При застосуванні **ППП Statistica** для визначення функціональної залежності за експериментальними даними слід використати метод, описаний у підрозділі **11.13 Побудова двовимірних поверхонь** і проілюстрований на рис. 11.108 (с. 846). Приймаючи до уваги, що рівняння (6) за аналогією з (11.41) повинно бути представлено виразом $v_2 = v_1 / (a_0 + a_1 \cdot v_1)$ (рис. 11.15).

Для отримання його графічного представлення на панелі

Результаты: Швидкість витання слід виконати процедуру Fitted 2D function & observed vals / Подогнанная 2D функция и наблюдаемые значения (10).




Рис. 11.15. Визначення коефіцієнтів функціональної залежності

Отриманий у результаті цього рис. 11.16 містить також і одержане рівняння, яке має вигляд

$$V_s = \frac{l}{0.7197 + 0.0646 \cdot l} = 15.4799 \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + 0.0898 \cdot l} \right). \quad (11.42)$$

Таким чином отримані нами значення $a = 0.7197$ і $b = 0.0646$ дещо відрізняються від наведених автором $a = 0.52$ і $b = 0.068$.

Коефіцієнт кореляції рівняння (11.42) становить $R = 0.9984$ (рис. 11.15), тобто $R^2 = 0.9968$, тобто він вище цього показника у всіх рівнянь, отриманих за допомогою пакету **Excel** (табл. 11.14), а також рівняння отриманого Ю. В. Хоменком, величина коефіцієнту детермінації якого становить $R^2 = 0.9462$.




Рис. 11.16. Графічні представлення рівняння (11.42) залежності швидкості витання часток стебел кукурудзи від їх довжини

Далі натисненням кнопки **Summary** / **OK** (11) чи запуском процедури **Summary: Parameter estimates** / **Оценки параметров модели** (11) виконується перевірка коефіцієнтів рівняння за критерієм Стюдента, результати якої подано в табл. 11.15, а процедурою **Analysis of Variance** / **Дисперсионный анализ** (12) — ДА отриманого рівняння, результати якого представлені у табл. 11.16. За даними табл. 11.15 і 11.16 обидва коефіцієнти рівняння і саме рівняння значуще на прийнятому рівні $\alpha = 0.05$.

Таблица 11.15. Оцінка параметрів рівняння

Модель: $v2 = v1 / (a0 + a1 * v1)$ (Швидкість витання)						
Зав. Пер. : Var2						
Уров. значимости: 95.0% (альфа=0.050)						
ая	Оценка	Стандарт ошиб.	t-знач. сс = 3	p-уров.	Ниж. Дов Предел	Вер. Дов Предел
a0	0.719687	0.070870	10.15500	0.002035	0.494147	0.945228
a1	0.064591	0.002436	26.51331	0.000118	0.056838	0.072344

Таблица 11.16. Дисперсійний аналіз рівняння

Эффект	Модель: $v_2=v_1/(a_0+a_1*v_1)$ (Швидкість витання) Зав. Пер. : Var2				
	1	2	3	4	5
	Сум. квадратов	СС	Сред. квадраты	F-знач.	p-знач.
Регрессия	469.6051	2.000000	234.8026	1985.010	0.000021
Остатки	0.3549	3.000000	0.1183		
Сумма	469.9600	5.000000			
Привед. сумма	110.4063	4.000000			
Регрессия с Приведенной Суммой	469.6051	2.000000	234.8026	8.507	0.036234

У результаті виконання процедури / (13) маємо табл. 11.17 з одержаними і очікуваними даними та результатами розрахунку залишків.

При виконанні у вкладці **Advanced/Дополнительно** панелі / (рис. 11.15) процедури / і / у отримуємо табл. 11.18.

Таблица 11.17. Отримані і очікувані дані та дані залишків

	Модель: $v_2=v_1/(a_0+a_1*v_1)$ (Швидкість витання) Зав. Пер. : Var2		
	Наблюд.	Предсказанные	Остатки
1	0.00010	0.00014	-0.000039
2	7.10000	7.32282	-0.222817
3	10.10000	9.94282	0.157182
4	12.50000	12.10904	0.390959
5	12.70000	13.05730	-0.357296

Таблица 11.18. Кореляційні (а) і коваріаційні (б) показники параметрів

	Модель: $v_2=v_1/(a_0+a_1*v_1)$ (Швидкість витання) Зав. Пер. : Швидкість витання V_s , м/с	
	a_0	a_1
a_0	1.000000	-0.827479
a_1	-0.827479	1.000000

а)

	Модель: $v_2=v_1/(a_0+a_1*v_1)$ (Швидкість витання) Зав. Пер. : Швидкість витання V_s , м/с	
	a_0	a_1
a_0	0.005023	-0.000143
a_1	-0.000143	0.000006

б)

Для візуальної оцінки адекватності моделі перейшовши на вкладку / панелі / (рис. 11.17) виконанням процедур / (1), / / (2) / (3), / / (4) і / / (4) отримуємо відповідні оціночні графіки (рис. 11.18–11.22).




Рис. 11.17. Аналіз залишків

З рис. 11.18, який представляє розподіл залишків на нормальному ймовірнісному папері, видно, що дані досить добре укладаються на прямій, яка відповідає нормальному закону статистичного розподілу, що підтверджує його для даної вибірки.




Рис. 11.18. Нормальний ймовірнісний графік розподілу залишків




Рис. 11.19. Півнормальний ймовірнісний графік розподілу залишків




Рис. 11.20. Розподіл частот отриманих залишків




Рис. 11.21. Спостережувані і передбачувані значення залишків




Рис. 11.22. Розподіл залишків по площині

11.5.2. Трансформація нелінійно пов'язаних ознак

Багато ознак та явищ матеріального світу проявляють нелінійний характер зв'язку, тому для розрахунком рівняння залежності між подібними змінними іноді в таких випадках допомагає певна трансформація вихідних даних. Вона дозволяє перевести їх в іншу шкалу вимірювання і тим самим “вирівняти” нелінійну залежність між ознаками.

У табл. 11.13 на с. 697 експериментальні результати досліджень при визначенні залежності швидкості V_s витання часток стебел кукурудзи від їхньої довжини l . Необхідно отримати рівняння, що описує зв'язок між цими ознаками.

Характер зв'язку між двома змінними можна перевірити ще до запуску модуля регресійного аналізу. Наприклад, з табл. 11.14 на с. 698 і рис. 11.14 на с. 698, видно, що зв'язок між швидкістю V_s витання часток стебел кукурудзи і їхньою довжиною l далекий від лінійного, тому лінійний регресійний аналіз тут непри-

The screenshot shows the STATISTICA software interface. At the top is a data table with columns: 1 (Довжина часток l, мм), 2 (Швидкість витання V_s , м/с), 3 (ln(l)), 4 (Var4), 5 (Var5), 6 (Var6), 7 (Var7). The first three rows of data are visible. Below the table, the 'Variable 3' dialog box is open, showing the 'Name' field set to 'ln(l)' and the 'Type' set to 'Double'. The 'STATISTICA' dialog box is also open, displaying a warning message: 'Expression OK. Proceed? Note that values which cannot be calculated (e.g., =Sqrt(v2-1), =1/v2, when v2=0) will be converted to missing data values (MD). Also, if any argument of a formula for a given case is MD, then the entire formula will produce MD.' The 'Long name (label or formula with Functions)' field contains '=Log(v1)'. The 'Function guide' checkbox is checked.

Рис. 11.23. Введення логарифмів аргументам і функції відклику

Таблиця 11.19. Залежність швидкості витання часток від їх довжини

	1 Довжина часток l, мм	2 Швидкість витання V_s , м/с	3 ln(l)	4 ln(V_s)
1	0.0001	0.0001	-9.21034	-9.21034
2	10	7.1	2.302585	1.960095
3	20	10.1	2.995732	2.312535
4	40	12.5	3.688879	2.525729
5	60	12.7	4.094345	2.541602

змінним так званих *довгих імен* (*Long name*) у вигляді формул (див. рис. 11.107 на с. 845 і рис. 11.108 на 846).

датний.

Однак логарифмічні, ступеневі і експоненціальні залежності легко можна привести до лінійним шляхом логарифмування значень:

- незалежної змінної – для логарифмічних;
- обох змінних – для степеневих;
- залежної змінної – для експоненціальних.

Така трансформація в ППП **Statistica** виконується привласнюванням новим

Процес логарифмування обох аналізованих ознак подано на рис. 11.23. Клацнувши два рази по заголовку стовпця (у даному разі третього) (4), отримуємо панель **Variable/Переменная** налаштувань властивостей змінної. У її полі **Long name (label or formula with Functions)/Длинная метка или формула с Функциями** (1) слід ввести формулу **=log(v1)** (3), де **log** – функція натурального логарифма, **v1** – стовпець з даними (аргументом). У полі **Name/Имя** (4) введемо коротке ім'я змінної, наприклад **ln(I)** (5). Після натискання на кнопку **ОК** (6) з'явиться панель попередження де слід натиснути кнопку **Да** (7).

Аналогічні дії виконуємо і з стовбцем 4. У результаті отримуємо, що натуральний логарифм стовпця 1 розташовано і стовбці 3, стовпця 2 — в стовпці 4 (табл. 11.19).

Інші налаштування на панелі **Variable/Переменная** див на рис. 11.50, с. 737.




Рис. 11.24. Діаграма розсіювання логарифмованих значень аналізованих ознак

З діаграми розсіювання для логарифмованих значень бачимо, що точки тісно укладаються уздовж прямої лінії і ми можемо застосувати звичайний регресійний аналіз для знаходження залежності між ознаками (рис. 11.24). Регресійне рівняння для логарифмованих змінних запишеться у вигляді

$$\ln(V_s) = -0.6835 + 0.9163 \cdot \ln(I). \quad (11.43)$$

Тобто отримана степенева залежність

$$V_s = e^{-0.6835} \cdot I^{0.9163} = 0.504847 \cdot I^{0.9163}. \quad (11.44)$$




Рис. 11.25. Порівняння степеневих залежностей

Для порівняння степеневих залежностей, отриманих за виразом (11.44) і побудовою лінії тренду (табл. 11.14 на с. 698) побудуємо діаграму з наведенням експериментальних точок (рис. 11.25).

З неї видно надто низку точність результатів, отриманих трансформацією нелінійно пов'язаних ознак порівняно з безпосередніми визначеннями за допомогою **MS Excel** і **ППП Statistica**, які описані у підрозділі **11.5.1 Отримання коефіцієнтів рівняння однофакторної нелінійної залежності з використання ППП Statistica**.

Необхідно відзначити, що процедура трансформації вихідних даних часто застосовується не тільки для “вирівнювання” нелінійних зв'язків між ознаками. Часто логарифмування чи інші поширені способи трансформації дозволяють привести асиметрично розподілені дані до нормального розподілу, а також домогтися однорідності дисперсії в групах, що підлягають аналізу з використанням параметричних методів [120].

11.5.3. Аналіз двозонних кривих

Досить часто нелінійні регресійні рівняння, отримані за експериментальними даними, не має точок екстремуму (мінімуму чи максимуму). Як правило їх можна розбити на дві ділянки, які наближаються до прямолінійності, — швидко зростаючу (від точки **A** до **C**) і повільно зростаючу (від точки **C** до **B**) для кривої опуклого вигляду (рис. 11.26) і повільно зростаючу та швидко зростаючу для кривої увігнутого виду [115].

Розглядаючи хорду **AB**, яка стягує крайні точки кривої **ABC**, як ординату координатної осі, повернутої відносно старої осі координат проти годинникової стрілки на кут α (рис. 11.26), бачимо, що у новій координатній осі досліджувана функціональна залежність має екстримум.

Таким чином точка переходу від швидко зростаючої ділянки до повільно зростаючої визначається як точка дотичної, паралельної хорді **AB**. У цьому разі її координати можна знайти з виразу

$$\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = f'(x), \quad (11.45)$$

де x_A, x_B, y_A, y_B – абсциси і ординати початкової і кінцевої точки;
 $f'(x)$ – похідна регресійної функції.

Для розглянутого прикладу згідно рис. 11.26 використовуючи дані табл. 11.17 та похідну виразу (11.42) знаходимо величину l

$$\frac{15.4799 \times 0.0898}{(1 + 0.0898 \times l)^2} = \frac{13.0573 - 0.00014}{60 - 0}.$$




Рис. 11.26. Визначення зон у залежності швидкості витання часток стебел кукурудзи від їх довжини

Координати точки **C** становлять $l=17.010$ мм і $V_s=9.355$ м/с.

Таким чином можна записати при збільшенні довжини часток силосу до 17 мм швидкість витання інтенсивно зростає до 9.36 м/с, подальше збільшення часток до 60 мм зростання швидкості до 12.7 м/с відбувається з меншою інтенсивністю.

11.6. РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ПАСИВНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

11.6.1. Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ ПА MS Excel

Інструмент аналізу РЕГРЕССИЯ ПА Excel виконує розрахунки лише для *лінійної* регресії. Розглянемо його застосування на прикладі аналізу контрольованого некерованого масиву даних, як багатофакторного експерименту розглянуто аналіз досліджень біометричних показників рослин рижю ярого, виконаних у 2004 р. (табл. 11.20). За результатами досліджень показники 101 сортозразка лежать у межах: висота рослини H від 58.4 до 85.3 см, висота штамбу S від 3.3 до 34.9 см; кількість гілок K від 3.8 до 12.4 шт. і кількість стручків на центральній гілці Z від 13.7 до 39.9 шт. (див. табл. 2.17, с. 111).

Наведемо методику для регресійного аналізу пасивного багатофакторного експерименту, а також активного за матрицями першого порядку.

Зазвичай перед багатофакторним регресійним аналізом виконується кореляційний аналіз, наведений в табл. 9.10 на с. 507. З коефіцієнтів кореляції між функцією і аргументами бачимо, що згідно вимог, наведених на с. 660 всі взаємозалежності не придатні для регресійного аналізу, проте ми виконуємо його лише з метою демонстрації способу.

З них найбільше кількість стручків на центральній гілці Z залежить від висота штамбу S , тому для статистичної обробки матрицю даних слід ранжувати саме за цим фактором (див. с. 838).

Порядок дії й отримані результати наведено на полі рис. 11.2 на с. 681.

Таблиця 11.20. Оцінка попередніх даних та рівняння регресії

№ п.п.	№ ділянки	Висота рослини	Висота штамбу	Кількість гілок	Кількість стручків	Розрахунок U_T	Різниця $y-y_T$	Різниця залишків	Перша різниця із середнім	Друга різниця із середнім	Добуток різниць із середнім	
1	134	74.5	3.3	8.3	22.2	25.1	-2.9					
2	19	80.6	5.7	9.2	35.3	26.9	8.4	11.3	8.3	-2.9	-24.5	
3	133	59.8	5.8	10.9	20.9	27.3	-6.4	-14.8	-6.5	8.4	-54.1	
4	131	66.0	6.1	8.3	24.7	25.2	-0.5	5.9	-0.6	-6.4	3.6	
5	142	77.6	6.3	6.8	26.6	24.5	2.1	2.6	2.1	-0.5	-1.1	
96	73	75.4	24.4	9.3	30.4	30.9	-0.6	-2.2	-0.6	1.6	-1.0	
97	54	77.1	27.0	7.0	37.1	29.4	7.7	8.3	7.7	-0.6	-4.5	
98	64	79.3	28.0	6.0	30.1	28.8	1.4	-6.4	1.3	7.7	10.4	
99	9	85.3	32.6	7.7	31.6	31.8	-0.2	-1.6	-0.3	1.4	-0.4	
100	4	83.8	34.6	7.5	29.8	32.0	-2.2	-2.0	-2.2	-0.2	0.5	
101	8	84.7	34.9	8.1	32.2	32.7	-0.5	1.7	-0.6	-2.2	1.3	
					Сума квадратів		1875.4	3753.9	1866.7	1875.1		
					Сума добутків						-6.000	
Обсяг вибірки n		101						Емпіричний критерій d		2.002		
Нижня довірча межа $x_{н.дов.}$		58.9	14.5	7.4	17.0			-6.0	Нижня межа істотності d_L		1.610	
Мінімальне значення x_{min}		58.4	3.3	3.8	13.7			-11.2	Верхня межа істотності d_U		1.740	
Середнє значення x_{cp}		70.9	14.5	7.4	26.5			0.0	$4-d_U$		2.260	
Максимальне значення x_{max}		85.3	34.9	12.4	39.9			12.3	$4-d_L$		2.390	
Верхня довірча межа $x_{в.дов.}$		83.0	14.5	7.4	36.0			6.0	Коефіцієнт автокореляції r_1		-0.0008	
Довірча значущість α		0.05						Нижня межа коеф. автокор.		-0.1974		
Середньоквадрат. відхил s		6.063	5.978	1.380	4.791		3.010	Коефіцієнт автокореляції r_1		-0.0032		
Критерій Стюдента $t_{\alpha, n-1}$		1.984						Верхня межа коеф. автокор.		0.1974		
Коефіцієнт варіації V		8.5	41.4	18.8	18.1			Асиметрія As		0.179		
Асиметрія As		0.244	1.096	0.710	-0.124			Оцінка нормальності		Нормальн.		
Похибка асиметрії s_{As}		0.238										
Оцінка нормальності		Нормальн.	Ні	Ні	Нормальн.							

Результати аналізу представлені у табл. 11.21 і на рис. 11.27.

Таблиця 11.21. Представлення результатів регресійного аналізу

ВЫВОД ИТОГОВ					
Регрессионная статистика					
Множественный R	0.427611				
R-квадрат	0.182851				
Нормированный R-квадрат	0.157579				
Стандартная ошибка	4.397052				
Наблюдения	101				

Дисперсионный анализ					
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	3	419.65446	139.885	7.235149	0.000197127
Остаток	97	1875.404	19.3341		
Итого	100	2295.0585			

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95.0%	Верхние 95.0%
У-пересечение	11.20929	5.3516244	2.09456	0.038817	0.587800824	21.83079	0.5878	21.83079
Висота рослини	0.065011	0.0832658	0.78077	0.43684	-0.100248325	0.230271	-0.1002	0.230271
Висота штамбу	0.227606	0.0824464	2.76066	0.006899	0.063972969	0.39124	0.06397	0.39124
Кількість гілок	1.00335	0.3376412	2.97164	0.003735	0.333225495	1.673474	0.33323	1.673474

У верхній частині табл. 11.21 **Регрессионная статистика** подано аналіз впливу факторів на результат експерименту.

Її дані розраховані за формулами, представленими в табл. 11.5 на с. 683, а опис аналогічний опису табл. 11.4 на с. 682.

У нашому разі має місце **Значимость F** більша за прийнятий рівень значущості α , таким чином рівняння регресії значуще.

Також для **висоти рослини** **t-статистика** менша за прийнятий рівень значущості α , що свідчить про незначущість цього показника.

Таким чином, отримане рівняння за цією умови має вигляд (11.46)

$$Z=11.209+0.065H+0.228S+1.003K. \quad (11.46)$$

Рівняння регресії (11.46) має статистично незначущий показник “Висота рослини”. Так як план досліджу не ортогональний, слід провести регресійний аналіз ще раз лише для значущих факторів (табл. 11.22).

Таблиця 11.22. Оцінка попередніх даних та рівняння регресії

№ п.п.	№ ділянки	Висота рослини	Висота штамбу	Кількість гілок	Кількість стручків	Розрахунок y_T	Різниця $y-y_T$	Різниця залишків	Перша різниця із середнім	Друга різниця із середнім	Добуток різниць із середнім		
1	134	74.5	3.3	8.3	22.2	24.6	-2.5						
2	19	80.6	5.7	9.2	35.3	26.2	9.1	11.6	9.1	-2.5	-22.3		
3	133	59.8	5.8	10.9	20.9	28.1	-7.2	-16.3	-7.2	9.1	-65.8		
4	131	66.0	6.1	8.3	24.7	25.4	-0.7	6.5	-0.7	-7.2	5.2		
5	142	77.6	6.2	6.8	26.6	23.8	2.8	2.5	2.8	0.7	2.0		
6	50	70.0	20.0	7.0	31.2	20.7	10.0	1.0	1.0	0.1	0.0		
96	73	75.4	24.4	9.3	30.4	31.1	-0.7	-2.5	-0.8	1.8	-1.4		
97	54	77.1	27.0	7.0	37.1	29.3	7.8	8.5	7.8	-0.7	-5.7		
98	64	79.3	28.0	6.0	30.1	28.5	1.6	-6.2	1.6	7.8	12.6		
99	9	85.3	32.6	7.7	31.6	31.4	0.2	-1.5	0.1	1.6	0.2		
100	4	83.8	34.6	7.5	29.8	31.8	-2.0	-2.1	-2.0	0.2	-0.3		
101	8	84.7	34.9	8.1	32.2	32.5	-0.3	1.7	-0.3	-2.0	0.6		
						Сума квадратів	1887.2	3819.8	1881.1	1887.1			
						Сума добутоків					-25.766		
Обсяг вибірки n		101							Емпіричний критерій d		2.024		
Нижня довірча межа $x_{н.дов.}$		58.9	14.5	7.4	17.0				-5.8	Нижня межа істотності d_L		1.630	
Мінімальне значення x_{min}		58.4	3.3	3.8	13.7				-11.3	Верхня межа істотності d_U		1.720	
Середнє значення x_{cp}		70.9	14.5	7.4	26.5				0.0	$4-d_U$		2.280	
Максимальне значення x_{max}		85.3	34.9	12.4	39.9				12.5	$4-d_L$		2.370	
Верхня довірча межа $x_{в.дов.}$		83.0	14.5	7.4	36.0				5.8	Коефіцієнт автокореляції r_1		-0.0120	
Довірча значущість α		0.05									Нижня межа коеф. автокор.		-0.1974
Середньоквадрат. відхил s		6.063	5.978	1.380	4.791		2.947			Коефіцієнт автокореляції r_1		-0.0137	
Критерій Стюдента $t_{\alpha, n-1}$		1.984									Верхня межа коеф. автокор.		0.1974
Коефіцієнт варіації V		8.5	41.4	18.8	18.1						Асиметрія As		0.167
Асиметрія As		0.244	1.096	0.710	-0.124						Оцінка нормальності		Нормальн.
Похибка асиметрії s_{As}		0.238											
Оцінка нормальності		Нормальн.	Ні	Ні	Нормальн.								

З огляду на те, що пасивний експеримент не є ортогональним, слід не використовувати кореговане рівняння (11.46), а провести регресійний аналіз ще раз лише для значущих факторів (табл. 11.22).

Результати аналізу представлені у табл. 11.23.

Таблиця 11.23. Представлення результатів регресійного аналізу

Вывод итогов					
Регрессионная статистика					
Множественный R	0.421564				
R-квадрат	0.177716				
Нормированный R-квадрат	0.160935				
Стандартная ошибка	4.388285				
Наблюдения	101				

Дисперсионный анализ					
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия	2	407.868436	203.934	10.59011	6.85602E-05
Остаток	98	1887.19004	19.257		
Итого	100	2295.05848			

	Кoeffициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%	Нижние 95.0%	Верхние 95.0%
Y-пересечение	14.80302	2.72477059	5.43276	4.05E-07	9.395798948	20.21024	9.3958	20.21024
Висота штабу	0.255971	0.07386296	3.46549	0.000787	0.109392778	0.40255	0.10939	0.40255
Кількість гілок	1.08604	0.31996152	3.39428	0.000994	0.451087237	1.720994	0.45109	1.720994

Отримане на її основі рівняння є неадекватним ($p \geq \alpha$) і має вигляд

$$Z=14.803+0.256S+1.086K. \quad (11.47)$$

Розрахунки перевірки інформаційної спроможності моделі та визначення її роботоздатності (див. с. 682) наведені в табл. 11.24.

Таблиця 11.24. Перевірка інформаційної спроможності моделі

Джерело варіювання	Число ступенів вільності <i>df</i>	Сума квадратів <i>SS</i>	Середній квадрат <i>MS</i>	Критерій Фішера <i>F</i>	Рівень значущості <i>p</i>	Табличний критерій Фішера <i>F</i>	Зростання показника прогнозу θ , %
Регрессия	2	407.8684	203.9342	10.5901	6.856E-05		
Остаток	98	1887.19	19.25704				
Итого	100	2295.058	22.951				
Інформаційна спроможність моделі				1.192	0.192	1.395	9.2
Роботоздатність моделі		0.178					

Роботоздатність моделі становить лише $R=0.178$.

Так як має місце $F_{\text{ін}} \geq F_{\text{т}}$, нульова гіпотеза відхиляється. Це свідчить, що модель інформаційно спроможна і описує результати експерименту лише на 9.2 % краще за найпростішу модель — пряму лінію.

За результатами розрахунків маємо $d_{\Phi}=2.024$ (табл. 11.22), а для числа дослідів $n=101$ і число незалежних змінних першого порядку рівняння регресії (без постійного члена) $k=2$ згідно табл. Е.30 становлять $d_{L_{05}(2, 101)}=1.63$ і $d_{U_{05}(2, 101)}=1.72$, таким чином маємо $d_{U_{05}(2, 101)}=1.72 < d_{\Phi}=2.024 < 4 \cdot d_{U_{05}(2, 101)}=6.88$.

$=2.28$ — автокореляція відсутня. За рис. 11.105 на с. 839 визначаємо, що автокореляція також відсутня.





Рис. 11.27. Графічне представлення оцінки результатів регресійного аналізу.

Про це свідчить і коефіцієнти серіальної кореляції, за табл. 11.3, розраховані двома способами, вони становлять $r_1=0.0120$ і $r_1=-0.0137$, так як вони знаходяться у межах від $-1.984/\sqrt{101} = -0.1974$ до 0.1974 .

11.6.2. Визначення і оцінка коефіцієнтів лінійної регресії з використанням ППП Statistica

Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії розглянутого у підрозділі **11.6.1 Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ ПА MS Excel** прикладу виконаємо із застосуванням ППП Statistica.

Дані таблиці, наведеній в табл. 11.20, слід вставити у таблицю ППП Statistica і перейменувати та форматувати колонки відповідно до її головки, як це представлено на див. рис. 2.5, с. 102.

У меню **Statistics / Аналіз** (1) слід вибрати модуль **Multiple Regression / Множественная регрессия** (2) у результаті чого виникає панель вибору установок і процедур **Multiple Linear Regression / Множественная регрессия** (рис. 11.28).




Рис. 11.28. Вибір дії для отримання вихідного параметра і регресорів.

У вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (3) указуємо розташування даних **Input file: Raw Data** / **Файл данных Исходные данные** (4), у разі неорганізованого масиву даних — слід задати представлення ☒ **Review descriptive statistics, correlation matrix** / ☒ **Описательные статистики, матрицы корреляций** (5) і не відмічати ☐ **Advanced options (stepwise or ridge regression)** / ☐ **Пошаговая или гребневая регрессия** (6). Далі натискаємо ☒ **Variables** / ☒ **Переменные** (7) і на панелі ☒ **Select dependent and independent variable lists** / **Списки зависимых и независимых переменных** вибираємо **Dependent var. (or list for batch)** / **Зависимые переменные** (8) і **Independent variable list** / **Независимые переменные** (9) фактори і повернутися на панель ☒ **Multiple Linear Regression** / ☒ **Множественная регрессия** натиснувши **ОК** (10). Ще раз на ній натиснути **ОК** (11) для переходу на панель ☒ **Multiple Regression Results** / ☒ **Результаты множественной регрессии** (рис. 11.29).




Рис. 11.29. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка **Quick** / **Быстрый**)

У верхній інформаційній частині цієї панелі подана коротка інформація по виконаному аналізу із критерієм Фішера, знайденим за перевіркою моделі на адекватність. У середній частині представлені бета-коефіцієнти (β -коефіцієнти полінома — стандартизовані еквіваленти коефіцієнтів B , тобто b), причому значущі на заданому рівні **Alpha for highlighting effects: .05** / **Выделяемый уровень значимости: .05** (1) як завжди представлено червоним кольором.

У вкладці **Quick** / **Быстрый** виконання процедури **Summary: Regression results** / **Итоговая таблица регрессии** (2) (рис. 11.29) видає табл. 11.25, де представлена характеристика рівняння регресії і табл. 11.26 з її підсумковою статистикою. Значущі за критерієм Стюдента коефіцієнти рівнянь відмічені червоним кольором. Після чого переходимо на вкладку **Advanced** / **Дополнительно** (3).

Одна з переваг β -коефіцієнтів у порівнянні з B -коефіцієнтами (b) полягає у тому, що вони дозволяють оцінювати відносні внески кожної незалежної змінної у передбачення залежної змінної.

Таблиця 11.25. Сумарна характеристика залежної змінної (рівняння регресії)

N=101 Св.член	Итоги регрессии для зависимой переменной: Количество стручков на гилце R= .42754138 R2= .18279163 Скоррект. R2= .15751714 F(3,97)=7.2323 p<.00020 Станд. ошибка оценки: 4.3986					
	БЕТА	Ст.Ош. БЕТА	В	Ст.Ош. В	t(97)	p-знач.
Висота рослини-2004	0.082082	0.105375	0.06488	0.083295	0.778954	0.437903
Висота штамбу-2004	0.284044	0.102885	0.22770	0.082476	2.760792	0.006896
Кількість гілок-2004	0.289079	0.097267	1.00383	0.337761	2.972023	0.003731

як і в частинних кореляціях.

Для того щоб підставити нові значення в отриману модель, тобто побудувати передбачення (у масштабі вихідних змінних), використовуються **B**–коефіцієнти (**b**).

У колонці **B** табл. 11.25 представлено вільний член і коефіцієнти рівняння регресії — математичної моделі.

Результати табл. 11.25 і 11.26 тотожні з результатами табл. 11.21 на с. 711.

Кількість значущих цифр її коефіцієнтів визначається за кількістю значущих цифр їхніх стандартних похибок (колонка

Ст.Ош.В чи **Std.Err.of b**) за правилами, наведеними в підрозділі **5.16 Правила подання результатів вимірювань**

$$Z = 11.215 + 0.0649H + 0.228S + 1.004K. \quad (11.48)$$

Характеристики рівняння регресії (верхні частини рис. 11.29 і табл. 11.25) та подані у табл. 11.26 визначені з урахуванням незначущого коефіцієнта рівняння регресії.

Тому краще зразу отримавши за рис. 11.29 не виконувати подальші дії, а виключити із списку Independent variable list/Независимые переменные (9) на рис. 11.28 незначущий коефіцієнт рівняння регресії і отримати нове рівняння уже без нього (рис. 11.30).

Виконуючи дії за рис. 11.30 отримуємо табл. 11.27, де представлена характеристика рівняння регресії і табл. 11.28 з її підсумковою статистикою.

Результати табл. 11.27 і 11.28 тотожні з результатами табл. табл. 11.23 на с. 713.

За колонкою **B** табл. 11.27 маємо вільний член і коефіцієнти рівняння регресії — математичної моделі

$$Z = 14.802 + 0.256S + 1.086K. \quad (11.49)$$

Таким чином, **β**–коефіцієнти слід трактувати із точки зору відносного впливу кожного предиктора на залежну змінну. Їхня інтерпретація така ж,

Таблиця 11.26. Підсумкова статистика рівняння регресії

Статистика	Итоговые статистики; ЗП:Кількість стручків на гилці-2004 (Біометрія)
	Значение
Множест. R	0.427541377
Множест. R2	0.182791629
Скоррект. R2	0.157517144
F(3,97)	7.23225911
p	0.000197797708
Стд. Ош. Оценки	4.39860483

Характеристики рівняння регресії (верхні частини рис. 11.29 і табл. 11.25) та подані у табл. 11.26 визначені з урахуванням незначущого коефіцієнта рівняння регресії.




Рис. 11.30. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка **Quick**/Быстрый)

Критерій Фішера становить $F=10.587$ з розрахунковим значенням $p < 0.000069$, він менше 0.05, що свідчить про адекватність моделі. Це підтверджує і те, що розрахункове значення *більше табличного*, яке дорівнює $F_{05}(9; 91)$, розрахований за статистичною функцією MS Excel **F.ОБР.ПХ(0.05;3;97)** становить 2.698. Про це також свідчить $p = 0.0000687 < \alpha = 0.05$.

Дані з табл. 11.25 і 11.27 можна копіювати і вставляти як текст для представлення рівняння регресії (11.48) чи (11.49).

У вкладці **Advanced**/Дополнительно (рис. 11.31) розміщена кнопка процедури

Итоги регрессии для зависимой переменной: Кількість стручків на гілці-2						
R= .42152070 R2= .17767970 Скоорект. R2= .16089765 F(2,98)=10.587 p<.00007 Станд. ошибка оценки: 4.3898						
N=101	БЕТА	Ст.Ош. БЕТА	В	Ст.Ош. В	t(98)	p-знач.
Св.член			14.80195	2.725694	5.430524	0.000000
Висота штамбу-2004	0.319358	0.092172	0.25601	0.073888	3.464800	0.000789
Кількість гілок-2004	0.312845	0.092172	1.08636	0.320070	3.394132	0.000995

Таблиця 11.28. Підсумкова статистика рівняння регресії

Статистика	Итоговые статистики; ЗП:Кількість стручків на гілці-2004 (Біометрія)
Множест. R	0.421520699
Множест. R2	0.177679699
Скоррект. R2	0.160897652
F(3,97)	10.5874867
p	0.0000687083884
Стд. Ош. Оценки	4.38977113

ANOVA (Overall goodness of fit)
/ Дисперсионный анализ

(1), натисненням якої одержуємо табл. 11.29, де представлено дані ДА перевірки моделі на адекватність за кри-

терієм Фішера. Представлення даних червоним кольором свідчить про адекватність моделі із прийнятим рівнем значущості.

Дані табл. 11.29 дають змогу перевірити *інформаційну спроможності моделі* [151].




Рис. 11.31. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка **Advanced**/Дополнительно)

Перевірка нульової гіпотези $H_0: s_c^2 = s_{na}^2$ викладена на с. 673.

Розрахунки при перевірці інформаційної спроможності моделі наведені в табл. 11.30.

Отримані результати аналогічні табл. табл. 11.23 на с. 713.

Таблиця 11.29. Дисперсійний аналіз (розрахунок критерію Фішера)

Эффект	Дисперсионный анализ; ЗП: Кількість стручків на гілці-2004 (Біометрія)				
	Сумма квадр.	сс	Средн. квадр.	F	p-знач.
Регресс.	408.044	2	204.0218	10.58749	0.000069
Остатки	1888.469	98	19.2701		
Итого	2296.513				

Таблиця 11.30. Перевірка інформаційної спроможності моделі

Остаток	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F	Зростання показника прогнозу θ , %
Регресс.	407.868	2	203.9342	10.59011	6.856E-05		
Остатки	1887.190	98	19.2570				
Итого	2295.058	100	22.951				
Інформаційна спроможність моделі				1.192	0.192	1.395	9.2
Роботоздатність моделі		0.178					

Процедурою **Covariance of coefficients**/Ковариации коэффициентов (2) виводиться кореляційна (табл. 11.31) і коваріаційна (табл. 11.32) матриці вихідних даних.

При натисненні кнопки **Current sweep matrix**/Текущая матрица выметания (3) видається табл. 11.33, при **Partial correlations**/Частные корреляции (4) – табл. 11.34.

Таблиця 11.31. Кореляційна матриця коефіцієнтів регресії

Переменная	Корреляции В-коэффициентов регрессии (Биометрия)	
	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004
Висота штамбу-2004	1.000000	0.111009
Кількість гілок-2004	0.111009	1.000000

Таблиця 11.32. Коваріаційна матриця коефіцієнтів регресії

Переменная	Ковариации В-коэффициентов регрессии ; ЗП: Кількість стручків на гілці-	
	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004
Висота штамбу-2004	0.005459	0.002625
Кількість гілок-2004	0.002625	0.102445

Таблиця 11.33. Поточна матриця вимітання

Переменная	Текущая матрица выметания (Биометрия)		
	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на гілці-2004
Висота штамбу-2004	-1.01248	-0.11239	0.319358
Кількість гілок-2004	-0.11239	-1.01248	0.312845
Кількість стручків на гілці-2004	0.31936	0.31284	0.822320

Таблиця 11.34. Змінні, що входять в рівняння; ЗП

Переменная	Переменные, входящие в уравнение (Биометрия)						
	Бета(в)	Частная Корр.	Получаст Корр.	Толеран.	R-квадр.	t(98)	p-знач.
Висота штамбу-2004	0.319358	0.330348	0.317384	0.987677	0.012323	3.464800	0.000789
Кількість гілок-2004	0.312845	0.324326	0.310911	0.987677	0.012323	3.394132	0.000995



Натисненням кнопки процедури Redundancy / Избыточность (5) отримується табл. 11.35.

Таблиця 11.35. Залишки незалежних змінних

Переменная	Избыточность независимых переменных; ЗП: Кількість стручків на гілці-2 Столбец R-квадрат содержит значения R-квадрат для соотв. переменных по отношению ко всем остальным переменным			
	Толеран.	R-квадр.	Частная Корр.	Получаст Корр.
Висота штамбу-2004	0.987677	0.012323	0.330348	0.317384
Кількість гілок-2004	0.987677	0.012323	0.324326	0.310911

Після цього натиснувши кнопку Residuals/assumptions/prediction / Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения (6) переходимо на панель Multiple Regression Results / Результаты множественной регрессии (рис. 11.32).

Натискаємо кнопку Perform residual analysis / Анализ остатков (1), чим відкриваємо панель Residual Analysis / Анализ остатков, і на ній відкриваємо вкладку Quick / Быстрый (рис. 11.33). На ній запуском процедури Summary: Residuals & predicted / Остатки и предсказанные (1) отримуємо таблицю передбачуваних значень і за-

лишків, табл. 11.36, а запуском процедури  Normal plot of residuals /  Нормальный график остатков (2) — рис. 11.34.





Рис. 11.32. Панель аналізу показників рівняння регресії (вкладка  Residuals/assumptions/prediction/Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения)




Рис. 11.33. Панель аналізу залишків (вкладка  Quick/Быстрый)

З рис. 11.34, який представляє зображення графіка залишків на нормальному ймовірнісному папері, видно, що дані досить добре укладаються на прямій, яка відповідає нормальному закону статистичного розподілу, що підтверджує його придатність для даної вибірки.





Друга умова щодо залишків полягає в тому, що їх дисперсія повинна залишатися незмінною у всьому діапазоні значень аналізованих змінних. Для її перевірки слід перейти на закладку  Scatterplots /  Диаграммы рассеяния (3) (рис. 11.33) і натиснути кнопку  Predicted vs. residuals /  Предсказанные и остатки (4) у результаті чого створюється графік залежності значень залишків від прогнозованих моделлю значень залежної змінної (рис. 11.35).

Таблица 11.36. Значения и залишки зависимой переменной

Предсказанные значения и остатки (Биометрия) Зависимая перемен.: Кількість стручків на гілці-2004									
Набл. No.	Наблюд. Значение	Предсказанные Значение	Остатки	Станд. предск.	Станд. Остатки	Ст.Ош. предск.	Махалан. расст.	Удален. Остатки	Кука расст.
1	30.35000	31.08454	-0.7345	2.27418	-0.16733	1.092038	5.19849	-0.7830	0.000656
2	30.05000	27.04987	3.0001	0.27683	0.68344	0.531277	0.47464	3.0447	0.002349
3	32.20000	32.48178	-0.2818	2.96588	-0.06419	1.611859	12.49240	-0.3257	0.000247
4	33.52632	29.86207	3.6643	1.66900	0.83472	0.878889	3.01842	3.8173	0.010104
5	30.00000	27.53848	2.4615	0.51871	0.56074	0.560843	0.64220	2.5024	0.001768
6	37.10000	29.30585	7.7941	1.39364	1.77552	1.016528	4.37225	8.2358	0.062916
7	31.60000	31.44563	0.1544	2.45293	0.03517	1.419961	9.47321	0.1724	0.000054
94	17.50000	25.09565	-7.5957	-0.69061	-1.73031	0.557091	0.62043	-7.7200	0.016603
95	24.50000	24.21922	0.2808	-1.12448	0.06396	0.666437	1.31471	0.2874	0.000033
96	26.30000	25.82104	0.4790	-0.33150	0.10911	0.462456	0.11973	0.4843	0.000045
97	23.27778	23.69417	-0.4164	-1.38441	-0.09485	0.786172	2.21729	-0.4302	0.000103
98	20.77778	25.24752	-4.4697	-0.61542	-1.01822	0.517447	0.39937	-4.5327	0.004938
99	28.58824	25.88960	2.6986	-0.29756	0.61476	0.501700	0.31608	2.7344	0.001689
100	23.40000	25.13587	-1.7359	-0.67070	-0.39543	0.690007	1.48062	-1.7798	0.001354
101	30.60118	26.97529	3.6259	0.23990	0.82599	0.451307	0.06686	3.6646	0.002455
Минимум	13.72727	21.77518	-11.2863	-2.33440	-2.57104	0.441402	0.02098	-11.5394	0.000000
Максим.	39.90000	32.48178	12.5117	2.96588	2.85021	1.668301	13.45315	12.6734	0.096392
Среднее	26.49068	26.49068	0.0000	0.00000	0.00000	0.708452	1.98020	-0.0159	0.009843
Медиана	26.22222	26.18869	0.0346	-0.14950	0.00789	0.625270	1.03876	0.0350	0.002360




Рис. 11.34. Нормальный вероятностный график залишков

Якщо умова застосування багатфакторного РА виконується, то точки на цьому графіку будуть розташовуватися хаотично, не проявляючи ніякої закономірності (рис. 11.35). Якщо ж в розташуванні точок є тенденція (роз-

кід збільшується зліва направо, точки тісно укладаються вздовж прямої, і т.п.), даний регресійний аналіз також непридатний.




Рис. 11.35. Результаты проверки однородности дисперсии

У розглянутому прикладі обидві умови відносно залишків виконуються, що ще раз підтверджує адекватність розрахованої регресійної моделі.

Далі переходимо на вкладку **Advanced**/Дополнительно (5) (рис. 11.33).

У цій вкладці (рис. 11.36) дія кнопки процедури **Regression summary** / **Итоги регрессии**, аналогічна дії кнопки процедури **Summary: Regression results** / **Итоговая таблица регрессии** (2) (рис. 11.30, с. 718) для отримання табл. 11.27, с. 718 і кнопка процедури **Summary: Residuals & predicted** / **Остатки и предсказанные** аналогічна за дією подібній кнопці вкладки **Quick**/Быстрый (1) (рис. 11.33).






Рис. 11.36. Панель аналізу залишків (вкладка **Advanced**/Дополнительно)

Запустивши процедуру  /  Статистика Дарбіна-Уотсона (1) (рис. 11.36) одержуємо результати аналізу регресійних залишків функції відклику за методом Дарбіна-Уотсона (табл. 11.37). Вона містить значення статистики d Дарбіна-Уотсона і серіальну кореляцію (тобто кореляцію між сусідніми залишками).

У даному випадку $d_{\phi}=2.0559$ (табл. 11.37), а для числа дослідів $n=101$ і число незалежних змінних першого порядку рівняння регресії (без постійного члена) $k=2$ згідно табл. Е.30 становлять $d_{L05(2, 101)}=1.63$ і $d_{U05(2, 101)}=1.72$, таким чином маємо $d_{U05(2, 101)}=1.72 < d_{\phi}=2.0559 < 4-d_{U05(2, 101)}=2.28$ — автокореляція відсутня. За рис. 11.105 на с. 839 також видно, що автокореляція відсутня. Про це свідчить і коефіцієнт серіальної кореляції, який знаходиться у межах від $-1.983971519/\sqrt{n}=-0.197413$ до $+0.197413$.





Запустивши процедуру  /  Описательные статистики (2) (рис. 11.32 або 11.36), відкриваємо панель  /  Просмотр описательных статистик (рис. 11.37).

Таблица 11.37. Статистический анализ Дарбина-Уотсона

	Дарбина-Уотсона d (R-Биома) и сериальная корреляция остатков	
	Дарбина-Уотсон d	Сериаль Корр.
Оценка	2.055879	-0.032027




Рис. 11.37. Панель описової статистики (вкладка /Быстрый)

У вкладці  /  запуском процедури  /  Средние и std. отклонения (1) видається табл. 11.38, у якій саме і представлені ці значення та значення середніх. Натиснувши  /  Корреляции (2) одержуємо кореляційну таблицю вихідних даних (табл. 11.39). Натиснувши  /  (3) переходимо на однойменну вкладку панелі  /  Анализ остатков.

Таблица 11.38. Вибіркова середня і її похибка

Переменная	Средние и ст.отклонения (R-Биома)		
	Средние	Ст.Откл.	N
Висота штамбу-2004	14.45078	5.978065	101
Кількість гілок-2004	7.35414	1.380033	101
Кількість стручків на гілці-2004	26.49068	4.792194	101

Перейшовши на вкладку **Advanced**/Дополнительно (рис. 11.38) активізуємо ☒ SD=√(SS/N)/☒ Стд.откл.=√(SS/N) (1) для отримання середнього вибірки і СКВ, що буде наведено у табл. 11.58.

Таблица 11.39. Кореляция выходных данных			
Переменная	Корреляции (R-Биома)		
	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на гілці-2004
Висота штамбу-2004	1.000000	-0.111009	0.284630
Кількість гілок-2004	-0.111009	1.000000	0.277393
Кількість стручків на гілці-2004	0.284630	0.277393	1.000000

☒ Means & standard deviations / ☒ Средние и std.отклонения та ☒ Correlations / ☒ Корреляции, як і на вкладці **Quick**/Быстрый (рис. 11.37).

На вкладці **Advanced** / **Дополнительно** розташовані кнопки процедури




Рис. 11.38. Панель описовой статистики (вкладка **Advanced**/Дополнительно)

Натиснувши кнопки процедури ☒ Covariances / ☒ Ковариации (2) (рис. 11.38) одержуємо коваріаційну матрицю вихідних даних (табл. 11.40), а натисненням кнопок процедур ☒ Matrix plot of correlations / ☒ Матричный график (3) і ☒ Box & whisker plot / ☒ Диаграмма размаха (4) — відповідно графічне (рис. 11.40) представлення квадратної кореляційної матриці згідно даних табл. 11.41 і діаграми розмаху (“ящиків з вусами”) (рис. 2.19 а на с. 117), вибір змінних і типу якої наведено відповідно на рис. 11.41, а) і рис. 11.41, б). Далі натискаємо кнопку **Matrix**/Матричный (5) для переходу на однойменну вкладку.




Рис. 11.39. Панель описовой статистики (вкладка **Advanced**/Дополнительно)

Таблица 11.40. Ковариационная матрица выходных данных

Переменная	Ковариации (R-Биома)		
	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на гілці-2004
Висота штамбу-2004	35.73726	-0.915820	8.15408
Кількість гілок-2004	-0.91582	1.904492	1.83451
Кількість стручків на гілці-200	8.15408	1.834507	22.96513

ляційна таблиця вихідних даних (табл. 11.41).

На вкладці **Matrix** / **Матричный** натисненням єдиної кнопки процедури **Matrix** / **Отобразить матрицу** виводиться коре-






Рис. 11.40. Графічне представлення кореляційної матриці (табл. 11.41)

У результаті натиснення кнопки опції / (4) (рис. 11.42) маємо кореляційний графік залишків із лініями довірчих меж та коефіцієнтом кореляції і рівнянням регресії (рис. 11.43). Довірчий еліпс, який охоплює 95 % точок, нанесено нами додатково для більшої наочності. Чим сильніше зв'язок, тим більше витягнутий еліпс уздовж лінії тренду.



а)



б)

Рис. 11.41. Вибір змінних (а) і типу (б) діаграми розмаху

Натискуємо **ОК** і повертаємося на панель **Residual Analysis** / **Анализ остатков** (рис. 11.36), де натиснувши **Residuals**/**Остатки** (3) переходимо на відповідну вкладку (рис. 11.42).

Таблиця 11.41. Кореляційна матриця вихідних даних

	Биометрия-П.ста									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	H	S	K	HS	HK	KS	HH	SS	KK	Z
H	1.00000	0.39764	0.24708	0.54376	0.58938	0.48123	0.99882	0.45647	0.20057	0.26654
S	0.39764	1.00000	-0.10588	0.98229	0.06541	0.91460	0.41070	0.96399	-0.12188	0.28495
K	0.24708	-0.10588	1.00000	-0.04299	0.92565	0.28017	0.24038	-0.04957	0.98802	0.28257
HS	0.54376	0.98229	-0.04299	1.00000	0.17264	0.92432	0.55728	0.97674	-0.06648	0.30800
HK	0.58938	0.06541	0.92565	0.17264	1.00000	0.42089	0.58389	0.13371	0.89878	0.33671
KS	0.48123	0.91460	0.28017	0.92432	0.42089	1.00000	0.49079	0.90001	0.25467	0.38627
HH	0.99882	0.41070	0.24038	0.55728	0.58389	0.49079	1.00000	0.47404	0.19444	0.25848
SS	0.45647	0.96399	-0.04957	0.97674	0.13371	0.90001	0.47404	1.00000	-0.07008	0.30994
KK	0.20057	-0.12188	0.98802	-0.06648	0.89878	0.25467	0.19444	-0.07008	1.00000	0.23516
Z	0.26654	0.28495	0.28257	0.30800	0.33671	0.38627	0.25848	0.30994	0.23516	1.00000
Средние	70.94554	14.45743	7.36040	1039.38812	523.68713	105.37030	5068.51683	244.21089	55.96733	26.49604
Ст. Откл.	6.05974	5.98044	1.38008	499.35540	115.02706	47.49795	869.94854	219.05501	21.88807	4.79427
Кол-во N	101.00000									
Матрица	1.00000									




Рис. 11.42. Панель аналізу залишків (вкладка **Остатки**)

Натиснувши кнопку **Casewise plot of residuals**/**Построчные графики остатков** (1), (рис. 11.42) отримуємо табл. 11.42.

Таблиця 11.42. Залишки за повторністю (рядками)

				Остатки (обычные) (R-Биома)						
				Зависимая перемен.: Кількість стручків на гілці-2004						
Набл.	-3s	Остатки (обычные)		Наблюд.	Предсказанные	Остатки	Станд.	Станд.	Ст.Ош.	Махалан
		0	+3s	Значение	Значение		предск.	Остатки	предск.	Удален.
1	.	.	*	30.35000	31.08454	-0.7345	2.27418	-0.16733	1.092038	5.19849
2	.	.		30.05000	27.04987	3.0001	0.27683	0.68344	0.531277	0.47464
3	.	.	*	32.20000	32.48178	-0.2818	2.96588	-0.06419	1.611859	12.49240
4	.	.		33.52632	29.86207	3.6643	1.66900	0.83472	0.878889	3.01842
5	.	.		30.00000	27.53848	2.4615	0.51871	0.56074	0.560843	0.64220
6	.	.		37.10000	29.30585	7.7941	1.39364	1.77552	1.016528	4.37225
98	.	.	*	20.77778	25.24752	-4.4697	-0.61542	-1.01822	0.517447	0.39937
99	.	.		28.58824	25.88960	2.6986	-0.29756	0.61476	0.501700	0.31608
100	.	.	*	23.40000	25.13587	-1.7359	-0.67070	-0.39543	0.690007	1.48062
101	.	.		30.60118	26.97529	3.6259	0.23990	0.82599	0.451307	0.06686
Минимум	.	*	.	13.72727	21.77518	-11.2863	-2.33440	-2.57104	0.441402	0.02098
Максим.	.	.		39.90000	32.48178	12.5117	2.96588	2.85021	1.668301	13.45315
Среднее	.	.	*	26.49068	26.49068	0.0000	0.00000	0.00000	0.708452	1.98020
Медиана	.	.	*	26.22222	26.18869	0.0346	-0.14950	0.00789	0.625270	1.03876

В табл. 11.42 наводяться відстані Махаланобіса. Ними оцінюються викиди набору незалежних змінних, тобто відстані від кожного спостереження до точки (центроїда) з координатами, визначеними як їх середні значення.

Інший дуже важливою статистикою, що дозволяє оцінити масштаб проблеми викидів, є віддалені залишки. Вони визначаються як стандартизовані залишки для відповідних спостережень, які вийшли б при виключенні відповідних спостережень з аналізу. Якщо одне зі спостережень є очевидним викидом, то лінія регресії прагне “наблизиться” до цього викиду, з тим щоб врахувати його, наскільки це можливо. В результаті, при виключенні відповідного спостереження, виникне абсолютно інша лінія регресії (і β -коефіцієнти). Тому, якщо віддалений залишок сильно відрізняється від стандартизованого залишку (рис. 11.43), є підстави вважати, що результати регресійного аналізу істотно зміщені відповідною точкою.




Рис. 11.43. Кореляційний графік залишків з довірчими межами та еліпсом

Задіявши кнопки процедур Histogram of observed / Гистограмма наблюдаемых (2) і Histogram of residuals / Гистограмма остатков (3) виводимо відповідні гістограми з накладеними кривими нормального статистичного розподілу, наведені на рис. 11.44.




Рис. 11.44. Розподіл отриманих експериментальних значень (а) і їхніх залишків (б)

Тут, як і нижче на рис. 11.45, слід звернути увагу на положення перемикача ☒ Raw residuals / ☒ Исходные чи ☐ Standard residuals / ☐ Стандартные — представлення даних у вихідному або стандартизованому вигляді.

Натиснувши кнопку / ☒ Residual Analysis / ☒ Анализ остатков (рис. 11.45).




Рис. 11.45. Панель аналізу залишків (вкладка **Предсказанные**)

Виконання процедури **Histogram of predicted** / **Гистограмма** (1) видає гістограму передбачуваних значень залежного фактору з накладеною кривою нормального статистичного розподілу (рис. 11.46).



Рис. 11.46. Розподіл передбачуваних значень

Натиснення кнопки процедури **Predicted vs. independent var.** / **Предсказанные и независимые переменные** (2) виводить кореляційний графік передбачених значень від незалежного фактору, або їхньої парної (потрійної і т.д.) залежності з поясом довірчих меж та коефіцієнтом кореляції і рівнянням регресії (рис. 11.47). Довірчий еліпс нанесено для більшої наочності.

Результатом запуску процедури **Casewise plot of predicted** / **Построчный график** (3) є одержання таблиці, аналогічної табл. 11.42, але у її боковику замість розподілу залишків представлено розподіл передбачуваних значень.



Рис. 11.47. Кореляційний графік залежності передбачених значень залишків від незалежного фактору залишків з довірчими межами

Після цього натиснувши **Outliers/Выбросы** (4) переходимо на однойменну панель. Вона має єдину опцію **Casewise plot of outliers/Построчный график выбросов**, яка діє лише для типу викидів **Standard residual (>2* sigma)/Стандартный остаток(>2 * сигма)**. При її натисненні видається таблиця порядкових викидів (табл. 11.43).


Дія кнопок процедур **Normal plot of residuals / Нормальный** (1), **Half-normal plot/Полунормальный** (2) і **Detrended normal plot/Без тренда** (3) вкладки **Probability plots/Вероятностные графики** (рис. 11.48) аналогічна дії кнопок процедур **Normal probability plot / Нормальные вероятностные графики**, **Half-normal probability plot / Полунормальные вероятностные графики** і **Detrended normal probability plot / Нормальные вероятн. графики без тренда** вкладки **Prob. & Scatterplots / Диаграммы** меню **Descriptive Statistics/Описательные статистики** (рис. 2.20).

У результаті їхньої дії одержуємо графіки рис. 2.31–2.33).

При натисненні **Predict dependent variable / Предсказать зависимую переменную** (4) вкладки **Residuals/assumptions/prediction / Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения** панелі **Multiple Regression Results/Результаты множественной регрессии** (рис. 11.31) відкривається панель **Specify values for indep. vars / Задайте значения независимых переменных**, де значення незалежних змінних встановлюється у відповідності з рис. 11.49. Натиснувши на ній кнопку **ОК** одержуємо табл. 11.44 з передбаченими значеннями залежної змінної.

Таблиця 11.43. Викиди за повторністю (рядками)

								Станд. остатки (R-Биома)					
								Выбросы					
Набл.	Стандартиз. остатки							Наблюд.	Предсказанные	Остатки	Станд.	Станд.	Ст.Ош.
	-5.	-4.	-3.	±2.	3.	4.	5.	Значение	Значение		предск.	Остатки	предск.
21	.	.	.	*	.	.	.	35.30000	26.20138	9.0986	-0.14322	2.07269	0.925602
28	.	.	.		*	.	.	39.90000	27.38825	12.5117	0.44434	2.85021	0.495715
68	.	.	.		*	.	.	36.23529	24.98932	11.2460	-0.74325	2.56186	0.551918
69	.	.	.	*		.	.	17.41667	28.70294	-11.2863	1.09517	-2.57104	0.650186
82	.	.	.	*		.	.	13.72727	24.09712	-10.3699	-1.18493	-2.36228	0.867676
Минимум	.	.	.	*		.	.	13.72727	24.09712	-11.2863	-1.18493	-2.57104	0.495715
Максим.	.	.	.		*	.	.	39.90000	28.70294	12.5117	1.09517	2.85021	0.925602
Среднее	.	.	.	*	.	.	.	28.51585	26.27580	2.2400	-0.10638	0.51029	0.698219
Медиана	.	.	.	*	.	.	.	35.30000	26.20138	9.0986	-0.14322	2.07269	0.650186

Рис. 11.48. Панель wyboru ймовірнісних графіків (вкладка Вероятностные графики)

У даному для ознайомлення з роботою модуля Multiple Regression /




Рис. 11.49. Панель wyboru незалежних змінних

Множественная регрессия наведено одержання великої кількості статистичного матеріалу у вигляді таблиць (табл. 11.25–11.44 та рис. 11.34, 11.35, 11.43, 11.44, 11.46 і 11.47), які ілюструють можливості модуля (та й то далеко не всі). Практично ж при його використанні отримання рівняння регресії і його статистичної характеристики закінчуються табл. 11.25, яка саме поєднує в собі вказане вище [143].

До суттєвих недоліків модуля Multiple Regression / Множественная регрессия слід віднести ще й те, що він не дозволяє визначити оптимальні параметри рівняння регресії й одержувати парні залежності функції відклику з фіксацією інших факторів на заданому рівні. Але останнє не завжди необхідне, так як у разі досить великої вибірки є змога виділити певний діапазон необхідного фактору і провести його аналіз.

Побудова поверхонь відклику парних залежностей без фіксації інших

факторів на необхідному рівні, з одержанням виразів функціональних залежностей у вигляді рівнянь другого порядку, викладена на рис. 2.26 і 2.27.

Отримані результати загалом можна інтерпретувати так.

— якщо значення p для рівняння регресії розраховане для F -критерію Фішера (рис. 11.29 і 11.30 та табл. 11.25–11.28) менше прийнятого рівня значущості α , то можна вважати, що знайдена досить адекватно описує взаємозв'язок ознак;

— якщо $p > \alpha$, то регресійна модель незадовільно описує взаємозв'язок ознак;

— стандартна похибка оцінки моделі (табл. 11.25 і 11.27) показує ступінь розсіювання різниці між фактичними і прогнозованими значеннями залежної змінної;

— коефіцієнт детермінації R^2 (у разі простого регресійного аналізу) є квадратом коефіцієнта кореляції і показує, яка частина дисперсії залежної ознаки може бути пояснена дисперсією незалежного ознаки. Він має значення від 0 (немає зв'язку ознак) до 1 (детермінуючий зв'язок ознак);

— Коефіцієнт множинної детермінації (скорегований R^2) (рис. 11.29 і 11.30 та табл. 11.25–11.28) для множинного регресійного аналізу показує, якою мірою варіація залежної ознаки визначається варіацією незалежних ознак, включених в модель. Чим вище R^2 , тим краще регресійна модель;

— вагові коефіцієнти B , тобто b (β — їх стандартизований варіант) (табл. 11.25 і 11.27) є коефіцієнтами рівняння регресії. Вони показують, наскільки сильно середнє значення залежного ознаки y варіює з кожною одиницею зміни незалежного ознаки x . У разі простої лінійної регресії регресійний коефіцієнт (нахил регресійної прямої) є мірою зв'язку між аналізованими ознаками x і y . Нульовий нахил (горизонтальна лінія на графіку) означає відсутність лінійного зв'язку між ознаками. Тому в ході регресійного аналізу перевіряються гіпотези про рівність нулю цих коефіцієнтів ;

— якщо для будь-якого коефіцієнта b_i маємо $p_i < \alpha$, то відповідний фактор x_i є значущим прогностичним для ознаки y (на рис. 11.29 і 11.30 та в табл. 11.25–11.28 виділений червоним кольором);

— якщо $p > \alpha$, то відповідний фактор x_i не є значущим прогностичним для ознаки y .

Слід мати на увазі, що результати регресійного аналізу можуть бути застосовні тільки до *задіяного інтервалу* значень даних, інакше модель некоректна.

Результатом регресійного аналізу є створення статистичної моделі, яку, як і всяку математичну модель, слід перевірити на інформаційну спроможність та роботоздатність (див. табл. 11.30 на с. 719 [5]).

Таблиця 11.44. Передбачені значення залежної змінної			
Переменная	Предск.значения для (R-Биома) перемен.: Кількість стручків на гілці-2004		
	В-Веса	Значение	В-Веса * знач.
Висота штамбу-2004	0.256007	60.00000	15.36042
Кількість гілок-2004	1.086360	10.00000	10.86360
Св.член			14.80195
Предсказанные			41.02597
-95.0%ИП			29.77599
+95.0%ИП			52.27594

11.6.3. Визначення і оцінка коефіцієнтів регресії другого порядку з використанням ППП **Statistica**

Багатофакторні дослідження при контрольованому некерованому масиві даних, тобто, пасивному експерименті — коли рівні факторів лише реєструються, а не задаються дослідником [17, 144]), часто застосовуються для виявлення функціональних залежностей між факторами, одержаними в результаті замірів параметрів існуючих об'єктів, зокрема, біологічних. Як показує досвід, отримати для них матрицю експерименту типу 3^n (де n — кількість факторів функціональної залежності) організацією значень фактору у вигляді нижнього, основного і верхнього рівнів не представляється можливим через майже відсутність комбінацій нижніх і верхніх рівнів (див. рис. 2.16, с. 114).

В якості прикладу використання ППП **Statistica** для аналізу контрольованого некерованого масиву даних, як багатофакторного експерименту розглянуто аналіз досліджень біометричних показників рослин рижію ярого, виконаних у 2004 р. За результатами досліджень показники 101 сортозразка лежать у межах: висота рослини H від 58.4 до 85.3 см, висота штамбу S від 3.3 до 34.9 см; кількість гілок K від 3.8 до 12.4 шт. і кількість стручків на центральній гілці Z від 13.7 до 39.9 шт. (див. табл. 2.17, с. 111).

Таблиця 11.45. Розкодована розширена матриця									
H	S	K	HS	HK	SK	HH	SS	KK	Z
75.4	24.4	9.3	1839.76	701.22	226.92	5685.16	595.36	86.49	30.4
68.4	18.4	7.0	1258.56	478.80	128.80	4678.56	338.56	49.00	30.1
65.3	15.4	6.6	1005.62	430.98	101.64	4264.09	237.16	43.56	28.6
63.3	7.3	7.8	462.09	493.74	56.94	4006.89	53.29	60.84	23.4
69.6	15.0	7.7	1044.00	535.92	115.50	4844.16	225.00	59.29	30.6

Розширена матриця експериментів (з доданням парних взаємодій факторів і квадратів факторів) створюється в розкодованому вигляді

за допомогою пакету **Excel**. При цьому для назв колонок використовуються позначення великими літерами латиниці (табл. 11.45).

При аналізі результатів пасивного багатофакторного експерименту завжди слід виконувати перевірку відповідності умов застосування регресійного аналізу, викладених на с. 660. Щоб не обтяжувати викладення матеріал, тут перевірка не наводиться, хоч деякі з показників були визначені раніше (див. рис. 2.10 на с. 107, табл. 9.8 на с. 505).

Дані табл. 11.45 слід вставити у таблицю ППП **Statistica** і перейменувати та форматувати колонки відповідно до її головки, як це представлено на див. рис. 2.5, с. 102.

Також можна одержувати розширену матрицю експерименту безпосередньо в таблиці ППП **Statistica**. Він полягає в копіюванні в неї значень факторів і функції відгуку, перейменуванні та форматуванні колонок відповідно до її головки виконанням дій (1)–(4) рис. 11.50, і застосуванні формул (5) для розрахунків парних взаємодій факторів та квадратів факторів. Після вве-

дення відповідної формули слід натиснути **ОК (6)** і дією кнопки **Да (7)** підтвердити перерахунок даних відповідної колонки.

Для призначення дії над вибіркою слід у меню **Statistics / Аналіз (1)** вибрати модуль **Multiple Regression / Множественная регрессия (2)** у результаті чого виникає панель вибору установок і процедур

Multiple Linear Regression /

Множественная регрессия

(рис. 11.51).

У вкладці **Advanced / Дополнительно (3)** указуємо розташування даних **Input file: Raw Data** / **Файл даних Исходные данные (4)**, у разі неорганізованого масиву даних — слід задати представлення

☒ **Review descriptive statistics, correlation mat**

/

☒ **Описательные статистики, матрицы корр**

(5) і не відмічати

☐ **Advanced options (stepwise or ridge regress**

/ ☐ **Пошаговая или гребневая регрессия**

(6). Далі натискаємо

Variables / Переменные (7) і

на панелі

Select dependent and independent variable lists /

Списки зависимых и независимых переменных вибираємо **Dependent var. (or list for batch)** /

Зависимые переменные (8) і **Independent variable list/Независимые переменные (9)** фактори і по-

вернутися на панель **Multiple Linear Regression / Множественная регрессия** натиснувши

ОК (10). Ще раз на ній натиснути **ОК (11)** для переходу на панель

Multiple Regression Results / Результаты множественной регрессии (рис. 11.52).

У верхній інформаційній частині цієї панелі подана коротка інформація по виконаному аналізу із критерієм Фішера, знайденим за перевіркою моделі на адекватність. У середній частині представлені бета-коефіцієнти (β -коефіцієнти полінома — стандартизовані еквіваленти коефіцієнтів **B**, тобто **b**), причому значущі на заданому рівні **Alpha for highlighting effects: .05** / **Выделяемый уровень значимости: .05 (1)** як завжди представлено червоним кольором.

У вкладці **Quick / Быстрый** виконання процедури **Summary: Regression results / Итоговая таблица регрессии (2)** (рис. 11.52) видає табл. 11.46, де представлена характеристика рівняння регресії і табл. 11.47 з її підсумковою статистикою.




Рис. 11.50. Створення розкодової розширеної матриці

Значущі за критерієм Стюдента коефіцієнти рівнянь відмічені червоним кольором. Після чого переходимо на вкладку **Advanced**/Дополнительно (3).




Рис. 11.51. Вибір дії для отримання вихідного параметра і регресорів.

Бета-коефіцієнти є коефіцієнтами, які були б отримані, якби ми заздалегідь стандартизували всі змінні.

Одна з переваг β -коефіцієнтів у порівнянні з B -коефіцієнтами (b) полягає у тому, що вони дозволяють оцінювати відносні внески кожної незалежної змінної у передбачення залежної змінної.

Таким чином, β -коефіцієнти слід трактувати із точки зору відносного впливу кожного предиктора на залежну змінну. Їхня інтерпретація така ж, як і в частинних кореляціях.

Результаты множ. регрессии: Биометрия-Пста

Результаты множ. регрессии
Зав.перем.: Z Множест. R = .56025802 F = 4.625734
R2= .31388905 cc = 9,91
Число набл.: 101 скоррект. R2= .24603192 p = .000048
Стандартная ошибка оценки: 4.162924984
Своб.член: -159.3856043 Ст.ошибка: 60.32874 t(91) = -2.642 p = .0097

H бета=5.95 S бета=.293 K бета=.968
HS бета=-.59 HK бета=1.10 KS бета=-.23
HH бета=-6.4 SS бета=.904 KK бета=-1.5

(выделены значимые бета)

Выделяемый уровень значимости: 05 1

Быстрый 3 Дополнительно 2 Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения

Итоговая таблица регрессии

Отмена

Опции

Рис. 11.52. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка Quick/Быстрый)

Для того щоб підставити нові значення в побудовану модель, тобто побудувати передбачення (у масштабі вихідних змінних), використовуються **B**-коефіцієнти (**b**).

У колонці **B** табл. 11.46 представлено вільний член і коефіцієнти рівняння регресії — математичної моделі.

Кількість значущих цифр її коефіцієнтів визначається за кількістю значущих цифр їхніх стандартних похибок (колонка **Ст.Ош.B** чи **Std.Err.of b**) за правилами, наведеними в підрозділі **5.16 Правила подання результатів вимірювань**

Таблиця 11.46. Сумарна характеристика залежної змінної (рівняння регресії)

Итоги регрессии для зависимой переменной: Z (Биометрия-П)						
R= .56025802 R2= .31388905 Скорректир. R2= .24603192 F(9,91)=4.6257 p<.00005 Станд. ошибка оценки: 4.1629						
N=101	БЕТА	Стд.Ош. БЕТА	B	Стд.Ош. B	t(91)	p-уров.
Св.член			-159.386	60.32874	-2.64195	0.009703
H	5.95118	2.141778	4.708	1.69450	2.77862	0.006631
S	0.29332	1.255915	0.235	1.00681	0.23355	0.815857
K	0.96845	1.258450	3.364	4.37174	0.76956	0.443557
HS	-0.58615	1.824248	-0.006	0.01751	-0.32131	0.748713
HK	1.10145	1.511442	0.046	0.06300	0.72874	0.468031
KS	-0.23253	0.734548	-0.023	0.07414	-0.31657	0.752296
HH	-6.36879	2.323230	-0.035	0.01280	-2.74135	0.007366
SS	0.90378	0.569863	0.020	0.01247	1.58596	0.116217
KK	-1.54763	0.624716	-0.339	0.13684	-2.47733	0.015083

$$Z = -159 + 4.7H - 0.24S - 3K - 0.006HS + 0.05HK + 0.02KS - 0.035H^2 + 0.020S^2 - 0.34K^2. \quad (11.50)$$

Характеристики рівняння регресії (верхні частини рис.11.52 і табл. 11.46) подано у табл. 11.47. Критерій Фішера становить $F=4.625734$ з розрахунковим значенням $p < 0.000048$, він менше 0.05, що свідчить про адекватність моделі. Це підтверджує і те, що розрахункове значення **більше табличного**, яке дорівнює $F_{05(9;91)}=1.98440974$. Таким чином, практичне застосування моделі можливе.

Таблиця 11.47. Підсумкова статистика рівняння регресії

Итоговые статистики; ЗП: Z (Биометрия-П.ста)	
Статистика	Значение
Множест. R	0.560258
Множест. R2	0.313889
Скорр. R2	0.246032
F(9,91)	4.625734
p	0.000048
Стд. Ош.Оценки	4.162925

Дані з табл. 11.47 можна копіювати і вставляти як текст для характеристики рівняння (11.50).

У вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (рис. 11.53) розміщена кнопка процедури **ANOVA (Overall goodness of fit)** / **Дисперсионный анализ** (1), натисненням якої одержуємо табл. 11.48, де представлено дані ДА перевірки моделі на адекватність за критерієм Фішера. Представлення даних червоним кольором свідчить про адекватність моделі із прийнятим рівнем значущості.

Дані табл. 11.48 дають змогу перевірити *інформаційну спроможності моделі* [151].




Рис. 11.53. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії (вкладка **Advanced** / **Дополнительно**)

Для цього формулюється нульова гіпотеза $H_0: s_c^2 = s_{на}^2$, де s_c^2 – дисперсія суми, яка розраховується як відношення показника **Сума квадрат. Итого** до **суми ступенів вільності Регресс. і Остатки** середній квадрат (фактично дисперсія) загального розсіювання результатів вимірювань по відношенню до загальної середнього значення по всьому експерименту; $s_{на}^2$ – дисперсія неадекватності (**Середн. квадрат Регресс** за табл. 11.48).

Розрахунки перевірки інформаційної спроможності моделі за виразом (11.28) та визначення її роботоздатності (11.29) (див. с. 682) наведені в табл. 11.49.

Таблиця 11.48. Дисперсійний аналіз (розрахунок критерію Фішера)


Дисперсионный анализ; ЗП: Z (Биометрия-П)					
Эффект	Сумма квадрат	сс	Средн. квадрат	F	p-уров.
Регресс.	721.473	9	80.16372	4.625734	0.000048
Остатки	1577.025	91	17.32994		
Итого	2298.498				



Таблиця 11.49. Перевірка інформаційної спроможності моделі

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності SM	Середній квадрат df	Емпіричний критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_T	Зростання показника прогноза θ , %
2	Регресія	721.273	9	80.14	4.6244	0.000048		
3	Залишки	1577.025	91	17.33				
4	Разом	2289.498	100	22.89				
5	Інформаційна спроможність моделі				3.5004	0.000845	1.9748	87.0934
C4=СУММ(C2:C3) D4=B4/C4 E5=D2/D4 H5=100*(E5^0.5-1) F5=1-F.РАСП(E5;C2;C4;ИСТИНА) G5=F.ОБР.ПХ(0.05;C2;C4)								

Тут слід звернути увагу, критерій Фішера $F_{\text{ін}}$ (значення чарунки E5), як і в табл. 10.17 (с. 588) через те що $s_c^2 < s_{\text{на}}^2$ береться оберненим дробом до виразу (11.28), тобто $s_{\text{на}}^2 / s_c^2$, а рівень значущості і критичне значення критерію Фішера (чарунки F5 і G5) визначаються за статистичними функціями Excel при зміні місць ступенів вільності чисельника й знаменника.

Так як має місце $F_{\text{ін}} \geq F_T$, нульова гіпотеза відхиляється. Це свідчить, що модель інформаційно спроможна і описує результати експерименту на 87.1 % краще, ніж найпростіша модель — пряма лінія.

Процедурою  Ковариансии коэффициентов (2) виводиться кореляційна (табл. 11.50) і коваріаційна (табл. 11.51) матриці вихідних даних.

При натисненні кнопки  Текущая матрица выметания (3) видається табл. 11.52, при  Частные корреляции (4) — табл. 11.53.

Таблиця 11.50. Кореляційна матриця коефіцієнтів регресії

Переменная	Корреляции В-коэффициентов регрессии (Биометрия-П.ста)								
	H	S	K	HS	HK	KS	HH	SS	KK
H	1.000000	-0.187628	-0.072059	0.082798	0.012888	-0.020176	-0.944372	0.268133	0.103894
S	-0.187628	1.000000	0.285968	-0.800244	-0.197108	-0.174062	0.327752	0.362830	-0.083540
K	-0.072059	0.285968	1.000000	-0.258943	-0.815247	0.050366	0.301199	0.054787	-0.377560
HS	0.082798	-0.800244	-0.258943	1.000000	0.394027	-0.384076	-0.303866	-0.712451	-0.111139
HK	0.012888	-0.197108	-0.815247	0.394027	1.000000	-0.424677	-0.316429	-0.189558	-0.188738
KS	-0.020176	-0.174062	0.050366	-0.384076	-0.424677	1.000000	0.175229	0.286665	0.312072
HH	-0.944372	0.327752	0.301199	-0.303866	-0.316429	0.175229	1.000000	-0.118545	-0.023822
SS	0.268133	0.362830	0.054787	-0.712451	-0.189558	0.286665	-0.118545	1.000000	0.133169
KK	0.103894	-0.083540	-0.377560	-0.111139	-0.188738	0.312072	-0.023822	0.133169	1.000000

Таблица 11.51. Коваріаційна матриця коефіцієнтів регресії

Переменная	Ковариации В-коэффициентов регрессии ; ЗП: Z (Биометрия-П.ста)								
	H	S	K	HS	HK	KS	HH	SS	KK
H	2.871340	-0.320103	-0.53380	0.002457	0.001376	-0.002535	-0.020488	0.005667	0.024090
S	-0.320103	1.013675	1.25870	-0.014111	-0.012502	-0.012993	0.004225	0.004556	-0.011509
K	-0.533804	1.258698	19.11211	-0.019827	-0.224521	0.016325	0.016859	0.002987	-0.225859
HS	0.002457	-0.014111	-0.01983	0.000307	0.000435	-0.000499	-0.000068	-0.000156	-0.000266
HK	0.001376	-0.012502	-0.22452	0.000435	0.003969	-0.001984	-0.000255	-0.000149	-0.001627
KS	-0.002535	-0.012993	0.01633	-0.000499	-0.001984	0.005497	0.000166	0.000265	0.003166
HH	-0.020488	0.004225	0.01686	-0.000068	-0.000255	0.000166	0.000164	-0.000019	-0.000042
SS	0.005667	0.004556	0.00299	-0.000156	-0.000149	0.000265	-0.000019	0.000156	0.000227
KK	0.024090	-0.011509	-0.22586	-0.000266	-0.001627	0.003166	-0.000042	0.000227	0.018724

Таблица 11.52. Поточна матриця вимітання

Переменная	Текущая матрица выметания (Биометрия-П.ста)									
	H	S	K	HS	HK	KS	HH	SS	KK	Z
H	-608.410	66.939	25.760	-42.907	-5.533	4.2100	623.242	-43.4053	-18.4372	5.95118
S	66.939	-209.203	-59.946	243.172	49.625	21.2976	-126.837	-34.4414	8.6933	0.29332
K	25.760	-59.946	-210.048	78.844	205.667	-6.1750	-116.796	-5.2111	39.3688	0.96845
HS	-42.907	243.172	78.844	-441.382	-144.095	68.2602	170.807	98.2328	16.7988	-0.58615
HK	-5.533	49.625	205.667	-144.095	-302.991	62.5342	147.369	21.6546	23.6364	1.10145
KS	4.210	21.298	-6.175	68.260	62.534	-71.5627	-39.661	-15.9152	-18.9935	-0.23253
HH	623.242	-126.837	-116.796	170.807	147.369	-39.6611	-715.865	20.8158	4.5856	-6.36879
SS	-43.405	-34.441	-5.211	98.233	21.655	-15.9152	20.816	-43.0713	-6.2879	0.90378
KK	-18.437	8.693	39.369	16.799	23.636	-18.9935	4.586	-6.2879	-51.7622	-1.54763
Z	5.951	0.293	0.968	-0.586	1.101	-0.2325	-6.369	0.9038	-1.5476	0.68611

Натисненням кнопки процедури Redundancy/ Избыточность (5) отримується табл. 11.54. Після цього натиснувши кнопку Residuals/assumptions/prediction/ (6) переходимо на панель Multiple Regression Results/ (рис. 11.54).


Натискаємо кнопку Perform residual analysis/ Анализ остатков (1), чим відкриваємо панель Residual Analysis/ , і на ній відкриваємо вкладку Quick/ (рис. 11.55).

Таблица 11.53. Змінні, що входять в рівняння; ЗП

Переменная	Переменные входящие в уравнение; ЗП: Z (Биометрия-П.ста)						
	Бета	Частная Корр.	Получаст Корр.	Толеран.	R-квадр.	t(91)	p-уров.
H	5.95118	0.279656	0.241271	0.001644	0.998356	2.77862	0.006631
S	0.29332	0.024476	0.020280	0.004780	0.995220	0.23355	0.815857
K	0.96845	0.080410	0.066822	0.004761	0.995239	0.76956	0.443557
HS	-0.58615	-0.033663	-0.027900	0.002266	0.997734	-0.32131	0.748713
HK	1.10145	0.076171	0.063278	0.003300	0.996700	0.72874	0.468031
KS	-0.23253	-0.033167	-0.027488	0.013974	0.986026	-0.31657	0.752296
HH	-6.36879	-0.276194	-0.238035	0.001397	0.998603	-2.74135	0.007366
SS	0.90378	0.164003	0.137711	0.023217	0.976783	1.58596	0.116217
KK	-1.54763	-0.251357	-0.215110	0.019319	0.980681	-2.47733	0.015083

Таблица 11.54. Залишки незалежних змінних

Переменная	Избыточность независимых переменных; ЗП: Z (Биометрия-П) Столбец R-квадрат содержит значения R-квадрат для соотв. переменных по отношению ко всем остальным переменным			
	Толеран.	R-квадр.	Частная Корр.	Получаст Корр.
H	0.001644	0.998356	0.279656	0.241271
S	0.004780	0.995220	0.024476	0.020280
K	0.004761	0.995239	0.080410	0.066822
HS	0.002266	0.997734	-0.033663	-0.027900
HK	0.003300	0.996700	0.076171	0.063278
KS	0.013974	0.986026	-0.033167	-0.027488
HN	0.001397	0.998603	-0.276194	-0.238035
SS	0.023217	0.976783	0.164003	0.137711
KK	0.019319	0.980681	-0.251357	-0.215110

Рис. 11.54. Панель аналізу показників рівняння регресії (вкладка Residuals/assumptions/prediction/Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения)

На ній (рис. 11.55) запуском процедури Summary: Residuals & predicted / Остатки и предсказанные (1) отримуємо таблицю передбачуваних значень і залишків, яка є власне табл. 11.59 (с. 750) без першої колонки (загальний вигляд такої таблиці аналогічний табл. 11.92, с. 828), а запуском процедури Normal plot of residuals / Нормальный график остатков (2) — рис. 11.56.

З рис. 11.56, який представляє зображення графіка залишків на нормальному ймовірнісному папері, видно, що дані досить добре укладаються на прямій, яка відповідає нормальному закону статистичного розподілу, що підтверджує його придатність для даної вибірки.

Друга умова щодо залишків полягає в тому, що їх дисперсія повинна залишатися незмінною у всьому діапазоні значень аналізованих змінних. Для перевірки цієї умови слід перейти на закладку Scatterplots / Диаграммы рассеяния (3) (рис. 11.55) і натиснути кнопку Predicted vs. residuals / Предсказанные и остатки (4) у результаті чого створюється графік залежності значень залишків від прогнозованих моделлю значень залежної змінної (рис. 11.57).

Якщо умова застосування багатofакторного регресійного аналізу виконується, то точки на цьому графіку будуть розташовуватися хаотично, не проявляючи ніякої закономірності (рис. 11.57). Якщо ж в розташуванні точок

є тенденція (розкид збільшується зліва направо, точки тісно укладаються вздовж прямої, і т.п.), даний регресійний аналіз також непридатний.




Рис. 11.55. Панель аналізу залишків (вкладка **Quick**/Быстрый)




Рис. 11.56. Нормальный ймовірнісний графік залишків




Рис. 11.57. Результати перевірки однорідності дисперсії

У розглянутому прикладі обидві умови відносно залишків виконуються, що ще раз підтверджує адекватність розрахованої регресійної моделі для опису зв'язку між кількістю стручків Z на центральній гілці і висотою H рослини.

Після цього переходимо на вкладку **Advanced** / **Дополнительно** (5) (рис. 11.55).

У цій вкладці (рис. 11.58) дія кнопки процедури **Regression summary** / **Итоги регрессии**, аналогічна дії кнопки процедури **Summary: Regression results** / **Итоговая таблица регрессии** (2) (рис. 11.52, с. 739) для отримання табл. 11.46, с. 739 і кнопка процедури **Summary: Residuals & predicted** / **Остатки и предсказанные** аналогічна за дією подібній кнопці вкладки **Quick** / **Быстрый** (1) (рис. 11.55).










Рис. 11.58. Панель аналізу залишків (вкладка **Advanced** / **Дополнительно**)

Запустивши процедуру  /  Статистика Дарбіна-Уотсона (1) (рис. 11.58) одержуємо результати аналізу регресійних залишків функції відклику за методом Дарбіна-Уотсона (табл. 11.55) зі значеннями d цієї статистики і серіальну кореляцію (кореляцію між сусідніми залишками).

У даному випадку $d_\phi = 1.98569$ (табл. 11.55), а для числа дослідів $n=101$ і число незалежних змінних першого порядку рівняння регресії (без постійного члена) $k=1$ згідно табл. E.30 становлять $d_{L05(1, 101)}=1.65$ і $d_{U05(1, 101)}=1.69$, таким чином маємо $d_{U05(2, 101)}=1.69 < d_\phi = 1.98569 < 4 - d_{U05(2, 101)}=2.31$ — автокореляція відсутня.

Про це свідчить і коефіцієнти серіальної кореляції, значення якого 0.004190, знаходиться у межах, визначених виразом (11.92), тобто $\pm t_{05(100)} / \sqrt{n}$, а саме від $-1.984 / \sqrt{101} = -0.197$ до 0.197.

Запустивши процедуру  /  Описательные статистики (2) (рис. 11.54 або 11.58), відкриваємо панель  /  Просмотр описательных статистик (рис. 11.59).

Таблиця 11.55. Статистичний аналіз Дарбіна-Уотсона

	Дарбина-Уотсона d (Биометрия-П.ста) и сериальная корреляция остатков	
	Дарбина-Уотсон.с	Сериал. Корр.
Оценка	1.985691	0.004190



















Рис. 11.59. Панель описової статистики (вкладка /Быстрый)

У вкладці  /  запуском процедури  /  Средние и std. отклонения (1) видається табл. 11.56, у якій саме і представлені ці значення та значення середніх. Натиснувши  /  Корреляции (2) одержуємо кореляційну таблицю вихідних даних (представлену табл. 11.58 без нижніх чотирьох рядків). Натиснувши  /  Дополнительно (3) переходимо на однойменну вкладку панелі  /  Анализ остатков.

Перейшовши на вкладку  /  (рис. 11.61) активізуємо    (1) для отримання середнього вибірки і СКВ, що буде наведено у табл. 11.58.

На вкладці **Advanced** / **Дополнительно** розташовані кнопки процедури **Means & standard deviations** / **Средние и std.отклонения** та **Correlations** / **Корреляции**, як і на вкладці **Quick** / **Быстрый** (рис. 11.59).

Таблица 11.56. Вибіркова середня і її похибка

Переменная	Средние и станд.отклонения Стд.откл.=sqrt(SS/N)		
	Средние	Ст.Откл.	N
H	70.946	6.0297	101
S	14.457	5.9508	101
K	7.360	1.3732	101
HS	1039.388	496.8772	101
HK	523.687	114.4562	101
KS	105.370	47.2622	101
HH	5068.517	865.6312	101
SS	244.211	217.9679	101
KK	55.967	21.7794	101
Z	26.496	4.7705	101

Натиснувши кнопки процедури **Covariances** / **Ковариации** (2) (рис. 11.61) одержуємо коваріаційну матрицю вихідних даних (11.57), а натисненням кнопок процедур **Matrix plot of correlations** / **Матричный график** (3) і **Box & whisker plot** / **Диаграмма размаха** (4) — відповідно графічне (рис. 11.62) представлення квадратної кореляційної матриці згідно даних табл. 11.58 і діаграми розмаху (“ящиків з вусями”) (рис. 2.19 а на с. 117), вибір змінних і типу якої наведено відповідно на рис. 11.63 а) і рис. 11.63 б). Далі натискаємо кнопку **Matrix** / **Матричный** (5) для переходу на однойменну вкладку.




Рис. 11.60. Панель описовой статистики (вкладка **Advanced** / **Дополнительно**)




Рис. 11.61. Панель описовой статистики (вкладка **Advanced** / **Дополнительно**)

На вкладці **Matrix** / **Матричный** натисненням єдиної кнопки процедури **Matrix** / **Отобразить матрицу** виводиться кореляційна таблиця вихідних даних (табл. 11.58).

Таблиця 11.57. Коваріаційна матриця вихідних даних

Переменная	Ковариации (Биометрия-П.ста) Стд. откл.=sqrt(SS/N)									
	H	S	K	HS	HK	KS	HH	SS	KK	Z
H	36.357	14.268	2.0459	1629.1	406.75	137.14	5213.3	599.9	26.340	7.667
S	14.268	35.412	-0.8653	2904.4	44.55	257.23	2115.6	1250.4	-15.796	8.089
K	2.046	-0.865	1.8858	-29.3	145.49	18.18	285.7	-14.8	29.550	1.851
HS	1629.104	2904.447	-29.3335	246886.9	9818.17	21706.21	239694.1	105783.7	-719.415	730.060
HK	406.750	44.549	145.4892	9818.2	13100.22	2276.80	57850.0	3335.8	2240.478	183.847
KS	137.138	257.227	18.1835	21706.2	2276.80	2233.72	20079.1	9271.5	262.141	87.089
HH	5213.297	2115.607	285.7462	239694.1	57849.99	20079.12	749317.3	89442.3	3665.681	1067.406
SS	599.931	1250.366	-14.8379	105783.7	3335.79	9271.55	89442.3	47510.0	-332.662	322.275
KK	26.340	-15.796	29.5500	-719.4	2240.48	262.14	3665.7	-332.7	474.344	24.433
Z	7.667	8.089	1.8511	730.1	183.85	87.09	1067.4	322.3	24.433	22.757




Рис. 11.62. Графічне представлення кореляційної матриці (табл. 11.58)

У результаті натиснення кнопки опції **Residuals vs. independent var.** / **Остатки и независимые переменные** (4) маємо кореляційний графік залишків із лініями довірчих меж та коефіцієнтом кореляції і рівнянням регресії




Рис. 11.64. Панель аналізу залишків (вкладка **Остатки**)

Натиснувши кнопку **Casewise plot of residuals** / **Построчные графики остатков** (1), (рис. 11.64) отримуємо табл. 11.59.

Таблица 11.59. Залишки за повторністю (рядками)

			Остатки (обычные) (Биометрия-П.ста)							
			Зависимая перемен.: Z							
Набл.	Остатки (обычные)					Наблюд.	Предск.	Остатки	Станд.	Станд.
	-3σ	.	.	0	+3σ	Значение	Значение		предск.	Остатки
1	.	.	.	*	.	30.40000	32.22407	-1.8241	2.13253	-0.43817
2	*	30.10000	28.61802	1.4820	0.79001	0.35600
3	.	.	.	*	.	32.20000	33.27061	-1.0706	2.52215	-0.25718
4	*	33.50000	31.38237	2.1176	1.81917	0.50869
5	*	30.00000	28.75325	1.2467	0.84035	0.29949
95	.	.	.	*	.	24.50000	24.72313	-0.2231	-0.66005	-0.05360
96	.	.	.	*	.	26.30000	26.33183	-0.0318	-0.06113	-0.00765
97	.	.	.	*	.	23.30000	23.70883	-0.4088	-1.03767	-0.09821
98	.	.	*	.	.	20.80000	26.11841	-5.3184	-0.14059	-1.27757
99	*	28.60000	25.94768	2.6523	-0.20415	0.63713
100	.	.	.	*	.	23.40000	25.29658	-1.8966	-0.44656	-0.45559
101	*	30.60000	28.13554	2.4645	0.61038	0.59200
Минимум	.	*	.	.	.	13.70000	16.10736	-12.2391	-3.86768	-2.94002
Максим.	*	39.90000	33.27061	11.5699	2.52215	2.77928
Среднее	.	.	.	*	.	26.49604	26.49604	0.0000	-0.00000	0.00000
Медиана	.	.	.	*	.	26.20000	26.70521	-0.0318	0.07787	-0.00765






Рис. 11.65. Кореляційний графік залишків з довірчими межами та еліпсом

Задіявши кнопки процедур Histogram of observed / Гистограмма наблюдаемых (2) і Histogram of residuals / Гистограмма остатков (3) виводимо відповідні гістограми з накладеними кривими нормального статистичного розподілу, наведені на рис. 11.66.



а)



б)

Рис. 11.66. Розподіл отриманих експериментальних значень (а)
і їхніх залишків (б)

Тут, як і нижче на рис. 11.67, слід звернути увагу на положення перемикача ☒ Raw residuals / ☒ Исходные чи ☐ Standard residuals / ☐ Стандартные — представлення даних у вихідному або стандартизованому вигляді.

Натиснувши кнопку Predicted / Предсказанные (4) переходимо на однойменну вкладку панелі ☒ Residual Analysis / ☒ Анализ остатков (рис. 11.67).




Рис. 11.67. Панель аналізу залишків (вкладка **Предсказанные**)

Виконання процедури ☒ Histogram of predicted / ☒ Гистограмма (1) видає гістограму передбачуваних значень залежного фактору з накладеною кривою нормального статистичного розподілу (рис. 11.68).






Рис. 11.68. Розподіл передбачуваних значень

Натиснення кнопки процедури  /  (2) виводить кореляційний графік передбачених значень від незалежного фактору, або їхньої парної (потрійної і т.д.) залежності з поясом довірчих меж та коефіцієнтом кореляції і рівнянням регресії (рис. 11.69). Довірчий еліпс нанесено для більшої наочності.





























Рис. 11.69. Кореляційний графік залежності передбачених значень залишків від незалежного фактору залишків з довірчими межами

Результатом запуску процедури  /  (3) є одержання таблиці, аналогічної табл. 11.59, з тією різницею, що у її бовокику замість розподілу залишків представлено розподіл передбачуваних значень.

Після цього натиснувши  (4) переходимо на однойменну панель. Вона має єдину опцію  / , яка діє лише для типу викидів  / . При її натисненні видається таблиця порядкових викидів (табл. 11.60).

Для кнопок процедур  /  (1),  /  (2) і  /  (3) вкладки  /  (рис. 11.70) аналогічна дії кнопок процедур  / ,  /  і  /  вкладки  /  меню  /  (рис. 2.20).

Таблиця 11.60. Викиди за повторністю (рядками)

Набл.	Станд. остатки							Станд. остатки (Биометрия-П.ста)			
	-5.	-4.	-3.	±2.	3.	4.	5.	Наблюд. Значение	Предск. Значение	Остатки	Станд. предск.
21	.	.	.	*	.	.	.	35.30000	26.70521	8.5948	0.077875
28	*	.	.	39.90000	28.33009	11.5699	0.682811
68	*	.	.	36.20000	25.06145	11.1386	-0.534094
69	.	.	*	17.40000	29.63909	-12.2391	1.170150
Минимум	.	.	*	17.40000	25.06145	-12.2391	-0.534094
Максим.	*	.	.	39.90000	29.63909	11.5699	1.170150
Среднее	.	.	.	*	.	.	.	32.20000	27.43396	4.7660	0.349185
Медиана	.	.	.	*	.	.	.	35.75000	27.51765	9.8667	0.380343



Рис. 11.70. Панель wyboru ймовірнісних графіків (вкладка Вероятностные графики)

Рис. 11.71. Панель wyboru незалежних змінних

У результаті їхньої дії одержуємо графіки рис. 2.31–2.33).

При натисненні

Predict dependent variable /

Предсказать зависимую переменную (4)

вкладки Residuals/assumptions/prediction /

Остатки/предсказанные/наблюдаемые значения

панелі Multiple Regression Results /

Результаты множественной регрессии

(рис. 11.54) відкривається панель

Specify values for indep. vars /

Задайте значения независимых переменных, де

значення незалежних змінних уста-

новлюється у відповідності з

рис. 11.71. Натиснувши на ній кно-

пку **OK** одержуємо табл. 11.61 з передбаченими значеннями залежної змінної.

У даному для ознайомлення з роботою модуля Множественная регрессия наведено одержання великої кількості статистичного матеріалу у вигляді таблиць (табл. 11.46–11.61 та рис. 11.56, 11.62, 11.66, 11.65 і 11.69), які ілюструють можливості модуля (та й то далеко не всі).

Практично ж при його використанні отримання рівняння регресії і його статистичної характеристики закінчуються табл. 11.46, яка саме поєднує в собі вказане вище [143].

До суттєвих недоліків модуля **Multiple Regression** / **Множественная регрессия**, окрім того, що він працює лише із середніми значеннями показників, слід віднести ще й те, що він не дозволяє визначити оптимальні параметри рівняння регресії й одержувати парні залежності функції відклику з фіксацією інших

факторів на заданому рівні. Але останнє не завжди необхідне, так як у разі досить великої вибірки є змога виділити певний діапазон необхідного фактору і провести його аналіз.

Побудова поверхонь відклику парних залежностей без фіксації інших факторів на необхідному рівні, з одержанням виразів функціональних залежностей у вигляді рівнянь другого порядку, викладена на рис. 2.26 і 2.27.

Таблица 11.61. Предбачені значення залежної змінної			
Переменная	Предск. значения для (Биометрия-П. ста) перемен.: Z		
	В-Веса	Значение	В-Веса * знач.
H	4.708376	70.0	329.586
S	0.235145	10.0	2.351
K	3.364296	8.0	26.914
HS	-0.005628	700.0	-3.939
HK	0.045908	560.0	25.708
KS	-0.023471	80.0	-1.878
HN	-0.035098	900.0	-171.982
SS	0.019780	100.0	1.978
KK	-0.338986	64.0	-21.695
Св. член			-159.386
Предсказ.			27.7
-95.0%ДП			26.2
+95.0%ДП			29.1

Отримані результати загалом можна інтерпретувати так.

— якщо значення p для рівняння регресії розраховане для F -критерію Фішера (рис. 11.52, с. 739, табл. 11.46–11.48 на с. 739–740) менше прийнятого рівня значущості α , то можна вважати, що знайдена досить адекватно описує взаємозв'язок ознак;

— якщо $p > \alpha$, то регресійна модель незадовільно описує взаємозв'язок ознак;

— стандартна похибка оцінки моделі (табл. 11.46, с. 739) показує ступінь розсіювання різниці між фактичними і прогнозованими значеннями залежної змінної;

— коефіцієнт детермінації R^2 (у разі простого регресійного аналізу) є квадратом коефіцієнта кореляції і показує, яка частина дисперсії залежної ознаки може бути пояснена дисперсією незалежного ознаки. Він має значення від 0 (немає зв'язку ознак) до 1 (детермінуючий зв'язок ознак);

— Коефіцієнт множинної детермінації (скорегований R^2) (рис. 11.52, с. 739, табл. 11.46, на 739) для множинного регресійного аналізу показує, якою мірою варіація залежної ознаки визначається варіацією незалежних ознак, включених в модель. Чим вище R^2 , тим краще регресійна модель;

— вагові коефіцієнти B , тобто b (β — їх стандартизований варіант) (табл. 11.46, с. 739) є коефіцієнтами рівняння регресії. Вони показують, наскільки сильно середнє значення залежного ознаки y варіює з кожною оди-

ницею зміни незалежного ознаки x . У разі простої лінійної регресії регресійний коефіцієнт (нахил регресійної прямої) є мірою зв'язку між аналізованими ознаками x і y . Нульовий нахил (горизонтальна лінія на графіку) означає відсутність лінійного зв'язку між ознаками. Тому в ході регресійного аналізу перевіряються гіпотези про рівність нулю цих коефіцієнтів ;

— якщо для будь-якого коефіцієнта b_i маємо $p_i < \alpha$, то відповідний фактор x_i є значущим прогностичним для ознаки y (на рис. 11.52, с. 739 і табл. 11.46, на 739 виділений червоним кольором);

— якщо $p > \alpha$, то відповідний фактор x_i не є значущим прогностичним для ознаки y .

Слід мати на увазі, що результати регресійного аналізу можуть бути застосовні тільки до *задіяного інтервалу* значень даних, інакше модель некоректна.

Результатом регресійного аналізу є створення статистичної моделі, яку, як і всяку математичну модель, слід перевірити працездатність (див. с. 675) [5].

11.7. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ.

11.7.1. Множинна регресія

Множинна регресія полягає в аналізі зв'язку між декількома незалежними змінними і залежною. Для множинної лінійної регресії передумови регресійного аналізу і його проведення повністю збігаються з простою лінійною регресією, основні вимоги та показники множинного регресійного аналізу такі ж, як і для простої регресії.

Бажано відбирати для множинного регресійного аналізу ті незалежні змінні, які сильно корелюють із залежною змінною, в той же час, вони повинні слабо корелювати один з одним. Якщо незалежних змінних багато, то доцільно перед множинним регресійним аналізом провести факторний аналіз спрямований на редукцію даних.

При інженерному експерименті для дослідження роботи устаткування при двофакторному експерименті зазвичай береться один фактор, пов'язаний з конструкцією машини, а другий з режимом роботи; при трифакторному — додається ще фактор, що характеризує оброблюваний матеріал.

Існує три види методів множинної регресії. *Стандартний метод* — враховує всі залежні змінні. *Покроковий прямий* і *покроковий зворотний* дозволяють підібрати найбільш оптимальну комбінацію незалежних змінних. Тому, саме їх і слід вибрати.

При прямому методі незалежні змінні, які мають найбільші коефіцієнти часткової кореляції з залежною змінною покроково ув'язуються в регре-

сійне рівняння. При зворотному методі починають з результату, що містить всі незалежні змінні і потім виключають незалежні змінні з найменшими частковими кореляційними коефіцієнтами, поки відповідний регресійний коефіцієнт не виявляється незначним.

Необхідно відзначити, що різні варіанти покрокового методу можуть давати різні результати, тому слід застосувати кожен з них, а потім вибрати більш відповідний кінцевий результат.

Основними цілями множинного лінійного регресійного аналізу є:

1) Визначення того, якою мірою залежна змінна пов'язана з сукупністю незалежних змінних і, яка статистична значимість цього взаємозв'язку. Розглянуті показники оцінюються коефіцієнтом множинної кореляції і його статистична значимість за F -критерієм Фішера.

2) Визначення суттєвості внеску кожної незалежної змінної в оцінку залежної змінної, відсів несуттєвих для передбачення незалежних змінних. Розглянуті показники — регресійні β -коефіцієнти і їх статистична значимість за t -критерієм Стюдента.

3) Аналіз точності передбачення і ймовірних помилок оцінки залежної змінної. Розглянуті показники — коефіцієнт множинної детермінації.

Загалом, множинна регресія дозволяє досліднику задати питання про те, “що є кращим предиктором для ...” [9].

Пошук екстремального значення функцій декількох змінних, для яких відсутнє аналітичне вираження, методами, що базуються на послідовному варіюванні однієї змінної при фіксованих значеннях усіх інших, вимагає виконання великого обсягу дослідів [1, 76]. Тому представляється доцільним використання методів математичної теорії планування експериментів, яка полягає у виборі числа й умов проведення дослідів, необхідних і достатніх, щоб розв'язати поставлену задачу з мінімальними витратами й відповідною точністю при неповному знанні про так звану *функцію відклику* — рівняння регресії $\hat{y} = f(x)$, що установлює взаємозв'язок між випадковою факторіальною величиною y (*параметром оптимізації*) і величиною x (*фактором*), яка є змінною, але не випадковою [76]. Це скорочує обсяг досліджень, зменшує число дослідів, дозволяє одержати кількісну оцінку впливу факторів; дає можливість мати необхідну математичну модель явища; визначити оптимальні умови його виконання тощо. [68]. Поєднання цього із застосуванням електронної обчислювальної техніки дає змогу швидко обробляти результати й у ряді випадків вносити корективи в дослідження безпосередньо в процесі проведення експерименту.

Для складання матриці спектра плану першого порядку використовуються правило: в першому рядку матриці все фактори дорівнюють мінус одиниці, в першому стовпці знаки одиниць змінюються по чергово; у другому стовпці вони чергуються через два; в третьому — через 4; в четвертому — через 8 і т.д. за ступенями двійки [145] (Додаток К, табл. К.1–К.2, с. 1138).

Для моделей другого порядку починаючи з трьох факторів, використовують спеціально розроблені плани, які дозволяють знайти числові значення

всіх компонентів рівняння регресії та оцінити похибку експерименту. Деякі з матриць цих планів представляє Додаток К, табл. К.5–К.22, с. 1139–1146.

При цьому плани експерименту складаються так, щоб рандомізувати, тобто, зробити випадковими) ті систематично діючі фактори, які важко піддаються обліку і контролю, з тим, щоб можна було розглядати їх як випадкові величини і, отже, враховувати статистично [51].

Однак далеко не завжди можливий такий активний експеримент. У багатьох випадках дослідникові доводиться обмежуватися *пасивним експериментом*, залишаючись в ролі пасивного спостерігача за деякими спонтанно протікає процесом, і залишається тільки спостерігати за тим, що відбувається і реєструючи значення параметрів, які задають умови його проведення. Природно поставити питання: чи можна, користуючись результатами пасивного експерименту, виділити домінуючі фактори? Інтуїтивно ясно, що однозначного рішення таке завдання мати не може і тут потрібно вводити додатково ряд сильних припущень [51].

Досвід показує, що багатовимірний регресійний аналіз, застосований при обробці результатів пасивного спостереження, рідко дає цікаві результати. Переваги активного експерименту аж ніяк не задаються тільки тим, що матриця незалежних змінних тут організована — в сенсі критерію *D*—оптимальності або критерію ротатабельності — краще, ніж в пасивному експерименті. Дуже важливе значення має і та обставина, що в активному експерименті вимірюється відгук на варійовані нами змінні, тоді як в пасивному експерименті вимірюється відгук, який обумовлений не лише досліджуваними змінними. У будь-якої реальної ситуації завжди є безліч незалежних змінних, які з тих чи інших причин не можна включати в розгляд - ці змінні ми будемо тут називати неспостережуваними. В активному експерименті, як би він не був організований, спостережувані змінні завжди практично некорельовані з неспостережуваними, і тому оцінки коефіцієнтів регресії виявляються незміщеними.

У пасивному експерименті незалежні змінні, як правило, сильно корельовані з неспостережуваними, що веде до зміщення оцінок. Зсув може бути настільки сильним, що регресійний аналіз іноді втрачає будь-який сенс [51].

На практиці найчастіше доводиться мати справу зі змішаним *активно-пасивним* експериментом у якому поєднуються активне варіювання одних факторів з лише реєструванням значення параметрів інших. Результати таких досліджень аналізують шляхом побудови графічних залежностей між величинами, які оптимізуються, і варійованим фактором.

Варто зауважити, що останнім часом унаслідок використання для обробки експериментальних даних електронно-обчислюваної техніки, яка “розрахує будь-що”, все частіше зустрічаються експерименти з довільним вибором і взаємним поєднанням рівнів досліджуваних параметрів. У цьому разі оцінка результатів ґрунтується лише на статистичній оцінці за критерієм Фішера, у той час як самі плани експериментів передбачають оптимальність і ефективність розташування точок [68]. Тому дослідник повинен чітко до-

тримуватися вимог: там де можна здійснити експеримент на сталих рівнях досліджуваних факторах, особливо конструкційних і технологічних параметрів та режимів, складу сумішей і т.п., експеримент повинен бути виконаний **виключно** за відповідними матрицями планування.

Коефіцієнти регресії **b** математичної моделі представляють собою незалежні внески кожної незалежної змінної до передбачуваної функції відклику, тобто показують на скільки фізичних величин зміниться значення функції при зміні регресора на одну фізичну величину факторіальної ознаки, тобто наскільки змінна фактору корелюється зі змінною функції при фіксації всіх інших незалежних факторів. Ця кореляцію також називається частковою.

Зв'язана залежність між результуючою й факторіальною ознаками в багатьох випадках не має лінійної форми, тобто пропорційної зміни на всьому градієнті взаємної мінливості. Непропорційність полягає в ослабленні або посиленні форми вираження мінливості результуючого значення зі збільшенням або зниженням факторіального значення. У цьому разі рівняння зв'язаної мінливості набуває форми параболи різного ступеня [128].

Для вибору моделі опису поведінки системи можна задовольнятися гіпотезою, обраною з принципу простоти [146], а саме взяти в якості апроксимуючої функції поліном (многочлен).

Для математичного опису області оптимуму отриманих залежностей багатофакторного експерименту найчастіше використовується математична модель — рівняння регресії — функцію відклику, яка представляє відгук ряду Тейлора, який містить квадрати змінних [140, 147, 148].

Те, що математичні моделі не є предметно-фізичними, а абстрактно-знаковими, не зменшує їх об'єктивності за умови, що вони з достатньою точністю описують поведінку системи.

Для спрощення оцінки розрахункових значень функції відклику в активному експерименті, тобто, коли рівні факторів задаються дослідником [144], при плануванні експерименту фактори з натуральних змінних (іменованих величин з відповідною розмірністю) переводяться в кодовані зазвичай з обмеженням $-1 \leq x_i \leq +1$, яке перетворює k -вимірний паралелепіпед в k -вимірний куб, а еліпсоїд — в сферу [121].

З алгебраїчної точки зору введення кодованих змінних відображає прагнення до ортогоналізації систем функцій [149], з обчислювальною — до спрощення розрахунків оцінок коефіцієнтів поліноміальних моделей, з загально-методичної — до створення стандартизованого набору оптимальних планів (матриць), незалежних від субстанції і структури об'єкта дослідження.

Інтервалом варіювання факторів є число, додавання якого до основного (нульового) рівня показує верхній, а віднімання — нижній рівень факторів. Для кожної змінної він вибирається таким, щоб прирошення величини вихідного параметра до базового значення при реалізації кроку можна було виділити на фоні “шуму” при даному числі паралельних дослідів [32].

Найбільш економічним є варіювання факторів на трьох рівнях, що дозволяє мати залежність у вигляді полінома другого порядку [25].

Щоб виключити основні недоліки класичного регресійного аналізу — кореляцію між коефіцієнтами регресії використовується кодування значень факторів за формулою [76].

$$X_{is} = \frac{2x_{is} - x_{iB} - x_{iH}}{x_{iB} - x_{iH}}, \quad (11.51)$$

де X_{is} — кодоване значення фактору (безрозмірна величина), для верхнього, центру експерименту та нижніх рівнів, позначених як +1, 0 і -1;
 x_{is} — натуральне значення i -го фактору;
 x_{iB}, x_{iH} — натуральне значення i -го фактору відповідно на верхньому й нижньому рівні.

Ряд авторів указують, що інтервал варіювання не можна брати менше помилки величини основного рівня, інакше верхній і нижній рівні будуть нерозрізненними. [145]

З іншого боку, збільшення величини інтервалів варіювання небажане, так як може призвести до зниження ефективності пошуку оптимуму. Окрім того він не може бути настільки великим, щоб вийти за межі області визначення фактору. Також вибір інтервалів варіювання безпосередньо залежить від інформації щодо кривизни поверхні відгуку і про діапазон зміни параметра оптимізації [145].

Розглянемо умову про те, що інтервал варіювання повинен бути не менше помилки величини основного рівня більш докладно. За нею, використавши похибку результату вимірювання $t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}$ (див. с. 62), маємо

$$\varepsilon > t_{\alpha(v)} \cdot s_{\bar{x}}, \quad (11.52)$$

де ε — інтервал варіювання.

Вибірковий відхил s при $n=3$ рівнях активного експерименту за виразом (1.56) дорівнює

$$s = +\sqrt{\frac{2\delta^2}{n-1}} = \varepsilon, \quad (11.53)$$

а похибка $s_{\bar{x}}$ середнього, тобто основного рівня x_0 , за виразом (1.63), становитиме

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{\delta}{\sqrt{3}}. \quad (11.54)$$

Таким чином вираз (11.52) набуде вигляду

$$\delta > \frac{\delta}{\sqrt{3}} \cdot t_{\alpha(2)_T}, \quad (11.55)$$

тобто

$$t_{\alpha(2)_T} < \sqrt{3}, \quad (11.56)$$

Звідси можна знайти лише рівень значущості, який статистично. функцією пакету **Excel** **СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х**($\sqrt{3}$;2) становить $\alpha = 0.225403$. Він значно перевищує зазвичай використовуваний допустимий $\alpha = 0.05$. Це свідчить, що умова, наведена в [145], у активному експерименті нездійсненна і може використовуватися лише для вибірки оброблюваного матеріалу.

Якщо немає ніяких вказівок на величину інтервалу варіювання ϵ , то в першому наближенні можна вибрати $\epsilon = 0.15x_{0i}$, тобто прийняти за крок відхилення у 15 % від базового рівня x_{0i} . Такий крок надає достатню гарантію того, що фактор x_i викликає статистично значущу реакцію функції відгуку, якщо зв'язок між ними існує [32].

Відтворюваність дослідів перевіряється за критерієм Кохрена (див. підрозділ 11.9.4.1 Використання критерію Кохрена) чи Бартлетта (див. підрозділ 11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта) [72]. Дані x_i , отримані в результаті декількох рівнобіжних вимірів із повторністю n замінюються середнім арифметичним значенням, тобто найбільш імовірним значенням вимірюваної величини [1, 12, 25, 100].

Якщо досліди невідтвірні, то можна спробувати досягти відтворюваності виявленням і усуненням джерел нестабільності експерименту, а також використанням більш точних методів і засобів вимірювань. Але якщо ніякими способами неможливо досягти відтворюваності, то математичні методи планування до такого експерименту застосовувати не можна [140].

11.7.2. Оптимальні плани багатфакторних експериментів для моделей першого порядку

11.7.2.1. План першого порядку для двох змінних

Планами першого порядку для двох змінних відшукувана функція двох змінних $y = f(x_1, x_2)$ описується моделлю у вигляді площини, рис. 11.80 на с. 794

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 \quad (11.57)$$

або у вигляді гіперболоїду (неповний поліном другого порядку, рис. 11.77 на с. 792)

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_1x_2. \quad (11.58)$$

Досліди ставляться при значеннях факторів x_1 і x_2 , рівних x_{1min} , x_{1max} , x_{2min} і x_{2max} (табл. К.1), де знак "-" означає x_{min} , а знак "+" означає x_{max} .

За співвідношенням між кількістю оцінюваних невідомих параметрів моделі і кількістю точок плану експерименту всі плани підрозділяються на три класи: **ненасичені** — кількість параметрів менше числа точок плану; **насичені** — обидві величини однакові; **наднасичені** — кількість параметрів більше числа точок плану.

Для моделі у вигляді *гіперболоїду* цей план **гранично економний**, тобто, **насичений**, так як модель гіперболоїду має чотири коефіцієнта a_0 , a_1 , a_2 і a_3 , які отримуються на основі чотирьох дослідів. Так як гіперболоїд пройде через чотири експериментальних значення, то насичений експеримент не дозволяє усереднити випадкові похибки і не дає відомостей про їх розмір.

Для моделі у вигляді площини цей план є **ненасиченим (надлишковим)** — для визначення трьох коефіцієнтів (a_0 , a_1 , і a_2) використовується рівняння (11.58), яке відповідає чотирьом дослідом.

Ненасиченість дозволяє зробити усереднення і оцінити розмір випадкових похибок — у кожній з точок може бути знайдена похибка відхилення експериментальних даних щодо моделі і за ними може бути обчислено їх СКВ, оцінити випадкові похибки і отримати модель з їх усередненням.

Якщо виключити надлишковий дослід то план експерименту стане **нерототабельним**, тобто, нерівноточним в усіх напрямках, так як для рототабельності три точки дослідів факторів повинні бути рівновіддалені як один від одного, так і від центру 0, тобто, розташовуватися в вершинах рівностороннього трикутника [19].

11.7.2.2. Плани для моделі гіперболоїду при трьох і більше факторах

При трьох змінних x_1, x_2 і x_3 простір факторів є тривимірним, а простір відгуку — чотиривимірним, тому уявити в аксонометрії функцію відгуку неможливо.

Для моделі у вигляді чотиривимірного гіперболоїду

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_1x_2 + a_5x_2x_3 + a_6x_4x_3 + a_7x_4x_2x_3 \quad (11.59)$$

шуканими є вісім коефіцієнтів (a_0, a_1, \dots, a_7), для визначення яких мінімально необхідно мати вісім дослідів.

Забезпечення рототабельності плану вимагає, щоб вони знаходилися в просторі факторів на рівній відстані один від одного і рівних відстанях від центру. Це задовольняє розміщення дослідів в восьми вершинах куба, вписаного в сферу з центром, що збігається з центром плану. Так як всі перетини поверхні гіперболоїду, паралельні осям x_1, x_2, x_3 , суть прямі лінії, то для їх визначення достатньо двох точок, тобто, кожен з факторів x повинен варіюватися лише на двох рівнях — x_{min} і x_{max} .

Графічно зобразити рототабельний план для більшого, ніж для трьох факторів неможливо. Його можна тільки записати у вигляді таблиці.

Складання таких планів-таблиць для будь-якого числа змінних, тобто, для координат всіх вершин багатовимірного гіперкуба в k -вимірному просторі факторів будь-якої розмірності виконується за правилом: знаки “-” і “+” в колонках плану-таблиці повинні чергуватися за правилом двійкового коду, тобто, в стовпці для x_1 — через один, в стовпці для x_2 — через два, для x_3 — через чотири, для x_4 — через вісім, а для x^k — через 2^{k-1} .

Це, у першу чергу, стосується матриці плану організації експерименту. Для статистичної обробки матрицю даних краще ранжувати за факторами (див. с. 838).

Приклад плану-таблиці для моделі чотиривимірного гіперболоїду з трьома факторами наведено в табл. К.2. За цим правилом, можна скласти плани — таблиці для моделі гіперболоїду для будь-якого числа факторів.

Загальною властивістю цих планів є те, що вони завжди насичені і дають єдине рішення, не дозволяючи усереднити дані і оцінити розмір випадкових похибок одержуваних даних. У теорії планування ці плани отримали назву повних факторних планів, або скорочено — ПФП [19].

11.7.2.3. Плани для моделі у вигляді гіперплощини

На відміну від моделі гіперболоїду, що вимагає визначення 2^k невідомих коефіцієнтів, модель у вигляді гіперплощини

$$y = a_0 + a_1x_1 + \dots + a_kx_k \quad (11.60)$$

містить $k + 1$ відшукуваний коефіцієнт і вимагає для їх визначення не менше ніж $n = k + 1$ дослідів. Тому ПФП для гіперплощини сильно надлишковий і для визначення коефіцієнтів досить використовувати лише його певну частину, яка називається в теорії планування дробовою реплікою, дробовим факторним планом, скорочено — ДФП [19, 144].

Якщо дроблення ПФП проводиться багаторазовим послідовним розподілом числа його дослідів на 2, то репліка називається регулярною. Число раз p такого послідовного ділення називається дрібністю репліки, а число дослідів регулярного ДФП становить $n = 2^{k-p}$. При $p = 1$ ДФП називають напівреплікою (1/2–реплікою), при $p = 2$ — четвертьреплікою (1/4–реплікою), при $p = 3$ — 1/8–реплікою, при $p = 4$ — 1/16–репліки і т.д. [144].


11.7.2.4. Правило складання планів–таблиць для регулярних дробових реплік.

Складання плану починають з мінімального рівня кожного фактору, позначених знаком “-”. Для стовпців перших факторів, поки забезпечується чергування знаків, план складається з викладеного вище правилом чергування цифр в розрядах двійкового коду. Починаючи ж з того стовпця, де за правилом двійкового коду повинні бути поставлені тільки знаки “-” і чергування знаків відсутнє, знаки знаходяться за правилом множення знаків цього рядка вже заповнених стовпців плану (x_1x_2 , x_2x_3 , x_1x_3 , $x_1x_2x_3$ і т.д.).

Розглянемо це правило на прикладі складання плану для трьох факторів x_1 , x_2 і x_3 . Повний факторний план для $k = 3$ містив би $2^3 = 8$ дослідів, розміщених на поверхні сфери на рівних відстанях між собою і рівних довжин ребер куба, вписаного в цю сферу (див. рис. 11.74 б).

Для моделі гіперплощини

$$y = a_0 + a_1x_1 - a_2x_2 + a_3x_3 \quad (11.61)$$



необхідно визначити лише 4 коефіцієнта, отже, досить напіврепліки, 4 дослідів з 8, зазначених на рис. 11.74 б) і в табл. К.2. Але для збереження рототабельності плану вони повинні розміщуватися на поверхні сфери, яка описує куб на рис. 11.74 б), на рівних відстанях між собою.

Для цього перші два стовпці плану (табл. 11.62) заповнюються за правилом двійкового коду, а третій стовпець знаходиться за правилом множення як $x_3 = x_1 x_2$. Якщо тепер порівняти поєднання чинників в табл. 11.62 і К.2, то можна помітити, що в табл. 11.62 увійшли 5, 2, 3 і 8-й дослід з табл. К.2, що зазначено в останньому стовпчику табл. 11.62. Таким чином, зазначене правило з ПФП відбирає

ДФП у вигляді регулярної репліки.

У даному випадку це — напіврепліки (4 дослідів з 8), дослідів якої розміщені у вершинах правильного тетраедра, рис. 11.72). Решта ж чотири вершини куба утворюють другу напіврепліку, розташовуючись в вершинах другого можливого тетраедра.

Таблиця 11.62. Отримання напіврепліки 2^{3-1}				
Номер дослідів	x_1	x_2	x_3	Номер дослідів за табл. К.2
1	-	-	+	5
2	+	-	-	2
3	-	+	-	3
4	+	+	+	8

Так як найпростіші правильні фігури або тіла (рівносторонній трикутник на площині, тетраедр в тривимірному просторі і т.д.) в стереометрії називаються **симплексами**, то отримані описаним шляхом ДФП, дослідів яких розташовуються в вершинах симплексів, називаються в теорії планування **симплекс-планами**.

Параметри симплекс-планів для моделей у вигляді гіперплощини з різним числом k факторів приведені в табл. 11.63, з якої видно, що симплекс-плани для моделі у вигляді гіперплощини можуть бути як насиченими (при $k=3$, $k=7$ і т.д.), Так і містити кілька надлишкових дослідів.

В останньому випадку для зменшення похибки адекватності моделі в неї можуть бути додатково введені деякі члени моделі гіперболоїду. Наприклад, при $k=4$ напіврепліки містить 8 дослідів, модель же гіперплощини вимагає визначення тільки 5 коефіцієнтів. Що залишилися в надлишку 3 досвіду дозволяють ввести в модель ще 3 додаткових члена у вигляді добутку факторів з решти $16-5=11$ членів моделі гіперболоїду. Але для усереднення випадкових похибок раціонально залишити 1–2 надлишкових досвіду, тобто, ввести лише одне або два найбільш значущих добутків факторів [35].

Таблиця 11.63. Симплекс–плани для моделей у вигляді гіперплощини з різним числом k факторів

Число факторів k	Число коефіцієнтів моделі $k+1$	Число дослідів ПФП	Вид плану	Число дослідів плані	Надлишковість
2	3	4	ПФП	4	1
3	4	8	Напіврепліка	4	0
4	5	16	Напіврепліка	8	3
5	6	32	Чвертьрепліка	8	2
6	7	64	1/8–репліка	8	1
7	8	128	1/16–репліка	8	0
8	9	256	1/16–репліка	16	7

11.7.3. Плани другого порядку

11.7.3.1. Критерії оптимальності та типи планів

Для детального вивчення області оптимуму і ділянок поверхні відгуку зі значною кривизною лінійна модель стає неадекватною. У таких випадках для математичного опису може бути досить полінома другого порядку, рідше третього порядку, отриманого використовуючи плани відповідно другого і третього порядків.

Плани 2–го порядку дозволяють отримати математичний опис у вигляді повної квадратичної моделі, що містить крім основних ефектів b_i парні взаємодії b_{ij} і квадратичні ефекти b_{ii} . Плани $2k$ не можуть забезпечити отримання роздільних оцінок коефіцієнтів b_{jj} при квадратичних функціях і коефіцієнта b_0 .

Вони плани застосовують, як правило, або в тому випадку, коли використання планування першого порядку не дозволило отримати адекватну регресійну модель, і з'ясувалася необхідність її ускладнення, або якщо заздалегідь відомо, що об'єкт дослідження має істотні нелінійними властивості.

Застосування повного факторного експерименту типу $3k$ для отримання роздільних оцінок коефіцієнтів полінома другого порядкане є раціональним, так як планування на трьох рівнях характеризується різким збільшенням обсягу експерименту. Зазвичай ці плани використовують на заключному етапі дослідження: при описі експериментальної області в ситуаціях, коли відсутня апріорна інформація про об'єкт і його поліноміальних модель доводиться підбирати послідовно, починаючи з найпростішого лінійного рівняння, яке потім добудовується до повної квадратичної моделі. У таких випадках застосування композиційних планів виявляється найбільш вигідним за числом дослідів [150].

У багатьох випадках метою дослідження є отримання математичного опису досліджуваного процесу. Часто через складність процесу або малий обсяг інформації невідому залежність досліджуваної величини x_i від m незалежних факторів представляють поліномом виду:

$$y = \chi_0 + \sum_{1 \leq i \leq m} \beta_i x_i + \sum_{1 \leq i \leq m} \beta_{ij} x_{ij} + \sum_{1 \leq i \leq m} \beta_{ii} x_{ii}^2 + \dots \quad (11.62)$$

У цьому випадку необхідно визначити коефіцієнти рівняння і оцінити їх значимість. За результатами дослідів можна визначити тільки вибіркові коефіцієнти регресії $b_0, b_i, b_{ij}, b_{ii} \dots$, які є лише оцінками теоретичних коефіцієнтів $\beta_0, \beta_i, \beta_{ij}, \beta_{ii} \dots$ полінома (11.62), які прийнято називати *ефектами факторів* [58], кількість яких визначається за виразом $n = 0.5 \cdot m^2 + 1.5m + 1$.

Опис поверхні відгуку поліномами першого порядку часто виявляється недостатнім. У багатьох випадках задовільна апроксимація може бути досягнута, якщо скористатися поліномом другого порядку (11.63).

Рівняння регресії, отримане за результатами дослідів, має вигляд:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{1 \leq i \leq m} b_i x_i + \sum_{1 \leq i \leq m} b_{ij} x_{ij} + \sum_{1 \leq i \leq m} b_{ii} x_{ii}^2 + \dots \varepsilon, \quad (11.63)$$

де \hat{y} – вибірка оцінка функції відгуку y ;

b_0, b_i, b_{ij}, b_{ii} – коефіцієнти регресії, отримані за вибірковою оцінкою.

Вибір факторів, що впливають на досліджуваний показник, проводить-ся, перш за все, виходячи з змістовності аналізу. Для отримання надійних оцінок в модель їх кількість не повинна перевищувати однієї третини обсягу наявних даних (тобто $m < n/3$) [142].

У моделі (11.63) є доданок ε – випадкова величина, яка розподілена з математичним сподіванням рівним нулю і відмінною від нуля дисперсією $s^2(\hat{y})$. Вона відображає вплив випадкових факторів, а також наслідки розрахунку оцінок коефіцієнтів моделі за експериментальними даними.

На даний час використовується понад 20 різних критеріїв оптимальності планів, які поділяються на дві основні групи. До першої групи відносять критерії, пов'язані з похибками при оцінці коефіцієнтів функції відгуку, а до другої — з похибками оцінки поверхні відгуку.

Критерії *першої групи* становлять інтерес для задач оптимізації, виділення домінуючих (найбільш значущих) параметрів на початкових етапах розв'язання оптимізаційних задач або для виявлення несуттєвих параметрів встановлення закономірності функціонування об'єкта. Геометричне тлумачення властивостей похибок коефіцієнтів пов'язано з властивостями еліпсоїда їх розсіювання, що визначається математичним сподіванням і дисперсією значень похибок. Саме просторове розташування, форма, і розмір еліпсоїда повністю залежать від плану експерименту.

Критерію **D**–оптимальності відповідає мінімальний об’єм еліпсоїда розсіювання похибок (мінімум добутку всіх дисперсій коефіцієнтів полінома). У **D**–оптимальних планах значення факторів не виходять за встановлені межі діапазонів їх зміни, а ефекти факторів максимально незалежні між собою.

Крім того, вони забезпечують мінімальну похибку передбачення функції відгуку у всьому прийнятому діапазоні зміни факторів. На практиці найбільш часто застосовуються плани Коно і плани Кіфера.

Критерію **A**–оптимальності відповідає план, який мінімізує суму квадратів головних напівосей еліпсоїда розсіювання, чим досягнемо сумарної і середньої дисперсії оцінок всіх коефіцієнтів [51].

Критерію **E**–оптимальності — план, який мінімізує максимальну вісь еліпсоїда розсіювання, при цьому максимальна дисперсія коефіцієнтів буде мінімальна, що досягається мінімізацією максимального власного числа коваріаційної матриці оцінок [51].

Критерію **MV** відповідає оптимальний план, який мінімізує максимальний діагональний елемент коваріаційної матриці оцінок.

Вибір критерію залежить від завдання дослідження, так при вивченні впливу окремих факторів на поведінку об’єкта застосовують критерій **E**–оптимальності, а при пошуку оптимуму функції відгуку — **D**–оптимальності. Якщо побудова **D**–оптимального плану викликає труднощі, то можна перейти до **A**–оптимальному плану, побудова якого здійснюється простіше.

Критерії *другої групи* використовують при вирішенні завдань опису поверхні відгуку, визначення обмежень на значення параметрів. Основним тут є критерій **G**–оптимальності, який дозволяє побудувати план з мінімальним значенням найбільшої похибки в описі функції відгуку, тобто **G**–оптимальний план забезпечує найменшу, за всіма планами, максимальну величину дисперсії передбачених значень функції відгуку в області планування експерименту. Його застосування дає впевненість у тому, що в області планування немає точок з надмірно великою похибкою опису функції [51].

Серед усіх класів планів основна увага в практичній роботі приділяється *ортгональним* і *ротатабельним* планам.

Ортгональним називається план, для якого виконується умова парної ортгональності стовпців матриці планування, діагональності коваріаційної матриці. Таким чином скалярний добуток всіх векторів — стовпців матриці дорівнює нулю, зокрема, для незалежних змінних має місце

$$\sum_{u=1}^n x_{iu} \cdot x_{ju} = 0; \quad i \neq j; \quad i, j = \overline{1, k}, \quad (11.64)$$

де n — кількість точок плану експерименту;
 k — кількість незалежних факторів.

Тоді матриці будуть з попарно ортгональними векторами, скалярні добутки для всіх векторів-стовпців дорівнюють нулю. Дисперсії оцінок кое-

фіцієнтів регресії у цьому разі будуть мінімальними, а також оцінки коефіцієнта регресії для ортогональних планів виходять незалежними один від одного і оцінюються з однієї і тієї ж дисперсією, що істотно полегшує їх обчислення, аналіз та інтерпретацію [[51. 76, 151].

Таким чином, при ортогональному плануванні коефіцієнти полінома визначаються незалежно один від одного, тому **вилучення доданків у функції відгуку не змінює значення інших коефіцієнтів полінома**.

Для ортогональних планів еліпсоїд розсіювання орієнтований у просторі так, що напрямки його осей збігаються з координатними осями.

Використання **ротатабельних** планів забезпечує для будь-якого напрямку від центру експерименту рівнозначність точності оцінки функції відклику (сталість дисперсії передбачення) на рівних відстанях від центру експерименту, тобто дисперсія передбаченого значення залежить тільки від радіуса, проведеного з центру експерименту. Таким чином інформація, що міститься в рівнянні регресії рівномірно «розмазана» по сфері (в загальному випадку гіперсфері) з радіусом r [51].

Це особливо важливо при вирішенні завдань **пошуку оптимальних значень** параметрів на основі градієнтного методу, так як дослідник до початку експериментів не знає напрямку градієнта і тому прагне прийняти план, точність якого однакова у всіх напрямках.

При ротатабельному плануванні **вилучати без перерахунку полінома можна лише коефіцієнти лінійних і парних залежностей**, при вилученні вільного члена чи квадратичних залежностей поліном повинен бути перерахований заново [150].

У ряді випадків при дослідженні поверхні відгуку потрібна **уніморфність** моделі, а саме, дотримання сталості значень дисперсії похибки в деякій області навколо центру експерименту. Виконання такої вимоги доцільно коли дослідник **не знає точно розташування області поверхні відгуку** з оптимальними значеннями параметрів. Зазначена область буде визначена на основі спрощеної моделі, отриманої за результатами експериментів.

На етапі попереднього дослідження, коли потрібно отримати хоча б наближене уявлення про об'єкт з мінімальними витратами, бажано мати план, близький до насиченого.

Метод найменших квадратів застосовують тільки при ненасиченому та насиченому плануванні, і не застосується для наднасиченого.

Між критеріями оптимальності та методами побудови оптимальних планів експериментів існує жорсткий зв'язок.

11.7.3.2. Особливості застосування градієнтної оптимізації спільно з методом планування експерименту

При цьому виникає ряд проблем. Побудова математичної моделі другого порядку вимагає застосування плану, в якому кожна змінна приймає три різних значення, тобто, щоб кожен фактор варіювався не менше ніж на трьох рівнях. Існують різні підходи до побудови планів другого порядку.

Можна скористатися повнофакторним експериментом типу 3^k ($k=3$), але такі плани характеризуються великою надмірністю. Наприклад, для трьох змінних кількість точок плану складе 27 (див. рис. 11.74 а) на с. 785 і табл. К.13): 1 – центр, 8 вершин, 6 – центрів граней і 12 — середин сторін куба, у той час кількість оцінюваних коефіцієнтів функції відгуку дорівнює 10; при $k=5$ число дослідів 243, а коефіцієнтів 21. У зв'язку з цим здійснення ПФЕ для планів другого порядку не тільки складно, але й недоцільно.

Для отримання планів з меншим числом дослідів Дж. Бокс і К. Уїлсон запропонували у 1951 р. модифікацію методу крутого сходження для побудови ортогональних композиційних планів. Їхнім ядром є лінійні ортогональні плани, побудовані до планів другого порядку; звідси й назва — **композиційні плани** [2].

На початковому етапі пошуку рекомендується застосовувати лінійні поліноми для опису функції відгуку. Значення градієнта оцінюється в початковій точці, після чого покроковий рух по градієнту триває до попадання в частинний оптимум (до тих пір, поки значення функції відгуку зростає при переході від точки до точки). У цій точці за допомогою факторного експерименту знову визначається градієнт і покроковий рух починається по новому напрямі. Так продовжується до попадання в область глобального екстремуму, яка не може бути адекватно описана лінійним рівнянням.

Далі переходять до більш точного опису поверхні відгуку на основі поліномів другого порядку і уточненню положення точки глобального оптимуму. Побудова плану для формування полінома другого ступеня проводиться шляхом додавання деяких точок до “ядра”, вже сформованого для лінійного наближення (такі плани отримали найменування композиційних).

У цілому метод Бокса–Уїлсона в багатьох випадках вимагає меншої кількості дослідів хоч іноді при трохи більшому числі кроків.

Опишемо побудову ортогонального центрального композиційного плану Бокса–Уїлсона, представленого на рис. 11.74 б) на с. 785, табл. К.21. При дослідженнях спочатку ставляться досліди в точках, що задаються вершинами правильного симплекса (тетраедра) (дробнофакторний експеримент 2^{3-1} рис. 11.74 в) на с. 785. Ці три точки є підмножиною вершин того куба, яким задаються межі варіювання змінних в лінійній задачі.

Далі ставимо експерименти центрі куба для перевірки гіпотези адекватності. Якщо гіпотеза адекватності не проходить, то побудовуються ще 3 вершини куба. Далі додається ще частина так званих “зіркових” точок, які

утворюють октаедр (рис. 11.74 б) на с. 785). Тут видно, що при переході до плану другого порядку межі варіювання змінних розширюються. У результаті виходить композиційний план другого порядку, що містить всього лише 15 точок проти 27 точок повнофакторного експерименту.

11.7.3.3. Плани для опису поверхні відгуку

11.7.3.3.1. Ортогональне центральне композиційне планування

Як правило, процес оптимізації виконується в області факторного простору, де кривизна поверхні відгуку велика і внаслідок цього поверхня описується многочленом виду (11.63), тому використовується центральне композиційне планування експерименту (ЦКП).

Скоротити число дослідів можна, скориставшись так званим **композиційним** або **послідовним** планом, розробленим Боксом і Уїсоном. Так, при двох чинниках модель $y = f(x_1, x_2)$ функції відгуку другого порядку являє собою поверхню у вигляді циліндра, конуса, еліпса і т.д. (див. рис. 11.75–11.79 на с. 791–794) та табл. 11.70 на с. 795).

У відповідності з ідеєю покрокового експерименту планування раціонально здійснювати шляхом додавання спеціально підібраних точок до “ядра”, утвореного плануванням для лінійного наближення. Такі плани називають **композиційними** (послідовними), вони дозволяють використовувати інформацію, отриману в результаті реалізації лінійного плану.

Композиційним вважається план, в спектр якого у якості складової частини входять точки спектра плану, який був реалізований при побудові більш простої моделі (для другого порядку — лінійної).

Композиційність плану — важлива умова ефективності практичної реалізації принципу поступового ускладнення моделей. Вона дає можливість використовувати точки плану першого етапу в плані другого етапу у випадку, якщо модель першого етапу (поліном ступеня m , наприклад, лінійного) неадекватно описує поведінку системи (потрібно опис поліномом ступеня $m+1$, наприклад, квадратичним). Тобто, поліноми другого порядку отримують додаванням деяких точок до планів формування лінійних функцій. Це дає можливість при дослідженнях спочатку спробувати побудувати лінійну модель, а потім при необхідності, додавши спостереження, перейти до моделей другого порядку, використовуючи раніше отримані результати і зберігаючи при цьому деяке задане властивість плану, наприклад його ортогональність.

Рішення подібних завдань ґрунтується на застосуванні ортогональних чи ротатабельних **центральных композиційних планів** (ЦКП). Ці плани використовують як ядра повний факторний експеримент або мінімально можливі регулярні дробові репліки типу 2^{k-p} , де p — дробність репліки, тобто чис-

ло ефектів взаємодії, замінені новими змінними

У якості дробової репліки застосовують таку, в якій дві будь-які парні взаємодії за модулем не рівні один одному для будь-яких попарно різних індексів

$$|z_i x_j| \neq |x_s x_z|. \quad (11.65)$$

Саме план повнофакторного експерименту (ПФЕ) або дробові репліки, що задовольняють вказаним умові, служать ядром ЦКП.

Для визначення такої поверхні необхідно розташовувати координатами не менше трьох її точок, тобто фактори x_1 і x_2 повинні варіюватися не менше ніж на трьох рівнях. Тому план експерименту в площині факторів x_1 і x_2 на рис. 11.73, а, не може складатися лише з дослідів 1, 2, 3, 4 ПФЕ 2^2 , розташованих у вершинах квадрата, як це було для моделі першого порядку.

До них повинні бути додані досліді (зіркові точки) 5, 6, 7, 8, розташовані на осях x_1 і x_2 з координатами $(\pm\alpha, 0)$, $(0, \pm\alpha)$ і обов'язково дослід 9 в центрі квадрата, щоб з будь-якого напрямом (5–9–6), (1–9–4) і т.д. розташовувалося три точки, що визначають кривизну поверхні в цьому напрямку.

Таким чином, у загальному випадку ядро композиційного плану становить при $k < 5$ ПФЕ 2^k , а при $k \geq 5$ — дробову репліку від нього. Якщо лінійне рівняння регресії виявилось неадекватним, необхідно:

1) додати $2k$ зіркових точок на координатних осях факторного простору $(\pm\alpha, 0, 0, \dots, 0)$, $(0, \pm\alpha, 0, \dots, 0)$, ..., $(0, 0, \dots, \pm\alpha)$ — вершинах k -мірного аналога октаедра, де α — зіркове плече, або відстань до зіркової точки;




Рисунок 11.73. Плани другого порядку при $k = 2$.

2) провести n_0 дослідів при значеннях факторів у центрі плану.

При k факторах загальне число дослідів у матриці композиційного плану становить:

$$n = 2^k + 2k + n_0 \quad \text{при } k < 5,$$

$$n = 2^{k-1} + 2k + n_0 \quad \text{при } k \geq 5.$$

При цьому величина зіркового плеча α і число дослідів в центрі плану n_0 залежить від обраного виду композиційного плану.

Таким чином композиційний план являє собою комбінацію повного чи дробового факторного плану і деякого додаткового плану. Останній часто являє собою так званий **зірковий план**, і якщо за допомогою повного факторного експерименту не вдається одержати адекватного математичного опису, то до нього додають дослідів в “зіркових” точках і в центрі плану, а отриману при цьому композицію використовують для математичного опису процесу у вигляді многочлена другого ступеня.

Звідси і пішла назва методу — **центральне композиційне планування** (ЦКП). Поняття “**центральный**” для композиційного плану означає, що фактори приймають значення, симетричні щодо його центру, таким чином центри обох планів збігаються.

Для комбінації повного трирівневого факторного плану і зіркового плану другого порядку загальне число точок плану при k факторах буде

$$n = 2^k + 2k + n_0, \quad (11.66)$$

де 2^k — кількість дослідів, що утворюють повний факторний експеримент;

$2k$ — число так званих зіркових точок у факторному просторі;

n_0 — дослідів в центрі плану.

При **ортогональному** плані на число n_0 нульових точок у центрі експерименту не накладається ніяких обмежень, тому для скорочення експериментальної роботи застосовують $n_0 = 1$.

Ядром плану може бути як не повний факторний експеримент типу 2^k , напіврепліки і навіть чвертьрепліки від нього. При числі факторів $k \leq 5$ рекомендується використовувати повний факторний експеримент, а при більшому числі факторів — напіврепліки. При $k \geq 8$ планування ведуть за схемою 2^{k-p} .

На практиці широке поширення одержали два типи ЦКП, відомі як плани Бокса і Хартлі.

Центральний композиційний план другого порядку називають **планом Бокса**, якщо його ядром є ПФЕ 2^k або регулярна репліка типу 2^{k-p} , для якої парні взаємодії не рівні по модулю лінійним фактором: $x_i \neq x_s x_z$; $s \neq z$; $i, s, z = 1, 2, \dots, k$ і, крім того, виконується умова (11.65). Застосування ПФЕ або регулярних реплік, що відповідають цим умовам, дозволяє отримати незміщені оцінки коефіцієнтів моделі (11.63). З умов побудови дробової репліки випливає, що роздільна здатність ядра плану повинна бути більше чотирьох, тобто визначальний контраст повинен містити не менше п’яти змінних. Отже, ядром плану Бокса при $k < 5$ є ПФЕ, а при $k \geq 5$ може бути дробовофакторний експеримент (ДФЕ).

Спеціальним підбором зіркового плеча α ЦКП Бокса можна отримати

або ортогональним або ротатабельним, але не можна домогтися одночасного і строго дотримання обох властивостей.

Центральний композиційний план може бути наближено ротатабельним і ортогональним [151]. Для цього слід спочатку побудувати ротатабельний план, а потім підібрати необхідну кількість дослідів в центральній точці.

Слід звернути увагу, що нема необхідності проводити n_0 разів досліди в центрі плану, достатньо провести цей дослід один раз і записати результат n_0 разів [96].

У планах Бокса до ядра, побудованому на основі ПФЕ або ДФЕ експерименту, додається одна точка в центрі плану з координатами $(0, 0, \dots, 0)$ і $2k$ “зіркових” точок з координатами $(\pm\alpha, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, \pm\alpha)$. Побудований таким чином план буде ЦКП другого порядку. Загальна кількість точок плану при використанні композиційного планування визначається виразом (11.66), при цьому кожен фактор варіюється на п’яти рівнях: $-\alpha; -1; 0; +1; +\alpha$.

Таким чином у матриці другого порядку не для всіх стовбців витрима на умова симетричності і не всі їх пари ортогональні.

Суми $\sum_{u=1}^n x_{iu}^2 \neq 0$, $\sum_{u=1}^n x_{iu}^2 \cdot x_{ju}^2 \neq 0$ так як $x_{iu}^2 \neq 0$ для всіх рядків плану.

Для усунення асиметрії і порушень ортогональності ЦКП Бокса слід перетворити квадратичні параметри і вибрати величину зіркового плеча α [151]

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sqrt{n \cdot n_0} - n_0}{2}}. \quad (11.67)$$

Композиційні плани легко привести до ортогональних, вибираючи зіркове плече α . У табл. 11.64 наведено значення α для різного числа факторів k і числа дослідів в центрі плану n_0 .

Зокрема, геометрична інтерпретація ортогонального плану другого порядку для $k=2$ і $n_0=1$ представлений на рис. 11.73, а) на с. 773. Цей план експерименту для моделі другого порядку працездатний, хоча і надто надлишковий (9 дослідів для визначення 6 коефіцієнтів). Завдяки надлишковим дослідом, він дозволяє усереднити випадкові похибки і оцінити їх характер.

Слід особливо відмітити, що коефіцієнти рівняння регресії, які отримуються за допомогою ортогональних планів другого порядку, визначаються з різною точністю, у той час як ортогональні плани першого порядку забезпечують однакову точність коефіцієнтів, тобто план, представлений в табл. К.5, є ортогональним і забезпечує незалежність визначення коефіцієнтів b , але не є ротатабельним [17, 151].

Оцінки дисперсії коефіцієнтів є різними так як обчислюються за різними сукупностями точок плану. Оцінка дисперсії функції відгуку залежить не тільки від відстані до заданої точки від центру, але і від її положення в просторі, тобто ортогональний план другого порядку не є ротатабельним.

Таблиця 11.64. Значення зіркових плечей в ортогональних планах другого порядку

Число дослідів в центрі плану n_0	Зіркове плече α при різному числі факторів k			
	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$ *)
1	1.000	1.215	1.414	1.546
2	1.077	1.285	1.471	1.606
3	1.148	1.353	1.546	1.664
4	1.214	1.414	1.606	1.718
5	1.267	1.471	1.664	1.772
6	1.320	1.525	1.718	1.819
7	1.369	1.575	1.772	1.868
8	1.414	1.623	1.819	1.913
9	1.454	1.668	1.868	1.957
10	1.498	1.711	1.913	2.000
*) У ядрі напіврепліки.				

Ортогональним є також композиційний план Бокса B_3 , представлений на рис. 11.74, е) на с. 785 і в табл. К.24.

Центральний композиційний план другого порядку називають **планом Хартлі**, якщо його ядром є регулярна репліка типу 2^{k-p} , в якій деякі парні взаємодії рівні за модулем лінійним фактором. Їх доцільно застосовувати, якщо відомо, що частина ефектів b_j або b_{ju} в моделі відсутня (отже, прості ефекти можна змішувати з парними взаємодіями, не втрачаючи у роздільній здатності плану) або тоді, коли дисперсія спостережень відносно мала.

Інакше кажучи, ЦКП другого порядку буде або планом Бокса або планом Хартлі. Плани Хартлі більш економні за числом дослідів, ніж плани Бокса, але поступаються їм точністю оцінювання коефіцієнтів, крім того, плани Хартлі не можна зробити ні ортогональними, ні ротатабельними. До того ж вони не дозволяють отримати роздільні оцінки відповідних коефіцієнтів.

Тому, якщо не пред'являються особливі вимоги до точності передбачення вихідної величини за рівнянням регресії в будь-якому напрямку факторного простору від базової точки, переважно застосування ортогонального ЦКП через його простоти [150].

11.7.3.3.2. Ротатабельні центральні композиційні плани

При дослідженні екстремальної області часто інтерес представляє оцінка не коефіцієнтів отриманої регресійної моделі, а самої функції відгуку. Крім того, на практиці часто можна значно спростити регресійну модель шляхом повороту координатних осей, тобто перетворенням координат. Ро-

тотабельное планування, що забезпечує похибку передбачення вихідної величини по рівняння регресії, що залежить лише від відстані точки факторного простору до центру експерименту, дозволяє прогнозувати з однаковою точністю значення функції відгуку, а, отже, перетворювати систему координат з метою спрощення рівняння регресії [150].

Експериментатору заздалегідь не відомо, де знаходиться та частина поверхні відгуку, яка представляє для нього особливий інтерес, тому слід прагнути до того, щоб кількість інформації, що міститься в рівнянні регресії, було однаково для всіх одно-віддалених від центру експерименту точок.

Дійсно, видалення від центру точок 5, 6, 7, 8 в $\sqrt{2}=1.414$ рази менше, ніж видалення точок 1, 2, 3, 4 (див. рис. 11.73, а) на с. 773, і, отже коефіцієнти рівняння регресії визначаються з різною дисперсією. Також у деяких випадках ортогональне планування другого порядку не відповідає потребам практики — при описі поверхні відгуку, особливо в околі точки оптимуму, коли більш значущою є *оцінка дисперсії рівняння в цілому*, ніж оцінка дисперсії окремих коефіцієнтів полінома. У цьому випадку зазвичай прагнуть до рівномірності розподілу інформації в рівнянні функції відгуку в усіх напрямках. Такому стану відповідають ротатабельні плани.

План називається *ротатабельним* якщо його точки розташовані на сферах (гіперсферах), тому інформація про поверхні відгуку однакова для всіх напрямів (факторів) в точках, віддалених на однаковій відстані від центру експерименту, тобто дисперсії значень рівнянь регресії, однакові за всіма чинниками на рівних відстанях від центру експерименту, таким чином дисперсія оцінки функції відгуку залежить лише від відстані до центра плану [76]. Це особливо значиме *при визначенні оптимальних параметрів*.

Бокс і Хантер запропонували ротатабельні плани 2-го порядку. Для того щоб композиційний план був ротатабельним, величину зіркового плеча α вибирають з умови [17]

$$\alpha = 2^{\frac{k-p}{4}} \quad (11.68)$$

Крім сказаного, подібні плани другого порядку дозволяють мінімізувати систематичні похибки, пов'язані з неадекватністю представлення результатів поліномами другого порядку. Але побудова ротатабельного плану другого порядку більш складно, ніж ортогонального, а сама Приклад побудови не має однозначного вирішення. Один з підходів до побудови таких планів полягає в наступному [152].

Ротатабельні плани для k факторів мають 2^k точок в ядрі плану, $2k$ зіркових точок і n_0 нульових точок у центрі (див. табл. К.16 і К.29). Вони інваріантні до ортогонального обертання координат і мають позитивну властивість — мінімальну дисперсію коефіцієнтів регресії математичної моделі.

Пояснимо ідею вибору значення зіркового плеча α на прикладі матриці ротатабельного планування другого порядку для $k=2$ (табл. К.8).

Розміщення точок цього плану показано на рис. 11.73, а) на с. 773. Для забезпечення ротатабельності точок 5, 6, 7, 8 необхідно видалити їх від центру плану на відстань α в $\sqrt{2}=1.414$ разів більше, ніж видалення точок 1, 2, 3, 4 від осей x_2 і x_1 . У результаті цього всі точки плану (табл. К.8) виявляються розташованими на колі. Враховуючи істотно більший вплив на функцію відгуку випадкової похибки в точці 9, рекомендується ставити в цій точці плану не один, а кілька дублюючих дослідів (в даному випадку досліди з 9 до 13) для усереднення отриманих результатів і для здійснення статистичного аналізу результатів усього експерименту в цілому.

При використанні ротатабельних планів другого порядку дисперсія відтворюваності визначається за дослідом в центрі плану.

З огляду на специфічний характер *ротатабельного плану* у разі, якщо будь-який з квадратичних ефектів виявився незначущим, то **після його виключення коефіцієнти рівняння регресії необхідно перерахувати заново.**

Якщо модель другого порядку виявилася неадекватною, слід повторити експерименти на меншому інтервалі варіювання факторів або перенести центр плану в іншу точку факторного простору. У тих випадках, коли адекватність моделі як і раніше не досягається, рекомендується перейти до планів третього порядку.

Як було сказано вище, підбором зіркового плеча α ЦКП Бокса можна зробити або ортогональним або ротатабельним.

Точки ротатабельного ЦКП Бокса другого порядку розташовуються на не менше двох концентричних гіперсферах. Перша гіперсфера може бути виродженою, тобто представляти собою центральну точку плану, її радіус $\rho_1=0$, що часто використовується на практиці.

Друга гіперсфера відповідає вписаному до неї кубу, обраного у якості ядра плану. Для ядра $x_i = \pm 1$, отже, радіус цієї гіперсфери $\rho_2 = k^{1/2}$. Ядро являє собою ПФЕ виду 2^k або ДФЕ виду 2^{k-p} , причому має виконуватися умова $k-p > 3$. Отже, з урахуванням обмежень на ЦКП Бокса, якщо $k \geq 5$, то в якості ядра можна використовувати напіврепліки, якщо $k \geq 8$, ядром може служити чверть репліки.

Третя гіперсфера має радіус $\rho_3 = 2^{k/4}$ для ядра у вигляді повнофакторного і радіус $\rho_3 = 2^{(k-p)/4}$ для ядра у вигляді дробовофакторного експерименту.

Таким чином, кожен фактор ротатабельного ЦКП Бокса варіюється на п'яти рівнях. У деяких випадках радіуси другої і третьої гіперсфери збігаються: для $n=2$ маємо $\rho_2 = 2^{1/2}$, $\rho_3 = 2^{2/4} = 2^{1/2}$; для $n=8$ і $p=2$ отримується $\rho_2 = 8^{1/2} = 2^{3/2}$, $\rho_3 = 2^{(8-2)/4} = 2^{3/2}$.

Ротатабельне планування не дозволяє отримати незалежні оцінки коефіцієнтів моделі, корельованими виявляються коефіцієнти β_0 і β_{ii} та β_{ii} і β_{ij} .

В табл. 11.65 наведено всі необхідні дані для побудови матриці ротатабельного плану [68].

Таблиця 11.65 Дані для побудови центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку

Кількість факторів k	Кількість точок			Зіркове плече α	Загальна кількість дослідів n	Примітки
	ядра 2^k	зіркових $2k$	нульових n_0			
2	4	4	3	1.4142	11	
3	8	6	2	1.6818	16	
4	15	8	2	2.0000	25	
5	32	10	3	2.3784	45	
5	16	10	1	2.0000	27	Напіврепліка
6	64	12	3	2.8284	79	
6	32	12	2	2.3784	46	Напіврепліка
7	126	14	1	3.3636	143	
7	64	14	3	2.8284	81	Напіврепліка
8	256	16	0	4.0000	272	

Виходячи з розташування всіх точок ротатбельного плану на сфері з радіусом $R = \sqrt{k}$ і умов ортогональності в [96] запропоновано дані для побудови ротатбельного ортогонального центрального композиційного плану другого порядку, представлені в табл. 11.66.

Таблиця 11.66 Дані для побудови ротатбельного ортогонального центрального композиційного плану другого порядку

Кількість факторів k	Кількість точок			Зіркове плече α	Загальна кількість дослідів n	Примітки
	ядра 2^k	зіркових $2k$	нульових n_0			
2	4	4	8	1.4142	16	
3	8	6	10	1.7321	24	
4	15	8	12	2.0000	35	
5	32	10	13	2.2361	55	
5	16	10	12	2.0000	38	Напіврепліка
6	64	12	14	2.4495	90	
6	32	12	13	2.2361	57	Напіврепліка
7	126	14	16	2.6458	156	
7	64	14	14	2.4495	92	Напіврепліка
8	256	16	17	2.8284	289	
8	128	16	16	2.6458	160	Напіврепліка

Іноді інтерес представляє інформація про функції відгуку у деякому околі центру плану. У цьому випадку слід домогтися однакової похибки моделі всередині гіперсфери одиничного радіуса. План, що забезпечує таку властивість функції відгуку, називається **уніформ-ротатбельним**. Слід зазначити, що **уніформними** вважається план якщо в деякій області простору навколо центру експерименту дисперсія передбачення відгуку постійна.

Виконання уніформності вимоги доцільне якщо невідомо точне положення області з оптимальним значенням параметрів. У цьому разі вона буде отримана на основі спрощеної моделі.

Це більш жорстка вимога, ніж ротатабельність, яка гарантує однакову точність передбачення в околі центра області планування [76].

Для його формування досить забезпечити рівність дисперсії в центрі плану ($\rho_0 = 0$) і на поверхні гіперсфери радіуса $\rho_2 = 1$. Це досягається підбором числа спостережень n_0 в центрі плану.

Зараз існують два підходи до визначення кількості n_0 нульових точок — з додержанням і недодержанням умов уніформного планування [153].

В табл. 11.67 наведено всі необхідні дані для побудови матриці центрального композиційного уніформ–ротатабельного плану [125].

Побудова ротатабельних композиційних планів аналогічна побудові ортогональних, проте, при ротатабельному плануванні вибір числа нульових точок (у центрі експерименту) виявляється дещо невизначеним, так як їх число не впливає на ротатабельність. Нульові точки необхідні для оцінки похибки експерименту та перевірки адекватності моделі другого порядку і, крім того, кількість нульових точок змінює вид інформаційного контуру [17, 153].

Таблиця 11.67 Дані для побудови центрального композиційного уніформ–ротатабельного плану другого порядку

Кількість факторів k	Кількість точок			Зіркове плече α	Загальна кількість дослідів n	Примітки
	ядра 2^k	зіркових $2k$	нульових n_0			
2	4	4	5	1.4142	13	
3	8	6	6	1.6818	20	
4	15	8	7	2.0000	31	
5	32	10	10	2.3784	52	
5	16	10	6	2.0000	32	Напіврепліка
6	64	12	15	2.8284	91	
6	32	12	9	2.3784	53	Напіврепліка
7	126	14	21	3.3636	163	
7	64	14	14	2.8284	92	Напіврепліка
8	256	16	1	4.0000	273	
8	128	16	1	3.3636	145	Напіврепліка

11.7.3.3.3. Плани Бокса–Бенкіна типу BB_n

При плануванні другого порядку в умовах неоднорідностей типу дискретного дрейфу [154], або без дрейфу Боксом і Бенкіним розроблені ротатабельні (або майже ротатабельні) трирівневі плани (див. табл. К.25). Плани

Бокса–Бенкіна отримуються відповідною комбінацією факторного плану 2^k зі збалансованим неповноблочним планом. Відмінною рисою цих планів є те, що у всіх рядках плану деякі фактори знаходяться на нульових рівнях.

Для виключення впливу неоднорідностей весь план може бути розбитий на ортогональні блоки так, щоб блокові ефектів не корелювали з оцінками ефектів факторів [154].

Ротатабельними є плани Бокса (рис. 11.74 , л) на с. 785, які ґрунтуються на емпірико–інтуїтивному підході. Найбільш поширені центральні композиційні плани і плани Бокса–Бенкіна.

У них експериментальні точки розташовані на поверхнях двох гіперсфер (рис. 11.74 , д) на с. 785. На відміну від центральних композиційних планів, тут кожен фактор варіюється лише на трьох рівнях.

Якщо і в цьому випадку виконувати три паралельні вимірювання в центрі плану, то для трьох факторів загальне число дослідів становить 15 (див. табл. К.25) у порівнянні з 27 для центрального композиційного плану (рис. 11.74 , а) на с. 785. В цілому плани Бокса–Бенкіна вимагають меншого числа дослідів, ніж центральні композиційні. Залежність числа дослідів від числа факторів для планів Бокса–Бенкіна при *трьох* паралельних вимірюваннях в центрі плану наведена в табл. 11.68.

Таблиця 11.68
Залежність числа дослідів від числа факторів

Кількість факторів	Кількість дослідів
3	15
4	27
5	46
6	54
7	62

Ротатабельні плани добре оцінюють коефіцієнти регресії полінома, але вони трудомісткі через велике число дослідів і не завжди ортогональні.

Зазвичай повні трирівневі факторні плани використовують, коли число досліджуваних факторів невелика (два–три), так як зі збільшенням числа факторів виникає різке зростання числа дослідів. Статистичні властивості трирівневих планів зазвичай гірше, ніж дворівневих (з погляду симетрії або можливості змішаного оцінювання).

Одночасно умовам ортогональності і ротатабельності задовольняють плани тільки при побудові лінійних моделей факторів.

11.7.3.3.4. Композиційні плани Бокса типу B_n

Плани Бокса типу B_n є симетричними планами другого порядку з ядром у вигляді ПФЕ $2k$ або ДФЕ 2^{k-p} , доповненим $2k$ зірковими точками з плечем $\alpha=1$ і дослідями в центрі плану. Тобто, вони складаються з 2^k (2^{k-p}) вершин k -мірного гіперкуба з координатами ± 1 , з $2k$ центрів $(n-1)$ -мірних

граней і деякого числа дослідів n_0 в центрі гіперкуба. Кількість точок плану з ядром із ПФЕ становить $n = 2^k + 2k + 1$, для ДФЕ експерименту $n = 2^{k-p} + 2^k + 1$.

У кожній точці проводиться рівне число дослідів. Плани цього типу мають мінімально кількість рівнів варіювання факторів, рівне трьом, що дозволяє більш точно витримувати режими прийнятий при натурних випробуваннях порівняно з планами, в яких потрібно більше число рівнів зміни керованих змінних. Плани типу B_n *близькі* до D - і G -оптимальних планів.

Слід мати на увазі, якщо деякі коефіцієнти функції відгуку незначущі, то останні уточнюються за спеціальними формулами, проте, простіше провести регресійний аналіз ще раз без них.

11.7.3.3.5. Некомпозиційні D -оптимальні плани

Останнім часом запропоновано ряд некомпозиційних планів з багатьма властивостями E -, D -, A -, G -оптимальних планів. Серед них найбільш розробленими є D -оптимальні плани, які ґрунтуються на теорії спільних ефективних оцінок, розвиненій американським математиком Кіфером [125].

Композиційні плани ОЦКП і РЦКП мають істотний недолік, який зростає зі збільшенням кількості факторів: чим більше факторів, тим більше відстань зіркових точок від центру осей координат, яке все більше і більше віддаляється від заданих меж діапазонів зміни факторів, що є небажаним.

У D -оптимальних планах значення факторів не виходять за встановлені межі діапазонів їх зміни. Крім того, вони забезпечуючи мінімальну похибку у всьому прийнятому діапазоні зміни факторів. На практиці найбільш часто з них застосовуються плани Коно і плани Кіфера.

Як було сказано раніше, основною перевагою D -оптимальних планів є те, що вони мінімізують узагальнену дисперсію, або об'єм еліпсоїда розсіювання оцінок параметрів. D -оптимальні плани мінімізують дисперсію оцінок коефіцієнтів регресії і одночасно дають максимальну точність в прогнозі значень функції відгуку. Вони використовуються в тих випадках, *коли є ап-ріорна інформація про відсутність частини ефектів* [155], так як деякі оцінки коефіцієнтів регресії в цих планах виходять змішаними.

Ефективність D -оптимальних планів в концепції Кіфера, що ґрунтується на логічному розвитку центральних ідей математичної статистики, обумовлюється оптимальним розташуванням точок у факторному просторі.

D -оптимальні плани для опису поверхні відгуку поліномом другого порядку припускають варіювання факторів *тільки на трьох рівнях* (див. симетричний квазі- D -оптимальний план (рис. 11.74, г) і несиметричний (рис. 11.74, и) [125]. Це спрощує і здешевлює організацію дослідів, скорочує час проведення експериментів. Переваги всіх типів трирівневих планів полягають у більшій простоті організації дослідів в порівнянні з п'ятирівневими

планами. Крім того, майже D -оптимальних плани Хартлі (рис. 11.74, ж), табл. К.34 і К.37) більш економічні, ніж ортогональні і ротатабельне [153].

В табл. К.26 подано трирівневу матрицю D -оптимального плану другого порядку на кубі для трьох факторів, в табл. К.27 — матрицю D -оптимального плану другого порядку для трьох факторів на кулі.

План табл. К.26 включає в себе 21 точку: 12 точок, які відповідають центрам ребер куба, 8 його вершинам і нульову точку, проте не включає точки, які відповідають центрам його граней.

План табл. К.27 включає в себе 15 точок, причому кожний фактор варіюється на п'яти рівнях. За своїми параметрами він аналогічний композиційному ортогональному плану Бокса–Уїлксона (табл. К.21). Відмінність між ними полягає у величині радіуса напівсфери — який дорівнює одиниці, у той час, як в ЦКП Бокса радіус перевищує одиничне значення.

План на кулі більш економічний порівняно з планом на кубі, проте, замість трьох рівнів варіювання факторів має п'ять рівнів.

Майже D -оптимальними планами є плани Бокса B_3 (табл. К.31) і B_4 (табл. К.34), Хартлі–Коно $Ha-Ko_{34}$ (табл. К.33), Хартлі Ha_5 (табл. К.37, Вестлейра W_5 (табл. К.38), Кіфера Ki_{75} (табл. К.39). Також близькими до D -оптимальних є трирівневі плани Бокса–Бенкіна, які до того ж порівняно з традиційними ортогональними і ротатабельними планами більш економічні за числом дослідів [125].

11.7.3.4. Основи побудови та вибору планів експерименту

Порівняння різних типів планів, який задовольняє той чи інший критерієм оптимальності, — складна математична задача, яка докладно викладена в [156]. Тут же будуть сформульовані практичні рекомендації для застосування в конкретних випадках того чи іншого типу плану.

Основні принципи побудови і вибору планів для експерименту можна пояснити на прикладі аналізу відомих і практично застосовуваних планів розмірності $k=3$, дванадцять з яких наведено в табл. 11.69 і на рис. 11.74 [121].

Крім назви і схеми плану тут наведено:

- n — загальне число дослідів і повторень в центрі експерименту n_0 ;
- k_n — коефіцієнт економічності, $k_n = n:L$, де L — кількість членів рівняння регресії;
- k_D — коефіцієнт D -оптимальності, представлений виразом $k_D = |\tilde{M}| : |\tilde{M}\{D\}|$, який виражається відношенням детермінанта $|\tilde{M}|$ інформаційної матриці даного плану до детермінанта $|\tilde{M}\{D\}|$ безперервного D -оптимального плану тієї ж розмірності;

Таблиця 11.69. Деякі статистичні характеристики трифакторних планів і їх дослідні точки

Рисунок плану	Назва і тип плану	n	k_n	k_D	k_A	k_Q	Ротатабельність	Кореляція коефіцієнтів рівняння				k_{si}	k_{sii}	k_{sij}
								b_0b_{ii}	$b_{ii}b_{ij}$	b_ib_j	b_ib_{jk}			
11.74, а	Повнофакторний 3^3	27	2.7	1.03	1.03	1.06		0.53	0	0	0	0.23	0.43	0.29
11.74, б	Повнофакторний 2^3	8	1.1 ¹⁸⁾	–	–	–	+	–	–	–	0	0.35	–	0.35
11.74 в	Дробовофакторний 2^{3-1}	4	1.0 ¹⁹⁾	–	–	–		–	–	–	–	0.50	–	–
11.74, г	Симетричний квазі- D -оптимальний	13	1.3	1.12	1.22	1.21	(+)	0.45	0.43	0	0	0.36	0.66	0.50
11.74, д	Бокса–Бенкіна BB_3 ($n_0=3$)	15	1.5	1.14	1.07	1.05	(+)	0.55	0.07	0	0	0.35	0.52	0.50
11.74, е	Бокса B_3	14	1.4	1.01	1.03	1.05		0.38	0.23	0	0	0.32	0.64	0.35
11.74, ж	Хартлі Ha_3	11	1.1	1.29	1.39	1.43		0.36	0.21	0	0.81	0.71	0.64	0.87
11.74, и	Несиметричний квазі- D -оптимальний	10	1.0	1.09	1.32	1.32		≤ 0.52	≤ 0.47	≤ 0.63	≤ 0.32	≤ 0.54	≤ 1.05	≤ 0.50
11.74, к	Рехтшафнера R_3	10	1.0	1.09	1.39	1.45		0.47	0.12	0.25	0.50	0.50	1.00	0.50
11.74, л	Ротатабельний РЦКП-3 ($n_0=6$, $\alpha=1.6818$)	20	2.0	1.92	1.91	1.69	+	0.52	0	0	0	0.46	0.74	1.00
11.74, м	Ортогональний ОЦКП-3 ($\alpha=1.215$)	15	1.5	1.23	1.29	1.15		0.53	0	0	0	0.36	0.71	0.52
–	Насичений точний D -оптимальний	10	1.0	1.06	1.13	1.16		0.50	0.05	≤ 0.13	≤ 0.17	0.39	0.77	0.47

¹⁸⁾ Неповна квадратична модель.

¹⁹⁾ Лінійна модель.




Рисунок 11.74 . Схема утворення трифакторних планів із 27 точок повного факторного експерименту 3^3

(● – центр куба, ● – вісім вершин, □ – шість центрів граней, ○ – дванадцять середин ребр):

а – повнофакторний 3^3 ; б – повнофакторний 2^3 ; в – дробовофакторний 2^{3-1} ; г – симетричний квазі-*D*-оптимальний;
 д – Бокса–Бенкіна BB_3 ($n_0=3$); е – Бокса B_3 ; ж – Хартлі Ha_3 ; и – несиметричний квазі-*D*-оптимальний; к – Рехтшафнера R_3 ;
 л – ротатбельний РЦКП-3 Бокса ($n_0=6$, $\alpha=1.6818$); м – ортогональний ОЦКП-3 Бокса–Уїлсона ($\alpha=1.215$)

— k_A — коефіцієнт A -оптимальності, визначений виразом $k_A = \mathbf{tr} : \mathbf{tr}\{A\}$, тобто, відношенням сліду \mathbf{tr} коваріаційної матриці даного плану до сліду $\mathbf{tr}\{A\}$ коваріаційної матриці безперервного A -оптимального плану;

— k_Q — коефіцієнт Q -оптимальності, який розраховується за виразом $k_Q = \tilde{d}_{cp} : \tilde{d}_{cp}\{Q\}$ — відношенням відповідних мір точності даного плану і безперервного Q -оптимального плану;

— інформація про ротатабельність;

— $b_0 b_{ii}, b_{ii} b_{jj}, b_i b_j, b_i b_{jk}$ — абсолютні величини найбільших коефіцієнтів кореляції в матриці $[D]$;

— k_{sp}, k_{sip}, k_{sij} — коефіцієнти середньоквадратичних похибок оцінок

— $k_s = s\{b\} : s_e$, тут s_e — середньоквадратична похибка експерименту.

Ці відомості, наведені в [121] на основі аналізу великого числа джерел, дозволяють вибрати план відповідно до цілей даного дослідження.

Повний факторний план 3^3 , представлений в табл. 11.69 і на рис. 11.74, а) — традиційний план техніко-економічних експериментів, одержуваний при дослідженні впливу окремо кожного з трьох факторів на трьох рівнях (“за інших рівних умов”). План має хороші статистичні характеристики ²⁰⁾ і кращі за точністю оцінками всіх коефіцієнтів регресії k_s .

Недолік — максимальний перевитрата ресурсу $k_n = 2.7$. План складається з 27 точок (1 — центр, 8 — вершин, 6 — центрів граней і 12 — середин сторін куба).

Повний факторний план 2^3 , представлений на рис. 11.74, б) і в) табл. 11.69) застосовується для побудови неповних квадратичних моделей ($L_{нкм} = 7$). Вісім точок розташовані у вершинах куба — повний перебір всіх комбінацій з трьох дворівневих факторів x_i . План ортогональний і ротатабельний (крім того, плани типу 2^k завжди D -, A -, Q - та E -оптимальні).

Дробний факторний план 2^{3-1} поданою на рис. 11.74, в), використовується для побудови лінійних моделей ($L_{лм} = 4$). Його можна отримати взявши будь-яку напіврепліку з чотирьох точок плану ПФЕ 3^3 , рис. 11.74, а).

Для побудови квадратичної моделі за **симетричним квазі- D -оптимальним планом** (рис. 11.74, г), табл. 11.69) можна відібрати з ПФЕ 3^3 , рис. 11.74, а) будь-які точки у кількості $n \geq L_{км} = 10$. Цей план має 12 середин сторін плюс точка в центрі експерименту. Він **близький до ротатабельного**, але його статистичні характеристики задовільні, однак коефіцієнти b_0, b_{ii} і b_{jj} регресії **сильно корельовані**.

План **Бокса-Бенкіна BB_3** (рис. 11.74, д), табл. 11.69) аналогічний си-

²⁰⁾ Проведені в МГУ фундаментальні дослідження показали, що “хорошими” можна вважати плани при $k_D \leq 1.15$, $k_A \leq 1.30$ і $k_Q \leq 1.30$.

метричному квазі- D -оптимальному плану, рис. 11.74, г), але вимагає триразового повторення дослідів в центрі. Статистичні характеристики плану хороші, він близький до ротатабельного і D -оптимального, але некомпозиційний, тобто не може бути отриманий побудовою на другому етапі досліджень планів ПФЕ 2^3 , рис. 11.74, б) чи ДФЕ 2^{3-1} , рис. 11.74, в).

Порівняно з традиційними ортогональними і ротатабельними планами Плани Бокса–Бенкіна BB_n більш економічні за числом дослідів.

На рис. 11.74, е) і в) табл. 11.69 наведено один з кращих планів для $k=3$ на кубі — план **Бокса B_3** , композиційного до плану ПФЕ 2^3 , рис. 11.74, б), до якого додаються 6 точок у центрі граней. При додаванні точок у центрі плану може бути знижений k_{sij} . Дослідження послідовно генерованих планів показало, що послідовне збільшення числа дослідів в деяких точках плану, наприклад додаток до B_3 плану ПФЕ 2^3 , рис. 11.74 б або ДФЕ 2^{3-1} , рис. 11.74, в), покращує статистичні характеристики зокрема k_{si} і k_{sij} .

Майже насичений композиційний (до плану рис. 11.74, в) план типу **Хартлі Ha_3** , представлений на рис. 11.74, ж) має *погані статистичні характеристики*, зокрема, високу кореляцію між коефіцієнтами регресії b_i і b_{ij} .

Некомпозиційний несиметричний квазі- D -оптимальний план (рис. 11.74, 11.74 и) насичений, проте має *погані статистичні характеристики* (крім k_D) і практично не застосовується.

Майже композиційний (відносно ПФЕ 2^3 на рис. 11.74, б) з втратою однієї точки) насичений план **Рехтшафнера R_3** (рис. 11.74, к) також має *погані характеристики*.

Ротатабельний план Бокса РЦКП–3 (рис. 11.74, л) композиційний до плану ПФЕ 2^3 , рис. 11.74, б), але має шість точок винесені на сферу радіусом ω (планування на сфері). Аналіз його статистичних характеристик показує, що його слід застосовувати лише при гострій необхідності забезпечити незалежність похибки передвіщеного значення $s\{\hat{y}\}$ від напрямку прогнозу.

Ортогональний план Бокса–Уїлсона ОЦКП–3, наведений на рис. 11.74, м) (за рахунок відповідних перетворень x_i^2) також композиційний до плану ПФЕ 2^3 , рис. 11.74, б), але точки виносяться на сферу меншого радіуса, ніж в плані рис. 11.74, л) (його розмір підбирається на основі згаданого перетворення). *Переваг* порівняно з планами рис. 11.74, г), д), е) та ін. *не має*.

При хороших характеристиках k_N , k_D , k_A і k_Q насичений точний D -оптимальний план відрізняється деякою *складністю процедури* експерименту: координати шести точок кілька зрушені по відношенню до звичайних координатам варіювання факторів 0 і ± 1 .

Слід підкреслити, що всі наведені тут порівняльні оцінки планів (“хороший”, “поганий” і т. п.) відноситься тільки до планів розмірності $k=3$. Наприклад, план Хартлі Ha_5 при $k=5$ або план Рехтшафнера при $k \geq 6$ будуть належати до групи кращих, а оцінки плану Бокса–Бенкіна погіршаться.

11.8. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Експериментальні дані, одержані в процесі досліджень обробляються загальноприйнятими методами математичної статистики (див. розділ 1). Результати наводяться аналітичними залежностями й у графічному вигляді для наочного відображення взаємозв'язку досліджуваних факторів.

Дослідженням та аналізом рівняння (11.63), яке представляє математичну модель процесу у вигляді полінома другого порядку, вирішуються такі задачі: визначається центр поверхні відклику; отримане рівняння приводиться до канонічного виду й визначається тип поверхні відклику; визначається оптимум досліджуваних параметрів. При цьому застосовуються методи аналітичної геометрії й лінійної алгебри. Використання матричної форми має ряд переваг — рівняння набувають загальності і їхнє розв'язання може застосовуватися до будь-якої задачі незалежно від кількості членів у них.

Визначення координат центра поверхні відклику знаходиться рішенням системи рівнянь часткових похідних параметрів оптимізації [68]

$$\frac{\delta \hat{y}}{\delta x_1} = 0; \frac{\delta \hat{y}}{\delta x_2} = 0; \dots \frac{\delta \hat{y}}{\delta x_n} = 0. \quad (11.69)$$

У матричній формі ця система має вигляд

$$A \cdot X = C, \quad (11.70)$$

де A — симетрична квадратна матриця n -го порядку

$$A = \begin{vmatrix} b_{11} & 0.5b_{12} & \dots & 0.5b_{1n} \\ 0.5b_{21} & b_{22} & \dots & 0.5b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0.5b_{n1} & 0.5b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{vmatrix};$$

$$X \text{ — вектор—стовпець з елементів } x_1, x_2, \dots, x_n, X = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{vmatrix};$$

C — вектор—стовпець з елементів $-0.5b_{1\ n+1}, -0.5b_{2\ n+1}, \dots, -0.5b_{nn}$,

$$C = \begin{vmatrix} -0.5b_{1\ n+1} \\ -0.5b_{2\ n+1} \\ \dots \\ -0.5b_{nn} \end{vmatrix}.$$

Для визначення типу поверхні відклику і її аналізу функція приводиться до канонічного вигляду

$$Y - Y_s = B_{11}X_1^2 + B_{22}X_2^2 + \dots + B_{nn}X_n^2, \quad (11.71)$$

де Y – значення критерію оптимізації;
 Y_s – його значення в оптимальній точці;
 B_{11}, \dots, B_{nn} – коефіцієнти регресії канонічної форми, тобто власні значення матриці A , одержані з рівняння $\det(A - B \cdot E) = 0$;
 E – одинична матриця.

Аналіз поверхні відклику, обумовлений рівнянням регресії, виконується за допомогою двовимірних перетинів при фіксованих рівнях інших факторів [68]

$$y = b_{n+1\ n+1} + b_{i\ n+1}x_i + b_{j\ n+1}x_j + b_{ij}x_ix_j + b_{ii}x_i^2 + b_{jj}x_j^2. \quad (11.72)$$

Канонічна форма цього рівняння поверхні відгуку має вигляд

$$Y - Y_s = B_{ii}X_i^2 + B_{jj}X_j^2, \quad (11.73)$$

де Y_s – значення критерію оптимізації в центрі нової системи координат, рівне $Y_s = D/J$;
 B_{ii}, B_{jj} – коефіцієнти регресії, визначені з рівняння $B^2 - I \cdot B + J = 0$;
 I – перший інваріант (сума коефіцієнтів квадратичних членів), тобто $I = b_{ii} + b_{jj}$;

J – другий інваріант (малий дискримінант), $J = \det \begin{vmatrix} b_{ii} & 0.5b_{ij} \\ 0.5b_{ji} & b_{jj} \end{vmatrix}$;

D – третій інваріант (великий дискримінант)

$$D = \begin{vmatrix} b_{ii} & 0.5b_{ij} & 0.5b_{i\ n+1} \\ 0.5b_{ji} & b_{jj} & 0.5b_{j\ n+1} \\ 0.5b_{n+1\ i} & 0.5b_{n+1\ j} & b_{n+1\ n+1} \end{vmatrix}.$$

Координати X_{oi} та X_{oj} центра нової системи знаходяться з виразу

$$\begin{vmatrix} X_{oi} \\ X_{oj} \end{vmatrix} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{J}} \begin{vmatrix} b_{ii} & -0.5b_{ij} \\ -0.5b_{ji} & b_{jj} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} b_{i\ n+1} \\ b_{j\ n+1} \end{vmatrix}. \quad (11.74)$$

Кут повороту $\alpha_{\text{пк}}$ нової системи координат знаходиться як кут між віссю OX_i й напрямом відповідного характеристичного числа B_{ii} [157]

$$\alpha_{\text{пк}} = \frac{1}{2} \cdot \arctg \frac{B_{ii} - b_{ii}}{b_{ii}}. \quad (11.75)$$

Рівняння (11.72) може представляти еліпс (при $J > 0$), гіперболу ($J < 0$) або параболу ($J = 0$). При $J \neq 0$ ці лінії будуть дійсними, а при $J = 0$ вироджуються в точку. Крім того, еліпс може бути уявним, якщо його осі не додатні [158]. При підстановці різних значень варійованих факторів одержують рівняння відповідних контурних кривих, що представляють лінії рівного значення досліджуваних факторів [68].

Усе різноманіття поверхонь відгуку, описуваних рівнянням виду (11.72), можна розділити на три класи [2, 68, 140].

До першого класу належать поверхні, що мають екстремум — максимум чи мінімум. У цьому випадку всі коефіцієнти канонічної форми мають однакові знаки, тобто $J > 0$, а центр поверхні знаходиться поблизу центру експерименту. Аналіз таких поверхонь закінчується приведенням рівняння регресії до канонічної форми. У цьому разі треба лише поставити кілька дослідів поблизу центру поверхні й переконатися, що значення функції відгуку, передбачені рівнянням регресії, досить добре збігаються з експериментальними даними.

Якщо такий поліном містить лінійні, парні і квадратичні ефекти, то він представляє собою еліпсоїд (рис. 11.75, а і б), причому якщо опуклістю вниз якщо квадратичні ефекти додатні (рис. 11.75, а) і опуклістю вгору (рис. 11.75, б) при від'ємних квадратичних ефектах (рис. 11.75, б). Їх ізолінії — сімейство еліпсів із загальним центром (рис. 11.75). На цих рисунках над зображеннями поверхні подано функцію відгуку, наведену в кодованому вигляді.




Рис. 11.75 – Еліпсоїд

До другого класу належать поверхні типу мінімаксу і представляють собою гіперболічний параболоїд, у вигляді сідловидної поверхні.

У них коефіцієнти рівняння у канонічному вигляді мають різні знаки (тобто $J < 0$), а ізолінії є сімейством із загальним центром (рис. 11.76, а і б), а центр поверхні знаходиться поблизу від центру експерименту [140].




Рис. 11.76 – Гіперболічний параболоїд

У сідловидній точці за однією змінною буде відповідати мінімуму функції, а за другою змінною — максимум, тому ця точка не буде екстремальною одночасно для обох змінних.

Якщо поліном не містить квадратичних ефектів ($b_{11}=b_{22}=0$), — (неповний поліном другого порядку), то він описує сідловидну поверхню рис. 11.77, а) і б) і методи класичного аналізу на екстремум тут непридатні [68].

Виконання умови $J < 0$ свідчить про його гіперболічний характер.

Такий поліном отримується при варіюванні факторів на двох рівнях. Його ізолінії наведені на рис. 11.77, а) і б) представляють як і у рис. 11.76, а) і б) собою сімейство гіпербол із загальним центром.




Рис. 11.77 – Гіперболічний параболоїд

До третього типу відносяться гребеневі поверхні — гіперболічні (при умові $J < 0$) та параболічні циліндри (при $J = 0$).

Поліном, який представляє собою гіперболічний циліндр, не містить один з квадратичних ефектів, тобто b_{11} чи b_{22} дорівнюють нулю — (неповний поліном другого порядку), він описує сідловидну поверхню гіперболічного циліндра, див рис. 11.78, а) і б).

Тут варто зауважити, що сам гребінь буває за умови якщо коефіцієнт квадратичного члена позитивний (рис. 11.78, б). При негативному коефіцієнті замість гребня отримується рівчак (рис. 11.78, а).

Ізолінії рис. 11.78, а) і б) представляють як і у рис. 11.76, а) і б) та рис. 11.77, а) і б) собою сімейство гіпербол із загальним центром.

Якщо поліном містить по одному фактору лише лінійний ефект, а по другому лінійний, парний і квадратичний, то він описує параболічний ци-

ліндр ($J = 0$) з опуклістю вниз при позитивному квадратичному ефекті (див. рис. 11.79, а) і вгору — при негативному (див. рис. 11.79, б).




Рис. 11.78 – Гіперболічний циліндр

При цьому ізолінії представляють собою паралельні прямі; абсолютні числові оцінки лінійних ефектів можна інтерпретувати як швидкості впливу x на Z ; чим більше $|b|$, тим сильніше його вплив, причому за знаками лінійних ефектів можна знайти напрям зміни Z від b .

Його ізолінії — сімейство парабол із загальною головною віссю (рис. 11.79, а) і б).




Рис. 11.79 – Параболічний циліндр

У разі якщо поліном містить тільки лінійні члени то він описує поверхні першого порядку, рис. 11.80, а) і б).




Рис. 11.80 – Поверхня першого порядку

Результати розрахунків поверхонь, виконаних за формулами цього розділу, наведено в табл. 11.70.

Таблиця 11.70 – Вихідні дані рівняння регресії і параметри функції відгуку

Показ- ник	Еліпсоїд		Гіперболічний параболоїд				Циліндр				Пряма площина	
							гіперболіч- ний		параболіч- ний			
b₀	27		27		27		27		27		27	
b₁	2		2		2		2		2		2	-2
b₂	3		3		3		3		3		3	
b₁₂	5	-7	7	-7	0		0		0		0	
b₁₁	7	5	5	5	5	-5	5		0		0	
b₂₂	11	-11	-11	11	0		11	-11	11	-11	0	
I	18	-6	-6	16	5	-5	16	-6	11	-11	0	
J	70.7 5	-67.25	-67.25	42.75	0		55	-55	0		0	
D	1891	-1827	-1805.5	1121.5	-11.25	11.25	1462.8	-1485	-11	11	0	
H	26.7 3	27	26.85	26.23	-		26.60	27.00	-		-	
x_{опт}	-0.10	0	-0.24	-0.38	-		-0.20	-0.20	-		-	
y_{опт}	-0.11	0	0.06	-0.26	-		-0.14	0.14	-		-	
Z_{опт}	26.7 3	27	26.85	26.23	-		26.60	27.00	-		-	
B₁₁	12.2	27	27		27		27		27		27	
B₂₂	5.8	27	27		27		27		27		27	
α	-25.7	-12	11.8	24.7	0		0		0		-	
Z_{-1,-1}	45	9	23	31	27	17	38	16	33	11	22	26
Z_{-1,1}	41	29	15	51	33	23	44	22	39	17	28	32
Z_{1,-1}	39	27	13	49	31	21	42	20	37	15	26	22
Z_{1,1}	55	19	33	41	37	27	48	26	43	21	32	28
Рис.	11.75 а	11.75 б	11.76 а	11.76 б	11.77 а	11.77 б	11.78 а	11.78 б	11.79 а	11.79 б	11.80 а	11.80 б

Для планування досліджень у залежності від кількості факторів використовуються трирівневі матриці другого порядку (див. табл. К.5–К.41 на с. 1139–1160).

Коефіцієнти математичної моделі розраховуються на комп'ютері з використанням програм **Statist** і **Statistica** [53, 159] (див. підрозділи **11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатфакторного активного експерименту** і **11.11 Використання ППП Statistica для регресійного аналізу експериментів**, виконаних за).

11.9. ПАРАМЕТРИ ОПТИМІЗАЦІЇ

11.9.1. Вимоги до параметрів оптимізації

Параметр оптимізації — це ознака, за якою ми хочемо оптимізувати процес. Він повинен бути **кількісним**, задаватися числом. Безліч значень, які може приймати параметр оптимізації, є областю його визначення. Вона може бути безперервною і дискретною, обмеженою і необмеженою. Наприклад, вихід реакції — це параметр оптимізації з безперервною обмеженою областю визначення. Він може змінюватися в інтервалі від 0 до 100 %. Число бракованих виробів, число бур'янів на квадратному метрі поля — ось приклади параметрів з дискретною областю визначення, обмеженої знизу.

Якщо немає способу кількісного вимірювання результату, то доводиться скористатися прийомом, званим ранжуванням (рангових підходом). При цьому параметрами оптимізації присвоюються оцінки — ранги по заздалегідь обраної шкалою: двобальною, п'ятибальною і т.д. Ранговий параметр має дискретну обмежену область визначення. У найпростішому випадку область містить два значення (так—ні, добре—погано). Це може відповідати, наприклад, придатної продукції і браку.

Ранг — це кількісна оцінка параметра оптимізації, але вона носить умовний (суб'єктивний) характер, так як у відповідність якісним ознакою ставиться деяке число — ранг.

Для кожного фізично вимірюваного параметра оптимізації можна побудувати ранговий аналог. Потреба в побудові такого аналога виникає, якщо наявні числові характеристики неточні або невідомий спосіб побудови задовільних чисельних оцінок. За інших рівних умов завжди потрібно віддавати перевагу фізичному виміру, так як ранговий підхід менш чутливий і з його допомогою важко вивчати тонкі ефекти.

Наступна вимога: параметр оптимізації повинен виражатися **одним числом**.

Іноді це виходить природно, як реєстрація показання приладу. Частіше ж доводиться виконувати деякі обчислення, як, наприклад, при визначенні енергоємності процесу.

Ще одна вимога — **однозначність** у статистичному сенсі. Заданому набору значень факторів повинно відповідати одне з точністю до похибки експерименту значення параметра оптимізації. Однак зворотне невірно: одному і тому ж значенню параметра можуть відповідати різні набори значень факторів. Тому необхідно, щоб параметр оптимізації дійсно оцінював ефективність функціонування системи у заздалегідь обраному сенсі. Ця вимога є головною і визначає коректність постановки задачі.

Уявлення про ефективність досліджуваного явища не залишається постійним в ході дослідження. Воно змінюється в міру накопичення інформації і залежно від досягнутих результатів, що призводить до послідовного підходу при виборі параметра оптимізації. Так, наприклад, на перших стадіях дос-

лідження технологічних процесів як параметр оптимізації часто використовується вихід продукту, то з часом коли можливість підвищення виходу вичерпана, дослідники починають цікавити такі параметри, як собівартість, чистота продукту і т.д. До того ж параметр оптимізації повинен бути ефективним в статистичному сенсі.

Наступна вимога до параметра оптимізації — вимога *універсальності* або *повноти*. Під універсальністю параметра оптимізації розуміється його спроможність всебічно характеризувати об'єкт. Зокрема, технологічні параметри оптимізації недостатньо універсальні: вони не враховують економіку. Універсальність притаманна узагальненим параметрам оптимізації, які будуються як функції від кількох частинних параметрів.

Бажано, щоб параметр оптимізації мав *фізичний зміст*, був *простим* і *легко обчислюваним*. Це пов'язане з подальшою інтерпретацією результатів експерименту. Іноді доцільно нормувати параметр з тим, щоб він приймав значення від нуля до одиниці.

Крім перелічених вище вимог слід мати на увазі, що параметр оптимізації в деякій мірі впливає на вид математичної моделі досліджуваного об'єкта. Економічні параметри, в силу їх адитивної природи, легше представляються більш простими функціями, ніж фізико–механічні чи хімічні показники. Не випадково методи лінійного програмування, засновані на простих моделях, набули широкого поширення саме в економіці.

Наприклад, поживність раціону при годівлі худоби є складною, багатоекстремальною характеристикою, тоді, як вартість лінійно залежить від його складу.

11.9.2. Узгодження декількох вихідних параметрів

На практиці найчастіше доводиться враховувати кілька вихідних параметрів. Наприклад, при виробництві гумових і пластмасових виробів доводиться враховувати фізико–механічні, технологічні, економічні, художньо–естетичні та інші параметри (міцність, еластичність, відносне подовження, здатність суміші прилипати до форми і т.д.).

Математичні моделі можна побудувати для кожного з параметрів, але одночасно оптимізувати кілька функцій неможливо.

Зазвичай оптимізується одна функція, найбільш важлива з точки зору мети дослідження, при обмеженнях, що накладаються іншими функціями. Тому з багатьох вихідних параметрів вибирається один як параметр оптимізації, а інші служать обмеженнями. Завжди корисно дослідити можливість зменшення числа вихідних параметрів. Для цього можна скористатися кореляційним аналізом.

При цьому між всілякими парами параметрів необхідно обчислити коефіцієнт парної кореляції (див. розділ **9 Кореляційні залежності та їх аналіз**) і при високій значимості коефіцієнта кореляції кожної пари аналізованих параметрів один можна виключити з розгляду як що не містить додаткової інформації про об'єкт дослідження. Виключити можна той параметр, який технічно важче вимірювати, або той, фізичний зміст якого менш ясний.

При плануванні експерименту доцільно вимірювати всі параметри, потім оцінити кореляцію між ними і будувати моделі для їх мінімально можливого числа або ж скористатися узагальненим параметром. Але бувають випадки, коли доводиться розглядати і корельовані параметри.

11.9.3. Застосування критеріїв вилучення сумнівних результатів при інженерному експерименті

11.9.3.1. Використовувані критерії перевірки аномальності отриманих даних

Найчастіше інженерні дослідження виконуються за активним експериментом згідно прийнятих матричних планів. При цьому зазвичай використовується трикратне повторення, що дає змогу виконати статистичну оцінку отримуваних результатів [12].

При визначенні грубих помилок оцінювана вибірка ранжується за величиною, значення і сумнівне значення x_c , яке може розглядатися як груба похибка може бути як мінімальною $x_c = x_{\min}$, так і максимальною $x_c = x_{\max}$.

Знайдений критерій t порівнюється з критичним $t_{\alpha(v)}$ чи $t_{\alpha(n)}$, наведеним у відповідних таблицях. Величину x_c можна вважати грубою похибкою, якщо отримано $t > t_{\alpha(v)}$ чи $t > t_{\alpha(n)}$.

Розглянемо ряд найбільш уживаних критеріїв критерії оцінки аномальності результатів вимірювань і виключення помилкових значень.

По-перше це параметричні критерії (див. підрозділ **5.12.1 Параметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань і виключення помилкових значень**), які ґрунтуються на нормальності розподілу оцінюваної вибірки.

Найуживаніші параметричні критерії подані в табл. 11.71.

З аналізу табл. 11.71 бачимо, що з 13 наведених критеріїв для оцінки результатів інженерних досліджень при триразовому повторенні використовуються 8, а саме критерії: Стюдента, Смирнова–Грабса, Грабса, критерій v , Ірвіна, Романовського і спрощений критерій Шовене.

Практично всі вони, як і непараметричні критерії, наведені в табл. 11.72, зустрічаються в літературі, яка описує попередню обробку екс-

периментальних даних, але проаналізувавши їх бачимо, що найбільш строгим є критерій Смирнова–Грабса ($U_{05(2)}=1.15$), найменш строгим є критерій Стьюдента ($t_{05(2)}=4.303$) і Романовського ($\beta_{05(2)}=4.97$).

Таблиця 11.71. Параметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань

Назва критерію		Розрахункова формула	Межі обсягу вибірки	Обсяг вибірки	Критичне критеріальне значення $t_{\alpha(v)}$; рівень значущості p
5.12.1.3 Оцінка за t -критерієм Стьюдента		(5.66)	$n \geq 8(3)$	повна	$t_{05(2)}=4.303$
5.12.1.4 Оцінка за r -критерієм з використанням стандартного відхилу		(5.68)	$3 \leq n \leq 28$	повна	$r_{05(2)}=1.412$
5.12.1.5 Критерій Смирнова–Граббса		(5.69)	$3 \leq n \leq 500$	повна	$t_{05(2)}=1.7$
5.12.1.6 Оцінки сумнівних даних за критерієм Смирнова		(5.69) (5.70)	$3 \leq n \leq 20(25)$	повна	$U_{05(2)}=1.15$
5.12.1.8.1 Критерій Граббса для одного викиду		(5.72) (5.73)	$3 \leq n \leq 20(25)$	повна	$U_{05(2)}=1.15$
5.12.1.9 Застосування критерію v		(5.79)	$3 \leq n \leq 52$	повна	$v_{05(2)}=1.412$
5.12.1.13 Критерій Ірвіна		(5.83)	$2 \leq n \leq 100$	повна	$\eta_{05(2)}=2.2$
5.12.1.12 Критерій В. І. Романовського		(5.82)	$2 \leq n \leq 100$	неповна	$\beta_{05(2)}=4.97$
5.12.2.2 Спрощений критерій Шовене		(5.85)	$3 \leq n < 6$	повна	$p=0.1096$
			$6 \leq n < 8$		$p=0.0891$
			$8 \leq n < 10$		$p=0.0574$
			$n = 10$		$p=0.0455$
Нормальний розподіл	5.12.1.1 Метод виключення при відомому σ	(5.64)	$20(8) \leq n \leq \infty$	повна	
	5.12.1.2 Метод виключення при невідомому s	(5.65)	$20(8) \leq n \leq \infty$	неповна	
5.12.1.7 Критерій Шарльє		(5.71)	$5 \leq n \leq 100$	повна	$K_{ш 05(4)}=1.3$
5.12.1.10 Критерій 3s. Критерій Райта (4s)		(5.80)	$20 \leq n \leq 50$	повна	
5.12.1.11 Рекомендації Г. А. Аганекяна		(5.81)	$6 \leq n < 100$	повна	$p=6.33 \cdot 10^{-5}$
			$100 \leq n < 1000$		$p=6.80 \cdot 10^{-6}$
			$1000 \leq n \leq 10000$		$p=5.73 \cdot 10^{-7}$

Проте, довільність у виборі застосування критерію відсутня — за рекомендаціями міжнародних стандартів ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002 [105] та ГОСТ Р 8-736-2011 [21] слід використовувати критерій Смирнова–Грабса. При цьому також слід мати на увазі, що він придатний лише для нормального розподілу вимірюваної величини. Тому спочатку слід оцінити можливість прийняття гіпотези нормального розподілу. Але не можливо стверджувати, що дані трьох повторень відповідатимуть нормальному розподілу, адже мінімальний обсяг вибірки при оцінці її на нормальність за ГОСТ 11.004–74 (СТ СЭВ 876–78) [1] повинен бути не менше восьми.

Проте, ця вимога зазвичай ігнорується і параметричні критерії використовуються для оцінки вибірок з трьох повторень.

Крім параметричних критеріїв застосовуються непараметричні (див. підрозділ **5.12.3 Непараметричні критерії оцінки сумнівних і виключення помилкових значень**), що насправді для вибірки із трьох повторень більш обґрунтовано.

Найбільш уживані непараметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань наведені в табл. 11.72.

Аналіз табл. 11.72 свідчить, що з п'яти наведених критеріїв для оцінки результатів інженерних досліджень при триразовому повторенні використовуються два — розмах усіченої вибірки і вибіркового розмаху (виділені жовтим кольором), які за строгістю незначно відрізняються між собою, відповідно дорівнюючи $\kappa_{05(3)}=0.885$ і $Q_{05(3)}=0.89$.

Таблиця 11.72. Непараметричні критерії оцінки аномальності результатів вимірювань

Назва критерію	Розрахункова формула	Межі обсягу вибірки	Критичне критеріальне значення $t_{\alpha(n)}$
5.12.3.4 Застосування розмаху усіченої вибірки	(5.88)	$2 \leq n \leq 20$	$\kappa_{05(3)}=0.885$
5.12.3.6 Використання вибіркового розмаху	(5.91) (5.92)	$3 \leq n \leq 10$ $8 \leq n \leq 10$	$Q_{05(3)}=0.94$
5.12.3.5 Застосування вибіркового розмаху	(5.90)	$5 \leq n \leq 150$	$k_{05(5)}=1.7$
5.12.3.2 Метод різниць за критерієм τ	(5.86)	$4 \leq n \leq 30$	$\tau_{05(4)}=0.995$
5.12.3.3 Метод різниць (критерій Діксона)	(5.87)	$3 \leq n \leq 30$	$k_{\tau 05(4)}=0.941$

11.9.3.2. Оцінка викидів за критерієм Смирнова–Граббса

Як було сказано вище, (див. підрозділ **5.12.1.5 Критерій Смирнова–Граббса**), міжнародний стандарт ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002 [105] та розроблений на його основі стандарт РФ ГОСТ Р 8–736–2011 [21] рекомендують використовувати для аналізу вибірок на грубі помилки при одному сумнівному значенні параметричний критерій Граббса [59].

При цьому також слід мати на увазі, що за строгими вимогами він придатний лише для нормального розподілу вимірюваної величини. Тому спочатку слід оцінити можливість прийняття гіпотези нормального розподілу.

Але ця вимога зазвичай ігнорується і параметричні критерії, зокрема, критерій Граббса використовується для оцінки вибірок з трьох повторень.

Розглянемо його застосування для оцінки аномальності експериментальних даних, поданих нижче у табл. 11.79 на с. 810.

У першу чергу сумнівними значеннями x_c є мінімальні і максимальні значення. Оцінка приналежності x_{\min} чи x_{\max} до даної сукупності при малій кількості повторень ($n=3$) і прийняти рішення про їхнє виключення або залишення виконується з використанням відношення (5.69), тобто як при розрахунку стандартних відхилень [8,116].

Застосування критерію Смирнова–Граббса для оцінки експериментальних даних, поданих нижче у табл. 11.79 на с. 810, наведено у табл. 5.9.

В чарунку **D18** занесене значення $t_{\alpha,n}=1.74$, взяте з табл. Д.4 для $n=3$ і $\alpha=0.05$.

За даними табл. 5.9 бачимо, що у всіх повтореннях аномальні результати (викиди) відсутні, так як для них виконується умова $t_{\text{експ}} < t_{\alpha,n}$.

Таблиця 11.73. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм Смирнова–Граббса

	A	B	C	D	E	F
1	Y1	Y2	Y3	σ	t_{\min}	t_{\max}
2	596.5	788.9	672.6	79.11	1.13	1.30
3	740.5	489.4	576.1	104.10	1.08	1.33
4	516.4	768.6	605.0	104.47	1.09	1.33
5	683.2	444.4	525.4	99.19	1.08	1.33
6	559.3	846.2	658.4	118.98	1.08	1.33
7	734.5	501.7	584.9	96.33	1.09	1.32
8	510.5	784.9	603.6	113.95	1.08	1.33
9	674.0	460.3	536.7	88.39	1.09	1.32
10	527.0	784.5	617.5	106.62	1.09	1.33
11	692.5	457.7	538.8	97.36	1.08	1.33
12	501.6	771.3	593.1	111.97	1.08	1.33
13	718.2	452.4	539.4	110.65	1.06	1.34
14	473.2	763.3	566.5	120.90	1.06	1.34
15	774.4	472.7	567.9	125.94	1.05	1.35
16	Числа варіантів дослідів n			3		
17	Рівень значущості α			0.05		
18	Критичне значення $t_{\alpha,n}$			1.75		

D2=СТАНДОТКЛОН.Г(A2:C2)

D16=СЧЁТ(A2:C2)

E2=(СРЗНАЧ(A2:C2)-МИН(A2:C2))/D2

F2=(МАКС(A2:C2)-СРЗНАЧ(A2:C2))/D2

11.9.3.3. Оцінка викидів за критерієм вибіркового розмаху

Для оцінки аномальності експериментальних даних, поданих нижче у табл. 11.79 на с. 810 використаємо згідно обґрунтування і рекомендацій, наведених у підрозділі **11.9.3.1 Використовувані критерії перевірки аномальності отриманих даних** наведемо використання непараметричного критерію вибіркового розмаху (див. підрозділ **5.12.3.6 Використання вибіркового розмаху**).

Оцінка приналежності сумнівних значень x_c , якими є мінімальне x_{\min} чи максимальне значення x_{\max} при малій кількості повторень ($n=3$) і прийняти рішення про їхнє виключення або залишення виконується з використанням відношення (5.91) [86].

Виконання розрахунків за цією формулою подано на полі табл. 11.74.

У чарунку **D19** табл. 11.74 занесене значення $t_{05,3}=0.94$, взяте з табл. Д.26 для $n=3$ і $\alpha=0.05$.

За її даними бачимо, що у всіх повтореннях аномальні результати (викиди) відсутні, так як для них виконується умова $Q < Q_{\alpha,n}$.

Таблиця 11.74. Результати оцінки сумнівних даних за критерієм вибіркового розмаху

	A	B	C	D	E
1	Y1	Y2	Y3	Q^{\min}	Q^{\max}
2	596.5	788.9	672.6	0.40	0.60
3	740.5	489.4	576.1	0.35	0.65
4	516.4	768.6	605.0	0.35	0.65
5	683.2	444.4	525.4	0.34	0.66
6	559.3	846.2	658.4	0.35	0.65
7	734.5	501.7	584.9	0.36	0.64
8	510.5	784.9	603.6	0.34	0.66
9	674.0	460.3	536.7	0.36	0.64
10	527.0	784.5	617.5	0.35	0.65
11	692.5	457.7	538.8	0.35	0.65
12	501.6	771.3	593.1	0.34	0.66
13	718.2	452.4	539.4	0.33	0.67
14	473.2	763.3	566.5	0.32	0.68
15	774.4	472.7	567.9	0.32	0.68
16	Максимальне значення			0.40	0.68
17	Числа варіантів досліду n			3	
18	Рівень значущості α			0.05	
19	Критичне значення $Q_{\alpha,n}$			0.94	

D16=МАКС(D2:D15) **E16=МАКС(E2:E15)**
D17=СЧЁТ(A2:C2)

**D2=(СУММ(A2:C2)-2*МИН(A2:C2)-МАКС(A2:C2))/
 (МАКС(A2:C2)-МИН(A2:C2))**
**E2=(2*МАКС(A2:C2)+МИН(A2:C2)-СУММ(A2:C2))/
 (МАКС(A2:C2)-МИН(A2:C2))**

11.9.4. Перевірка відтворюваності результатів

Необхідною умовою застосування методу найменших квадратів для розрахунку оцінок коефіцієнтів моделі є однорідність оцінок дисперсії відтворюваності середнього значення функції відгуку в усіх точках плану. Тому обов'язковим етапом обробки повинна бути перевірка статистичної гіпотези про однорідність сукупності дисперсій відтворюваності. Критерій Фішера–Снедекора чи Бартлетта може застосовуватися якщо число спостережень n в різних вибірках (повтореннях) не однакове, при однаковому числі застосовується критерій Кохрена.

Проте іноді буває що у дослідях з повторенням отримано відмінні результати, але вони погано відтворювалися. З позицій статистика цей дослід слід бракувати, але він результат служить вказівкою, що знайдений хороший режим [51].

Якщо перевірка відтворюваності дала негативний результат, то залишається визнати невоспроизводимость експерименту внаслідок наявності в об'єкті джерел неоднорідності, для виділення яких слід звернутися до прийомів дисперсійного аналізу [150].

11.9.4.1. Використання критерію Кохрена

Критерій Кохрена G (G -критерій, *Cochran's test*) є параметричним. Він більш потужний за критерій Бартлетта [160] (див. підрозділ **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта**) і служить для перевірки гіпотези про статистичну однорідність (належність до однієї генеральної сукупності) всіх дисперсій.

Нульова гіпотеза має вигляд: $H_0: s_1^2 = s_2^2 \dots s_i^2 = s_k^2$.

Він використовується при активному експерименті з однаковою повторністю (більше двох) числа дослідів, які підпорядковуються нормальному розподілу і залежить від числа дослідів n та кількості варіантів дослідів k (числа дисперсій). Таким чином матриця даних, отримана згідно матриці планування, складається із k повторень дослідів, представленими колонками і n рядів (повторів). Ряди позначаються індексом i , колонки — j .

Перевірка однорідності дисперсій виконується обчисленням частки від ділення максимальної дисперсії s_{\max}^2 на суму всіх дисперсій $\sum_i^n s_i^2$

$$G_{(k,n-1)} = \frac{s_{\max}^2}{\sum_i s_i^2}. \quad (11.76)$$

Отримана частка порівнюється із критичним значенням $G_{\alpha(k,v)}$, яке для $\alpha=0.05$ та $\alpha=0.01$ і ступеня вільності $v=n-1$ наведено у табл. Ж.4 і Ж.6 [29]. Хоч функції розподілу Кохрена немає ні в **Excel**, ні **Statistica**, проте його критичні значення можна апроксимувати розподілом Фішера [25]

$$G_{(k,v)_T} = \frac{F_{\alpha/k, v, (k-1) \cdot v}}{F_{\alpha/k, v, (k-1) \cdot v} + k - 1} \quad (11.77)$$

Якщо $G_{(k,v)} < G_{\alpha(k,v)}$, то нульова гіпотеза підтверджується — всі вибіркові дисперсії є оцінками однієї генеральної сукупності, тобто однорідні.

Якщо $G_{(k,v)} \geq G_{\alpha(k,v)}$, тобто перевірка на відтворюваність дала негативний результат, то залишається визначити відтворюваність або невідтворюваність експерименту щодо керованих змінних внаслідок наявності флуктуацій некерованих і неконтрольованих змінних, що створюють на виході великий рівень “шуму”, або наявності грубого промаху в рядку, звідки взята сумнівна дисперсія. У першому випадку слід підвищити точність вимірів, або встановити менші інтервали варіації факторів та підвищити повторність у дослідях, у другому — знайти грубий промах і замінити його результатом доброякісного виміру при відповідній комбінації чинників. Якщо це з певних причин неможливо, то, щоб не порушувати передумови використання критерію, на місце грубого промаху слід помістити середнє арифметичне \bar{y}_j даного рядка, чи виконати відтворення виключених значень згідно підрозділу **14.1.2.1 Відновлення одного втраченого чи забракованого значення**.

Плюси застосування критерію Кохрена — його розподіл знайдено точно і він простий за обчисленнями, мінуси — обмеження за числом ступенів вільності дисперсій, виявляє відхилення лише в більшу сторону і вимагає однакового числа вимірювань n для всіх варіантів досліджу k .

За приклад застосування G -критерію представлено аналіз даних трифакторного експерименту, наведеного в табл. 11.79, с. 813. Процес розрахунків ясно з виразу (11.76) та табл. 11.75 і додаткового пояснення не потребує.

Так як $k=14$ і $n=3$ маємо $G_{(14,2)}=0.1003 < G_{05(14,2)}=0.3517$, усі вибіркові дисперсії на 0.05 рівні значущості є оцінками однієї генеральної сукупності, тобто однорідні (див. рис. 11.89, с. 813).

Таблиця 11.75. Результати однорідності декількох дисперсій за G -критерієм Кохрена

	A	B	C	D
1	Y1	Y2	Y3	s ²
2	596.5	788.9	672.6	6258.30
3	740.5	489.4	576.1	10837.77
4	516.4	768.6	605.0	10913.69
5	682.2	444.4	525.4	6822.57
6	D2=ДИСПР(A2:C2)			46
7	D15=ДИСПР(A15:C15)			38
8	D16=СЧЁТ(A15:C15)-1			83
9	D17=СЧЁТ(C2:C15)			32
10	D19=МАКС(D2:D15)/СУММ(D2:D15)			75
11	D20=F.ОБР.ПХ(D18/D17;D16;(D17-1)*(D16))			33
12	D21=D20/(D20+D17-1)			
13	501.6	771.3	593.1	12537.46
14	718.2	452.4	539.4	12244.23
15	473.2	763.3	566.5	14615.76
16	774.4	472.7	567.9	15861.46
17	Вільність повторності дослідів v			2
18	Повторення дослідів k			14
19	Рівень значущості α			0.05
20	Розрахунковий критерій Кохрена G			0.1003
21	Критерій Фішера F			7.0533
22	Критичний критерій Кохрена G_T			0.3517

Критичні значення критерію Кохрена, наведені в табл. Ж.4 і Ж.6 за повторенням дослідів k не узгоджуються з таблицями матриць планування експериментів, найбільш уживані з яких представляє Додаток К. Тому в табл. Ж.6 для зручності користування наведені критичні значення критерію Кохрена розраховані за формулою (11.77) для матриць вміщених у цьому додатку.

Якщо ж число спостережень n в різних серіях неоднаково, то для перевірки однорідності дисперсій можна вибрати, наприклад, критерій Фішера–Снедекора (підрозділ **11.9.4.3 Критерій згоди Фішера–Снедекора**) чи Бартлетта (підрозділ **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта**).

11.9.4.2. Застосування критерію згоди Бартлетта

Обов'язковою умовою є належність всіх повторень вимірів до одної генеральної сукупності, тобто щоб дисперсії, обумовлені помилками дослідів, були для всіх повторень статистично однорідними [68]. Таким чином використовується гіпотеза про рівність всіх вибірових дисперсій, тобто їх статистичну однорідність. Вона характеризує відтворюваність (ступінь близькості один одного) результатів вимірювань, отриманих у різних умовах і кількісно виражається через міжгрупову і внутрішню групову дисперсію.

Критерій Бартлетта (*Bartlett's test*, 1937) використовується для перевірки гіпотези про відтворюваності дослідів як при активному, так і при пасивному експерименті у тих випадках, коли є результати декількох серій паралельних дослідів, проте число дослідів в цих повтореннях різне, але **не менше чотирьох**, тобто $n > 4$ [49].

Він є видозміною критерію відносин найбільшої правдоподібності, запропонованого Нейманом і Пірсоном (Neumann і Pearson, 1931) [127].

Критерій залежить від числа дослідів n та кількості варіантів дослідів (числа дисперсій). Таким чином матриця даних складається із k повторень дослідів, представленими колонками і n рядів (повторів). Ряди позначаються індексом i , колонки — j .

Так як критерій Бартлетта сильно чутливий до відхилення даних від нормального розподілу [25], тому якщо можна слід завжди надавати перевагу критерію Кохрена (див. підрозділ **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**). Критерій Бартлетта сильно чутливий до припущення про нормальності розподілів, тому його використання у відомому сенсі обмежена. Однак, чутливість критерію до припущення про нормальності розподілів дозволяє використовувати його як засіб оцінки нормальності.

Нульова гіпотеза має вигляд: $H_0: s_1^2 = s_2^2 \dots = s_i^2 = s_k^2$. Зауважимо, що формулювання альтернативної гіпотези у вигляді математичного співвідношення досить проблематичне, так як окремі значення дисперсій можуть і збігатися між собою. Однак нульова гіпотеза полягає в статистичній нерозрі-

зненості *всіх* значень дисперсій, і перевірка полягатиме в оцінці здійсненності саме цих вимог. Відповідно, альтернативна гіпотеза полягатиме у тому, що основна гіпотеза не виконується. Для попарного порівняння краще скористатися критерієм Фішера–Снедекора (підрозділ **11.9.4.3 Критерій згоди Фішера–Снедекора**).

Статистика критерію Бартлетта розраховується згідно за умови

$$B = M/c, \quad (11.78)$$

де

$$M = v \cdot \ln s_{\text{св}}^2 - \sum_{i=1}^n v_i \cdot \ln s_i^2 \quad \text{і} \quad c = 1 + \frac{1}{3 \cdot (k-1)} \cdot \left(\sum_{j=1}^k \frac{1}{v_j} - \frac{1}{v} \right). \quad (11.79)$$

Ступені вільності v_i ряду i вибірки v становлять [49]

$$v_i = n_i - 1 \quad \text{і} \quad v = \sum_{i=1}^n v_i. \quad (11.80)$$

де n_i – кількість даних i -го ряду.

Вибіркова дисперсія s_i^2 кожного ряду розраховується за формулою (1.48) чи знаходиться за допомогою статистичної функції **ДИСП.В** (див. Додаток А). Середньозважена оцінка дисперсії за формулою [49]

$$s_{\text{св}}^2 = \frac{1}{v} \sum_{j=1}^k (s_j^2 \cdot v_j). \quad (11.81)$$

Значення B порівнюється зі значенням χ^2 -критерію для рівня значущості α і ступенів вільності $v = k - 1$ і за умови $B \leq \chi_{\alpha(k-1)}^2$ приймається нульова гіпотеза про відтворюваність дослідів з достовірністю α [49].

При відхиленні від нормальності рекомендується замість статистики M використовувати її модифікацію

$$M^* = \frac{v_2 \cdot M}{v_1(b - M)}, \quad (11.82)$$

де $v_1 = k - 1$ і $v_2 = \frac{k + 1}{(c - 1)^2}, b = \frac{v_2^2}{v_2(2 - c) + c}.$

Статистика M^* має F -розподіл зі ступенями вільності ν_1 і ν_2 . Тому за умови за умови $M^* > F_{\alpha(\nu_1, \nu_2)}$ з достовірністю α приймається нульова гіпотеза про відтворюваність дослідів [79].

Розглянемо використання критерію Бартлетта для аналізу даних три-факторного експерименту, наведеного в табл. 11.79, с. 813.

Процес розрахунків подано на полі табл. 11.76 за виразами (11.78)–(11.82).

З розрахунків видно, що $B \leq \chi^2_{\alpha(k-1)}$, тобто $1.064 < 22.362$, отже, можна прийняти гіпотезу про відтворюваності дослідів.

Також виконується умова $M^* = 0.074 < F_{\alpha(\nu_1, \nu_2)} = 1.863$, що також свідчить про можливість прийняття нульової гіпотези.

Таблиця 11.76 – Результати однорідності дисперсій за критерієм Бартлетта

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	ν	$\nu \cdot s^2$	$1/\nu$	$\nu \cdot \ln(s^2)$	
2	596.5	681.5	788.9	672.6	3	18790.13	0.33	26.23	
3	740.5	593.2	489.4	576.1	3	32570.83	0.33	27.88	
4	516.4	621.6	768.6	605.0	3	32794.56	0.33	27.90	
5	683.2	542.3	444.4	525.4	3	29572.05	0.33	27.59	
6	559.3	678.0	846.2	658.4	3	42541.50	0.33	28.68	
7	734.5	599.5	501.7	584.9	3	27877.84	0.33	27.41	
8	510.5	623.0	784.9	603.6	3	39028.84	0.33	28.42	
9	674.0	550.1	460.3	536.7	3	23474.27	0.33	26.90	
10	527.0	634.4	784.5	617.5	3	34161.95	0.33	28.02	
11	692.5	554.8	457.7	538.8	3	28487.39	0.33	27.48	
12	501.6	612.2	771.3	593.1	3	37684.17	0.33	28.32	
13	718.2	559.6	452.4	539.4	3	36813.51	0.33	28.25	
14	473.2	589.3	763.3	566.5	3	43950.43	0.33	28.78	
15	774.4	592.4	472.7	567.9	3	47703.72	0.33	29.02	
16	E2=СЧЁТ(A2:D2)-1				Сума	42	475451.20	4.67	390.85
17	F2=ДИСП.В(A2:D2)*(СЧЁТ(A2:D2)-1)						$s^2_{CB} = 11320.27$		
18	G2=1/(СЧЁТ(A2:D2)-1)						$M = 1.190$		
19	H2=(СЧЁТ(A2:D2)-1)*LN(ДИСП.В(A2:D2))						$C = 1.119$		
20	E16=СУММ(E2:E15) . . . H16=СУММ(H2:H15)						$B = 1.064$		
21	H17=F16/E16 H18=E16*LN(H17)-H16						$\nu_1 = 13$		
22	H19=(G16-1/E16)/(3*(СЧЁТ(E2:E15)-1))+1						$\alpha = 0.05$		
23	H20=H18/H19 H21=СЧЁТ(E2:E15)-1						$\chi^2_{\alpha(k-1)} = 22.362$		
24	H23=ХИ2.ОБР.ПХ(H22;H21)						$p = 1.000$		
25	H24=ХИ2.РАСП.ПХ(H20;H21)						$\nu_2 = 71$		
26	H25=(СЧЁТ(E2:E15)+1)/(H19-1)^2						$b = 78.68$		
27	H26=(H25^2)/(H25*(2-H19)+H19)						$M^* = 0.074$		
28	H27=Ф.ОБР.ПХ(H22;H21;H25)						$F_T = 1.863$		
29	H29=Ф.РАСП.ПХ(H27;H21;H25)						$p = 1.000$		

11.9.4.3. Критерій згоди Фішера–Снедекора

Критерій Фішера–Снедекора як і критерій Бартлетта може застосовуватися якщо число спостережень n в різних вибірках (повтореннях) не однакове, при однаковому числі застосовується критерій Кохрена (див. підрозділ 11.9.4.1 Використання критерію Кохрена).

При аналізі за критерієм Фішера–Снедекора F_T з усіх k оцінок дисперсій вибирають дві — максимальну і мінімальну. Якщо виявиться, що різниця між ними не значима, то тим більше не значима і відмінність між іншими дисперсіями. З цією метою обчислюють відношення, причому критерій Фішера розраховується за умови $s_1^2 > s_2^2$ і при ступенях вільності вибірок $v_1 = n_1 - 1$ і $v_2 = n_2 - 1$, де n_1 і n_2 обсяги *більшої* і *меншої* вибірок.

З цією метою за формулою (3.29) обчислюють F .

Оцінка отриманих результатів аналогічна наведеній на с. 360.

Далі визначається $F_{\alpha/2(v_1, v_2)}$ — табличне значення критерію Фішера (табл. В.7–В.9). Оскільки критична область двобічна, нульова гіпотеза приймається при подвійному зниженні рівня значущості $\alpha/2$ для коефіцієнта Фішера, тобто за умови $F < F_{\alpha/2(v_1, v_2)}$ при даних ступенях вільності.

Недолік цього методу полягає в тому, що враховується інформація лише найменшої і найбільшої дисперсій. Не враховується також ні кількість спостережень n , ні від кількості вибірок k , а використовує лише крайні дисперсії ранжируваного ряду спостережень. Через це його краще не застосовувати. Також його не слід застосовувати якщо дисперсії вибірок суттєво відрізняються між собою.

За приклад застосування критерій Фішера–Снедекора представлено аналіз даних трифакторного експерименту, наведеного в табл. 11.77 на основі поданої нижче табл. 11.79, яка ґрунтується на чарунках **K2:M16**. Процес розрахунків ясно з виразу (3.29) та табл. 11.77 і додаткового пояснення не потребує.

Так як $F < F_{05(2, 2)}$, і F

Таблиця 11.77. Однорідність декількох дисперсій за критерієм Фішера–Снедекора

	A	B	C	D	E
1	Y1	Y2	Y3	s ²	Ступінь вільності v
2	596.5	788.9	672.6	6258.30	2.0
3	740.5	489.4	576.1	10837.77	2.0
4	516.4	768.6	605.0	10913.69	2.0
5	683.2	444.4	525.4	9838.57	2.0
6	559.3	846.2	658.4	14155.46	2.0
7	D2=ДИСПР(A2:C2) D15=ДИСПР(A15:C15)				
8	E2=СЧЁТ(A2:C2)-1 E15=СЧЁТ(A15:C15)-1				
9	D16=МАКС(D2:D15) D17=МИН(D2:D15)				
10	B19=D16/D17 D20=F.ОБР.ПХ(D18;E15;E2)				
11	D21=F.ОБР.ПХ(D18/2;E15;E2)				
12	501.6	771.3	593.1	12537.46	2.0
13	718.2	452.4	539.4	12244.23	2.0
14	473.2	763.3	566.5	14615.76	2.0
15	774.4	472.7	567.9	15861.46	2.0
16	Максимальна дисперсія			15861.5	
17	Мінімальна дисперсія			6258.3	
18	Рівень значущості α			0.05	
19	Критерій Фішера F			2.5345	
20	Критичний критерій Фішера $F_{\alpha, T}$			19.0000	
21	Критичний критерій Фішера $F_{\alpha/2, T}$			39.0000	

$<F_{025(2, 2)}$, тобто 2.534 менше від 19.000 і 39.000, усі вибіркові дисперсії на 0.05 рівні значущості є оцінками однієї генеральної сукупності, тобто однорідні.

Якщо не виявлена неоднорідність дисперсії відтворюваності, то обробку результатів експериментів можна продовжувати далі. В іншому випадку слід виявити і усунути причини неоднорідності. Зазвичай неоднорідність є наслідком прийнятих рішень з організації та проведення експериментів.

По–перше, можливо в експериментальному дослідженні не врахований деякий істотний фактор (фактори), який змінювався в ході дослідів. Такий фактор (фактори) слід виявити, включити в модель або забезпечити його стабільність в ході досліджень і повторити досліді;

По–друге, кількість повторних дослідів в точках плану з великою дисперсією функції відгуку проведено недостатньо. Дійсно, дисперсія функції відгуку s_u^2 може суттєво відрізнятись в різних точках плану.

Отже, неоднорідність можна знизити за рахунок зменшення інтервалу варіювання факторів або збільшення кількості дослідів у відповідних точках плану. Зміна інтервалів варіювання тягне необхідність повторення дослідів у всіх точках плану. Тому із зазначених способів зниження неоднорідності слід вибрати той, який вимагає меншої кількості нових дослідів.

11.10. ВИКОРИСТАННЯ ППП STATIST ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОФАКТОРНОГО АКТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Пакет програм **Statist**²¹⁾ розміщується в кореневій теці **c:** маючи назву **c:\statist**. Він складається з файлів **Statu_p.exe**, **Axtrem.exe** і **Bim_win.exe**, а також тек **Xm** і **Dat**²²⁾. У теці **Xm** містяться файли, які є матрицями експериментальних досліджень (табл. К.5 на с. 1139, К.24 на с. 1147, К.31 на с. 1151, К.34 на с. 1155 — матриці планів Бокса і К.33 на с. 1153 — матриця плану Хартлі–Коно), причому розширення цих файлів відповідає кількості факторів матриці, тобто у файлі для чотирифакторного експерименту розширення повинно бути ***.004**, і файли **Ur-reg** з таким же розширенням для вибору коефіцієнтів рівняння, математичної моделі (див. рис. 11.88 на с. 813). У теку **Dat** поміщають файли з вихідними даними. Вони можуть містити не лише середні показники експерименту, а й бути представлені по-

²¹⁾ Пакет програм **Statist**, свого часу швидко використовувався в Таврійському державному агротехнологічному університеті, люб'язно наданий нам автором, зробив для DOS у 90-х роках минулого століття к.т.н. Є. Є. Антонов, у той час доцент ТДАТУ.

²²⁾ Підрозділ написано за участю Є. Є. Антонова [159].

вторністю й подаватися у вигляді матриці $n \times j$, де n – рядки дослідів з даними кількістю повторності j , відокремлених одна від одної пробілом або табуляцією. Ці файли повинні мати розширення ***.stn**, де n – число факторів, тобто файл даних п'ятифакторного експерименту повинен мати розширення ***.st5**.

Крім того, у директорії **Statist** повинен бути файл **Config.stp**, який містить указування шляхів до тек **Xm** і **Dat**, тобто записи **c:\statist\xm** і **c:\statist\dat**, а в кореновому каталозі **c:** повинен бути файл **Autoexec.bat** з указаним шляхом до файлу **Statu_p.exe**, а саме містити запис **SET STATU_P=c:\statist**.

Як зрозуміло, пакет програм **Statist** дозволяє отримувати математичні моделі лише за даними аналізу результатів багатфакторного активного експерименту, представленими в кодованому вигляді.

Розглянемо приклад використання пакету програм **Statist**.

Маємо дані інтервалів варіювання (табл. 11.78) і табл. 11.79 з величинами, знайденими реалізацією активного експерименту, проведеного згідно трирівневої матриці оптимального плану Бокса другого порядку для трьох факторів B_3 (табл. К.24) [159].


Таблиця 11.78. Інтервали і рівні варіювання факторів

Показник	Кодоване значення факторів	Фактори і їхнє позначення		
		середня довжина часток l , мм	уміст зв'язуючої речовини δ , %	кут конуса матриці α , град
		X_1	X_2	X_3
Верхній рівень	+1	40	9.0	6
Основний рівень	0	30	4.5	4
Нижній рівень	-1	20	0	2
Інтервал варіювання	ϵ	10	4.5	2

Таблиця 11.79. Результати замірів щільності брикетів ρ , кг/м³


№ п. п.	Значення замірів				№ п. п.	Значення замірів			
	Y_1	Y_2	Y_3	Y_{cp}		Y_1	Y_2	Y_3	Y_{cp}
1	597	789	672	686	8	674	460	537	557
2	740	489	577	602	9	527	784	618	643
3	516	769	605	630	10	692	458	539	563
4	683	444	526	551	11	502	771	593	622
5	559	846	659	688	12	718	452	540	570
6	734	502	585	607	13	473	763	567	601
7	510	785	604	633	14	774	473	568	605

Дані представимо таблицею, у якій наведено лише повторність дослідів без наведення середніх значень. Виділяємо її, запам'ятаємо і вставляємо в один із текстових редакторів (рис. 11.81 а). Цей файл записуємо з розширенням **st3** у папку **Dat**, тут це файл названо **Br.st3** (рис. 11.81 б). Запускаємо файл **Statu_p.exe**, відкриваємо меню **Параметры** (рис. 11.82), з його підменю **Количество фактор** вибираємо необхідну кількість факторів експерименту (рис. 11.83) і далі з меню **X-Матр** матрицю експериментальних досліджень (трирівневу матрицю Бокса для трьох факторів, рис. 11.84), і відкриваємо її (рис. 11.85). З меню **Y-Матр** знаходимо наш файл **Br.st3** (рис. 11.86) і відкриваємо його (рис. 11.87).



597	789	673
740	489	576
516	769	605
683	444	525
559	846	658
734	502	585
510	785	604
674	460	537
527	784	617
692	458	539
502	771	593
718	452	539
473	763	567
774	473	568

а)



б)

Рис. 11.81. Зміст (а) і запис (б) файлу **Br.st3**

З меню **Параметры** відкриваємо **Ур. регрес.** і кнопкою **Ins** позначаємо коефіцієнти рівняння, які потрібні для математичної моделі (рис. 11.88). Запуск **Alt-R Счет** видає кодовану функцію відклику (рис. 11.89).

Практичне застосування моделі можливе за умови $F > F_T$. Згідно рис. 11.89 модель адекватна, тому продовжуємо дії далі ²³⁾.

²³⁾ За більш точними розрахунками, виконаними ППП **Statistica** (див. табл. 11.84, с. 824) модель неадекватна, так як у програмі **Statist** неадекватність моделі визначається без урахування значущості коефіцієнтів рівняння і лише за показниками його лінійних складових.



Рис. 11.82. Меню **Параметры**

Рис. 11.83. Вибір необхідної кількості факторів експерименту




Рис. 11.84. Вибір матриці досліджень




Рис. 11.85. Матриця досліджень




Рис. 11.86. Вибір файлу даних

Знаком “плюс” на рис. 11.89 відмічені значущі коефіцієнти.




Рис. 11.87. Файл даних




Рис. 11.88. Вибір коефіцієнтів рівняння, математичної моделі




Рис. 11.89. Результати розрахунку у кодованому вигляді

З меню **Параметры** відкриваємо **Сохранить** результат і вибираємо запис даних у файл із розширенням **bim** (ім'я файлу відповідатиме файлу даних) (рис. 11.90), у теці **Dat** створюється файл **Br.bim** (рис. 11.94 а, с. 817).




Рис. 11.90. Запис даних у файл з розширенням **bim**.

Далі з меню **Параметры** відкриваємо **Раскодиров.**, заносимо середні рівні і інтервали варіювання факторів, їхні позначення та розмірності (останнє не обов'язково) і нажимаємо **Ввод** (рис. 11.91).




Рис. 11.91. Розкодування варійованих факторів

Знову з меню **Параметры** відкриваємо **Ур. регрес.** і кнопкою **Ins** позначаємо коефіцієнти, потрібні для математичної моделі (рис. 11.88). Запустивши **Alt-R Счет** маємо функцію відклику в натуральному вигляді (на рис. 11.92 наведено нижню частину таблиці).

З меню **Параметры** відкриваємо **Сохранить** результат і вибираємо запис даних у текстовий файл із розширенням **txt** (ім'я файлу автоматично відповідає файлу даних), тобто в теці **Dat** створюється файл **Br.txt** (рис. 11.93).

Таким чином, рівняння функції відклику виглядатиме

$$\rho_6 = 899.5333 - 11.2617 \cdot l - 8.8926 \delta - 24.0417 \alpha + 0.0278 \cdot l \delta + 0.0458 \cdot l \alpha + 0.0378 \delta \alpha + 0.1158 \cdot l^2 + 0.2263 \delta^2 + 2.9375 \alpha^2. \quad (11.83)$$




Рис. 11.92. Результати розрахунку функції відклику у натуральному вигляді

З даних, наведених на рис. 11.89, бачимо, що на 95 % рівні довірчої ймовірності дисперсії однорідні, так як для критерію Кохрена маємо співвідношення $G = 0.0999 < G_{.05(2,14)} = 0.3539$ (див. підрозділ **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**).


Дисперсія неадекватності математичної моделі $SS_f = 0.0834$, дисперсія похибки дослідів $SS_y = 16929.1429$, критерій Фішера $F_{(df=4, fy=28)} = 0.0000$. Так як $F_{.05(4, 28)} = 2.714108$, тобто розрахункове значення менше табличного, модель адекватна на прийнятому рівні довірчої ймовірності (див. посилання²³) на с. 811), множинний коефіцієнт регресії $R_{y,r} = 1.0000$. У цьому разі коефіцієнт детермінації становить $R_{y,r}^2 = 1.0$, тобто більше ніж 0.75, що свідчить про працездатність даного рівняння регресії., яке на 100 % пояснює загальний розкид даних.

Далі редагується файл **Br.bim**. Для цього він відкривається текстовим редактором (рис. 11.94, а) і прибираються дві колонки нулів (рис. 11.94, б), нулями замінюються незначущі коефіцієнти рівняння регресії. Після чого файл записується під тим же ім'ям і з тим же розширенням у директорію **c:\statist**.


Для аналізу двовимірних залежностей функції відклику в пакеті програм **Statist** використовується файли **Axtrem.exe** і **Bim_win.exe**, які обробляють дані файлу **Br.bim**.

Файл **Axtrem.exe** визначає мінімальне (рис. 11.95, а) і максимальне значення функції відклику та координат їхнього положення у межах варіювання (рис. 11.95, б).


Фіксовані значення приймаємо відповідно результатам, представленим на рис. 11.95 а). Після їхнього введення висвічуються межі крайніх значень функції відклику.



а)



б)



в)

Рис. 11.97. Проекція двовимірної поверхні функції відгуку для взаємодії двох факторів при фіксації третього на рівні максимальної щільності:

а – середньої довжини часток l і умісту зв'язуючої речовини δ ;

б – середньої довжини часток l і кута конуса матриці α ;

в – умісту зв'язуючої речовини δ і кута конуса матриці α

Натиснувши **Ввод** одержуємо геометричний образ — ізолінії двовимірної поверхні функції відклику при парній взаємодії факторів. На ній лініями зеленого кольору позначено ізолінію фіксованого значення — перетин при прийнятому значенні $F = 650$ (рис. 11.97).

11.11. Використання ППП Statistica для регресійного аналізу експериментів, виконаних за планами другого порядку

11.11.1. Отримання і оцінка математичної моделі багатофакторного активного експерименту

11.11.1.1. Попередня оцінка і обробка даних при регресійному аналізі

Умови застосування методу регресійного аналізу наведено в підрозділі **11.1 Загальні положення регресійного аналізу**, а саме на с. 660. Одні з цих вимог забезпечуються організацією плану активного експерименту [140], виконання інших, зокрема, оцінка отриманої функції відгуку, аналізується програмами статистичної обробки [25], проте виконання деяких з них повинно перевірятися перед статистичною обробкою даних самим експериментатором [33]²⁴⁾.

Попередня оцінка і обробка отриманого масиву експериментальних

Таблиця 11.80 – Результати досліджень щільності паливних брикетів з соломи

№ п.п.	Фактори			Щільність брикету ρ , кг/м ³			
	Довжина часток l , мм	Уміст зв'язуючого δ , %	Конусність матриці α , град	Повторності			Середнє \bar{Y}_{cp}
1	20	0.0	2	596.5	788.9	672.6	686
2	40	0.0	2	740.5	489.4	576.1	602
3	20	9.0	2	516.4	768.6	605.0	630
4	40	9.0	2	683.2	444.4	525.4	551
5	20	0.0	6	559.3	846.2	658.4	688
6	40	0.0	6	734.5	501.7	584.9	607
7	20	9.0	6	510.5	784.9	603.6	633
8	40	9.0	6	674.0	460.3	536.7	557
9	20	4.5	4	527.0	784.5	617.5	643
10	40	4.5	4	692.5	457.7	538.8	563
11	30	0.0	4	501.6	771.3	593.1	622
12	30	9.0	4	718.2	452.4	539.4	570
13	30	4.5	2	473.2	763.3	566.5	601
14	30	4.5	6	774.4	472.7	567.9	605

даних при регресійному аналізі активного експерименту виконується з використанням ППП Statistica і статистичних функцій табличного процесора Microsoft Excel, що виключає застосування довідкових таблиць з показниками розподілів, чим суттєво підвищує швидкість і точність розрахунків.

При розрахунку математичної моделі багатофакторного активного експерименту, тобто коли рівні факторів у кожному досліді задаються дослідником [17, 157], використовуються матриці планів експериментальних досліджень, які подає Додаток К [161, 162].

Як приклад використання ППП Statistica при обробці даних багатофакторного активного експерименту розглянемо матеріали підрозділу **11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатофакторного активного експерименту**, дані табл. 11.78, с. 810 і табл. 11.79, с. 810

²⁴⁾ Підрозділ написано за участю А. О. Комарова [162].

представлено у табл. 11.80. Розрахунки виконуються як за повтореннями, так і за їх середніми значеннями.

Перевірка вибірки на нормальність розподілу виконується згідно міжнародного стандарту ISO 3479–97 за критерієм Шапіро–Уїлка. Її краще здійснювати побудовою гістограм ППП **Statistica**, як це описано у підрозділі **15.5.2 Представлення суміщених гістограм**, чи гістограм і табличного представлення (табл. 15.5 на с. 976) у підрозділі **15.5.4 Побудова й аналіз одинарних гістограм**. Дані обох варіантів можуть бути представлені текстом.

Результати оцінки подані в табл. 11.81. З неї бачимо, що для всіх повторень і середнього арифметичного виконується умова $p > \alpha$, де $\alpha = 0.05$ – прийнятий рівень статистичної значущості. Таким чином вони нормально розподілені і для їх оцінок можуть бути застосовані параметричні критерії Фішера, Стюдента, Кохрена та інші.

Розглянемо оцінку сумнівних і виключення помилкових значень (промахів) для такої повторності, коли у вибірці є тільки одне аномальне значення із трьох.

Найбільш уживаним для цього є критерій Стюдента див. підрозділ **5.12.1.3 Оцінка за t-критерієм Стюдента**, а саме, табл. 5.6 на с. 250. За її результатами всі мінімальні і максимальні значення повторень є достовірними з прийнятим рівнем значущості.

Перевірка належності всіх вибірок до однієї генеральної сукупності здійснюється оцінкою статистичної значущості різниці між парами середніх арифметичних вибірок з використанням критерію Стюдента чи за порівнянням їхніх довірчих інтервалів. На наш погляд доцільно використовувати останній спосіб, здійснюючи побудову блокових діаграм (див. рис. 2.12, с. 109 і рис. 2.19, с. 117) з графічним наведенням середнього, його похибки і довірчого інтервалу для середнього арифметичного, яке виконується у ППП **Statistica** (рис. 11.98).

Представлення довжини “вусів” як інтервалу у вигляді похибки результату вимірювання, яка визначається виразом $t_{\alpha(v)_T} s_{\bar{x}}$, описано у підрозділі **15.7 Побудова діаграми розмахів**.

З аналізу рис. 11.98 бачимо, що всі три вибірки мають загальний довірчий інтервал середнього, який знаходиться у межах від **A** до **B**, що свідчить про їх належність до однієї генеральної сукупності.

Для перевірки гіпотези про однорідність (належність до однієї генеральної сукупності) дисперсій всіх вибірок використовується критерій Кохрена, описаний у підрозділі **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**, з поданням результатів розрахунку у табл. 11.75 на с. 804.

Так як $k=14$ і $n=3$ маємо $G < G_{05(14, 2)}$, тобто $0.1003 < 0.3517$, усі вибіркові дисперсії на 0.05 рівні значущості є оцінками однієї генеральної сукуп-

Таблиця 11.81 – Відповідність повторень нормальному розподілу


Повторність	Критерій Шапіро-Уїлка W	Рівень значущості p
Y_1	0.8986	0.1077
Y_2	0.8209	0.0760
Y_3	0.9385	0.3996
Y_{cp}	0.9376	0.3883

ності, тобто однорідні.

Визначення коефіцієнту r лінійної кореляції для отримання лінійних регресійних рівнянь краще виконувати за допомогою ППП **Statistica**, як більш інформативну порівняно з **MS Excel**. Але ми аналізуємо вихідні дані рівняння функції відгуку другого порядку, тому необхідно отримати кореляційне відношення η , яке характеризує криволінійну кореляцію, тобто тісноту зв'язку результуючою ознаки з фактором і змінюється від 0 до 1.

Найбільш просто це зробити виконавши дисперсійний аналіз вихідних даних за допомогою інструментів **Excel** чи **Statistica** як описано в підрозділі **10.10.2 Метод Плогінського оцінки сили впливу факторів** та **10.10.3 Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі**. Далі використовуючи таблицю його результатів (чарунки **A1:F5** табл. 11.82) за формулами (10.47), наведених на її полі, визначається індекс детермінації фактору η^2 , а потім кореляційне відношення η .

З неї бачимо сильне кореляційне відношення між залежним фактором — щільністю брикетів і довжиною часток та помітне (за шкалою Чеддока, табл. 9.1 на с. 492) з умістом зв'язуючої речовини. Між щільністю брикетів і конусністю матриці наявне слабе кореляційне відношення. Про істотність кореляційного відношення свідчить не його величина, а рівень значущості [36]. Для всіх названих кореляцій за значеннями поданими в колонці **F** табл. 11.82 він є статистично значущим на прийнятому рівні α .



Таблиця 11.82 – Визначення кореляційного відношення факторів

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіювання	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F	Рівень значущості p	Індекс детермінації η^2	Кореляційне відношення η
2	Вільний член	5102389	1	5102389	1995347	0.000000		
3	Довжина частки l, мм	16333	2	8166	3194	0.000000	0.68834	0.82966
4	Уміст зв'язуючого d, %	7022	2	3511	1373	0.000000	0.29595	0.54402
5	Конусність матриці a, град	373	2	186	73	0.000021	0.01571	0.12532
6	Ошибка	18	7	3	G3=B3/СУММ(\$B\$3:\$B\$5)		H3=G3^0.5	

Між незалежними факторами — довжиною часток соломи, умістом зв'язуючої речовини та конусністю матриці брикетного пресу кореляційні відношення відсутні, що забезпечується самою організацією плану активного експерименту.

11.11.1.2. Розрахунок математичної моделі багатфакторного активного експерименту

При розрахунку математичної моделі багатфакторного експерименту за допомогою ППП **Statistica** використовується розширена матриця плану експериментів, яка є аналогом вибору коефіцієнтів рівняння, математичної моделі, представленої на рис. 11.88 на с. 813 і задана розкодованою, представлено у табл. 11.80 на с. 819.

Перевірка відтворюваності дослідів за критерієм Кохрена, представлена в підрозділі **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**.

Дані вихідної таблиці (табл. 11.80, с. 819) слід скопіювати і вставити у таблицю ППП **Statistica**, подаючи повторності функції відклику однією колонкою і повторюючи значення аргументів (як для ДА при використанні опції **Факторный ДА** / **Factorial ANOVA**, див. підрозділ **10.4.3.1 Особливості дисперсійного аналізу експериментів засобами ППП Statistica**, с. 576), перейменувати колонки, за необхідності формувати дані та записати у файл (табл. 11.83), або створити розкодовану розширену матрицю згідно рис. 11.50, с. 737.

Представляти повторення колонками, як і для ДА опцією **Repeated measures ANOVA** / **Повторные измерения ДА**, не можна, так як модуль **Multiple Regression** / **Множественная регрессия** аналізує лише дані першої колонки.

У модулі **Multiple Regression** / **Множественная регрессия** меню **Statistics** / **Анализ** виводимо панель вибору установок і процедур **Multiple Linear Regression** / **Множественная регрессия** (рис. 11.99), де у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** натиснувши **Variables** / **Переменные** виконаємо дії аналогічно (рис. 11.51, с. 738) до переходу на панель **Multiple Regression Results** / **Результаты множественной регрессии** (рис. 11.100).




Рис. 11.99. Панель вибору параметрів рівняння регресії

Таблиця 11.83. Розкодована розширена матриця

STATISTICA - [Данные: Брукет ^ (11v ^ 14c)]										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Довжина частки l, мм	Уміст зв'язуючого δ, %	Конусність матриці α, град	l x δ	l x α	δ x α	l x l	δ x δ	α x α	Щільність брикета ρ, кг/мЗ
1	20	0	2	0	40	0	400	0	4	597
2	40	0	2	0	80	0	1600	0	4	740
3	20	9	2	180	40	18	400	81	4	516
4	40	9	2	360	80	18	1600	81	4	683
5	20	0	6	0	120	0	400	0	36	559
38	40	4.5	4	180	160	18	1600	20.25	16	539
39	30	0	4	0	120	0	900	0	16	593
40	30	9	4	270	120	36	900	81	16	540
41	30	4.5	2	135	60	9	900	20.25	4	567
42	30	4.5	6	135	180	27	900	20.25	36	568




Рис. 11.100. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії

У вкладці **Quick**/Быстрый чи **Advanced**/Дополнительно при запуску процедури **Summary: Regression results** / **Итоговая таблица регрессии** (рис. 11.100, с. 823) маємо табл. 11.84 з характеристикою рівняння регресії, отриманого *за повторностями*.

Таблиця 11.84. Сумарна характеристика залежної змінної
(рівняння регресії)

N=42	Regression Summary for Dependent Variable: Щільність брикету ρ , кг/м ³ (Брукет)					
	R= .36502066 R ² = .13324008 Adjusted R ² = ----- F(9,32)=.54657 p<.82928 Std.Error of estimate: 121.68					
	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(32)	p-value
Intercept			898.2750	410.7179	2.187085	0.036159
Довжина частки l, мм	-0.833446	2.039053	-11.2500	27.5235	-0.408741	0.685452
Уміст зв'язуючого δ , %	-0.295595	0.952570	-8.8667	28.5732	-0.310314	0.758335
Конусність матриці α , град	-0.348195	1.458174	-23.5000	98.4135	-0.238788	0.812792
$l \times \delta$	0.030433	0.604702	0.0278	0.5519	0.050328	0.960174
$l \times \alpha$	0.020641	0.683548	0.0375	1.2419	0.030197	0.976098
$\delta \times \alpha$	0.004460	0.443143	0.0278	2.7597	0.010066	0.992032
$l \times l$	0.518783	1.998200	0.1162	0.4478	0.259625	0.796816
$\delta \times \delta$	0.070933	0.686725	0.2284	2.2112	0.103292	0.918376
$\alpha \times \alpha$	0.347553	1.338673	2.9063	11.1940	0.259625	0.796816

При цьому також видається підсумкова статистика рівняння регресії (табл. 11.85), яка представляє собою верхні частини рис. 11.100 і табл. 11.84.

Таблиця 11.85. Підсумкова статистика рівняння регресії	
Статистика	Итоговые статистики; ЗП: Щільність брикету ρ , кг/м ³
Множест. R	0.3648
Множест. R ²	0.1330
Скорр. R ²	-0.1108
F(9,32)	0.5457
p	0.8300
Стд. Ош. Оценки	121.7788

За даними рис. 11.100 і табл. 11.84 та 11.85, бачимо що всі коефіцієнти рівняння регресії, отриманого за повторностями, неістотні, а сама математична модель неадекватна. Відмінність результату від отриманого на рис. 11.89 (с. 813) у тому, що у **Statist** неадекватність моделі визначається без урахування значущості всіх коефіцієнтів рівняння і лише за лінійними складовими.

Далі у вкладці **Advanced**/Дополнительно (рис. 11.53, с. 740) кнопкою процедури **ANOVA (Overall goodness of fit)**/Дисперсионный анализ (1) одержуємо табл. 11.86, де представлено дані ДА перевірки моделі на адекватність за критерієм Фішера, яка свідчить про неадекватність моделі із прийнятим рівнем значущості.

За табл. 11.86 виконуємо перевірку *інформаційної спроможності моделі*, результати якої подано в табл. 11.87. Тут розрахунок критерію Фішера $F_{\text{ін}}$ знаходиться за виразом (11.28), так як результат більше нуля.

Таблиця 11.86. Дисперсійний аналіз (розрахунок критерію Фішера)					
Effect	Analysis of Variance; DV: Щільність брикету ρ , кг/м ³ (Брукет)				
	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-value
Regress.	72829.4	9	8092.15	0.546567	0.829282
Residual	473773.2	32	14805.41		
Total	546602.6				

Так як має місце $F_{\text{ін}} < F_{\text{т}}$ нульова гіпотеза відхиляється, що свідчить, що модель інформаційно неспроможна на прийнятому рівні значущості

$\alpha=0.05$, так як результати експерименту вона описує краще за найпростішу модель — пряму лінію лише на 28.4 %.

Проте, при *розрахунку за середніми значеннями* функції отримується адекватне рівняння регресії з переважною більшістю значущих коефіцієнтів (рис. 11.101, табл. 11.88 та 11.89), хоч коефіцієнти рівнянь регресії для обох способів співпадають.

Таблиця 11.87. Перевірка інформаційної спроможності моделі

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності SM	Середній квадрат df	Емпіричний критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F_T	Зростання показника прогноза θ , %
2	Регресія	72829.4	9	8092.15	0.546567	0.829282		
3	Залишки	473773.2	32	14805.41				
4	Разом	546602.6	41	13331.77				
5	Інформаційна спроможність моделі				1.6475	0.133910	2.8231	28.3547

C4=СУММ(C2:C3)

D4=B4/C4

E5=D4/D2

H5=100*(E5^0.5-1)

F5=1-F.РАСП(E5;C4;C2;ИСТИНА)

G5=F.ОБР.ПХ(0.05;C4;C2)

Таким чином варто використовувати обидва способи розрахунку і приймати більш сприятливий результат. Далі ми будемо розглядати лише його.

Розрахунковий критерій Фішера $F_{05(9;4)}=26973.84$ зі значенням $p<0.000001$, тобто він менше $\alpha=0.05$, що свідчить про адекватність моделі на даному значущості, а саме $p<0.000001$, тому практичне застосування моделі можливе.




Рис. 11.101. Панель вибору аналізу показників рівняння регресії, отриманих за середніми значеннями повторень.

Таблиця 11.88. Сумарна характеристика залежної змінної (рівняння регресії), отриманої за середніми значеннями повторень

N=14	Итоги регрессии для зависимой переменной: Щільність брикета ρ , кг/м ³ (Брикет) R= .99999176 R2= .99998352 Скорректир. R2= .99994645 F(9,4)=26974. p<.000000 Станд. ошибка оценки: .31623					
	БЕТА	Стд.Ош. БЕТА	В	Стд.Ош. В	t(4)	p-уров.
Св.член			898.2750	1.848817	485.8647	0.000000
Довжина частки l, мм	-2.28326	0.025145	-11.2500	0.123895	-90.8026	0.000000
Уміст зв'язуючого δ , %	-0.80980	0.011747	-8.8667	0.128620	-68.9367	0.000000
Конусність матриці α , град	-0.95390	0.017982	-23.5000	0.443001	-53.0473	0.000001
l x δ	0.08337	0.007457	0.0278	0.002485	11.1803	0.000364
l x α	0.05655	0.008429	0.0375	0.005590	6.7082	0.002570
δ x α	0.01222	0.005465	0.0278	0.012423	2.2361	0.089009
l x l	1.42123	0.024642	0.1162	0.002016	57.6762	0.000001
δ x δ	0.19432	0.008469	0.2284	0.009953	22.9464	0.000021
α x α	0.95214	0.016508	2.9063	0.050389	57.6762	0.000001

Виконуючи дії, описані у під-розділі **11.6.3 Визначення і оцінка коефіцієнтів регресії другого порядку з використанням ППП Statistica**, отримаємо необхідні дані.

Проте, таблиця зі значеннями вибіркової середньої і її похибки (аналогічно табл. 11.56, с. 747) для організованих аргументів не має сенсу, а для функції буде розраховуватися нижче. Виконання аналізу за допомогою діаграми розмаху факторів і кореляційної матриці з тієї ж причини теж недоцільні.

Далі одержуємо табл. 11.90, за якою виконуємо перевірку інформаційну спроможності моделі, результати якої подано в табл. 11.91.

Таблиця 11.90. Дисперсійний аналіз (розрахунок критерію Фішера)					
Analysis of Variance; DV: Щільність брикету (Spreadsheet1)					
Effect	Sums of Squares	df	Mean Squares	F	p-value
Regress.	24276.46	9	2697.384	26973.84	0.000000
Residual	0.40	4	0.100		
Total	24276.86				

Таблиця 11.89. Підсумкова статистика рівняння регресії

Статистика	Итоговые статистики; ЗП: Щільність брикета ρ , кг/м ³ (Брикет)
	Значение
Множест. R	1.00
Множест. R2	1.00
Скорр. R2	1.00
F(9,4)	26973.84
p	0.00
Стд. Ош. Оценки	0.32

Так як має місце $F_{\text{ін}} < F_{\text{т}}$ нульова гіпотеза як і у попередньому випадку (табл. 11.87) відхиляється, що свідчить, що модель інформаційно неспроможна на рівні значущості $\alpha=0.05$ так як результати експери-

менту вона описує краще за найпростішу модель — пряму лінію лише на 20.2 %.

Таблиця 11.91. Перевірка інформаційної спроможності моделі

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіювання	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F	Рівень значущості p	Табличний критерій Фішера F	Зростання показника прогнозу θ , %
2	Регресс.	24276.46	9	2697.384	26973.84	0.000000		
3	Остатки	0.40	4	0.100				
4	Итого	24276.86	13	1867.451	D4=C4/B4 E5=D2/D4 C6=C2/C4			
5	Інформаційна спроможність моделі				1.444	9.856E-19	2.714	20.2
6	Роботоздатність моделі		1.000	F5=F.РАСП.ПХ(D4;B2;B4) G5=F.ОБР.ПХ(0.05;B2;B4) H5=100*(E5^0.5-1)				

На наш погляд, перевірку інформаційну спроможності моделі, слід виконувати за всіма повтореннями, навіть якщо коефіцієнти регресійного рівняння визначаються розрахунком за середніми значеннями.

Проте, при *розрахунку за середніми значеннями функції* отримується адекватне рівняння регресії з переважною більшістю значущих коефіцієнтів (рис. 11.101, табл. 11.88 та 11.89), хоч коефіцієнти рівнянь регресії для обох способів співпадають.

У колонці **B** табл. 11.88 представлено вільний член і коефіцієнти рівняння регресії (у вигляді функції відклику другого порядку) — математичної моделі, яка має вигляд

$$\rho_6 = 898.2750 - 11.25 \cdot l - 8.8667\delta - 23.5\alpha + 0.0278 \cdot l\delta + 0.0375 \cdot l\alpha + 0.0278 \cdot \delta\alpha + 0.1162 \cdot l^2 + 0.2284\delta^2 + 2.9063\alpha^2. \quad (11.84)$$

Для порівняння експериментальних значень і значень, розрахованих за рівнянням регресії представимо таблицю передбачуваних значень і залишків (табл. 11.92), одержання якої подано на рис. 11.55, с. 744.

Наявність автокореляції перевіряється за допомогою *d*-критерію Дарбіна–Уотсона (див. с. 746).

Таблиця 11.92. Передбачувані значення і залишки

Набл. No.	Предсказанные значения и остатки (Брикеты)								
	Зависимая перемен.: Щільність брикета ρ , кг/м ³								
	Наблюд. Значение	Предск. Значение	Остатки	Станд. предск.	Станд. Остатки	Стд. Ош. предск.	Махалан. расст.	Удален. остатки	Кука расст.
1	686.0000	685.9000	0.099976	1.72664	0.31615	0.282843	9.471429	0.49988	0.199902
2	602.0000	601.9000	0.099976	-0.21719	0.31615	0.282843	9.471429	0.49988	0.199902
3	630.0000	630.1000	-0.099976	0.43538	-0.31615	0.282843	9.471429	-0.49988	0.199902
4	551.0000	551.1000	-0.099976	-1.39275	-0.31615	0.282843	9.471429	-0.49988	0.199902
5	688.0000	687.9000	0.099976	1.77292	0.31615	0.282843	9.471429	0.49988	0.199902
6	607.0000	606.9000	0.099976	-0.10149	0.31615	0.282843	9.471429	0.49988	0.199902
7	633.0000	633.1000	-0.099976	0.50480	-0.31615	0.282843	9.471429	-0.49988	0.199902
8	557.0000	557.1000	-0.099976	-1.25390	-0.31615	0.282843	9.471429	-0.49988	0.199902
9	643.0000	643.0000	0.000000	0.73389	0.00000	0.244949	6.871428	0.00000	0.000000
10	563.0000	563.0000	0.000000	-1.11737	0.00000	0.244949	6.871428	0.00000	0.000000
11	622.0000	622.4000	-0.400024	0.25719	-1.26499	0.244949	6.871428	-1.00006	0.600073
12	570.0000	569.6000	0.400024	-0.96464	1.26499	0.244949	6.871428	1.00006	0.600073
13	601.0000	601.0000	0.000000	-0.23802	0.00000	0.244949	6.871428	0.00000	0.000000
14	605.0000	605.0000	0.000000	-0.14546	0.00000	0.244949	6.871428	0.00000	0.000000
Минимум	551.0000	551.1000	-0.400024	-1.39275	-1.26499	0.244949	6.871428	-1.00006	0.000000
Максим.	688.0000	687.9000	0.400024	1.77292	1.26499	0.282843	9.471429	1.00006	0.600073
Среднее	611.2857	611.2857	0.000000	0.00000	0.00000	0.266603	8.357143	0.00000	0.199955
Медиана	606.0000	605.9500	0.000000	-0.12347	0.00000	0.282843	9.471429	0.00000	0.199902

Запустивши процедуру Durbin-Watson statistic / Статистика Дарбина-Уотсона у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** панелі Residual Analysis / Анализ остатков, отримуємо аналіз регресійних залишків функції відклику за статистикою Дарбіна–Уотсона (табл. 11.93).

У даному випадку $d_{\phi}=2.725134$ (табл. 11.93). Згідно табл. Е.30, с. 1117 для $n=14$ і числі незалежних змінних першого порядку рівняння регресії (без постійного члена) $k=3$ маємо

Таблиця 11.93. Статичний аналіз Дарбіна–Уотсона

	Дарбина-Уотсона d (Брикеты) и сериальная корреляция остатков	
	Дарбина-Уотсон d	Сериал. Корр.
Оценка	2.725134	-0.375061

Таблиця 11.94. Ранжовані результати досліджень щільності паливних брикетів

№ п.п.	Фактори			Функція відгуку ρ	№ п.п.	Фактори			Функція відгуку ρ
	I	δ	α			I	δ	α	
1	20	0	2	686	14	30	4.5	6	605
5	20	0	6	688	12	30	9.0	4	570
9	20	4.5	4	643	2	40	0	2	602
3	20	9.0	2	630	6	40	0	6	607
7	20	9.0	6	633	10	40	4.5	4	563
11	30	0	4	622	4	40	9.0	2	551
13	30	4.5	2	601	8	40	9.0	6	557

$d_{L,05(3; 14)}=0.77$ і $d_{U,05(3; 14)}=1.78$, тобто $d_{L,05(3; 14)} < d_{\phi} < d_{U,05(3; 14)}$ — таким чином про автокореляцію залишків однозначного висновку дійти не можна, проте ми припускаємо існування автокореляції залишків. Тому виконаємо додаткову перевірку за серіальною кореляцією.

Згідно (11.92) вона повинна знаходитися у межах $\pm t_{05(13)} / \sqrt{n}$, а саме від -



$2.1604 / \sqrt{14} = -0.5774$ до 0.5774 . Ця умова виконується — автокореляцію залишків відсутня.

Якщо для аналізу за статистикою Дарбіна–Уотсона вихідні дані табл. 11.80 представити ранжованою, як це подано у табл. 11.94, де номери дослідів відповідають номерам табл. 11.80 матимемо результати табл. 11.95.

З її аналізу маємо $d=4-2.1279 = 1.8721$, тобто, ця величина знаходиться у межах від $d_{U.05(3; 14)}=1.78$ до $4-d_{U.05(3; 14)}=4-1.78=2.22$. Таким чином згідно рис. 11.105 на с. 839 автокореляцію залишків відсутня. Про це свідчить і коефіцієнти серіальної кореляції.

Як бачимо, використання для регресійного аналізу вихідних даних табл. 11.80 ранжовано дає більш точні результати при оцінці за статистикою Дарбіна–Уотсона.

Таблиця 11.95. Статичний аналіз Дарбіна–Уотсона		
	Durbin-Watson d (Spreadsheet1) and serial correlation of residuals	
	Durbin-Watson d	Serial Corr.
Estimate	2.127865	-0.148188

Практично ж при використанні модуля  Multiple Regression /  Множественная регрессия отриманням табл. 11.85–11.93 аналіз закінчують.

Таблиця 11.96. Порівняння пакетів програм **Statist** і **Statistica**

Показник	Пакет програм	
	Statist	Statistica
Обробка даних активного експерименту	+ ²⁵⁾	+
Обробка даних пасивного експерименту	–	+
Значення факторів: – безпосередні значення замірів	+ ²⁶⁾	+ ²⁷⁾
– середні значення замірів	+	+
Перевірка відтворюваності дослідів	+	–
Перевірка наявності автокореляції	–	+
Перевірка роботоздатності математичної моделі	+	+
Перевірка значущості коефіцієнтів математичної моделі	+	+
Перевірка математичної моделі на адекватність	+ ²⁸⁾	+
Координати оптимальної точки і значення функції відклику в ній	+ ²⁹⁾	–
Координати мінімальної і максимальної точок і значення функції відклику в них	+ ²⁹⁾	–
Аналітичне представлення двовимірних рівнянь	–	+
Графічне представлення двовимірних рівнянь: – плоске	+	+
– об’ємне	–	+
Нанесення лінії обмежуючого значення рівняння регресії	+	–

²⁵⁾ Лише при кодуванні досліджуваних факторів.

²⁶⁾ Необхідна однакова повторність замірів.

²⁷⁾ Рівняння регресії, отримані за безпосередніми значеннями замірів, часто оцінюються як неадекватні, хоч рівняння з тими ж коефіцієнтами, але отримані за середніми значеннями показників, оцінюються як адекватні.

²⁸⁾ Лише коефіцієнтів лінійних складових.

²⁹⁾ Лише у межах варіювання факторів.

Порівнюючи результати, наведені у підрозділах **11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатфакторного активного експерименту** і **11.11.1 Отримання і оцінка математичної моделі багатфакторного активного експерименту**, бачимо ряд несуттєвих відмінностей між ними, що впливає з особливостей аналізу результатів експериментальних досліджень, а саме з використання пакету програм Statist (підрозділ **11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатфакторного активного експерименту**) і Statistica (підрозділ **11.11.1 Отримання і оцінка математичної моделі багатфакторного активного експерименту**), наведених у табл. 11.96.

Таким чином, не один із пакетів програм не має істотної переваги перед іншим і кожен із них вимагає додаткового аналізу отриманих даних.

11.11.1.3. Особливості оцінки результатів регресійного аналізу

Існуючі спеціальні статистичні пакети, зокрема ППП **Statistica** наводячи подальший аналіз функції відклику, не враховують вилучення її неістотних коефіцієнтів [163]. Нижче викладено особливості подальшої оцінки функції відгуку другого порядку, отриманої при регресійному аналізі багатфакторного активного експерименту з повторенням, *виконаного за ортогональним планом* та ротатабельному плануванні з *вилученням лише коефіцієнтів лінійних і парних залежностей* і подальша оцінка її статистичної достовірності з урахуванням значущості коефіцієнтів ³⁰⁾.

Для ілюстрації взята табл. 11.80 (с. 819), при її обробці за допомогою ППП **Statistica** за середніми значеннями отримується адекватне рівняння регресії з переважною більшістю значущих коефіцієнтів, див. рис. 11.101 (с. 825) і табл. 11.88 (с. 826). Статистично неістотним на прийнятому рівні значущості є лише коефіцієнт при поєднанні факторів умісту зв'язуючої речовини і кута конусності матриці, тобто $\delta \times \alpha$. Проте слід звернути увагу, що наведена на рис. 11.101 і в табл. 11.88 оцінка адекватності математичної моделі за критерієм Фішера та інші показники стосуються моделі з усіма знайденими коефіцієнтами рівняння регресії, тобто і для статистично неістотних.

Для оцінки адекватності математичної моделі при виключенні з неї статистично незначущих коефіцієнтів, в **Microsoft Excel** створимо табл. 11.97.

У її верхній частині в колонки **A3:A12** і **B3:B12** відповідно занесені в головку і колонку **B** табл. 11.88, прийнявши незначущий коефіцієнт парної дії факторів $d \times a$ рівним нулю. Дані колонок **C**, **D**, **E**, **F** і **G** (рядки 3–16) узяті з табл. 11.80 на с. 819. Колонка **H3:H16** представляє собою розрахункові

³⁰⁾ Підрозділ написано за участю А. О. Комарова [163].

значеннями розрахованими за рівнянням регресії (11.84) для відповідних рядків колонок **D**, **E** і **F**.

У колонку **J**, яка використовується для визначення нормальності розподілу залишку, заноситься абсолютна різниця між поточним значенням колонки **I3:I16**, в якій подані різниці ε_i (залишки) даних між відповідними рядками колонок **G** і **H**, та середнього значення колонки **I3:I16**.

Таблиця 11.97. Зведена характеристика рівняння регресії з вилученим незначущим коефіцієнтом, отриманої за середніми значеннями повторень

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Розкодовані коефіцієнти рівняння		№ п.п.	Фактори			Функція відгуку Y		Залишок	Абсолютна різниця із середнім	Квадрат залишку	Квадрат різниці залишків
2				I	d	a	Експерим.	Розрах.				
3	In=	897.7750	1	20	0	2	686	685.65	0.35	0.35	0.123	
4	I=	-11.2500	2	40	0	2	602	601.65	0.35	0.35	0.122	1.29E-26
5	d=	-8.7556	3	20	9	2	630	630.35	-0.35	0.35	0.122	4.90E-01
6	a=	-23.3750	4	40	9	2	551	551.35	-0.35	0.35	0.123	5.17E-26
7	Ixa=	0.0278	5	20	0	6	688	688.15	-0.15	0.15	0.023	4.00E-02
8	Ixd=	0.0375	6	40	0	6	607	607.15	-0.15	0.15	0.023	0.00E+00
9	dxa=		7	20	9	6	633	632.85	0.15	0.15	0.022	9.00E-02
10	I²=	0.1162	8	40	9	6	557	556.85	0.15	0.15	0.022	0.00E+00
11	d²=	0.2284	9	20	4.5	4	643	643.00	0.00E+00	3.248E-14	0.00E+00	2.25E-02
12	a²=	2.9063	10	40	4.5	4	563	563.00	0.00E+00	3.248E-14	0.00E+00	0.00E+00
13			11	30	0	4	622	622.40	-0.40	0.40	0.160	1.60E-01
14			12	30	9	4	570	569.60	0.40	0.40	0.160	6.40E-01
15			13	30	4.5	2	601	601.00	0.00E+00	3.25E-14	0.00E+00	1.60E-01
16			14	30	4.5	6	605	605.00	0.00E+00	3.25E-14	0.00E+00	0.00E+00
17	Максимум						688.00	688.15	0.40	Рохрах.значення d _ф = 1.781		
18	Верхній довірчий інтервал						636.237	636.236	0.152	Нижня межа d _у = 1.820		
19	Середнє						611.29	611.29	0.000	Верхня межа 4-d _у = 2.180		
20	Нижній довірчий інтервал						586.335	586.335	-0.152	Нормальність розподілу залишків		0.069
21	Мінімум						551.00	551.35	-0.350			Нормальн.
22	Медіана						606.00	606.08	0.000	G21=МИН(G3:G16) G22=МЕДИАНА(G3:G16) G23=СЧЁТ(В3:В12)-1 G24=СЧЁТ(D3:D16)-СЧЁТ(В3:В12) G25=ДИСП.В(I3:I16) G26=ДИСП.В(G3:G16) G27=G26*G24/(G25*G23) G29=F.ОБР.ПХ(G28/2;G23;G24) G30=1-F.РАСП(G29;G23;G24;ИСТИНА) G31=КОРРЕЛ(H3:H16;G3:G16)		
23	Ступінь вільності досліду						8					
24	Ступінь вільності неадекватності						5					
25	Дисперсія неадекватності						0.069					
26	Дисперсія похибки досліду						1867.451					
27	Розрахунковий критерій F _ф						16858.929					
28	Довірчий рівень значущості α						0.050					
29	Табличний критерій F _т						6.757					
30	Розрахунковий рівень значущості						2.500E-02					
31	Коефіцієнт кореляції Пірсона						9.9998E-01					
32	Показник детермінації						9.9996E-01					

G17=МАКС(G3:G16)

G19=СРЗНАЧ(G3:G16)

G18=G19+ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(\$G\$28;СТАНДОТКЛОН.В(G3:G16);СЧЁТ(G3:G16))

G20=G19-ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(\$G\$28;СТАНДОТКЛОН.В(G3:G16);СЧЁТ(G3:G16))

G32=G31^2

I3=G3-H3

J3=ABS(СРЗНАЧ(I\$3:I\$16)-I3)

K3=I3^2

L4=(I3-I4)^2

L17=СУММ(L3:L16)/СУММ(K3:K16)

L19=4-L18

L21=ЕСЛИ(L20>0;"Нормальн."; "Ні")

L20=0.4/(СЧЁТ(I3:I16))^0.5-ABS((СРЗНАЧ(J3:J16))/СТАНДОТКЛОН.В(I3:I16)-0.7979)

Далі у колонці **K2:K16** подані різниці ε_i (залишки) даних між відповідними рядками колонок **G** і **H** та квадрати залишків $(\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2$. У колонку **L4:L16**, яка застосовуються для розрахунку критерію Дарбіна–Уотсона, заносяться різниці залишків, тобто різниці між даними попереднього і поточного рядка колонки **K**.

У нижній частині табл. 11.97 у рядки 17, 19, 21 і 22 колонок **G**, **H** і **I** відповідно заносяться максимальне, середнє і мінімальне значення та медіана, розраховані відповідно за статистичними функціями пакету аналізу MS Excel **МАКС**, **СРЗНАЧ**, **МИН** та **МЕДИАНА**. Таким чином колонки **G** і **H** відповідають двом першим колонкам табл. 11.92, с. 828.

За наведеними умовами нульове значення залишків повинно знаходитися у довірчих межах $\bar{d} \pm \Delta_{(x)}$, (див. с. 660). Для перевірки цієї умови у чарунках **I16** і **I20** розміщаються відповідно величини верхнього і нижнього довірчих інтервалів, тобто довірчі межі $\bar{d} \pm \Delta_{(x)}$ середнього арифметичного залишків \bar{d} , де $\Delta_{(x)}$ – величина відхилю, яка знаходяться за допомогою статистичної функції ПА MS Excel **СРЗНАЧ** і **СТАНДОТКЛОН.В**. Так як в довірчі межі нульове значення залишку не входить (табл. 11.97, відповідність різниці нулю не виконується).

У рядки з 23 по 32 колонки **G** заносяться ступінь вільності неадекватності моделі, які по аналогії з ППП **Statistica** визначаються як $v_m = n - k - 1$, де n – кількість рядків у матриці експерименту; k – загальна кількість членів рівняння регресії (11.84); ступінь вільності дослідів $v_d = k - 1$; дисперсія неадекватності моделі s_m^2 , розрахована за даними залишку, тобто **ДИСП.В(Н3:Н16)**; дисперсія похибки дослідів s_d^2 , розрахована за експериментальними даними, визначається **ДИСП.В(G3:G16)**; розрахунковий критерій F , який представляє собою вираз $F_\phi = \frac{s_d^2}{v_d} : \frac{v_m}{s_m^2}$, таблично розраховується як **G26*G23/(G25*G24)**.

Прийнявши у чарунці **G27** довірчий рівень значущості $\alpha = 0.05$, чарункою нижче за виразом **F.ОБР.ПХ** для α , v_d і v_m знаходимо F_T .

Отриманих результатів достатньо для оцінки адекватності, проте за аналогією з рис. 11.101 (с. 825) знаходимо за **1-F.РАСП** для F при α , v_d і v_m .

У нижній чарунках таблиці функцією **KORREL** визначено коефіцієнт кореляції Пірсона для вибірок експериментальних і розрахункових і показник детермінації, як квадрат цього значення.

У чарунку **L17** занесене розрахункове значення критерію d_ϕ Дарбіна–Уотсона, який визначає автокореляцію залишків і аналогічно табл. 11.102 на с. 840 розраховується за формулою (11.87).

Нижче під цією чарункою містяться табличні значення меж довірчого інтервалу відсутності автокореляції залишків, тобто нижнє значення d_U і верхнє $4 - d_U$, знайдені за табл. Е.29 і Е.30 для прийнятого рівня значущості і ступеня вільності $\nu_d = n - 1$.

Хоч за міжнародним стандартом ІСО 3479–97 відповідність вибірки нормальному статистичному розподілу виконується за критерієм Шапіро–Уїлка, використаємо спрощену перевірку виконанням умови (6.1).

Розрахунок за формулою (6.1) заноситься в чарунку **L20**, а в чарунку **L21** – логічну функцію **ЕСЛИ(L20>0;"Нормальн."; "Ні")**, яка видає оцінку нормальності розподілу залишків.

Працездатність математичної моделі визначається за умови $r^2 > 0.75$ (див. с. 675), де r – коефіцієнту кореляції Пірсона між експериментальним (**G3:G16**) і розрахунковим (**H3:H16**) значенням, яка обчислюється в чарунці **G31** за статистичною функцією Excel **KORREL**. У чарунці **G32** подається значення коефіцієнту детермінації $D = r^2$.

Більш докладно ці розрахунки наведеними на полі табл. 11.97, де представлено зведена характеристика рівняння регресії з вилученим коефіцієнтом.

Запропонована розрахункова таблиця також може бути використана для оцінки двофакторної моделі та лінійних дво– і три факторних моделей. При цьому слід прибирати вихідні дані і розрахункові формули з незадіяних рядків.

Для порівняння відповідності пропонованого розрахунку в табл. 11.98 викладено наведено зведену характеристику рівняння регресії без вилучення неістотних коефіцієнтів. Як видно її дані повністю співпадають з результатами, наведеними на рис. 11.101 (с. 825) і табл. 11.88 (с. 826).

Так як один із квадратичних ефектів виявився незначущим і був вилучений то коефіцієнти рівняння регресії необхідно перерахувати заново (див. підрозділ **11.7.3.3.2 Ротатабельні центральні композиційні плани**).

Таблиця 11.98. Зведена характеристика рівняння регресії з усіма знайденими коефіцієнтами

Максимум	688.00	687.90	0.40	Рохрах.значення $d_\Phi= 2.725$	
Верхній довірчий інтервал	636.237	636.237	0.101	Нижня межа $d_U= 1.820$	
Середнє	611.29	611.29	0.000	Верхня межа $4-d_U= 2.180$	
Нижній довірчий інтервал	586.335	586.335	-0.101	Нормальність розподілу залишків	-0.039
Мінімум	551.00	551.10	-0.100		Ні
Медіана	606.00	605.95	0.000		
Ступінь вільності дослідів	9				
Ступінь вільності неадекватності	4				
Дисперсія неадекватності	0.031				
Дисперсія похибки дослідів	1867.451				
Розрахунковий критерій F_Φ	26974.286				
Довірчий рівень значущості α	0.050				
Табличний критерій F_T	8.905				
Розрахунковий рівень значущості	2.500E-02				
Коефіцієнт кореляції Пірсона	9.9999E-01				
Показник детермінації	9.9998E-01				

При перерахунку отримується адекватне рівняння регресії з усіма значущими коефіцієнтами (табл. 11.99) дещо відмінними від табл. 11.88, с. 825 за *вільним членом* та *лінійними значеннями* умісту зв'язуючої речовини і конусності матриці, тобто тими показниками, які саме складають вилучене парне поєднання.

Таблиця 11.99. Сумарна характеристика залежної змінної (рівняння регресії), отриманої за середніми значеннями повторень

Regression Summary for Dependent Variable: Щільність брикета ρ , кг/					
R= .99998146 R ² = .99996293 Adjusted R ² = .99990361 F(8,5)=16858. p<.00000 Std.Error of estimate: .42426					
N=14	b*	Std.Err. of b*	b	Std.Err. of b	t(5)
Intercept			897.7750	2.462240	364.6172
Довжина частки l, мм	-2.28326	0.033736	-11.2500	0.166223	-67.6803
Уміст зв'язуючого δ , %	-0.79965	0.014537	-8.7556	0.159164	-55.0095
Конусність матриці α , град	-0.94882	0.023933	-23.3750	0.589597	-39.6457
l x δ	0.08337	0.010005	0.0278	0.003333	8.3333
l x α	0.05655	0.011309	0.0375	0.007500	5.0000
l x l	1.42123	0.033060	0.1162	0.002704	42.9893
δ x δ	0.19432	0.011362	0.2284	0.013354	17.1033
α x α	0.95214	0.022148	2.9063	0.067604	42.9893

Таким чином остаточно рівняння регресії за результатами табл. 11.99 яка має вигляд

$$\rho_b = 897.775 - 11.25 \cdot l - 8.7566\delta - 23.375\alpha + 0.0278 \cdot l\delta + 0.0375 \cdot l\alpha + 0.1162 \cdot l^2 + 0.2284\delta^2 + 2.9063\alpha^2. \quad (11.85)$$

Для порівняння відповідності пропонованого розрахунку в табл. 11.100 викладено наведено зведену характеристику рівняння регресії з вилученням неістотних коефіцієнтів.

Таблиця 11.100. Зведена характеристика рівняння регресії з усіма знайденими коефіцієнтами

Максимум	688.00	688.15	0.40	Рохрах.значення $d_\Phi= 1.781$	
Верхній довірчий інтервал	636.237	636.236	0.152	Нижня межа $d_U= 1.820$	
Середнє	611.29	611.29	0.000	Верхня межа $4 \cdot d_U= 2.180$	
Нижній довірчий інтервал	586.335	586.335	-0.152	Нормальність розподілу залишків	0.069
Мінімум	551.00	551.35	-0.350		Нормальн.
Медіана	606.00	606.08	0.000		
Ступінь вільності неадекватності	5				
Ступінь вільності дослідю	8				
Дисперсія неадекватності	0.069				
Дисперсія похибки дослідю	1867.451				
Розрахунковий критерій F_Φ	16858.93				
Довірчий рівень значущості α	0.050				
Табличний критерій F_T	6.757				
Розрахунковий рівень значущості	1.2079E-10				
Коефіцієнт кореляції Пірсона	0.99998146				
Показник детермінації	0.99996293				

Як видно дані табл. 11.100 дещо кращі за дані табл. 11.98, зокрема за нормальністю розподілу залишків.

Запропонований метод дає змогу швидко і з високою точністю визначити всі оціночні параметри отриманого рівняння регресії, які характеризують його придатність до використання як математичної моделі.

11.12. АВТОКОРЕЛЯЦІЯ В РЕГРЕСІЙНИХ ЗАЛИШКАХ

11.12.1. Визначення критерію Дарбіна–Уотсона

Одна з передумов використання методу найменших квадратів, застосовуваних у статистичній обробці, — це незалежність значень випадкових відхилень від значень відхилень у всіх інших спостереженнях, тобто відсутність автокореляції (послідовної кореляції) між що спостережуваними показниками, впорядкованими у часі чи у просторі [57, 164].

Для кожного значення, обчисленого відповідно функції відгуку \hat{y}_i , і експериментального значення y_i показника компоненти регресійний залишок ε_i функції відклику є випадковим (рис. 11.102, а) і визначається як

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{y}_i. \quad (11.86)$$




Рис. 11.102. Графік залишків

Нерідко у регресійних моделях зустрічається ситуація, коли регресійні залишки мають тенденцію — вони у свою чергу залежать від залежної функції (рис. 11.102, б) і в), або циклічно коливаються (рис. 11.102, г). Це свідчить про те, що кожне наступне значення залишків залежить від попередніх. В цьому випадку говорять про наявність автокореляції залишків.

При перевірці незалежності значень рівняння регресії розглядається відсутність у залишковому ряді автокореляції, тобто кореляції між елементами числового ряду. Відзначимо, що всі критерії значущості множинної регресії припускають, що дані є випадковою вибіркою з незалежних спостережень. Якщо це не так, то оцінки (**B**-коефіцієнти) можуть бути більш нестійкими, ніж це гарантують їх рівні значущості. Значна автокореляція свідчить, що специфікація регресії виконана неправильно (невірно визначений тип залежності).

Це явище може бути викликана причинами, що мають різну природу:

— наявні похибки у вихідних даних або у вимірі значень результативного ознаки;

— помилка у формулюванні моделі. Модель може не включати фактор, який надає істотне вплив на результат, вплив якого відбивається в залишках, внаслідок чого останні можуть виявитися автокорельованими.

— модель не враховує другорядні чинники, зі значним спільним впливом на результат через збіги тенденцій їх зміни або фаз циклічних коливань.

Від істинної автокореляції залишків слід відрізняти ситуації, коли причина автокореляції полягає в неправильній специфікації функціональної форми моделі. В цьому випадку слід змінити форму зв'язку факторних і результативних ознак, а не використовувати спеціальні методи розрахунку параметрів рівняння регресії за наявності автокореляції регресійних залишків функції.

Одним із методів визначення автокореляції залишків полягає у побудові графіка залежності залишків і візуальне визначення наявності або відсутності автокореляції [165] (див. рис. 11.12 на с. 695, рис. 11.34 на с. 722 і рис. 11.56 на с. 744).

Проте, якщо функція не пов'язана часовими показниками, наприклад, урожайністю чи інших показників за ряд років, можлива кількість перестановок рядків у досліді, становить $n!$. У нашому разі для прикладу, наведеного для даних підрозділу **11.4.1.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом** це $9.4259 \cdot 10^{159}$ варіантів, один з яких може бути ранжований за залишками (рис. 11.103). Адже ніяк не можна спростувати, для неорганізованої вибірки він не відповідатиме часовому ряду.

Тому для неорганізованих вибірок залишки обов'язково повинні бути ранжовані за аргументом рівняння (рис. 11.104).




Рис. 11.103. Графік ранжованих залишків

Тобто, при однофакторному експерименті дні вибірки перед початком статистичної обробки обов'язково повинні бути представлені відповідно часового ряду чи ранжовані за значенням аргументу.




Рис. 11.104. Графік залишків, ранжованих за аргументом рівняння

Адже ніяк не можна спростувати, що для неорганізованої вибірки це не відповідатиме часовому ряду.

Для одно- чи багатофакторного експерименту у разі неорганізованої вибірки (при відсутності факторів часового чи іншого ряду) слід виконати ранжування вибірки за фактором найбільшого впливу, хоч нічого не заважає виконати ранжування за залишками.

Хоч матриці активного багатфакторного експерименту формуються за правилом двійкового коду виходячи з умови зручності контролю їхньої побудови (див. с. 764) їх теж слід ранжувати починаючи з фактору найбільшого впливу, поступово переходячи до факторів з меншим впливом.

Ранжована трирівнева трифакторна матриця оптимального плану Бокса другого порядку (B_3), наведена у табл. К.24 у цьому разі матиме вигляд. Номера дослідів у табл. 11.101 відповідають номерам табл. К.24.

Другим методом є використання критерію Дарбіна–Уотсона. Особливістю його використання є те, що він придатний лише для часових рядів, тобто для повторів взаємопов'язаних відповідним розташуванням у часі або у просторі (перехресні ряди) [57, 165].

Тому залишки обов'язково повинні бути з часового ряду чи ранжованих за аргументом рівняння, як сказано вище.

Критерій Дарбіна–Уотсона, який позначається d чи DW , названий на честь Джеймса Дарбіна і Джефері Уотсона, розраховується за формулою

$$d = \frac{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i - \varepsilon_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2} = 2 - 2 \frac{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i \cdot \varepsilon_{i-1})}{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2} \approx 3(1 - r_1), \quad (11.87)$$

Тут ε_i – залишки, обчислені за виразом (11.86) для статистичних даних (x_i, y_i) [57].

Таблиця 11.101. Трирівнева трифакторна матриця оптимального плану Бокса другого порядку (B_3) з ранжованими факторами

№ дослідів	Фактор			№ дослідів	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	14	0	0	1
5	-1	-1	1	12	0	1	0
9	-1	0	0	2	1	-1	-1
3	-1	1	-1	6	1	-1	1
7	-1	1	1	10	1	0	0
11	0	-1	0	4	1	1	-1
13	0	0	-1	8	1	1	1

Таким чином d , значення якого коливається в межах $0 \leq d \leq 4$, представляє собою відношення суми квадратів різниць послідовних значень залишків до залишкової суми квадратів за моделлю регресії.

Наявність автокореляції може бути виявлена за допомогою d -критерію Дарбіна–Уотсона. (табл. Е.29 і Е.30), який перевіряє гіпотезу про те, що залишки некорельовані, проти альтернативи, що вони пов'язані авторегресій-

ною залежністю першого порядку. При цьому можливі варіанти: коефіцієнт авторегресії більше нуля, менше нуля або не дорівнює нулю.

Критерій визначається двома точками нижнього d_L і верхнього d_U рівня, які залежать як від числа спостережень, за якими побудована регресія, так і від числа предикторів.

Якщо знайдене значення d_ϕ більше двох, то перед порівнюванням його потрібно перетворити за виразом $d'_\phi = 4 - d_\phi$.

Якщо d_ϕ (або d'_ϕ) знаходиться в інтервалі від нуля до d_L , то значення залишкового ряду сильно автокорельовані, якщо значення d –критерію потрапляє в інтервал від d_U до 2, то автокореляція відсутня (рис. 11.105).

При умові $d_L < d_\phi < d_U$ — однозначного висновку про відсутність або наявності автокореляції зробити не можна, але *на практиці припускають її існування*.

Перевіримо гіпотезу про наявність автокореляції в залишках для моделі, представленої рівнянням (11.50).

Висуваємо нульову гіпотезу H_0 про відсутність автокореляції залишків. Альтернативні гіпотези H_A і H^*_A приймаємо відповідно про наявність прямої чи зворотної автокореляції в залишках. Далі за табл. Е.29 чи Е.30 відповідно до прийнятого рівня значущості α визначаємо критичні значення критерію Дарбіна–Уотсона нижнього d_L і верхнього d_U рівня для заданого числа спостережень n , числа незалежних змінних моделі k . За цим значенням числовий проміжок $[0;4]$ розбивається на п'ять відрізків.




Рис. 11.105 – Алгоритм перевірки гіпотези про наявність автокореляції в залишках

Прийняття чи відхилення кожної з гіпотез з імовірністю $P=1-\alpha$ подано на рис. 11.105 [165]:

$0 < d < d_L$ — є пряма автокореляція. Приймається гіпотеза H_A з ймовірністю $P=1-\alpha$.

$d_L < d < d_U$ — зона невизначеності.

$d_U < d < 4-d_U$ — автокореляція залишків відсутня.

$4-d_U < d < 4-d_L$ — зона невизначеності.

$4-d_L < d < 4$ — є пряма автокореляція. Приймається гіпотеза H^*_A з ймовірністю $P=1-\alpha$.

Таблиця 11.102. Розрахунок критерію Дарбіна–Уотсона

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			Дослід	Залишки	Різниця залишків	Перша різниця із середнім	Друга різниця із середнім	Добуток різниць із середнім
2	$D103=C4ET(D2:D102)$		83	-3.637				
3	$D104=СУММКВ(D2:D102)$		17	-3.269	0.368	-3.306	-3.616	11.952
4	$E104=СУММКВ(E3:E102)$		82	-10.660	-7.391	-10.696	-3.248	34.743
5	$F104=СУММКВ(F3:F102)$		80	-6.880	3.780	-6.916	-10.639	73.580
6	$G104=СУММКВ(G3:G102)$		89	-5.051	1.828	-5.088	-6.859	34.895
7	$H105=СУММ(H3:H102)$		88	-0.215	4.837	-0.251	-5.030	1.262
98	$D106=E104/D104$		29	-7.457	-3.106	-7.493	-4.330	32.444
99	$D109=4-D108$		39	-1.824	5.633	-1.860	-7.436	13.830
100	$D110=4-D107$		8	0.615	2.439	0.579	-1.802	-1.044
101	$D112=1-D106/2$		3	2.827	2.211	2.790	0.637	1.776
102	$D113=-D115$		7	2.112	-0.715	2.075	2.848	5.910
103	Обсяг вибірки		101					
104	Сума квадратів		2133.623		3891.558	2120.265	2129.120	
105	Сума добутоків							179.079
106	Емпіричний критерій d		1.824		$D115=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(D108;D103-1)/D103^0.5$			
107	Нижня межа істотності d_L		1.650		$D114=H105/(F104*G104)^0.5$			
108	Рівень значущості α		0.050					
109	Верхня межа істотності d_U		1.690					
110	$4-d_U$		2.310					
111	$4-d_L$		2.350					
112	Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0880					
113	Нижня межа коефіцієнту автокореляції		-0.1974					
114	Коефіцієнт автокореляції r_1		0.0843					
115	Верхня межа коефіцієнту автокореляції		0.1974					

мулою (11.47), чи за формулою (11.46), створюємо табл. 11.102. За розрахунками згідно виразів представленими на її полі отримано $d=1.842$.

Далі сформулюємо гіпотези:

- H_0 – в залишках немає автокореляції;
- H_A – в залишках є пряма автокореляція;
- H^*_A – в залишках є зворотна автокореляція.

За табл. Е.30 для прийнятого рівня значущості $\alpha=0.05$ для числа спостережень $n=101$ і числа незалежних змінних моделі $k=1$ знаходимо критичні значення критерію Дарбіна–Уотсона, які відповідно становлять $d_L=1.65$ і $d_U=1.69$. Отриманий результат $d=1.824$ (табл. 11.102) лежить у межах від 1.69 до 2.31, що свідчить про відсутність автокореляцію залишків. У цьому разі гіпотезу H_0 про відсутність автокореляції в залишках приймається з рівнем значущості $\alpha=0.05$.

Проте є ряд суттєвих обмежень на застосування цього критерію:

- він непридатний до моделей авторегресії;
- методика розрахунку і використання критерію Дарбіна–Уотсона спрямована лише на виявлення автокореляції *залишків першого порядку*.

При перевірці залишків на автокореляції більш високих порядків слід застосовувати інші методи.

— критерій Дарбіна–Уотсона дає достовірні результати лише для великих вибірок (хоч дані табл. Е.29 і Е.30 починаються з $n=6$) [165].

При наведені результатів регресійного аналізу поряд з наведенням рівня значущості α , коефіцієнту детермінації, значень t - і F -критеріїв слід подавати значення критерію Дарбіна–Уотсона.

В зонах невідзначеності *на практиці припускають існування автокореляції залишків і відхиляють гіпотезу H_0* .

При цьому слід використовувати інший критерій, наприклад, коефіцієнт автокореляції першого порядку (див. підрозділ.

11.12.2 Використання коефіцієнта автокореляції першого порядку).

На основі ранжованих даних стовпця **Остатки** чи даних, розрахованих за фор-

11.12.2. Використання коефіцієнта автокореляції першого порядку

Якщо розрахункове значення потрапило в інтервал, де не можна зробити остаточний висновок за критерієм Дарбіна–Уотсона, для визначення ступеня автокореляції за виразом (11.88) обчислюється коефіцієнт автокореляції першого порядку (коефіцієнт серіальної кореляції) і перевіряється його значимість за допомогою критерію стандартної похибки.

$$r_1 = \frac{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon}_1) \cdot (\varepsilon_{i-1} - \bar{\varepsilon}_2)}{\sqrt{\sum_{i=2}^n (\varepsilon_i - \bar{\varepsilon}_1)^2 \cdot \sum_{i=2}^n (\varepsilon_{i-1} - \bar{\varepsilon}_2)^2}}, \quad (11.88)$$

де середні значення $\bar{\varepsilon}_1$ і $\bar{\varepsilon}_2$ відповідно визначаються за виразами

$$\bar{\varepsilon}_1 = \frac{\sum_{i=2}^n \varepsilon_i}{n-1}, \quad (11.89)$$

$$\bar{\varepsilon}_2 = \frac{\sum_{i=2}^n \varepsilon_{i-1}}{n-1}. \quad (11.90)$$

Стандартна похибка коефіцієнта кореляції розраховується за виразом

$$s_{\varepsilon_{r_k}} = 1 / \sqrt{n}, \quad (11.91)$$

Коефіцієнти автокореляції випадкових даних мають вибірковий розподіл, що наближається до нормального з нульовим математичним очікуванням і середнім квадратичним відхиленням, рівним $1 / \sqrt{n}$.

Якщо коефіцієнт автокореляції першого порядку r_1 знаходиться в інтервалі (11.92)



$$-t_{\alpha(v)} / \sqrt{n} \leq r_1 \leq t_{\alpha(v)} / \sqrt{n}, \quad (11.92)$$

то можна вважати, що дані не показують наявності автокореляції першого порядку.

Для нашого випадку коефіцієнт автокореляції першого порядку r_1 повинен знаходитися у межах від $-1.983971519 / \sqrt{n} = -0.197413$ до 0.197413 .

Так як ця умова виконується ($r_1 = 0.088$, див. табл. 11.102), регресійні залишки можна вважати незалежними.

11.13. ПОБУДОВА ДВОВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ

Модулем  **Multiple Regression** /  **Множественная регрессия** ППП **Statistica** не передбачено визначення оптимальних параметрів рівняння регресії, тому для даних *дво– і трифакторного* експерименту можна використати **MS Excel** (див. табл. 11.103 і Додаток Л).

При використанні **Excel** в колонки **A2:A11** і **B2:B11** табл. 11.103 відповідно занесені головку і колонку **B** табл. 11.88, прийнявши незначущий коефіцієнт при $d \times a$ рівним нулю. У чарунки **C27:C30** і **C34:C36** заноситься відповідно визначає мінімальне і максимальне значення функції відклику та координати їхнього положення у межах варіювання, представлене відповідно на с. 817 на рис. 11.95, а і б). Розрахунки виконуються за матрицею Бокса–Бенкіна другого порядку для двох факторів (табл. К.5), яка в розкодованому вигляді для відповідних поєднань факторів наводиться відповідно в чарунках **F12:G20**, **J12:K20** і **N12:O20** та **F12:G20**, **J12:K20** і **N12:O20**.

Визначення координат центра поверхні відклику знаходиться за формулами (11.69) з використанням правила Саррюса.

Отримані дані ідентичні, проте пакет **Microsoft Excel** краще узгоджується із ППП **Statistica**, тому для даних трифакторного експерименту саме його, на наш погляд, слід і застосовувати.

Побудова двовимірних поверхонь описана у підрозділі **2.2.3 Одержання основних статистичних показників за допомогою ППП Statistica**, а саме на с. 121–124.

Необхідно зауважити, що слід виконувати аналіз лише *статистично значущих парних поєднань* прийнявши у якості вихідних лише *передбачувані дані параметрів* (див. табл. 11.60, с. 755). Редагування зображень для надання їм остаточного вигляду, наведеного на рис. 16.47 (с. 1026), викладено у підрозділі **16.2.6.2 Редагування тривимірних поверхонь**.

Таблиця 11.103. Розрахунок парних залежностей функції відклику

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Розкодовані коефіцієнти рівняння																	
2	In=	898.275000				0.232	0.028	0.037						0.232	-11.250	0.037		
3	l=	-11.250000		Dm =		0.028	0.457	0.000	=	0.612			Dy =	0.028	-8.867	0.000	=	-10.178
4	d=	-8.866667				0.037	0.000	5.813						0.037	-23.500	5.813		
5	a=	-23.500000																
6	lxa=	0.027778				-11.250	0.028	0.037						0.232	0.028	-11.250		
7	lxd=	0.037500		Dx =		-8.867	0.457	0.000	=	-28.036			Dz =	0.028	0.457	-8.867	=	-2.294
8	dxa=	0.000000				-23.500	0.000	5.813						0.037	0.000	-23.500		
9	l²=	0.116250																
10	d²=	0.228395																
11	a²=	2.906250																
12	Нульовий рівень					Двовимірні перетини оптимального значення												
13	xф=	30				№	l	d	Yxy		l	a	Yxz		d	a	Yyz	
14	yф=	4.5				1	40	9	541.345		40	6	541.090		9	6	550.956	
15	zф=	4				2	20	9	619.034		20	6	612.853		0	6	600.807	
16	Yф=	590.875				3	40	0	592.645		40	2	536.090		9	2	545.087	
17						4	20	0	675.334		20	2	610.853		0	2	594.938	
18						5	40	4.5	562.370		40	4	526.965		9	4	536.396	
19						6	20	4.5	642.559		20	4	600.228		0	4	586.247	
20						7	30	9	568.564		30	6	565.347		4.5	6	571.257	
21						8	30	0	622.364		30	2	561.847		4.5	2	565.387	
22						9	30	4.5	590.839		30	4	551.972		4.5	4	556.697	
23						Двовимірні перетини максимального значення												
24						№	l	d	Yxy		l	a	Yxz		d	a	Yyz	
25						1	40	9	555.600		40	6	606.900		9	6	631.600	
26						2	20	9	631.600		20	6	687.900		0	6	687.900	
27						3	40	0	606.900		40	2	601.900		0	2	685.900	
28						4	20	0	687.900		20	2	685.900		0	2	685.900	
29						5	40	4.5	576.625		40	6	606.900		9	4	618.975	
30						6	20	4.5	655.125		20	4	675.275		0	4	675.275	
31						7	30	9	581.975		30	6	635.775		4.5	6	655.125	
32						8	30	0	635.775		30	2	632.275		4.5	2	653.125	
33						9	30	5	604.250		30	4	622.400		4.5	4	642.500	
34																		
35																		
36																		
37																		

Для експерименту з більшою кількістю факторів варто використовувати програму **Mathcad** [166], застосування якої для трифакторного експерименту наведено у листингу розрахунку поданому на рис. 11.106.

У обох випадках обчислення виконуються за виразами, представленими в підрозділі **11.1 Загальні положення регресійного аналізу**.

Крім того, для отримання двовимірних поверхонь можна застосовувати ППП **Statistica**, а саме опцію **Nonlinear Estimation** / **Нелинейное оценивание** модуля **Advanced Linear/Nonlinear Models** / **Углубленные методы анализа** меню **Statistics** / **Анализ**.

```

In := 898.274999999997  D := -8.86666666666663  A := -23.5000000000004
L := -11.2499999999998  LD := 0.0277777777777772  LA := 0.0374999999999972
DA := 0  LL := 0.116249999999996  DD := 0.228395061728393
AA := 2.906250000000006

Dm :=  $\begin{pmatrix} 2 \cdot LL & LD & LA \\ LD & 2 \cdot DD & DA \\ LA & DA & 2 \cdot AA \end{pmatrix} \rightarrow .61218171296294908990$ 

Dx :=  $\begin{pmatrix} L & LD & LA \\ D & 2 \cdot DD & DA \\ A & DA & 2 \cdot AA \end{pmatrix} \rightarrow -28.035648148147997141$    $xo := \frac{-Dx}{Dm}$ 
                                      $xo = 45.796$ 

Dy :=  $\begin{pmatrix} 2 \cdot LL & L & LA \\ LD & D & DA \\ LA & A & 2 \cdot AA \end{pmatrix} \rightarrow -10.178072916666484761$    $yo := \frac{-Dy}{Dm}$ 
                                      $yo = 16.626$ 

Dz :=  $\begin{pmatrix} 2 \cdot LL & LD & L \\ LD & 2 \cdot DD & D \\ LA & DA & A \end{pmatrix} \rightarrow -2.2941820987653852542$    $zo := \frac{-Dz}{Dm}$ 
                                      $zo = 3.748$ 

F := In + L · xo + D · yo + A · zo + LD · xo · yo + LA · xo · zo + DA · yo · zo + LL · xo2 + DD · yo2 + AA · zo2
F = 522.929

x := 20, 30.. 40
y := 0, 4.5.. 9
z := 6

f(x, y, z) := In + L · x + D · y + A · z + LD · x · y + LA · x · z + DA · y · z + LL · x2 + DD · y2 + AA · z2
f(x, y, z) =


|         |
|---------|
| 687.9   |
| 635.775 |
| 606.9   |
| 655.125 |
| 604.25  |
| 576.625 |
| 631.6   |
| 581.975 |
| 555.6   |


x := 20, 30.. 40
y := 9
z := 2, 4.. 6

f(x, y, z) := In + L · x + D · y + A · z + LD · x · y + LA · x · z + DA · y · z + LL · x2 + DD · y2 + AA · z2
f(x, y, z) =


|         |
|---------|
| 685.9   |
| 632.275 |
| 601.9   |
| 675.275 |
| 622.4   |
| 592.775 |
| 687.9   |
| 635.775 |
| 606.9   |


x := 20
y := 0, 4.5.. 9
z := 2, 4.. 6

f(x, y, z) := In + L · x + D · y + A · z + LD · x · y + LA · x · z + DA · y · z + LL · x2 + DD · y2 + AA · z2
f(x, y, z) =


|         |
|---------|
| 685.9   |
| 653.125 |
| 629.6   |
| 675.275 |
| 642.5   |
| 618.975 |
| 687.9   |
| 655.125 |
| 631.6   |


```

Рис. 11.106. Лістинг розрахунку парних залежностей функції відклику

Процес виконується в поєднанні з використанням функції відклику, записуваної як `Long name (label or formula with Functions)]` / `Длинная метка или формула с Функциями`, з урахуванням значущості факторів відповідно до двофакторних матриць (табл. К.5) та фіксації інших регресорів на відповідному рівні.

У ППП **Statistica** створюється файл (рис. 11.107), у дві колонки якого, наприклад, **v1** і **v2** (1) записується повнофакторна матриця двох змінних, які аналізуються (у даному випадку це l та δ), у **v3** — прийнятий фіксований рівень третього фактору (2) (нами прийнято значення $\alpha = 6^\circ$, яке відповідає найбільшій щільності брикету (див. рис. 11.95 а) на с. 817).

Для запису даних у колонку **v4** (3) слід двічі клацнути лівою клавшею миші по її імені й у поле `Long name (label or formula with Functions)]` / `Длинная метка или формула с Функциями` (4) панелі **Variable** / **Переменная** ввести вираз рівняння регресії (11.84) (с. 827), почавши його зі знаку рівності, замінивши l , δ і α відповідно на **v1**, **v2** і **v3** та вилучивши незначущі складові — фактори, їхні квадрати та поєднання факторів (у нас незначуща складова $+0.0278*v2*v3$).

$$=898.2750-11.25*v1-8.8667*v2-23.5*v3+0.0278*v1*v2+0.0375*v1*v3+0.1162*v1^2+0.2284*v2^2+2.90637*v3^2$$




Рис. 11.107. Введення формули функції відклику

Після натиснення **ОК** (5) отримаємо заповнення колонки результатами згідно рівняння регресії (11.84).

Потім вибираємо меню **Statistics** / **Анализ** (1) (рис. 11.108), далі модуль **Advanced Linear/Nonlinear Models** / **Углубленные методы анализа** (2) і опцію **Nonlinear Estimation** / **Нелинейное оценивание** (3).




Рис. 11.108. Побудова двовимірної поверхні парної взаємодії з використанням рівняння регресії

На однойменній панелі вказуємо процедуру **User-specified regression, least squares** / **Регрессия пользователя - метод наим. квадратов МНК** (4) і натисненням **ОК** (5) переходимо на панель вибору установок і процедур **User-Specified Regression, Least Squares:** / **Функция пользователя, оценки МНК:**. Тут кнопкою **Function to be estimated** / **Оцениваемая функция** (6) переходимо на панель **Estimated function:** / **Оцениваемая функция:**, де записуємо рівняння двовимірної поверхні (7) у вигляді $v_4 = b_0 + b_1 \cdot v_1 + b_2 \cdot v_2 + b_{12} \cdot v_1 \cdot v_2 + b_{11} \cdot v_1^2 + b_{22} \cdot v_2^2$.

Тут теж слід наводити лише значущі складові — фактори, їхні квадрати та поєднання факторів.

Натискаємо **ОК** (8) і **ОК** (9) і далі **ОК** (10) на вкладці **Quick** / **Быстрый** відкритої панелі **Nonlinear Least Squares Model Estimation:** / **Оценка нелинейной модели НК:**. На отриманій панелі **Results:** / **Результаты:** у вкладці **Quick** / **Быстрый** запускаємо процедуру **Fitted 3D function & observed vals** / **Подогнанная 3D функция и наблюдаемые значения** (11) і отримуємо зображення поверхні, яка представляє собою щільність брикету ρ_6 при парній взаємодії факторів l та δ (рис. 11.109).




Рис. 11.109. Парна взаємодія середньої довжини часток l і умісту зв'язуючої речовини δ на щільність брикету при фіксації третього фактору на рівні $\alpha=6^\circ$, який відповідає найбільшій щільності

На ньому також представлено рівняння даної поверхні

$$\rho_{\delta l} = 861.904 - 11.025 \cdot l - 8.8667\delta + 0.0278 \cdot l\delta + 0.1162 \cdot l^2 + 0.2284\delta^2. \quad (11.93)$$

Залежності двовимірних поверхонь, які виражають вплив на щільність брикету парної взаємодії умісту δ зв'язуючої речовини і кута конуса матриці α та середньої довжини часток l і умісту зв'язуючої речовини δ за умови фіксації третього фактору (відповідно $\delta = 0^\circ$ і $l = 20$ мм), подано виразами

$$\rho_{\delta \alpha} = 942.8 + 11.375 \cdot l - 48.075\alpha + 0.0005 \cdot l\alpha + 0.1162 \cdot l^2 + 4.06265\alpha^2; \quad (11.94)$$

$$\rho_{\delta \alpha} = 719.755 - 8.3107\delta - 22.75\alpha + 0.2284\delta^2 + 2.90637\alpha^2. \quad (11.95)$$

11.14. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІЗ НЕЗАДІЯНИМ І ЗАДІЯНИМ РАНГОМ РЕГРЕСІЇ

Якщо активізувати ☒ Ridge regression; lambda: .025 / ☒ Гребневая регрессия, лямбда: .025 (ранг регресійного аналізу) (рис. 11.51, с. 738), буде задіяна гребенева регресія й отримане зовсім інше рівняння функції відклику.

Гребенева регресія використовується, коли незалежні змінні корелюють одна з одною, тобто має місце мультиколінійність. Зокрема, це явище виникає при роботі з даними пасивного багатфакторного експерименту. У цьому разі стійкі оцінки регресійних коефіцієнтів не можуть бути отримані за допомогою звичайного методу найменших квадратів через високі значення стандартних похибок.

Гребеневі оцінки параметрів регресії хоч і виявляються дещо зміщеними через додавання до діагоналі кореляційної матриці константи λ для того, щоб усі діагональні елементи кореляційної матриці були рівні 1.0 (при $\lambda=0$ гребеневі оцінки перетворюються в оцінки методу найменших квадратів), але мають кращі характеристики точності. Інакше кажучи, гребенева регресія штучно занижує коефіцієнти кореляції, щоб могли бути обчислені більш стійкі оцінки коефіцієнтів регресії. Проблема використання даного методу на практиці зводиться до вибору підходящого значення λ .

В якості прикладу розглянуто отримання експериментальних даних Y_{ϕ} наведено в табл. 11.104 і виконане за дворівневою матрицею оптимального плану Бокса–Бенкіна другого порядку для двох факторів (табл. К.5) [167].

³¹⁾ При аналізі взаємодії факторів **v2** і **v3** складову **b23*v2*v3** слід вилучити.

Виконуючи розрахунки при / і не активізувавши / отримуємо дані, представлені в табл. 11.105, у разі активізації / — табл. 11.106.

Таблиця 11.104. Результати експериментальних досліджень

№ п. п.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X_1	1	-1	1	-1	1	-1	0	0	0
X_2	1	1	-1	-1	0	0	1	-1	0
Експериментальні дані									
Y_{ϕ}	73.5	30.5	10.2	11.0	26.6	3.9	43.1	2.6	7.6
Дані за рівняннями регресії									
Y_{p1}	73.53	29.99	10.53	10.79	26.24	4.61	43.58	2.48	7.24
Y_{p2}	64.32	21.85	2.85	3.11	18.19	-2.92	43.08	2.98	7.63

Дані табл. 11.105 і 11.106 свідчать, що неістотним є лише коефіцієнт при X_1^2 у табл. 11.106.

Стандартні похибки для b і β -коефіцієнтів (див. с. 739) розраховуються з використанням загальноприйнятих формул регресії. При виборі цієї опції слід увести значення для λ .

Таблиця 11.105. Результати експериментальних досліджень при $\lambda=0$

Итоги регрессии для зависимой переменной: Y_{ϕ} (Гребень)						
R= .99983814 R2= .99967630 Скорректир. R2= .99913680 F(5,3)=1853.0 p<.00002 Станд. ошибка оценки: .68502						
N=9	БЕТА	Стд. Ош. БЕТА	B	Стд. Ош. B	t(3)	p-уров.
Св. член			7.24444	0.510587	14.18845	0.000758
X_1	0.401767	0.010388	10.81667	0.279660	38.67788	0.000038
X_2	0.763296	0.010388	20.55000	0.279660	73.48201	0.000006
$X_1 X_2$	0.332085	0.010388	10.95000	0.342513	31.96964	0.000067
X_1^2	0.175489	0.010388	8.18333	0.484386	16.89425	0.000452
X_2^2	0.338469	0.010388	15.78333	0.484386	32.58422	0.000064

Таблиця 11.106. Результати експериментальних досліджень при $\lambda=0.025$

N=9	Итоги Гребневой регрессии для зависимой переменной: Y_{Φ} (Гребінь) =.02500 R= .98756972 R2= .97529395 Скоррект. R2= .93411720 F(5,3)=23.686 p<.01289 Станд. ошибка оценки: 5.9846					
	БЕТА	Стд. Ош. БЕТА	В	Стд. Ош. В	t(3)	p-уров.
Св. член			7.63415	4.416928	1.728384	0.182365
X_1	0.391968	0.089635	10.55285	2.413226	4.372921	0.022125
X_2	0.744679	0.089635	20.04878	2.413226	8.307876	0.003654
X_1X_2	0.323986	0.089635	10.68293	2.955586	3.614487	0.036388
X_1^2	0.171209	0.089635	7.98374	4.179830	1.910063	0.152116
X_2^2	0.330214	0.089635	15.39837	4.179830	3.683972	0.034661



У колонці **В** табл. 11.105 і 11.106 представлено вільний член і коефіцієнти рівнянь регресії — математичних моделей (11.96) і (11.97), які відповідно мають вигляд

$$Y_{p1}=7.244+10.817X_1+20.55X_2+8.183X_1^2+10.95X_1X_2+15.783X_2^2, \quad (11.96)$$

$$Y_{p2}=7.634+10.553X_1+20.049X_2+10.683X_1X_2+7.984X_1^2+15.398X_2^2. \quad (11.97)$$

За даними табл. 11.105 і 11.106 обидві математичні моделі (11.96) і (11.97) адекватні на будь-якому рівні і працездатні.

Результати розрахунків, виконані за цими рівняннями, тобто, Y_{p1} при ☐ Ridge regression; lambda: .025 / ☐ Гребневая регрессия, лямбда: .025 і Y_{p2} при ☒ Ridge regression; lambda: .025 / ☒ Гребневая регрессия, лямбда: .025 представлено в нижніх рядках табл. 11.104.

Рівняння (11.96), отримане без врахування λ , співпадає з рівнянням, знайденим за допомогою ПП **Statist** [159] і також отриманими при побудові двовимірних поверхонь кнопкою процедур ( Surface plot) / ( График поверхности).

Порівняння розрахункових вибірок, одержаних різними способами, наведено в табл. 11.107.

Перевірка за критерієм Фішера, виконана за однофакторним ДА (див. підрозділ **10.3 Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПА Microsoft Excel**), показує, що виконується умова $F < F_{\alpha}$, таким чином, між вибіровими середньоарифметичними вихідних даних та результатами, одержаними різними способами, немає істотних відмінностей. Також немає істотних відмінностей і між отриманими різним способом рівняннями регресії.

Таблиця 11.107. Порівняння фактичних і розрахункових вибірок

Однофакторный дисперсионный анализ						
ИТОГИ						
Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Уф	9	209	23.222222	543.62444		
Ур1	9	209	23.222222	543.44847		
Дисперсионный анализ						
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	1.8E-12	1	1.819E-12	3.347E-15	1	4.493998478
Внутри групп	8696.58	16	543.53646			
Итого	8696.58	17				
Однофакторный дисперсионный анализ						
ИТОГИ						
Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Уф	9	209	23.222222	543.62444		
Ур2	9	161.098	17.899729	501.32705		
Дисперсионный анализ						
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	127.48	1	127.4802	0.2439926	0.6280496	4.493998478
Внутри групп	8359.61	16	522.47575			
Итого	8487.09	17				
Однофакторный дисперсионный анализ						
ИТОГИ						
Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Ур1	9	209	23.222222	543.44847		
Ур2	9	161.098	17.899729	501.32705		
Дисперсионный анализ						
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	127.48	1	127.4802	0.2440337	0.6280208	4.493998478
Внутри групп	8358.2	16	522.38776			
Итого	8485.68	17				

Про рівність вибірок розрахункових і обох експериментальних даних свідчить і те, що значення p більше за прийняте критичне значення $\alpha = 0.05$.

За рівняннями регресії (11.96) і (11.97) побудовані тривимірні поверхні, представлені на рис. 11.110, де простежується відмінність між ними, яка зростає зі збільшенням значення λ .

Таким чином, при використанні гребеневої регресії в разі аналізу масиву даних із взаємною кореляцією незалежних змінних, що досить часто проявляється при вивченні біологічних об'єктів, слід вибирати значення константи λ близьким до нуля. Це дає змогу отримати рівняння функції відклику – математичної моделі зі статистично незначущими відмінностями між ним і вихідним масивом даних.




Рис. 11.110. Двовимірні поверхні парної взаємодії:

а – при ☐ Ridge regression; lambda: ☐ Гребневая регрессия, лямбда: ;
 б – при ☒ Ridge regression; lambda: ☒ Гребневая регрессия, лямбда:

11.15. ВИКОРИСТАННЯ ТЕРНАРНИХ ГРАФІКІВ

11.15.1. Обробка даних експерименту склад – властивість

Розглянемо експеримент при оцінці систем, які є сумішами трьох компонентів, представлених відносним вмістом з постійною сумою значень [84, 155].

Один з них, спосіб Гіббса, який ґрунтується на властивості рівносторонніх трикутників — сума відстаней від точки, розташованої всередині його до його сторін дорівнює висоті трикутника.

Геометричне місце точок у цьому випадку представляє собою правильний трикутник, кожній точці якого відповідає суміш певного складу, і, навпаки, будь-якої комбінації відносного вмісту компонентів відповідає певна його точка.

Отже, якщо ми побудуємо рівносторонній трикутник (рис. 11.111), в якому висота дорівнює одиниці, то відносна кількість кожного з трьох речовин X , Y і Z , що відповідають суміші, представленій точкою A , будуть виражатися відносними довжинами відстаней від цієї точки до трьох сторін трикутника, тобто $0x_A$, $0y_A$ і $0z_A$ (зображення представлено червоним кольором).

Інший спосіб зображення (Розебома) полягає в тому, що береться рівносторонній трикутник, сторона якого дорівнює одиниці (рис. 11.111). Склад, що відповідає точці A , визначається не за допомогою перпендикуляра до сторін, а шляхом проведення ліній, паралельних сторонам. У цьому разі відносна кількість кожного з трьох речовин X , Y і Z , що відповідають суміші, представлена точкою A , будуть виражатися відносними довжинами відстаней від вершин трикутника, тобто $0x_A$, $0y_A$ і $0z_A$ (наведено синім кольором).

Із наведеного у даній роботі переліку джерел посилання найдокладніше про тернарні графіки викладено в [84].

Для введення четвертої змінної слід побудувати на рівносторонньому трикутнику, взятому за основу, прямокутну призму по висоті якої відкладають значення відповідної величини.

Так як надалі при плануванні експерименту і побудові діаграм склад-властивість доведеться оперувати факторним простором у вигляді симплекса (трикутника), доцільно визначити координати компонентів в спеціальній системі координат, в якій відносні змісту кожного компонента x , y і z відкладаються вздовж відповідних сторін симплекса.

У цьому випадку для визначення рівня компонента x , відповідного будь-якій точці A суміші в трикутній системі координат слід провести через точку A пряму, паралельну стороні z і взяти відрізка x_A , який відсікається на x . Для визначення координати y_A точки A проведемо через цю точку пряму, паралельну стороні x і візьмемо відсікається на стороні y відрізок y_A . Аналогічно, пропорція третього компонента z_A визначається шляхом проведення через точку A прямої, паралельної стороні y (рис. 11.111).

Для оцінки коефіцієнтів рівняння регресії використовуються плани, що забезпечують рівномірний розкид експериментальних точок. Ними є вузли симплексних решіток ділення трикутника, що утворюють насичений симплекс-гратчастий план (рис. 11.112, де номер точки симплексної решітки ділення трикутника відповідає номерам дослідів, наведених в табл. К.42–К.47, с. 1161–1163.), матриці яких представляє Додаток К (табл. К.42–К.47, с. 1161–1163).

За ними за допомогою **Statistica** отримуються апроксимуючі моделі:

— лінійна   (рис. 11.112 а)




Рис. 11.111. Визначення координат точки

$$V = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_3 \cdot z; \quad (11.98)$$






Рис. 11.112 – Типи симплексних решіток ділення трикутника:

а - лінійна; б - квадратична; в - неповна кубічна; г - кубічна; д - кватерктна (четвертого ступеня).

— квадратична  Quadratic /  Квадратичная (рис. 11.112 б)

$$V = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_3 \cdot z + a_4 \cdot x \cdot y + a_5 \cdot x \cdot z + a_6 \cdot y \cdot z; \quad (11.99)$$

— неповна кубічна  Special Cubic /  Специальная куб. (рис. 11.112 в)

$$V = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_3 \cdot z + a_4 \cdot x \cdot y + a_5 \cdot x \cdot z + a_6 \cdot y \cdot z + a_7 \cdot x \cdot y \cdot z; \quad (11.100)$$

— кубічна  Full Cubic /  Полная куб. (рис. 11.112 г)

$$V = a_1 \cdot x + a_2 \cdot y + a_3 \cdot z + a_4 \cdot x \cdot y + a_5 \cdot x \cdot z + a_6 \cdot y \cdot z + a_7 \cdot x \cdot y \cdot (x - y) + a_8 \cdot x \cdot z \cdot (x - z) + a_9 \cdot y \cdot z \cdot (y - z) + a_{10} \cdot x \cdot y \cdot z; \quad (11.101)$$

Отримані таким чином апроксимуючі моделі різних порядків можуть бути використані для передбачення відгуків у будь-якій точці симплекса. Точність передбачення відгуку будь-якої фіксованої моделлю різна в різних точках симплекса і крім координат точки залежить також від експериментальної ситуації (дисперсії досліду, кількості паралельних спостережень в вузлах симплексної решітки).

Таблиця 11.108. Теплота згорання брикету у залежності від умісту компонентів

Складові паливного брикету, у частках			Питома теплота згорання розрахована		
солома <i>S</i>	макуха <i>M</i>	волога <i>W</i>	експериментальна Q_{ϕ}	за тернарним графіком Q_p	за повнофакторним експериментом Q_{p2}
1	0	0	14.658	14.625	14.710
0.75	0.25	0	16.175	16.194	16.419
0.5	0.5	0	18.05	17.961	17.956
0.25	0.75	0	19.427	19.439	19.321
0	1	0	20.165	20.141	20.513
0.75	0	0.25	10.077	10.191	9.919
0.5	0.25	0.25	11.952	12.072	11.759
0.25	0.5	0.25	13.827	13.968	13.427
0	0.75	0.25	15.31	15.394	14.923
0.5	0	0.5	5.854	5.623	5.765
0.25	0.25	0.5	7.729	7.598	7.737
0	0.5	0.5	9.604	9.408	9.536
0.25	0	0.75	1.631	1.872	2.249
0	0.25	0.75	3.506	3.724	4.352
0	0	1	0	-0.115	-0.629

Представлені на рис. 11.112 трикутники називаються трикутниками Гіббса–Розебома. Тут вершини відповідають чистим компонентам, точки на сторонах — сполукам подвійних (бінарних) систем; точки усередині трикутника характеризують потрібні суміші [155].

Розглянемо використання тернарного графіка із застосуванням ППП **Statistica** при вивченні

впливу співвідношень складових трикомпонентної структури рослинних паливних брикетів, які в основному містять солому, клітковинну фракцію макухи та воду (вологу), на питому теплоту згорання [168].

Залежність теплоти згорання брикету від компонентного складу для симплексної решітки четвертого ступеня (див. рис. 11.112, д) представлено в табл. 11.108. Вставивши ці дані в створену таблицю, слід задіяти по черговому меню **Graphs** / **Графіка** (1), модуль **3D XYZ Graphs** / **3М XYZ графіки** (2) і опцію **Ternary Plots...** / **Тернарные графики** (3). Виникає панель **Ternary Graphs** / **Тернарные графики**, де якій у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** вибирається вид графічного представлення **Surface** / **Поверхность** (4) і натискається **Variables:** / **Переменные:** (5).

У результаті цього маємо панель **Select Variables for Ternary Graph** / **Выберите переменные для Тернарного графика**, на якій вибираються необхідні аргументи і фактор (6) і натискається **ОК** (7) (рис. 11.113). При цьому повертаємося на панель **Ternary Graphs** / **Тернарные графики** на вкладку **Advanced** / **Дополнительно**, де в меню **Surface** / **Поверхность** для побудови об'ємної діаграми вибираємо кубічний тип поверхні **Full Cubic** / **Полная куб.** (8) (див. (11.101) і натискаємо **ОК** (9).

У результаті одержуємо тернарну тримірну поверхню (рис. 11.114).

Для отримання карти ліній (рис. 11.115) після повернення на панель **Ternary Graphs** / **Тернарные графики** (рис. 11.113) і у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** замість **Surface** / **Поверхность** (4) слід натиснути і **Contour/Lines** / **Карта линий уровня**, вибрати тип поверхні **Quadratic** / **Квадратичная** (8) і натиснути **ОК** (9).




Рис. 11.113. Вибір варійованих факторів тернарного графіка

Як видно з рис. 11.114 і 11.115 рівняння поверхні функції відгуку, яка представляє собою залежність питомої теплоти згорання брикету від умісту його складових, подано кубічною залежністю (площиною третього порядку).

$$Q_p = 14.6247S + 20.141M - 0.1147W + 2.3136SM - 6.5266SW - 2.4226MW - 2.5956SM(S - M) + 5.0634SW(S - W) + 8.2243MW(M - W) + 11.318SMW, \quad (11.102)$$

де S , M і W – відповідно масові частки соломи, клітковинної фракції макухи і води в брикеті.




Рис. 11.114. Тернарна тримірна поверхня



Рис. 11.115. Тримірна карта ліній

11.15.2. Особливості оцінки результатів регресійного аналізу для експерименту склад–властивість

Статистична оцінка отриманої функціональної залежності ППП **Statistica** для тернарних графіків не передбачається. Нами пропонується істотність складових математичної моделі визначити за коефіцієнтом кореляції, а її адекватність за критеріями Стюдента і Фішера.

Для визначення коефіцієнтів кореляції складових математичної моделі в табл. 11.108 додається колонка з розрахунковими даними питомої теплоти згорання брикету за формулами (11.102) та (11.103) без вилучення статистично незначущих коефіцієнтів.

$$Q_{p2} = 14.4216 + 2.6942 \cdot S + 5.0631 \cdot M - 7.6551 \cdot W - 1.2028 \cdot S \cdot M - 14.9024 \cdot S \cdot W - 7.9907 \cdot M \cdot W - 1.2028 \cdot S^2 + 1.0208 \cdot M^2 - 7.3858 \cdot W^2. \quad (11.103)$$

За даними табл. 11.108 будується прямокутна кореляційна матриця (див. підрозділ **9.2.7.2 Визначення кореляційних залежностей і побудова квадратних матриць за допомогою ППП Statistica**) залежності теплоти згорання від лінійних факторів і їхніх парних взаємодій. Вона представлена табл. 11.109.



Таблиця 11.109. Кореляція залежності теплоти згорання від досліджуваних факторів і їхніх парних взаємодій

Переменная	Корреляции (Брикет-Т) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < 0.05000$ N=16 (Построчное удаление ПД)									
	Солома	Макуха	Волога	S*M	S*W	M*W	S*M*(S-M)	S*W*(S-W)	M*W*(M-W)	S*S*W
Теплота згорання	.2457	.7183	-.9577	.2455	-.4561	-.1632	-.1073	.2957	.4034	-.0640
	p=.359	p=.002	p=.000	p=.359	p=.076	p=.546	p=.693	p=.266	p=.121	p=.814

У табл. 11.109 шрифтом червоного кольору відмічаються коефіцієнти, значущі при $p < 0.05$. Так як ігнорувати лінійний вплив факторів не варто, остаточно залежність питомої теплоти згорання паливного брикету від умісту його складових представляє собою площину першого порядку

Перевірка за критерієм Фішера, виконана на основі однофакторного ДА (див. підрозділ **10.3 Порівняння двох вибірок за допомогою інструмента ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ ПА Microsoft Excel**) показує, що $F=9.252236 \cdot 10^{-11}$ і $F_T=4.170877$ (табл. 11.110, тобто $F < F_T$). Це свідчить, що між вибірковими середніми розрахункових і експериментальних даних немає істотних відмінностей і нульова гіпотеза про рівність вибірок розрахункових і експериментальних даних підтверджується.

Для порівняння розглянемо математичну модель (11.103), отриману за

факторним експериментом із допомогою модуля  **Multiple Regression** /  **Множественная регрессия** ППП Statistica

Розрахункові значення питомої теплоти згорання брикету, виконані за виразом (11.103), також представлені в табл. 11.108.

Таблиця 11.110. Результати перевірки відмінностей фактичних і розрахункових значень за критерієм Фішера

Группы	Счет	Сумма	Среднее	Дисперсия		
Q факт	16	175.694	10.980875	39.19755092		
Q розр	16	175.693659	10.98085371	39.17702747		
Дисперсионный анализ						
Источники вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое
Между группами	3.6257E-09	1	3.6257E-09	9.252236E-11	0.99999239	4.170876786
Внутри групп	1175.618676	30	39.18728919			
Итого	1175.618676	31				

Коефіцієнт детермінації між значеннями питомої теплоти згорання Q , отриманими за виразом (11.103), і фактичними, наведеними в табл. 11.108, дорівнює 0.9965, тобто у 99.65 % випадків розрахункові значення відповідають фактичним.

Значення критерію Фішера $F = 2.333829 \cdot 10^{-14}$ також підтверджує нульову гіпотезу про рівність вибірок.

Таблиця 11.111. Зведена характеристика тернарного рівняння регресії без незначущих коефіцієнтів

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Розкдовані коефіцієнти рівняння		№ п.п.	Фактори			Функція відгуку Y		Залишок	Абсолютна різниця із середнім	Квадрат залишку	Квадрат різниці залишків
2				S	M	W	Експерим.	Розрах.				
3	a ₁ =	14.625	1	1	0	0	14.658	14.625	0.033	0.39	0.001	
4	a ₂ =	20.141	2	0	1	0	20.165	20.141	0.024	0.38	0.001	0.000
5	a ₃ =	-0.115	3	0	0	1	0.000	-0.115	0.115	0.47	0.013	0.008
6	a ₄ =		4	0.5	0	0.5	5.854	7.255	-1.401	1.05	1.963	2.297
7	a ₅ =		5	0.5	0.5	0	18.050	17.383	0.667	1.02	0.445	4.277
8	a ₆ =		6	0	0.5	0.5	9.604	10.013	-0.409	0.06	0.167	1.158
9	a ₇ =		7	0.25	0	0.75	1.631	3.570	-1.939	1.59	3.760	2.341
10	a ₈ =		8	0.75	0	0.25	10.077	10.940	-0.863	0.51	0.745	1.158
11	a ₉ =		9	0.25	0.75	0	19.427	18.762	0.665	1.02	0.442	2.335
12	a ₁₀ =		10	0.75	0.25	0	16.175	16.004	0.171	0.52	0.029	0.244
13			11	0	0.25	0.75	3.506	4.949	-1.443	1.09	2.083	2.606
14			12	0	0.75	0.25	15.310	15.077	0.233	0.59	0.054	2.809
15			13	0.25	0.25	0.50	7.729	8.634	-0.905	0.55	0.819	1.295
16			14	0.50	0.25	0.25	11.952	12.319	-0.367	0.01	0.135	0.290
17			15	0.25	0.50	0.25	13.827	13.698	0.129	0.48	0.017	0.246
18	Максимум						20.17	20.14	0.67	Рохрах.значення d _Ф = 1.974		
19	Верхній довірчий інтервал						14.752	14.792	0.087	Нижня межа d _У = 1.750		
20	Середнє						11.20	11.55	-0.353	Верхня межа 4•d _У = 2.250		
21	Нижній довірчий інтервал						7.643	8.308	-0.792	Результат нормальності		0.084
22	Мінімум						0.00	-0.11	0.115			Нормальн.
23	Медіана						11.95	12.32	0.024			
24	Ступінь вільності неадекватності						12		H3=\$B\$3*D3+\$B\$4*E3+\$B\$5*F3+\$B\$6*D3*E3+\$B\$7*D3*F3+\$B\$8*E3*F3+\$B\$9*D3*E3*(D3+E3)+\$B\$10*D3*F3*(D3+F3)+\$B\$11*E3*F3*(E3+F3)+\$B\$12*D3*E3*F3			
25	Ступінь вільності дослідів						2					
26	Дисперсія неадекватності						0.629					
27	Дисперсія похибки дослідів						41.192					
28	Розрахунковий критерій F _Ф						392.81					
29	Довірчий рівень значущості α						0.050					
30	Табличний критерій F _т						5.096					
31	Розрахунковий рівень значущості						1.1596E-11					
32	Коефіцієнт кореляції Пірсона						0.9959					
33	Показник детермінації						0.9917					

Таким чином, оцінка залежності, виконана за тернарним графіком, практично не відрізняються від оцінки отриманої в повнофакторному експерименті. Також оцінку результатів можна виконувати

за аналогією з підрозділом **11.11.1.3 Особливості оцінки результатів регресійного аналізу**. Тут аналогічно табл. 11.97 (с. 831) представляємо табл. 11.111, де на її полі наведено розрахунки за виразом (11.102) з урахуванням незначущості ряду його коефіцієнтів. Розрахунки решти показників виконуються у відповідності з описом у цьому підрозділі та табл. 11.97.

Для порівняння в табл. 11.112 за аналогією з табл. 11.98 (с. 833) дані представлено за розрахунками без умови статистичної значущості коефіцієнтів рівняння регресії, тобто для стовпця Q_p табл. 11.108 (с. 855).

Таблиця 11.112. Зведена характеристика тернарного рівняння регресії з усіма знайденими коефіцієнтами

Максимум	20.17	20.14	0.23	Рохрах.значення $d_\Phi = 1.500$	
Верхній довірчий інтервал	14.752	14.757	0.071	Нижня межа $d_U = 1.750$	
Середнє	11.20	11.21	-0.009	Верхня межа $4-d_U = 2.250$	
Нижній довірчий інтервал	7.643	7.656	-0.088	Результат нормальності	0.088
Мінімум	0.00	-0.11	0.115		Нормальн.
Медіана	11.95	12.07	-0.012		
Ступінь вільності неадекватності	5				
Ступінь вільності досліду	9				
Дисперсія неадекватності	0.021				
Дисперсія похибки досліду	41.192				
Розрахунковий критерій F_Φ	1102.20				
Довірчий рівень значущості α	0.050				
Табличний критерій F_t	6.681				
Розрахунковий рівень значущості	1.0597E-07				
Коефіцієнт кореляції Пірсона	0.9997				
Показник детермінації	0.9995				

На рис. 11.116 наведена залежності між розрахунковими за виразами (11.102) та (11.103) даними, поданими в табл. 11.108 і фактичними величинами.

З рис. 11.116 видно, що відповідні розрахункові точки, отримані за рівняннями (11.102) і (11.103), майже повністю співпадають між собою.




Рис. 11.116. Залежності між розрахунковими Q_p , отриманими за тернарним графіком (1) та факторним експериментом (2) і фактичними величинами Q_Φ

11.15.3. Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту

У практиці регресійного аналізу найбільше зустрічаються проведення трифакторного експерименту. Особливо часто це властиво технічним наукам, так як зазвичай одним фактором є конструктивний параметр, другим — технологічний режим, третім — властивість оброблюваного матеріалу.

Для візуалізації отриманого рівняння функції відгуку, як правило, використовуються тривимірні поверхні парних взаємодій досліджуваних факторів, причому при трьох факторах будується три поверхні (див. рис. 11.97, с. 818) [145].

Для скорочення кількості поверхонь відгуку пропонується використати тернарний графік, де фактори подаються сторонами правильного трикутника (симплекса), рівними одиниці, а висотою є значення функції відгуку.

Сторони основи трикутника представляють в масштабі діапазони зміни, тобто розмах (1.38) досліджуваних факторів. Їх поточне значення розраховується за виразом [169]

$$x_i = x_{i_{\min}} + (x_{i_{\max}} - x_{i_{\min}})k. \quad (11.104)$$

де $x_{i_{\min}}, x_{i_{\max}}$ — відповідно мінімальне та максимальне значення i -го фактору;

k — частка довжини одиничної сторони симплекса за рис. 11.112, с. 854.

Розглянемо побудову тернарного графіка поверхні відгуку, представленої залежністю (11.84) з урахуванням значущості коефіцієнтів. Застосовуючи квартиктне (четвертого ступеня) ділення трикутника (згідно рис. 11.112 д, с. 854) на основі табл. 11.78, с. 810 отримаємо матрицю з натуральними значеннями факторів і симплексними координатами (табл. 11.113).

Далі в ППП **Statistica** створюється файл (рис. 11.117), у перші три колонки **v1–v3** якого (1) записується натуральні значення факторів з табл. 11.113, у три наступні **v4–v6** — частки одиничної сторони трикутника (2) з цієї ж таблиці.

Таблиця 11.113. Тернарні координати у натуральних значеннях і частках сторін трикутника

№ п.п.	Фактори			Частки факторів			ρ
	I	δ	α	I'	δ'	α'	
1	40	0	2	1	0	0	601.8
2	20	9.00	2	0	1	0	629.6
3	20	0	6	0	0	1	687.9
4	30	0.00	4	0.5	0	0.5	622.4
5	30	5	2	0.5	0.5	0	600.7
6	20	4.50	4	0	0.5	0.5	642.5
7	25	0.00	5	0.25	0	0.75	649.5
8	35	0.00	3	0.75	0	0.25	606.5
9	25	7	2	0.25	0.75	0	611.4
10	35	2	2	0.75	0.25	0	597.5
11	20	2.25	5	0	0.25	0.75	661.1
12	20	6.75	3	0	0.75	0.25	632.0
13	25	2.25	4	0.25	0.25	0.5	628.7
14	30	2.25	3	0.5	0.25	0.25	607.5
15	25	4.50	3	0.25	0.5	0.25	616.0

Для запису даних у колонку **v7** (3) слід двічі клацнути лівою клавiшею миші по її імені й у поле `Long name (label or formula with Functions):` / `Длинная метка или формула с Функциями` (4) панелі **Variable** / **Переменная** ввести вираз рівняння регресії (11.84) (с. 827).

	1 Довжина частки l, мм	2 Уміст зв'язуючого δ , %	3 Конусність матриці α , град	4 Довжина частки	5 Уміст зв'язуючого	6 Конусність матриці	7 Щільність брикета ρ , кг/м ³
1	40	0.00	2	1	0	0	601.82
2	35	2.25	2	0.75	0.25	0	597.52
3	30	4.50					
4	25	6.75					
5	20	9.00					
6	35	0.00					
7	30	2.25					
8	25	4.50					
9	20	6.75					
10	30	0.00					
11	25	2.25					
12	25	2.25					
13	20	4.50					
14	25	0.00					
15	20	2.25					
16	20	0.00					

Переменная 7

Имя: **Щільність брикета** Тип: **Двойной** **OK** **Отмена**

Код ПД: **-9999** Ширина: **8**

Формат отображения: **Общий** Все спецификации...

Длинная метка или формула с **Функциями** ☒ Просмотр функций

=898.2750-11.25*v1-8.8667*v2-23.5*v3+0.0278*v1*v2+0.0375*v1*v3+0.1162*v1*v1+0.2284*v2*v2+2.90637*v3*v3

Метки: любой текст. В формулах используйте имена переменных или символы v1, v2, ...; символ v0 соответствует именам наблюдений.
Примеры формул: (a) = mean(v1:v3, sqrt(v7), AGE) (b) = v1+v2; коммент. (после:)

Рис. 11.117. Отримання формули функції відклику

Починати його слід зі знаку рівності, замінивши фактичні значення довжини частки l , умісту δ зв'язуючої речовини і кута α конусності матриці відповідно на **v1**, **v2** і **v3** та вилучивши незначущі складові — фактори, їхні квадрати та поєднання факторів (див. с. 845).

Натиснувши **OK** (5) отримаємо заповнення колонки результатами згідно рівняння регресії (11.84).

Також можна повністю скопіювати всі колонки табл. 11.113 у колонки **v1–v7** файлу ППП **Statistica** (рис. 11.118).

Потім почергово слід виконавши дії з колонками **v4–v7** (рис. 11.118): в меню **Graphs** / **Графика** (1) задіяти модуль **3D XYZ Graphs** / **3D XYZ графики** (2) і далі опцію **Ternary Plots...** / **Тернарные графики** (3). Виникає панель **Ternary Graphs** / **Тернарные графики**, де якій у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** вибирається вид графічного представлення **Surface** / **Поверхность** (4), задається квадратичний тип поверхні **Quadratic** / **Квадратичная** (5) і натискується **Variables** / **Переменные** (6).

Цими діями виводиться панель **Select Variables for Ternary Graph** / **Выберите переменные для Тернарного графика**, на якій вибираються необхідні аргу-

менти і фактор (7) і натискається **ОК** (8), потім **ОК** (9).

У результаті одержуємо тернарну тримірну поверхню (рис. 11.119 а) і карту ліній (рис. 11.119 б). На цих рисунках для більшої наочності вони наведені графічно редагованими (див. підрозділ **16.2.6.3 Редагування тернарних графіків**) і з натуральними, а не нормованими значеннями аргументів.




Рис. 11.118. Вибір варійованих факторів тернарного графіка

На рис. 11.119 б як і на рис. 11.97 позначено ізолінію прийнятого значення $\rho_r = 650 \text{ кг/м}^3$ (фіолетовим кольором). Симплексні координати її точок та інших ізоліній, показують які значення незалежних факторів довжини частки l , умісту δ зв'язуючої речовини і кута α конусності матриці слід приймати для одержання брикету заданої щільності.




Рис. 11.119. Тернарні графіки поверхні функції відгуку:
а – тернарна тримірна поверхня; б – тримірна карта ліній.

11.16. ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБРОБЛЮВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Досить часто виконуються дослідження універсальних засобів механізації сільськогосподарського виробництва, призначених для роботи з різними матеріалами. Це в основному кормороздавачі, дробарки, навантажувачі кормів і т.д.

У результаті отримуються декілька рівнянь регресії, які характеризують роботу машини з тим, чи іншим матеріалом. На їх основі визначаються оптимальні параметри і режими роботи машини з тим чи іншим матеріалом без оцінки його впливу.

Так як зазвичай оброблювані матеріали характеризуються великою кількістю показників (наприклад, силос і сінаж³²⁾) і звести їх од одного, вираженого числовим значенням не має змоги, використання регресійного аналізу стає неможливим.

³²⁾ Див. роботу Киселев А. В. Обоснование технологического процесса параметров и режимов работы пило-винтового отделителя погрузчика кормов / А. В. Киселев // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Запорожье, 1987. – 163 с., результати регресійного аналізу продуктивності вивантаження силосу і сінажу розглядаються у даному підрозділі.

По–перше при оцінці слід порівняти середні показники продуктивності вивантаження силосу і сінажу.

В табл. 11.114 наведено середні значення продуктивності силосу і сінажу, отримані для трирівневої матриці центрального композиційного ротатабельного плану другого порядку для трьох факторів (табл. К.22), одержаних на основі результатів, виконаних за трирівневою матрицею центрального композиційного уніформ–ротатабельного плану другого порядку для чотирьох факторів (табл. К.29).

Порівнювання вибірок, які є вибірками з попарно зв'язаними варіантами виконується за вибірками повторень з використанням ППП **Statistica**, згідно з описом у підрозділі **7.3.7.11.3 Оцінка вибірок із попарно зв'язаними варіантами використанням ППП Statistica**. Результати оцінки подано у табл. 11.115.

З неї бачимо що продуктивність роботи пило–гвинтового відокремлювача вивантажувача кормів при вивантаженні силосу і сінажу статистично значуще відрізняється.

Проте, ця оцінка не дає відповіді на питання які саме фактори і у якій мірі викликають це явище.

Для цього слід провести дисперсійний аналіз, приймаючи також за фактор вид корму і за допомогою апостеріорних критеріїв проаналізувати виникнення відмінностей.

Таблиця 11.115. Результати перевірки відмінності різниці середніх продуктивності вивантаження силосу і сінажу

Переменная	Т-критерий для зависимых выборок (МояD1) Отмечены разности, значимые на уровне $p < .05000$									
	Среднее	Стд.откл.	N	разн.	Стд.откл. разн.	t	сс	p	Доверит. -95.000%	Доверит. +95.000%
Силос	10.66771	5.556781								
Сінаж	7.08750	3.661189	48	3.580208	1.965683	12.61873	47	0.000000	3.009434	4.150983

Проте, у даному разі при цьому є перепона — до даних, отриманих за трирівневою матрицею центрального композиційного ротатабельного плану

Таблиця 11.114. Продуктивність вивантаження силосу і сінажу

Рівні варіювання			Продуктивність	
Глибина врізання h , м	Кут розстановки зубів α , град	Швидкість подачі V_n , м/с	силосу	сінажу
0.15	10	0.100	6.3	4.1
0.25	30	0.250	8.4	5.8
0.15	10	0.100	4.3	2.9
0.25	30	0.250	4.9	3.5
0.15	10	0.100	16.3	10.7
0.25	30	0.250	19.7	13.4
0.15	10	0.100	13.4	9.1
0.25	30	0.250	12.4	8.7
0.30	20	0.175	6.7	4.4
0.10	20	0.175	12.1	8.1
0.20	0	0.175	14.4	9.4
0.20	40	0.175	5.4	3.6
0.20	20	0.025	1.7	1.1
0.20	20	0.325	21.5	13.8
0.20	20	0.175	11.6	7.5
0.20	20	0.175	11.9	7.5

другого порядку для трьох факторів (табл. К.22) не можна застосувати дисперсійний аналіз.

Таблиця 11.116. Продуктивність вивантаження силосу і сінажу

Рівні варіювання факторів				Продуктивність т/год при вивантаженні
Глибина врізання h , м	Кут розстановки зубів α , град	Швидкість подачі V , м/с	Корм	
0.15	10	0.10	Силос	6.3
0.25	30	0.25	Силос	8.4
0.15	10	0.10	Силос	4.3
0.25	30	0.25	Силос	4.9
0.15	10	0.10	Силос	16.3
0.25	30	0.25	Силос	19.7
0.15	10	0.10	Силос	13.4
0.25	30	0.25	Силос	12.4
0.15	10	0.10	Силос	7.5
0.25	30	0.25	Силос	11.4
0.15	10	0.10	Силос	10.1
0.25	30	0.25	Силос	5.9
0.15	10	0.10	Силос	12.0
0.25	30	0.25	Силос	24.3
0.15	10	0.10	Силос	15.6
0.25	30	0.25	Сінаж	4.1
0.15	10	0.10	Сінаж	5.8
0.25	30	0.25	Сінаж	2.9
0.15	10	0.10	Сінаж	3.5
0.25	30	0.25	Сінаж	10.7
0.15	10	0.10	Сінаж	13.4
0.25	30	0.25	Сінаж	9.1
0.15	10	0.10	Сінаж	8.7
0.25	30	0.25	Сінаж	5.0
0.15	10	0.10	Сінаж	7.8
0.25	30	0.25	Сінаж	6.6
0.15	10	0.10	Сінаж	4.0
0.25	30	0.25	Сінаж	8.0
0.15	10	0.10	Сінаж	16.2
0.25	30	0.25	Сінаж	10.4

Завадою при цьому є результати дослідів у зіркових точках і точках центру плану.

Тому ми змушені розглядати лише дані, отримані в центрі досліду, фактично дворівневу матрицю повнофакторного плану першого порядку для трьох факторів (табл. К.2), подані табл. 11.116.

Результати дисперсійного аналізу, виконані за цим планом наведені в табл. 11.117.

З неї бачимо, що наявний статистично значущий вплив виду корму на продуктивність вивантаження, що власне підтверджує висновок за табл. 11.115.

Всі парні поєднання виду корму з конструктивними і технологічними факторами пило-гвинтового відокремлювача виявилися статистично незначущими.

Це досить цінна закономірність, яка свідчить що конструктивні параметр і технологічні режими роботи відокремлювача практично не залежать від виду корму. Статистично значущим є лише потрійне поєднання факторів “Глибина×Кут×Корм”.

Оціночні показники сили впливу факторів і поєднань та роботоздатності моделі (див. підрозділ **10.10.3 Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі**), представлені табл. 11.118.

З неї бачимо, що сила впливу фактору “Корм” становить лише 10.3 %, потрійного поєднання “Глибина×Кут×Корм” — 16.3 %.

Роботоздатність дисперсійної мо-

делі досить висока і становить 0.843.

Хоч за даними табл. 11.117 всі парні поєднання виду корму з конструктивними і технологічними факторами пило-гвинтового відокремлювача виявилися статистично незначущими, виконаємо більш строге порівняння парних поєднань за апостеріорним критерієм Фішера (див. підрозділ **10.9.2.2 Визначення НІР Фішера застосуванням ППП Statistica**).

Дані розрахунки, виконані на основі ППП **Statistica**, подано в табл. 11.119.

Таблиця 11.117. Натуральні і стандартизовані значення показників.

Эффект	Одномерный критерий значимости дляПродуктивність (Таблица данных1) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	2925.169	1	2925.169	454.2512	0.000000
Глибина	0.115	1	0.115	0.0178	0.895448
Кут	76.622	1	76.622	11.8987	0.003297
Швидкість	255.474	1	255.474	39.6727	0.000011
Корм	67.716	1	67.716	10.5156	0.005098
Глибина*Кут	9.084	1	9.084	1.4107	0.252269
Глибина*Швидкість	13.847	1	13.847	2.1503	0.161920
Кут*Швидкість	47.166	1	47.166	7.3245	0.015567
Глибина*Корм	5.404	1	5.404	0.8392	0.373237
Кут*Корм	13.759	1	13.759	2.1367	0.163173
Швидкість*Корм	23.604	1	23.604	3.6655	0.073606
Глибина*Кут*Швидкість	24.939	1	24.939	3.8729	0.066653
Глибина*Кут*Корм	107.250	1	107.250	16.6550	0.000870
Глибина*Швидкість*Корм	15.797	1	15.797	2.4531	0.136854
Кут*Швидкість*Корм	0.183	1	0.183	0.0283	0.868417
Глибина*Кут*Швидкість*Корм	2.411	1	2.411	0.3744	0.549222
Ошибка	103.033	16	6.440		

З неї видно відсутність статистично значущої відмінності продуктивності вивантаження силосу, а також сінажу для обох рівнів глибини та між силосом і сінажем при верхньому рівні глибин врізання.

Для парного поєднанні швидкості подачі ріжучого гвинта з кормом статистично незначущою виявилася лише відмінність продуктивності при вивантаженні силосу зі відповідно швидкості подачі.

Саме статистично значущі парні поєднання факторів слід використовувати при аналізі їхньої взаємодії на продуктивність вивантаження корму, який виконується побудовою поверхні відгуку (див. рис. 11.109 на с. 847).

Таблиця 11.118. Сила впливу факторів і поєднань та роботоздатність моделі

Джерело варіації	Вплив, %
Організовані фактори	74.0
- з них одинарні	60.8
Кут	11.7
Швидкість	38.9
Корм	10.3
- з них поєднання	23.5
Кут*Швидкість	7.2
Глибина*Кут*Корм	16.3
- пов'язані з фактором "Корм"	26.6
Похибка	15.7
Роботоздатність моделі	0.843

Таблиця 11.119. Результати розрахунку і оцінки різниці середніх за критерієм Фішера

— для поєднання факторів Глибина × Корм

Парні поєднання факторів		Середнє арифметичне	Похибка середнього	Рівень значущості p	Нижня довірча межа середнього	Верхня довірча межа середнього	Найменша істотна різниця HIP_{05}
Глибина 0.15 × Силос	Глибина 0.15 × Сінаж	3.73125	1.268812	0.009594	1.04149	6.421012	2.690
Глибина 0.15 × Силос	Глибина 0.25 × Силос	0.70208	1.268812	0.587681	-1.98768	3.391846	
Глибина 0.15 × Силос	Глибина 0.25 × Сінаж	2.78958	1.268812	0.042965	0.09982	5.479346	
Глибина 0.15 × Сінаж	Глибина 0.25 × Силос	-3.02917	1.268812	0.029653	-5.71893	-0.339404	
Глибина 0.15 × Сінаж	Глибина 0.25 × Сінаж	-0.94167	1.268812	0.468744	-3.63143	1.748096	
Глибина 0.25 × Силос	Глибина 0.25 × Сінаж	2.08750	1.268812	0.119420	-0.60226	4.777262	

— для поєднання факторів Кут × Корм

Парні поєднання факторів		Середнє арифметичне	Похибка середнього	Рівень значущості p	Нижня довірча межа середнього	Верхня довірча межа середнього	Найменша істотна різниця HIP_{05}
Кут 10 × Силос	Кут 10 × Сінаж	4.220833	1.268812	0.004273	1.53107	6.910596	2.690
Кут 10 × Силос	Кут 30 × Силос	4.406250	1.268812	0.003139	1.71649	7.096012	
Кут 10 × Силос	Кут 30 × Сінаж	6.004167	1.268812	0.000226	3.31440	8.693929	
Кут 10 × Сінаж	Кут 30 × Силос	0.185417	1.268812	0.885641	-2.50435	2.875179	
Кут 10 × Сінаж	Кут 30 × Сінаж	1.783333	1.268812	0.178989	-0.90643	4.473096	
Кут 30 × Силос	Кут 30 × Сінаж	1.597917	1.268812	0.225956	-1.09185	4.287679	

— для поєднання факторів Ширина × Корм

Парі поєднання факторів		Середнє арифметичне	Похибка середнього	Рівень значущості p	Нижня довірча межа середнього	Верхня довірча межа середнього	Найменша істотна різниця HIP_{05}
Швидкість 0.10 × Силос	Швидкість 0.10 × Сінаж	1.19167	1.268812	0.361592	-1.4981	3.88143	2.690
Швидкість 0.10 × Силос	Швидкість 0.25 × Силос	-7.36875	1.268812	0.000027	-10.0585	-4.67899	
Швидкість 0.10 × Силос	Швидкість 0.25 × Сінаж	-2.74167	1.268812	0.046219	-5.4314	-0.05190	
Швидкість 0.10 × Сінаж	Швидкість 0.25 × Силос	-8.56042	1.268812	0.000005	-11.2502	-5.87085	
Швидкість 0.10 × Сінаж	Швидкість 0.25 × Сінаж	-3.93333	1.268812	0.006880	-6.6231	-1.24357	
Швидкість 0.25 × Силос	Швидкість 0.25 × Сінаж	4.62708	1.268812	0.002173	1.9373	7.31685	

11.17. ОСОБЛИВОСТІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ДОЗАТОРІВ І ЗМІШУВАЧІВ

Як відомо, оціночним критерієм якості роботи дозаторів і змішувачів є коефіцієнт варіації V . Для дозаторів це коефіцієнт варіації V маси проб, відібраних за постійний проміжок часу; для змішувачів — коефіцієнт варіації умісту V контрольованого чи контрольного компоненту в пробах [62, 63].

Таким чином значення повторення при їх дослідженнях представляє собою не величину одноразового заміру, а статистичну характеристику певної кількості зразків, які саме і складають дане повторення.

Згідно [63] при їх випробуванні за величиною зразків, відібраних для однієї повторності, знаходять статистичні характеристики: середнє арифметичне \bar{x} , СКВ s і коефіцієнт варіації V . Ці розрахунки відповідно виконуються: за формулою (1.22) чи статистичною функцією Excel **CP3HACH**, за формулою (1.56) або функцією **СТАНДОТКЛОН.В** і за формулою (1.100).

Проте, статистична обробка отриманих результатів наводиться лише для оцінки одного повторення, тобто подається лише обробка зразків.

Так як для дозаторів і змішувачів отримані показники повторення середнього арифметичного \bar{x} і коефіцієнту варіації V , які характеризують їх роботу, як уже було сказано вище, не є безпосередніми визначеннями замірами, а результатами статистичної обробки певної кількості проб, то для отримання значення повтору їх усередненням за триразовим повторенням не можна використовувати просто середньоарифметичні значення середньоарифметичних і коефіцієнтів варіації повторення. До того ж досить часто коефіцієнти варіації не належать до однієї генеральної сукупності варіацій, хоч і обчислені вони за вибірками, які складають генеральну сукупність.

Тут слід використовувати об'єднання серій (повторностей) прямих вимірювань (величина проб), які розраховуються за виразом (5.103), коли отримані результати повторень середнього арифметичного \bar{x} і його абсолютної похибки $\Delta_{\bar{x}}$ при отриманні значення повтору представляються усередненим середньоарифметичним \bar{x}_{yc} і усередненою абсолютною похибкою Δ_{xyc} .

За цими показниками, використовуючи критичне значення критерію Стюдента, знайдене за прийнятим рівнем значущості α і середнім значенням вільності повторностей, з використанням виразів (5.52) знаходиться абсолютна усереднена похибка $s_{\bar{x}_{yc}}$, далі за виразом (1.63) та середнім значенням кількості повторностей отримується усереднений СКВ s_{yc} і використовуючи (1.100) знаходиться усереднене значення коефіцієнту варіації V_{yc} для даного повтору.

Якщо з отриманням усереднених \bar{x}_{yc} і Δ_{xyc} (об'єднанням результатів n серій прямих вимірювань, яке виконується згідно виразів (5.103) проблеми не виникає, то для об'єднання коефіцієнтів варіації V і їх абсолютних похибок Δ_V для вибірок вираз (5.103) непридатний через нерівність верхніх і нижніх меж довірчого інтервалу, тобто нерівність між собою верхньої і нижньої похибок (див. вирази (1.106) і (1.107)).

Для використання виразів (5.103) представимо коефіцієнти варіації V_c з симетричними абсолютними похибками Δ_{Vc} .

За виразом (1.106) при оцінці змішувачів і (1.107) для дозаторів маємо

$$V_{cz} = \frac{V}{1 - (t_{\alpha(v)_T} s_V)^2}, \quad V_{cd} = \frac{V}{1 - (z_{\alpha} s_V)^2} \quad (11.105)$$

і відповідно

$$\Delta_{V_{cz}} = V \cdot \frac{t_{\alpha(v)} s_V}{1 - (t_{\alpha(v)} s_V)^2}, \quad \Delta_{V_{cd}} = V \cdot \frac{z_{\alpha} s_V}{1 - (z_{\alpha} s_V)^2}. \quad (11.106)$$

Таким чином кінцеві результати розрахунку коефіцієнтів варіації для змішувачів і для дозаторів представляється виразами

$$V_{\text{кз}} = \frac{V}{1 - (t_{\alpha(v)} s_V)^2} \cdot (1 \pm t_{\alpha(v)} s_V), \quad V_{\text{дз}} = \frac{V}{1 - (z_{\alpha} s_V)^2} \cdot (1 \pm z_{\alpha} s_V). \quad (11.107)$$

Приклад розрахунку показників змішування, де Y представляє показник проби, взятої за певний проміжок часу, наведений у табл. 11.120.

В ній триразові повторення відбору 20 проб ($n=20$) представлені трьома колонками, тобто $k=3$ (чарунки **C3:C22**, **D3:C22** і **E3:E22**). Нормативним показником Y_0 якості змішування є відсотковий уміст контрольного компоненту, величина якого становить $Y_0=3\%$.

При попередньому оцінюванні даних визначаємо відповідність умісту контрольного компоненту в повтореннях нормальному розподілу; виконуємо перевірку сумнівних і вибраковування недостовірних результатів та перевіряємо однорідності повторень.

Відповідність умісту контрольного компоненту повторення нормальному розподілу, виходячи з того, що вибірка проб досить велика, виконуємо відповідно стандартом ISO 3479-97 [74] за критерієм Шапіро–Уїлка, отримуючи його при побудові гістограм (див. підрозділ 15.5.4 Побудова й аналіз одинарних гістограм).

Таблиця 11.120. Перевірка сумнівних і вибраковування недостовірних результатів

	A	B	C	D	E
1	№ повтру	№ зразка	Повторення		
2			Y ₁	Y ₂	Y ₃
3	C23=C27-C35*C34 C24=МИН(C3:C22) C26=C27-C34/C32^0.5 C27=CP3HACH(C3:C22) C28=C27+C34/C32^0.5 C30=МАКС(C3:C22) C31=C27+C35*C34 C32=СЧЁТ(C3:C22)	1	2.2	4.3	4.2
4		2	3.8	2.1	2.9
5		3	3.9	2.6	3.0
6		4	4.4	2.7	1.5
7		5	5.2	3.2	1.7
8		6	3.3	3.4	4.2
9		7	4.6	3.1	2.3
10		8	2.8	3.1	4.0
11		9	5.0	3.6	2.7
12		10	3.6	3.2	3.2
13		11	2.8	2.6	3.3
14	C34=СТАНДОТКЛОН.В(C3:C22) C35=СТЮДЕНТ.ОБР.2X(C33;C32-1)		4.2	2.2	3.2
15			4.9	3.2	3.8
16		14	3.6	2.2	3.1
17		15	4.0	3.6	3.1
18		16	4.0	3.0	2.2
19		17	1.8	1.8	1.6
20		18	4.5	3.3	3.6
21		19	3.6	3.9	3.3
22		20	3.6	3.7	3.2
23	Нижнє надійне значення вибірки		1.91	1.68	1.32
24	Мінімальне значення вибірки		1.8	1.8	1.5
25	Нижня довірча межа середнього		3.37	2.74	2.63
26	Нижніс значення середнього		3.59	2.89	2.82
27	Середнє значення		3.79	3.04	3.01
28	Верхнє значення середнього		3.99	3.19	3.19
29	Верхня довірча межа середнього		4.21	3.34	3.38
30	Максимальне значення вибірки		5.2	4.3	4.2
31	Верхнє надійне значення вибірки		5.67	4.40	4.69
32	Об'єм вибірки		20	20	20
33	Прийнятий рівнь значущості		0.05	0.05	0.05
34	Середньоквадратичний відхил		0.898	0.649	0.806
35	Критичний критерій Стюдента повторення		2.093	2.093	2.093
C25=C27-ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(C33;C34;C32) C29=C27+ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(C33;C34;C32)					

Таблиця 11.122. Перевірка нормальності розподілу

Повторність	Вибірка n , шт.	Критерій Шапіро-Уїлка W	
		Розрахунковий	Критичний
Y_1 (до вибракування)	20	0.962	0.905
Y_1 (після вибракування)	18	0.966	0.858
Y_2	20	0.975	0.905
Y_3	20	0.635	0.905

Отримані значення для всіх вибірок перевищують критичне $W_{\alpha(n)}$ (табл. Е.26) для прийнятого рівня значущості $\alpha=0.05$ (табл. 11.122). Таким чином нормальність розподілу даних у повтореннях підтверджується (про особливості оцінки за критерієм Шапіро-Уїлка див. с. 305).

Таблиця 11.123. Перевірка однорідності декількох дисперсій за критерієм Фішера

23	Дисперсія s^2	0.478	0.421	0.649
24	Ступінь вільності ν	17	19	19
25	Рівень значущості α		0.05	
26	Розрахунковий критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-2}$		1.133	
27	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-2}$		2.243	
28	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-2}$		2.633	
29	Рівент значущості критерію Фішера p_{1-2}		0.394	
30	Розрахунковий критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-3}$		1.359	
31	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-3}$		2.243	
32	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 1-3}$		2.633	
33	Рівент значущості критерію Фішера p_{1-3}		0.265	
34	Розрахунковий критерій Фішера $F_{\alpha/2, 2-3}$		1.540	
35	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 2-3}$		2.168	
36	Табличний критерій Фішера $F_{\alpha/2, 2-3}$		2.526	
37	Рівент значущості критерію Фішера p_{2-3}		0.394	

$D23=\text{ДИСП.В}(D3:D22)$ $E23=\text{ДИСП.В}(E3:E22)$
 $F23=\text{ДИСП.В}(F3:F22)$ $D24=\text{СЧЁТ}(D3:D22)-1$
 $E24=\text{СЧЁТ}(E3:E22)-1$ $F24=\text{СЧЁТ}(F3:F22)-1$
 $D26=D23/E23$ $D27=F.ОБР.ПХ(D25;E24;D24)$
 $D28=F.ОБР.ПХ(D25/2;E24;D24)$
 $D29=1-F.РАСП(D26;D24;E24;ИСТИНА)$

Перевірка сумнівних і вибракування недостовірних результатів, виходячи з нормальності розподілу зразків, виконується з використанням критерію Стюдента способом порівняння мінімального та максимального значення вибірки (статистичні функції **Excel МИН** і **МАКС**) відповідно з нижнім та верхнім надійним значенням (див. с. 63 і підрозділ **2.1 Визначення основних статистичних показників**, с. 91). За її результатами вибраковано двоє даних з повто-

Таблиця 11.121. Результати оцінки однорідності дисперсій за критерієм Бартлетта.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	№ повт	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Уср	s²	ν·s²	1/ν	ν·ln(s²)	
2	Повторения	Y₁	*2.2	3.8	3.9	4.4	5.2	3.3	4.6	2.8	5.0	3.6	2.8	4.2	4.9	3.6	4.0	4.0	*1.8	4.5	3.6	3.6	3.99	0.48	8.12	0.50	-12.57
3		Y₂	4.3	2.1	2.6	2.7	3.2	3.4	3.1	3.1	3.6	3.2	2.6	2.2	3.2	2.2	3.6	3.0	1.8	3.3	3.9	3.7	3.04	0.42	8.01	0.50	-16.42
4		Y₃	4.2	2.9	3.0	1.5	1.7	4.2	2.3	4.0	2.7	3.2	3.3	3.2	3.8	3.1	3.1	2.2	1.6	3.6	3.3	3.2	3.01	0.65	12.33	0.50	-8.22
5	W2=CP3H4(C2:V2)																						Сума	28.46	1.60	-37.20	
6	X2=ДИСП.В(C2:V2)																						S²CB = 0.52		α= 0.05		
7	Z2=1/(CЧЁТ(C2:V2)-1)																						M= 0.953				
8	AA2=(CЧЁТ(C2:V2)-1)*LN(X2)																						C= 1.024				
9	Y5=СУММ(Y2:Y4)																						B= 0.930				
10	Z5=СУММ(Z2:Z4)																						χ²α(k-1) = 30.144				

рення Y_1 (чарунки С3 і С19 табл. 11.120). Для того щоб вони стали недоступними для розрахунків, перед їх значенням слід поставити знак зірочки (*) (див. табл. 2.6 на с. 92).

Підтвердження нормальності розподілу цього повторення після вилучення двох даних наведені в табл. 11.122.

Перевірка припущення про рівність (гомогенності) дисперсій ґрунтується на гіпотезі про те, що дисперсії пари вибірок не відрізняються одна від одної, тобто вибірки належать одній генеральній сукупності (див. підрозділ 7.3.3 **Визначення статистичної рівності (гомогенності) дисперсій**).

Аналіз попарного порівняння вибірок з вилученням недостовірних значень наведений в табл. 11.123. З її результатів видно, що для всіх порівнянь дисперсій розрахунковий коефіцієнт Фішера F менше табличного F_{α} , це означає що вибірккові дисперсії на α рівні значущості статистично рівні між собою, тобто є оцінками однієї генеральної сукупності.

Істотність відхилення середнього арифметичного значення по-

вторення від нормативного показника ($Y_0 = 3$) може виконуватися розрахунковим методом (див. підрозділ 7.3.7.2.1 **Оцінка відхилення середнього від константи (одновибірковий критерій Стюдента)**) чи з використанням ППП Statistica (підрозділ 7.3.7.3 **Двовибірковий гомоскедастичний t-тест**).

Таблиця 11.124. Розрахунок точності змішування

	A	B	C	D	E
1	№ повтру	№ зразка	Повторення		
2			Y ₁	Y ₂	Y ₃
3		1	*2.2	4.3	4.2
4		2	3.8	2.1	2.9
C24=CP3H4Ч(C3:C22)				C27=1/C26^2	
C25=СТАНДОТКЛОН.В(C3:C22)					
C26=ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(C45;C25;C44)					
C28=1/(СУММ(C27:E27))^0.5				C29=C24*C27	
C30=СУММ(C29:E29)/СУММ(C27:E27)					
C31=1/(СУММ(C27:E27))^0.5				C38=C36-C37	
C33=C25*100/C24				C35=C33/(1+C34*C46/100)	
C34=C33*((1+0.0002*C33^2)/(2*C44-2)^0.5)					
C36=C33/(1-C34*C46/100)				C39=1/C38^2	
C37=C33/(1-(C34*C46/100)^2)				C41=C37*C39	
C40=1/(СУММ(C39:E39))^0.5					
C42=СУММ(C41:E41)/СУММ(C39:E39)				3.6	2.2
C43=1/(СУММ(C39:E39))^0.5				4.0	3.6
C44=СЧЁТ(C3:C22)				4.0	3.0
C46=СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(C45;C44-1)				*1.8	1.8
20		18	4.5	3.3	3.6
21		19	3.6	3.9	3.3
22		20	3.6	3.7	3.2
23	Оцінка продуктивності				
24	Середнє значення		3.989	3.040	3.005
25	Середньоквадратичний відхил		0.691	0.649	0.806
26	Довірчий інтервал		0.344	0.304	0.377
27	Статистична частка вимірювання		8.468	10.832	7.035
28	Усереднений довірчий інтервал		0.195		
29	Статистична частка середнього		33.779	32.929	21.141
30	Усереднене середнє		3.336		
31	Усереднен. довірчий інтервал		0.195		
32	Оцінка якості змішування				
33	Коефіцієнт варіації V		17.324	21.356	26.807
34	Похибка коефіцієнту варіації s _v		3.149	3.780	4.974
35	Нижня межа довірчого інтервалу V _н		16.244	19.790	24.280
36	Верхня межа довірчого інтервалу V _в		18.557	23.190	29.922
37	Симетричний коефіцієнти варіації V _с		17.401	21.490	27.101
38	Симетрична абсолютна похибка Δ _{vс}		1.156	1.700	2.821
39	Статистична частка визначення варіації		0.748	0.346	0.126
40	Усереднений довірчий інтервал варіації		0.906		
41	Статистична частка варіації		13.017	7.433	3.405
42	Усереднений коефіцієнт варіації		19.560		
43	Усереднен. довірчий інтервал варіації		0.906		
44	Обсяг вибірки		18	20	20
45	Прийнятий рівнь значущості		0.05	0.05	0.05
46	Критичний критерій Стюдента		2.110	2.093	2.093

У даному разі виконується інтервальне оцінювання середнього арифметичного з використанням статистичної функції **MS Excel ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ**, у межах якого повинно знаходитися значення Y_0 . З табл. 11.120 видно, що ця вимога виконується для всіх трьох повторень з рівнем значущості α .

Перевірка належності всіх вибірок до однієї генеральної сукупності здійснюється оцінкою статистичної значущості різниці між парами середніх арифметичних вибірок з використанням критерію Стюдента чи за порівнянням їхніх довірчих інтервалів, виходячи із визначеної нами рівності всіх вибірових дисперсій, як представлено у підрозділах **7.3.7.3 Двовибірковий гомоскедастичний t-тест** чи **7.3.7.3.1 Розрахункове виконання двовибіркового t-тесту із статистично рівними дисперсіями**.

Більш доцільно використовувати останній спосіб, для наочності здійснюючи побудову блокових діаграм з графічним представленням середнього, його похибки і довірчого інтервалу для середнього арифметичного (див. рис. 2.19 на с. 117), яке виконується у ППП **Statistica** (рис. 11.120).

З його аналізу бачимо, що перша вибірка на рівні значущості α не має загального інтервалу середнього з іншими двома, що свідчить про її неналежність до їх генеральної сукупності.

Очевидно це повторення було виконане хибно і при дослідженнях його слід замінити, виконавши додаткові заміри.

Статистичну однорідність — рівність всіх вибірових дисперсій, яка характеризує відтворюваність, тобто ступінь близькості один одного результатів вимірювань, через нерівну кількість повторень (вилучені значення у чарунках **C3** і **C19**) не можна визначати критерієм Кохрена (див. **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**), а так як кількість зразків більше чотирьох можна застосовувати критерій Бартлетта (див. **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта**).

Розглянемо його застосування для аналізу даних трифакторного експерименту, наведеного в табл. 11.120. Порядок розрахунків за виразами (11.78)–(11.82) подано на полі табл. 11.121.

З неї маємо $0.930 < 30.144$, тобто умова $B \leq \chi^2_{\alpha(k-1)}$ виконується, отже, можна прийняти гіпотезу про відтворюваності дослідів.

Використовуючи дані табл. 11.124 отримуємо що розрахунковий Стюдента при порівнянні вибірок 1–2, 1–3 і 2–3 відповідно становить 0.819, 1.61 і 0.87 при критичному значенні 2.026, 2.026 і 2.023.

Так як маємо $t < t_{\alpha(v)}$, нульова гіпотеза про рівність між коефіцієнтами варіації всіх пар вибірок приймається з рівнем значущості α .

Верхня межа довірчого інтервалу усередненого коефіцієнту варіації $V_{\text{ус.в}}$ розрахована за формулою (1.106) чи (1.107) повинна бути менша від допустимого коефіцієнта варіації V_d за відповідними вимогами.

За умови $n < 30$, тобто для визначення якості змішування використовуються розрахункові формули (1.102) і (1.106) та статистична функція Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х**, при визначенні точності дозування, яке виконується при $n=30$ — розрахункові формули (1.103) і (1.107) та функція **НОРМ.СТ.ОБР(1- α /2)**.

Результати розрахунків, виконаних за формулами, наведеними на полі табл. 11.124 показують, що отримана величина усередненого середнього, яка становить 3.336, практично відрізняється від середньої арифметичної повторення 3.345, розрахованої за всім масивом даних. Тоді, як усереднений коефіцієнт варіації, який становить 19.56 % значно менший (в 1.12 разу) за його середнє значення 21.829 %, розраховане за повторностями.

У результаті нами визначено, забезпечує продуктивність видачі суміші (3.36 ± 0.20) кг/с з коефіцієнтом варіації (19.6 ± 0.9) %.

Таким чином отримуються значення \bar{x}_{yc} і V_{yc} для всіх повторень, з яких при регресійному аналізі показників оцінки дозаторів і змішувачів формують прийнятну матрицю плану експериментальних досліджень для визначення продуктивності роботи та якості змішування.

При текстовому чи табличному представленні результатів регресійного аналізу слід навести таку інформацію (використовуючи рис. 11.51, с. 738 і табл. 11.46, с. 739 та рис. 11.100, с. 823 і табл. 11.84, с. 824):

- число об'єктів дослідження;
- описову статистику (\bar{x} і s) для залежної і кожної незалежної ознак;
- результати попереднього парного кореляційного аналізу кожної з незалежних ознак із залежною ознакою (із зазначенням значень r для кожного коефіцієнта кореляції), а також незалежних ознак між собою;
- якщо в записі рівняння використовуються значення нестандартизованих регресійних коефіцієнтів B , то необхідно включати в рівняння константу a . Якщо ж використовуються стандартизовані регресійні коефіцієнти β , то константа a не включається;

— подати рівняння регресії (функцію відгуку) зі значущими коефіцієнтами B з наведенням кількості значимих цифр згідно вимог підрозділу **5.16 Правила подання результатів вимірювань** (як приклад див (11.50);

— список безрозмірних коефіцієнтів β у порядку убутання їх значень, оскільки цей список дозволяє судити про порядок прогностичних ознак (незалежних ознак) за силою їх впливу на залежну ознаку;




Рис. 11.120. Блокова діаграма

- точні значення p і стандартні похибки для кожного з регресійних коефіцієнтів B і β з наведенням прийнятого рівня значущості;
- оцінку адекватності моделі, подавши значення критерію Фішера у порівнянні його з критичним;
- оцінку роботоздатності моделі, подаючи коефіцієнт детермінації у порівнянні з критичним;
- оцінку інформаційної спроможності моделі, подаючи значення критерію Фішера у порівнянні його з критичним та наводячи її інформаційний рівень;
- діаграму розсіювання фактичних (як приклад див. рис. 11.66 а на с. 752) і розрахованих (передбачуваних за регресійною моделлю) значень (як приклад рис. 11.68, с. 753) залежної ознаки;
- у разі простого регресійного аналізу навести графік регресійної прямої з відображенням ліній, відповідних межах довірчих інтервалів навколо лінії регресії (як приклад лив. рис. 2.23, с. 121) [5];
- у разі багатофакторного регресійного аналізу визначити оптимальну точку і навести тривимірні поверхні другого порядку парних залежностей (як приклад див. рис. 2.26, с. 122) та виконати аналіз впливу факторів на функцію відгуку.

12. РЯДИ ДИНАМІКИ. ГЕНЕРАЦІЯ ТА ЗГЛАДЖУВАННЯ

12.1. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Динаміка (в статистиці) — це зміна явища у часі. Ряд динаміки (часовий ряд) — послідовність значень показника, прив'язаних до моментів або інтервалах часу. Окреме значення показника — рівень ряду [47].

При аналізі динаміки розглядаються три складові частини (компоненти) ряду динаміки:

T — тренд (основна тенденція);

S — коливання;

E — випадкова складова.

Найчастіше використовуються дві моделі рядів динаміки (моделі сезонності):

— адитивна (сума): $y_t = T + S + E$;

— мультиплікативна (добуток): $y_t = T \cdot S \cdot E$.

Адитивна модель будується за такими формулами:

$$T = a + b \cdot t; \quad (12.1) \quad S = 1 + f \cdot \sin(0.5236 \cdot t); \quad (12.2)$$

$$E = 1 + g \cdot N(0;1); \quad (12.3) \quad y_t = T + S + E. \quad (12.4)$$

Мультиплікативна модель будується за такими формулами:

$$T = a + b \cdot t; \quad (12.5) \quad S = c \cdot \sin(0.5236 \cdot t); \quad (12.6)$$

$$E = d \cdot N(0;1); \quad (12.7) \quad y_t = T \cdot S \cdot E. \quad (12.8)$$

Згладжування часових рядів — це метод локального усереднення, що дозволяє вивчати загальний характер динаміки.

При побудові ковзної середньої знаходять середнє значення на інтервалі фіксованої довжини (бажано непарної кількості), причому початок інтервалу зміщується за часом. Отримане згладжені значення “прив’язують” *до середини інтервалу* за часом.

Інтервал згладжування вибирають так, щоб видалити випадкові відхилення, але зберегти тренд і коливання. Згладжування з періодом 12 місяців видаляє не тільки випадкову складову, але і сезонні коливання [47].

12.2. КОМПОНЕНТИ ДИНАМІКИ




Рисунок 12.1. Випадкові числа з нормальним розподілом $N(0;1)$

Для знайомства з моделями динаміки згенеруємо їх ряди і побудуємо їх графіки відповідно до значень $n=120$; $a=7$; $b=0.5$; $c=4$; $d=0.6$; $f=0.2$; $g=0.05$. При цьому визначимо адитивну і мультиплікативну моделі [47].

Для них створюємо відповідні таблиці, які заповнюються відповідно за формулами (12.1)–(12.4) для адитивної моделі і формулами (12.5)–(12.8) для мультиплікативної моделі. Ці таблиці містять стовпчики (рис. 12.1):

$y(t)$ – ряд динаміки;

t – час, $t=1...n$;

T – тренд;

S – сезонні коливання;

E – випадкова складова.

Випадкові числа з нормальним розподілом $N(0;1)$

генеруються натисненням **Данные** (1), потім

Анализ данных (2) і на однойменній панелі

Анализ данных (рис. 12.1) з **Инструменты анализа**

вибрати **Генерация случайных чисел** (3) і

натиснувши **ОК** (4) перейти на однойменну панель

Генерация случайных чисел. На ній вибираємо **Распределение: Нормальное** (5), задати **Среднее = 0** (6) і **Стандартное отклонение = 1** (7) та у **Параметры вывода**

вказати **Выходной интервал: \$D\$7:\$D\$126** (див. табл. 12.1) (8) та натиснути **ОК** (9).

На рис. 12.2 наведено графіки рядів динаміки нестационарного випадкового процесу за математичним очікуванням для адитивної та мультиплікативної моделі, побудованих за даними табл. 12.1.

Таблица 12.1. Вихідні дані динаміки										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Вихідні дані									
2	n	a	b	c	d	f	g			
3	120	7	0.5	4	0.8	0.2	0.05			
4										
5	Аддитивна модель					Мультиплікативна модель				
6	t	T	S	E	$y(t)$	t	T	S	E	$y(t)$
7	1	7.5	2.000	-0.194	9.306	1	7.5	1.100	0.990	8.170
8	2	8.0	3.464	1.005	12.469	2	8.0	1.173	1.050	9.857
9	3	8.5	4.000	-0.500	12.000	3	8.5	1.200	0.975	9.945
B7=\$B\$3+\$C\$3*A7 C7=\$D\$3*SIN(0.5236*A7) D7=СУММ(B7:D7) G7=\$B\$3+\$C\$3*F7 H7=1+\$F\$3*SIN(0.5236*F7) I7=1+\$G\$3*D7 J7=G7*H7*I7										
123	117	65.5	-4.000	1.217	62.717	117	65.5	0.800	1.061	55.588
124	118	66.0	-3.464	-0.530	62.007	118	66.0	0.827	0.974	53.124
125	119	66.5	-1.999	0.403	64.904	119	66.5	0.900	1.020	61.058
126	120	67.0	0.001	-0.362	66.638	120	67.0	1.000	0.982	65.789

На них також наведено лінійні тренди (див. підрозділ 11.4.1.1.3 Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel).




Рисунок 12.2. Діаграма динаміки нестационарного процесу за математичним очікуванням (а – адитивна; б – мультиплікативна):

1 – тренд (основна тенденція); 2 – ряд динаміки; 3 – лінія тренду ряду динаміки.

З рис. 12.2 бачимо, що кут нахилу тренду основної тенденції до осі абсцис дещо більший за кут нахилу лінії тренду ряду динаміки до цієї осі, що пояснюється впливом випадкової складової.

Нестационарність того чи іншого випадкового процесу може бути за математичним очікуванням, дисперсією і затим та другим одночасно.

Найбільш часто той чи інший випадковий процес є нестационарним (причому лінійно) за математичним очікуванням [115], як це показано на рис. 12.2. На нестационарність за математичним очікуванням цього коливного процесу вказує той факт, що пряма лінія тренду ряду динаміки, яка апроксимує криву 2, нахилена до осі абсцис під деяким кутом α .

Таким чим для виключення нестационарності, тобто перетворення лінійно нестационарного коливного процесу у стаціонарний за математичним очікуванням масив, лінію тренду ряду динаміки слід повернути проти за ходом годинникової стрілки на той же кут $-\alpha$.

При цьому нові координати абсцис τ і ординат ψ відповідно старої системи координат xOy набувають вигляду [170]

$$\tau = t \cdot \cos \alpha - y_t \cdot \sin \alpha; \quad (12.9)$$

$$\psi = t \cdot \sin \alpha + y_t \cdot \cos \alpha. \quad (12.10)$$

Коефіцієнт b лінійного рівняння лінії тренду ряду динаміки, за яким визначається кут повороту α , знаходиться з використанням статистичної фу-

нкції **MS Excel НАКЛОН** (див. Додаток А).

Після оброблення експериментальних даних з урахуванням залежностей (12.9) і (12.10) отримано новий масив ординат, який представляє практично стаціонарний процес коливань.

Проте через вплив випадкової складової лінія тренду ряду динаміки не стає паралельною осі абсцис. Для досягнення цього слід дещо корегувати значення коефіцієнта b , беручи його у межах від його значення для лінії тренду ряду динаміки до значення для тренду основної тенденції.

Крім того може виникати явище, коли після повороту осей значення осі τ не будуть завжди зростаючими. У цьому разі значення $\psi(\tau)$ слід ранжувати за зростанням по τ [47, 115].

На рис. 12.3 наведено графіки рядів динаміки, побудованих за даними табл. 12.1.




Рисунок 12.3. Діаграма динаміки стаціонарного процесу за математичним очікуванням (а – адитивна; б – мультиплікативна):

1 – ряд динаміки; 2 – лінія тренду ряду динаміки.

12.3. ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

12.3.1. Згладжування за допомогою лінійного тренду

У якості прикладу виконання згладжування (лінійної фільтрації, яка застосовується для згладжування зашумлених даних) нами використовуються експериментальні дані (обсяг вибірки взято $n=600$, тобто кратним кількості місяців в році чи годин у добі [47]) прояву деякого явища у залежності від часу (табл. 12.2).

Рівняння лінійного тренду можна одержати методами регресійного аналізу (див. підрозділ 11.4.1.1.3 Використання лінії тренду для визначен-

ня параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel) чи розрахувати статистичною функцією MS Excel ПРЕДСКАЗ (див. Додаток А).

Сама лінія тренду наведені на рис. 12.5, лінія 2.

Застосування лінійної фільтрації задається в діалоговому вікні **Формат линии тренда**. Однак, результат лінійної фільтрації (ковзне середнє) — це не тренд. Ковзне середнє є лінією, яка зображує ряд значень, отриманих шляхом усереднення заданої кількості точок даних, розташованих *зліва* від поточної (результуючої) точки, тобто застосовується *несиметричні алгоритми лінійної фільтрації*.

Для додавання лінії змінного середнього (результату лінійної фільтрації) слід виділити діаграму і діалоговому вікні **Формат линии тренда** виділити елемент **Линейная фильтрация** (1) і в полі **Точки: 7** (2) задати період фільтрації. Період являє собою кількість точок даних зліва, за якими обчислюється ковзне середнє, та натиснути (3).

Таблица 12.2. Вихідні дані динаміки

	A	B	C	D	E	F	G
1	t	y(t)	y(t) _{кв.сз}	y(t) _{кв.уз}	y(t) _{ср}	y(t) _{ксп}	y(t) _{кв}
2	1	132.5			100.8		
3	2	88.5		88.5	100.8		
4	3	82.4	83.4	91.8	100.8	101.1	
5	4	73.0	72.0	87.1	100.8	81.3	77.7
6	5	60.9	62.7	80.8	100.8	72.1	65.6

$C4=(B2+4*B3+6*B4+4*B5+B6)/16$
 $D3=CPЗНАЧ(\$B\$2:B2)*(1-(2/(CЧЕТ(\$B\$2:B2)+1)))+B3*(2/(CЧЕТ(\$B\$2:B2)+1))$
 $E1=CPЗНАЧ(\$B\$2:\$B\$601)$
 $F4=CPЗНАЧ(B2:B4)$ $G5=CPЗНАЧ(B2:B8)$

595	594	136.5	136.8	100.5	100.8	139.4	135.2
596	595	135.2	134.4	100.6	100.8	137.0	136.5
597	596	128.5	133.8	100.6	100.8	133.4	135.1
598	597	139.8	134.7	100.7	100.8	134.5	133.3
599	598	133.6	134.2	100.8	100.8	134.0	
600	599	132.6			100.8	135.3	
601	600	127.2			100.8	131.1	




Рисунок 12.4. Виконання лінійної фільтрації

Розгледіти тенденцію зміни даних в ковзному середньому легше, ніж в незгладжених даних. На рис. 12.6 показаний графік зі змінним середнім, обчисленим по семи періодах (тобто усереднюються сім *зліва* від поточної) [171].

Як видно, лінія змінного середнього (лінія 2) більш згладжена за вихідну лінію і на ній добре проявляється тенденція до збільшення значень. Слід звернути увагу що вона починається не з першої точки даних.



Рис. 12.5. Отримання лінії тренду та створення ряду ковзної середньої пакетом **Анализ данных**:

1 – вихідні дані; 2 – лінійний тренд; 3 – ковзна середня, створена пакетом **Анализ данных**.




Рис. 12.6. Лінійна фільтрація з використанням лінійного тренду;
1 – вихідні дані; 2 – лінійна фільтрація трендом.

У прикладі, показаному на рис. 12.6, вона починається з сьомої точки, оскільки період усереднення дорівнює 7. Значення її першої точки дорівнює середньому арифметичному перших семи значень вихідних точок.

Значення другої точки змінного середнього — це середнє арифметичне вихідних точок з номерами від 2 до 8 і т.д. Чим більше період усереднення, тим більше гладкою буде лінія змінного середнього, проте при збільшенні інтервалу вона коротшає.

Несиметричні алгоритми лінійної фільтрації (до них відноситься ковзне середнє, що використовується в Excel) застосовуються в техніці для фільтрації в реальному часі, тобто коли наступні значення в кожен момент часу невідомі. Коли вони відомі, застосовувати несиметричний фільтр не має сенсу. В математиці розроблені більш досконалі симетричні фільтри, що обчислюють тренд у всіх точках діапазону (і за його межами) та забезпечують більш високу точність, ніж ковзне середнє.

Також можна обчислювати ковзне середнє ряду даних статистичною функцією **MS Excel СРЗНАЧ**. Це дає змогу виконувати більш досконалу симетричну фільтрацію, “прив’язуючи” згладжені значення “прив’язують” *до середини інтервалу* за часом, а також додати лінію змінного тренда в діаграму, тип якої не підтримує тренди, наприклад, об’ємний графік.

12.3.2. Ковзна проста середня, знайдена ПА MS Excel **Анализ данных**




Рисунок 12.7. Створення ковзної середньої ПА MS Excel **Анализ данных**.

Створення ковзної середньої пакетом аналізу MS Excel **Анализ данных** виконується натисненням **Данные** (1), потім **Анализ данных** (2) і на однойменній панелі **Анализ данных** (рис. 12.1) з **Инструменты анализа** вибрати **Скользящее среднее** (3) і натиснувши **OK** (4) перейти на однойменну панель **Скользящее среднее**. На ній вказуємо **Входной интервал: \$B\$1:\$B\$501** (5)

та **Выходной интервал: \$F\$1:\$F\$501** (6), відмічаємо **Вывод графика** (7) та **Стандартные погрешности** (8) (див. табл. 12.2) (9) та натиснути **OK** (10) [47].

На рис. рис. 12.5 це лінія 3, отримана за табл. 12.2 (стовпець Е).

12.3.3. Ковзна змінна середньозважена

При побудові виваженої середньої кожне усереднювати значення враховується зі своїм ваговим коефіцієнтом (вагою). Сума зважених значень ділиться на суму ваг, наприклад [47]

$$\bar{y}_t = \frac{y_{t-1} \cdot w_{t-1} + y_t \cdot w_t + y_{t+1} \cdot w_{t+1}}{w_{t-1} + w_t + w_{t+1}}. \quad (12.11)$$

Часто використовують біноміальні вагові коефіцієнти за трикутником Паскаля. Наприклад, усереднення по 5 точкам виглядає наступним чином:

$$\bar{y}_t = \frac{y_{t-2} + 4y_{t-1} + 6y_t + 4y_{t+1} + y_{t+2}}{16}. \quad (12.12)$$

Результат розрахунків змінної середньозваженої, виконані за виразом (12.12) наведено в табл. 12.2 (стовпець **С**) а її графік подано на рис. 12.8 (лінія 2).

12.3.4. Згладжування за допомогою експоненційно зваженої ковзної середньої

Згладжене значення \bar{y}_t обчислюється за поточним рівнем ряду y_t і попереднього згладженому рівню \bar{y}_{t-1} [47]

$$\bar{y}_t = \alpha \cdot y_t + (1 - \alpha) \bar{y}_{t-1}, \quad (12.13)$$

де α – параметр згладжування, $\alpha = 2/(n-1)$.

Якщо перетворити наведені вище співвідношення до стандартного вигляду ковзної середньої зваженої, то вагові коефіцієнти будуть спадати по експоненті.

Результати згладжування за допомогою експоненційно зваженої ковзної середньої наведено в табл. 12.2 (стовпець **Д**) а її графік подано на рис. 12.8 (лінія 4).

Слід звернути увагу, що при обчисленні згладжування за формулами використовується досконало симетрична фільтрація, як це застосовано у [47].




Рис. 12.8. Види лінійної фільтрації;

1 – вихідні дані; 2 – ковзна змінна середньозважена; 3 – ковзна проста середня;
4 – експоненційно зважена ковзна середня; 5 – середнє значення.

12.3.5. Нестационарність випадкового процесу за дисперсією

Нестационарність випадкового процесу за дисперсією перевіряється оцінкою однорідності сукупності дисперсій відтворюваності, які виконуються за критеріями Кохрена, Бартлетта чи Фішера–Снедекора, описаними відповідно у підрозділах **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена**, **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Бартлетта** та **11.9.4.3 Критерій згоди Фішера–Снедекора**.

За ними виконуються порівняння дисперсій, розрахованих для згладжених значень прийнятого періоду усереднення. Якщо перевірка на відтворюваність дає негативний результат, наявна нестационарність процесу за дисперсією і виявлену нестационарну ділянку (період) слід вилучити.

13. ВИКОНАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

13.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кластерний аналіз — це добре і давно відома задача попередньої класифікації спостережень. Раніше все класифікаційні завдання такого роду вирішувалися на інтуїтивному рівні, без будь-яких кількісних оцінок того, наскільки вдалим виявилось інтуїтивно запропоноване рішення. З появою ЕОМ з'явилася можливість формалізувати цей процес з використанням статистичних моделей [51].

Під кластером розуміються група об'єктів, які характеризуються властивістю щільності (щільність об'єктів усередині кластера вище, ніж поза ним), дисперсією, відокремленістю від інших кластерів, формою (наприклад, кластер може мати обрис гіперсфери або еліпсоїда), розміром.

Застосування кластерного аналізу дає змогу виконувати багатомірну класифікацію за аналізом ряду ознак об'єкта.

У цілому методи кластеризації діляться на *агломеративні* (агломерат — скупчення) та *ітеративні дивізивні* (*division* — ділення, поділ).

В агломеративних, або об'єднувачих методах виконується послідовне об'єднання найбільш близьких об'єктів в один кластер. Цей процес можна навести на графіку у вигляді дендрограми, або дерева об'єднань. Таке подання досить зручне і дозволяє наочно представити кластеризацію агломеративними алгоритмами.

Вихідними даними для аналізу можуть бути власне об'єкти і їхні параметри. Дані для аналізу можуть бути також представлені матрицею відстаней між об'єктами, у якій на перетині рядка з номером i та колонки з номером j записана відстань відповідно між i -м і j -м об'єктом.

Відстань між об'єктами — один із вимірів подібності, і чим менше відстань між об'єктами, тим вони більш схожі.

Для вибору метрики, тобто, виміру відстані між об'єктами, використовують евклідову метрику, наприклад, якщо об'єкт описується двома параметрами, то він може бути зображений точкою на площині, а відстань між об'єктами — це відстань між точками, розрахована за теоремою Піфагора.

Якщо просто прийняти абсолютні значення й просумувати їх, то вийде так звана манхеттенська відстань, або “відстань міських кварталів”, тобто шлях переміщення людини вулицями міста.

У ППП **Statistica** доступні такі міри подібності об'єктів: евклідова метрика, квадрат евклідової метрики, манхеттенська відстань, або “відстань міських кварталів”, метрика Чебишева, метрика Мінковського та інші.

У ній реалізовані агломераційні методи кластеризації:

- **joining (tree clustering)** — об'єднання (деревовидна кластеризація);
- **two-way joining** — двоходове об'єднання;
- **k-means clustering** — метод k -середніх.

Перед початком класифікації дані *стандартизуються (нормалізуються)* — за виразом (1.74), с. 60. Для цього краще використовувати функцію **Excel НОРМАЛИЗАЦИЯ** (табл. 13.1). Отримані в результаті стандартизації змінні мають нульове середнє й одиничну дисперсію.

В **Statistica** можна вибрати правила ієрархічного об'єднання кластерів:

Single linkage — метод одиночного зв'язку;

Complete linkage — метод повного зв'язку;

Unweighted pair group average — незважений метод “середнього зв'язку”;

Weighted pair group average — зважений метод “середнього зв'язку”;

Weighted centroid pair group (median) — зважений центроїдний метод;

Ward method — метод Уорда.

Дані алгоритми різняться правилами об'єднання об'єктів у кластери.

У *методі одиночного зв'язку* спочатку поєднуються два об'єкти, що мають між собою максимальну подібність. На наступному кроці до них приєднується об'єкт із максимальною мірою подібності з одним з об'єктів кластера. Таким чином, процес триває далі. Недолік цього методу — утворення занадто великих “довгастих” кластерів.

Метод повних зв'язків дозволяє усунути зазначений недолік. Тут міра подібності між об'єктом і кандидатом на включення в кластер і всіма членами кластера не може бути менше деякого граничного значення.

У *методі середнього зв'язку* міри подібності між кандидатом і членами кластера осереднюються — береться середньоарифметичне мір подібності.

Таблиця 13.1. Натуральні і стандартизовані значення показників, 2004 р.

	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ
2		Натуральні значення				Стандартизовані значення			
3	Сортоз разок	Висота рослини, см	Висота штамбу, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків на центральній гілці, шт.	Висота рослини-2004	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004	Кількість стручків на центральній гілці-2004
4	K-3274	70,8	19,3	4,6	26,2	-0,57	1,30	-2,25	-0,15
5	K-4152	70,6	11,9	7,0	32,4	-0,62	-0,15	-0,36	1,30
6	BW4=НОРМАЛИЗАЦИЯ(BS4;CPЗНАЧ(BS\$4:BS\$28);СТАНДОТКЛОН.B(BS\$4:BS\$28))								
7	K-3966	73,4	6,8	7,3	24,9	-0,01	-1,16	-0,14	-0,46
8	K-3385	75,3	6,8	8,5	23,8	0,41	-1,15	0,85	-0,72
9	K-3255	75,1	11,5	8,5	21,1	-0,55	-0,22	-0,17	-0,15
23	K-3872	68,0	11,4	7,4	21,4	-1,18	-0,26	-0,08	-1,28
24	K-4133	69,9	11,4	7,2	28,4	-0,75	-0,25	-0,23	0,36
25	K-3347	79,9	13,4	7,6	22,2	1,42	0,15	0,13	-1,09
26	BZ28=НОРМАЛИЗАЦИЯ(BV28;CPЗНАЧ(BV\$4:BV\$28);СТАНДОТКЛОН.B(BV\$4:BV\$28))								
27	K-2667	80,6	5,7	9,2	35,3	1,56	-1,38	1,35	1,97
28	K-3961	70,7	13,4	6,1	28,2	-0,58	0,14	-1,06	0,30

Ідея ще одного агломератного методу — *методу Уорда* полягає в тому, щоб проводити об'єднання, які дають мінімальний приріст усередині групової

суми квадратів відхилень. Відмічено, що метод Уорда призводить до утворення кластерів приблизно рівних розмірів, що й мають форму гіперсфер.

При **методі групування k -середні (k -means clustering)** дія виконується безпосередньо над об'єктами, а не з матрицею подібності, у ньому об'єкт ставиться до того класу, евклідова відстань до якого мінімальна [172].

В якості прикладу розглянуто фрагмент вибірки біометричних показників, наведені в табл. 13.1. На ній представлені як вихідні, так і стандартизовані дані.

13.2. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРУПУВАННЯ “ k -СЕРЕДНІ”

Цей метод кластеризації використовується коли вже є гіпотеза щодо кількості кластерів k (за спостереженнями або за змінним) і Приклад полягає в створенні k кластерів так, щоб вони були настільки різні за взаємозв'язками, наскільки це можливо, тобто розташованих на можливо більших відстанях один від одного. Робоча гіпотеза методу групування “ **k -середні**” передбачає можливість виділення відповідних кластерів, число k яких задається дослідником, виходячи з особливостей досліджуваної вибірки, який представляє собою певну групу одиниць обсягом n , та вимог до класифікації.

Цей метод класифікації дає змогу кількісно представлення робочих гіпотез відносно відмінності вибірки за певним проявом мінливості. Він найбільш часто використовуються в біології, так як найбільш відповідає класифікації досліджуваної вибірки за певними ознаками і властивостями. У цьому випадку визначаються відмінні за природою прояву мінливості типи і диференційна оцінка досліджуваного об'єкту за типами. Результати інтерпретуються в залежності від мети, а надійність класифікації і можливості змістовної інтерпретації визначаються добором оцінюваних ознак [128].

Для кластеризації стандартизовані дані слід скопіювати і вставити до листа ППП **Statistica**, перейменувати колонки і рядки у відповідності з їхніми назвами, наведеними у табл. 13.1 і форматувати дані (рис. 13.1). Перейменування колонок представлено на рис. 2.5. Для перейменування рядків слід двічі клацнути на його назві (номері) (1) і ввести нове найменування. Починати слід із верхнього рядка, тоді при натисненні клавіші **Enter**, виконується перехід вниз на наступний рядок.

У меню **Statistics** / **Анализ** (2) (рис. 13.1) відкрити модуль **Multivariate Exploratory Techniques** / **Многомерный разведочный анализ** (3) і вибрати **Cluster Analysis** / **Кластерный анализ** (4). На панелі **ClusteringMethod** / **Методы кластеризации** указати метод **K-means clustering** / **Кластеризация методом К средних** (5) і натиснувши **ОК** (6) перейти на панель **Cluster Analysis: K-Means Clustering** / **Кластерный анализ: кластеризация методом К средних**. На ній у вкладці **Quick** / **Быстрый** нати-

кнути кнопку **Variables** / **Переменные** (7) і в діалоговому вікні **Select variables for the analysis** / **Выбор переменных для анализа** вибрати дані для аналізу (8) і натиснувши **OK** (9) повернутись на панель **Cluster Analysis: K-Means Clustering** / **Кластерный анализ: кластеризация методом К-средних**.




Рис. 13.1. Вибір дій при кластерному аналізі

У вкладці **Advanced** / **Дополнительно**, так як ми кластеризуємо змінні, призначаємо **Cluster: Cases (rows)** / **Объекты: Наблюдения (строки)** (10), у рядку **Number of clusters: 5** / **Число кластеров: 5** (11) призначаємо кількість кластерів, на які слід розбити вибірку; у рядку **Number of iterations: 15** / **Число итераций: 15** (12) задаємо число ітерацій при побудові класів та вибираємо **Sort distances and take observations at constant intervals** / **Сортировать расстояния и выбрать набл. на постоянных интервалах** (13). Натиснувши **OK** (14) переходимо на панель **K-Means Clustering Results** / **Результаты метода К-средних** у вкладку **Advanced** / **Дополнительно** (рис. 13.2).




Рис. 13.2. Вкладка **Advanced**/Дополнительно панелі вибору дій для методу **k-середні**

Натиснення кнопки **Summary** / **OK** (1) або виконання процедури **Summary: Cluster means & Euclidean distances** / **Средние кластеров и евклидовы расстояния** (1) видає середні кластерів (табл. 13.2) і евклідові відстані між кластерами (табл. 13.3).

Таблица 13.2. Середні кластерів

перемен.	Средн. класт. (Биометрия-K.sta)				
	Кластер No. 1	Кластер No. 2	Кластер No. 3	Кластер No. 4	Кластер No. 5
Висота рослини-2004	0.682600	0.98500	-0.113167	-1.07743	0.637333
Висота штамбу-2004	1.417000	-0.21700	-0.416333	0.12400	-0.873167
Кількість гілок-2004	0.205400	-1.72700	0.868500	-0.87243	0.266333
Кількість стручків на центральній гілці-2004	0.359800	-2.78400	1.031167	-0.18886	-0.646333

Таблица 13.3. Евклідові відстані між кластерами

Кластер Номер	Евклидовы расст. между кластерами (Биометрия-K.sta) Расстояния под диагональю Квадраты расстояний над диагональю				
	Но. 1	Но. 2	Но. 3	Но. 4	Но. 5
Но. 1	0.000000	4.094762	1.221198	1.558072	1.565732
Но. 2	2.023552	0.000000	5.634455	2.958738	2.273606
Но. 3	1.105078	2.373701	0.000000	1.435263	0.987139
Но. 4	1.248228	1.720098	1.198025	0.000000	1.360203
Но. 5	1.251292	1.507848	0.993549	1.166278	0.000000

У табл. 13.3 нижче нульової діагоналі наведені відстані, вище діагоналі — їхні квадрати. З неї видно, що відстань між другим і першим кластерами

становить 2.023552, у той час, як другим і третім вона дорівнює 2.373701.



Натиснення кнопки процедури  Analysis of variance /  Дисперсионный анализ (2) дозволяє одержати таблицю ДА, який проводиться за розрахунками міжгрупових і групових дисперсій кожної ознаки (табл. 13.4).

Таблица 13.4. Дисперсійний аналіз кластерів

перемен.	Дисперсионный анализ (Биометрия-K. sta)					
	Между SS	сс	Внутри SS	сс	F	значим. p
Висота рослини-2004	13.93991	4	10.05592	20	6.93120	0.001138
Висота штамбу-2004	15.80869	4	8.19160	20	9.64932	0.000163
Кількість гілок-2004	13.47275	4	10.52685	20	6.39923	0.001743
Кількість стручків на центральній гілці-2004	17.53391	4	6.46494	20	13.56076	0.000017

Оцінка відмінності середніх значень кластерів за використаними ознаками, виконана за критерієм Фішера F показує на скільки відповідні ознаки дискримінують кластери. З табл. 13.4 можна зробити висновок, що ознака **Кількість стручків на гілці-2004** є домінуючою.

Натисненням кнопки  Graph of means /  График средних (3) одержуємо середні значення кожної групи кластерів на лінійному графіку кластерів (рис. 13.3).








Рис. 13.3. Середні значення груп кластерів

Далі на цієї ж панелі запустивши процедуру  Members of each cluster& distances/  Элементы кластеров и расстояния (5), отримаємо розподіл сортотразків за кластерами — п'ять електронних таблиць із кластерами та назвами сортотразків, які потрапили в них (табл. 13.5, редагована).

Таблиця 13.5. Розподіл сортотразків за кластерами

	Элементы кластера номер 1 (Биометрия-К) и расстояния до центра кластера. Кластер содержит 5 набл.						
	K2104	K2518	K3875	K3965	K3816		
Расст.	0.543963	0.454048	0.564866	0.708015	0.664385		
	Элементы кластера номер 2 (Биометрия-К) и расстояния до центра кластера. Кластер содержит 1 набл.						
	K3811						
Расст.	0.00						
	Элементы кластера номер 3 (Биометрия-К) и расстояния до центра кластера. Кластер содержит 6 набл.						
	K4152	K4151	K3260	K4063	K4060	K2667	
Расст.	0.688508	0.599871	0.772502	0.501915	0.601522	1.101225	
	Элементы кластера номер 4 (Биометрия-К) и расстояния до центра кластера. Кластер содержит 7 набл.						
	K3274	K3872	K3973	K4145	K3872	K4133	K3861
Расст.	0.940095	0.352351	0.309679	0.354869	0.704725	0.490994	0.362635
	Элементы кластера номер 5 (Биометрия-К) и расстояния до центра кластера. Кластер содержит 6 набл.						
	K3966	K3385	K2513	K3381	K3874	K3347	
Расст.	0.416534	0.346941	0.606627	0.541122	0.517640	0.683599	

З рис. 13.3 бачимо, що кластери 1 і 5, тобто сорти, які утворили ці кластери (див. табл. 13.5), мають відповідно найбільшу і найменшу висоту штамбу, кластери 2 і 4 — найбільшу і найменшу висоту рослини, кластери 3 і 2 — найбільшу і найменшу кількість стручків на гілці.

У результаті виконанні процедури  Descriptive statistics for each cluster /  Статистики для каждого кластера (4) створюється п'ять таблиць за статистичною характеристикою кожного кластера, одна з них (табл. 13.6) наведена у редагованому вигляді.

Таблиця 13.6. Статистична характеристика кластерів

перемен.	Описат.статистики для кластера 1 (Біометрія-К) Кластер содержит 5 набл.		
	Среднее	Стандарт отклон.	Дисперс.
Висота рослини-2004	0.682600	0.742023	0.550599
Висота штамбу-2004	1.417000	0.614116	0.377138
Кількість гілок-2004	0.205400	0.646617	0.418113
Кількість стручків на гілці-2004	0.359800	0.646508	0.417973
перемен.	Описат.статистики для кластера 2 (Біометрія-К) Кластер содержит 1 набл.		
	Среднее	Стандарт отклон.	Дисперс.
Висота рослини-2004	0.98500	0.00	0.00
Висота штамбу-2004	-0.21700	0.00	0.00
Кількість гілок-2004	-1.72700	0.00	0.00
Кількість стручків на гілці-2004	-2.78400	0.00	0.00
перемен.	Описат.статистики для кластера 3 (Біометрія-К) Кластер содержит 6 набл.		
	Среднее	Стандарт отклон.	Дисперс.
Висота рослини-2004	-0.113167	1.022588	1.045687
Висота штамбу-2004	-0.416333	0.585368	0.342656
Кількість гілок-2004	0.868500	0.945093	0.893200
Кількість стручків на гілці-2004	1.031167	0.569325	0.324131
перемен.	Описат.статистики для кластера 4 (Біометрія-К) Кластер содержит 7 набл.		
	Среднее	Стандарт отклон.	Дисперс.
Висота рослини-2004	-1.07743	0.460097	0.211690
Висота штамбу-2004	0.12400	0.548689	0.301060
Кількість гілок-2004	-0.87243	0.705001	0.497026
Кількість стручків на гілці-2004	-0.18886	0.624135	0.389544
перемен.	Описат.статистики для кластера 5 (Біометрія-К) Кластер содержит 6 набл.		
	Среднее	Стандарт отклон.	Дисперс.
Висота рослини-2004	0.637333	0.520567	0.270990
Висота штамбу-2004	-0.873167	0.795413	0.632682
Кількість гілок-2004	0.266333	0.530329	0.281249
Кількість стручків на гілці-2004	-0.646333	0.408689	0.167027

13.3. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ОБ'ЄДНАННЯ (ДЕРЕВОПОДІБНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ)

Виконаємо кластеризацію з використанням **joining (tree clustering)** методом приєднання (дерева кластеризації) (панель **ClusteringMethod:** / **Методы кластеризации** рис. 13.4.


Вибравши **Joining (tree clustering)** / **Иерархическая классификация** (1) і натиснувши **ОК** (2) перейдемо на панель **ClusterAnalysis:Joining (Tree Clustering):** /

Кластерный анализ: иерархическая классификация. Тут на вкладці **Quick** / **Быстрый** (рис. 13.5) виберемо дані для аналізу і перейдемо на вкладку **Advanced** / **Дополнительно**, де призначимо установки у відповідності з (рис. 13.5) — змінні призначити **Cluster: Cases(rows)** / **Объекты: Наблюдения(строки)** (1), одиничними зв'язуваннями **Amalgamation(linkage)rule: SingleLinkage** / **Правило объединения: Метод полной связи** (2) з евклідовими відстанями **Distance measure: Euclidean distances** / **Мера близости: Евклидово расстояние** (3).

За методом одиночного зв'язування (методом найближчого сусіда) **Amalgamation(linkage)rule: SingleLinkage** / **Правило объединения: Метод одиночной связи** відстань між

двома кластерами визначається відстанню між двома найбільш близькими об'єктами різних кластерів, пара яких утворює первинний кластер. Кожен наступний об'єкт приєднується до того кластеру, до одного з об'єктів якого він ближче.

При цьому відбувається утворення довгих кластерів ланцюгового вигляду. Цей метод має тенденцію утворювати невелике число великих кластерів, що часто не дає можливості ви-



значити, як багато кластерів перебуває в даних.

У той час, як відстані між кластерами за методом повного зв'язування, (методом “далекого сусіда”), тобто методом найбільш віддалених сусідів




Рис. 13.4. Панель вибору методу кластеризації

Рис. 13.5. Вкладка **Advanced** / **Дополнительно** методу **Joining (tree clustering)** / **Иерархическая классификация**

[Amalgamation(linkage)rule: SingleLinkage] / [Правило объединения: Метод полной связи] визначаються найбільшою відстанню між будь-якими двома об'єктами в різних кластерах (тобто “найбільш віддаленими сусідами”).

При цьому новий об'єкт приєднується до того кластеру, найдавший елемент якого знаходиться ближче до нового об'єкту, ніж найдавший елементи інших кластерів. Це правило є протилежним попередньому і більш жорстким. Тому тут спостерігається тенденція до виділення більшого числа компактних кластерів, що складаються з найбільш схожих елементів.

Цей метод зазвичай працює добре, коли об'єкти концентровані в різні “набори”. Якщо ж кластери мають у деякому роді видовжену форму або їхній природний тип є “ланцюговим”, то цей метод непридатний.

Метод середнього зв'язування або міжгруповий займає проміжне положення щодо крайнощів одиночного і повного методів. На кожному кроці обчислюється середня арифметична відстань між кожним об'єктом з одного кластера і кожним об'єктом з іншого кластера. Об'єкт приєднується до даного кластеру, якщо це середня відстань менше, ніж середня відстань до будь-якого іншого кластера. Цей метод дає більш точні результати, ніж інші методи.

Таким чином, різні методи кластеризації відповідають різним точкам зору на одну й ту ж структуру даних. Метод одиночного зв'язування відповідає принципу “друг мого друга — свій, хоч і ворог мені”. Результати методу повного зв'язування відповідають точці зору: “друг мого ворога — чужий, хоч і друг мені”. При цьому “друг” і “ворог” відрізняються відстанню, а “свій” і “чужий” — належністю до угруповання (кластеру). Інакше кажучи, стосовно однієї і тієї ж аналізованої структури метод одиночний зв'язку відповідає точці зору оптиміста, а метод повного зв'язку — песиміста. [123]

Натиснувши **ОК** (3) отримаємо панель [JoiningResults:] / [Результаты иерархической классификации] (рис. 13.6), де за допомогою кнопки [Vertical icicle plot] / [Вертикальная дендрограмма] (1) одержуємо дендрограму об'єднання сортозразків в кластери методом одиночних зв'язувань

[Amalgamation(linkage)rule: SingleLinkage] / [Правило объединения: Метод одиночной связи] (рис. 13.7) та методом повного зв'язування [Amalgamation(linkage)rule: SingleLinkage] / [Правило объединения: Метод полной связи] (рис. 13.8).




Рис. 13.6. Вкладка **Advanced** / **Дополнительно**

панелі вибору дій для методу

[Joining (tree clustering)] /

[Иерархическая классификация]




Рис. 13.7. Дендрограмма об'єднання сортозразків в кластери методом одиничних зв'язувань.












Рис. 13.8. Дендрограмма об'єднання сортозразків в кластери методом повного зв'язування

При натисненні кнопки  Descriptive statistics /  Описательные статистики (5) отримуємо значення середніх і стандартні відхили за сортозразками (табл. 13.7).

Натисненням кнопки процедури  Amalgamation schedule /  Схема объединения (2) виводиться табл. 13.8, яка представляє об'єднаний список кластерів, а кнопку процедури  Graph of amalgamation schedule /  График схемы объединения (3) — її графічне представлення (рис. 13.9). У разі виконання процедури  Distance matrix /  Матрица расстояний (4) одержуємо матрицю евклідових відстаней, представлену в табл. 13.9.

Лінії сітки на рис. 13.3 і 13.7–13.9, отримані засобами редагування зображень, подано для більш наочного представлення.

Таблиця 13.7. Середнє значення і стандартний відхил сортозразків

Наблюд.	Средние и станд. отклонения (Биометрия-K.sta)	
	Среднее	Стд. откл.
K-3274	-0.416500	1.459700
K-4152	0.045500	0.860494
K-4151	0.252000	1.186257
K-3966	-0.441250	0.514022
K-3395	-0.154250	0.939601
K-3260	0.724000	0.890038
K-2104	1.144750	0.779589
K-4063	0.261250	0.466341
K-2513	-0.518000	1.164536
K-4060	-0.104500	0.975592
K-2518	0.497250	0.948686
K-3381	-0.236000	0.906649
K-9272	-0.700250	0.836543
K-3911	-0.935750	1.658110
K-3673	-0.414500	0.767362
K-3875	0.178000	0.257879
K-3874	0.274750	0.579093
K-3965	0.675500	0.983049
K-4145	-0.777000	0.480668
K-3872	-0.700250	0.620890
K-4133	-0.217500	0.454056
K-3347	0.151000	1.026088
K-3816	0.835500	0.749602
K-2667	0.877000	1.524396
K-3961	-0.299750	0.635971

Таблица 13.8. Об'єднаний список кластерів

расст. объедин.	Схема объединения (Биометрия-К) Метод одиночной связи Евклидово расстояние																								
	Объект 1	Объект 2	Объект 3	Объект 4	Объект 5	Объект 6	Объект 7	Объект 8	Объект 9	Объект 10	Объект 11	Объект 12	Объект 13	Объект 14	Объект 15	Объект 16	Объект 17	Объект 18	Объект 19	Объект 20	Объект 21	Объект 22	Объект 23	Объект 24	Объект 25
.7118279	K3872	K4145																							
.7634429	K3973	K3861																							
.7990088	K3872	K4145	K3973	K3861																					
.8427212	K3385	K2513																							
.8431192	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133																				
.8547590	K4063	K3875																							
.9283932	K4152	K4060																							
.9336900	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872																			
.9657650	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872																	
.9670259	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875															
1.008043	K3874	K3347																							
1.065874	K3966	K3381																							
1.106030	K3966	K3381	K3385	K2513																					
1.223334	K3874	K3347	K3965																						
1.310448	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965												
1.334395	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513								
1.357845	K2104	K2518																							
1.391378	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518						
1.503952	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816					
1.579015	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816	K3260				
1.598011	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816	K3260	K4151			
1.718606	K3274	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816	K3260	K4151		
2.339787	K3274	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816	K3260	K4151	K2667	
2.574740	K3274	K4152	K4060	K3872	K4145	K3973	K3861	K4133	K3872	K4063	K3875	K3874	K3347	K3965	K3966	K3381	K3385	K2513	K2104	K2518	K3816	K3260	K4151	K2667	K3811




Рис. 13.9. Об'єднаний список кластерів, графічне
представлення табл. 13.8

Таблиця 13.9. Матриця евклідових відстаней

наблюд.	Евклидово расстояние (Биометрия-K)																								
	K3274	K4152	K4151	K3966	K3385	K3260	K2104	K4063	K2513	K4060	K2518	K3381	K3872	K3811	K3973	K3875	K3874	K3965	K4145	K3872	K4133	K3347	K3816	K2667	K3861
K3274	0.00	2.80	4.48	3.30	4.11	4.64	3.37	2.88	4.46	3.43	2.11	3.43	2.16	3.45	2.11	2.40	3.45	3.55	2.35	2.96	2.60	3.44	3.48	5.40	1.72
K4152	2.80	0.00	2.24	2.13	2.76	2.82	2.99	0.98	3.23	0.93	2.44	2.34	2.02	4.60	1.24	1.49	2.48	3.36	2.20	2.67	0.97	3.20	2.32	3.10	1.26
K4151	4.48	2.24	0.00	2.42	2.15	1.62	3.68	1.78	2.68	1.60	3.62	3.02	3.02	5.23	2.67	2.38	2.38	3.52	2.93	2.70	2.02	3.36	2.37	2.88	2.92
K3966	3.30	2.13	2.42	0.00	1.11	2.59	3.83	2.01	1.26	2.01	3.02	1.07	2.33	3.13	2.06	1.80	1.67	2.94	1.81	1.69	1.43	2.05	3.30	3.26	1.86
K3385	4.11	2.76	2.15	1.11	0.00	1.90	3.86	2.32	0.84	2.50	3.34	1.60	3.12	3.48	2.88	2.16	1.33	2.67	2.60	2.12	2.12	1.84	3.25	2.99	2.71
K3260	4.64	2.82	1.62	2.59	1.90	0.00	2.94	2.06	2.68	2.65	3.15	2.79	3.83	4.87	3.40	2.25	1.58	2.39	3.60	3.21	2.62	2.48	2.18	2.34	3.29
K2104	3.37	2.99	3.68	3.83	3.86	2.94	0.00	2.37	4.64	3.59	1.36	3.69	3.95	4.91	3.45	2.14	2.60	1.97	4.02	4.07	3.17	2.93	1.63	3.85	3.05
K4063	2.88	0.98	1.78	2.01	2.32	2.06	2.37	0.00	2.97	1.27	1.98	2.33	2.13	4.34	1.52	0.85	1.77	2.59	2.18	2.34	0.97	2.59	1.50	3.01	1.46
K2513	4.46	3.23	2.68	1.26	0.84	2.68	4.64	2.97	0.00	2.89	4.01	1.79	3.34	3.42	3.21	2.81	2.11	3.39	2.74	2.27	2.55	2.38	4.04	3.46	3.09
K4060	3.43	0.93	1.60	2.01	2.50	2.65	3.59	1.27	2.89	0.00	3.14	2.51	2.03	4.84	1.45	1.93	2.61	3.73	2.13	2.44	1.02	3.44	2.57	3.11	1.79
K2518	2.11	2.44	3.62	3.02	3.34	3.15	1.36	1.98	4.01	3.14	0.00	2.91	2.98	3.77	2.55	1.39	2.17	1.81	3.00	3.18	2.42	2.30	2.03	4.05	2.00
K3381	3.43	2.34	3.02	1.07	1.60	2.79	3.69	2.33	1.79	2.51	2.91	0.00	3.05	3.16	2.61	2.01	1.78	2.81	2.62	2.65	2.00	1.93	3.57	2.84	2.15
K3872	2.16	2.02	3.02	2.33	3.12	3.83	3.95	2.13	3.34	2.03	2.98	3.05	0.00	3.87	0.80	2.13	3.06	3.87	0.71	1.52	1.42	3.47	3.13	4.83	1.32
K3811	3.45	4.60	5.23	3.13	3.48	4.87	4.91	4.34	3.42	4.84	3.77	3.16	3.87	0.00	4.01	3.59	3.34	3.47	3.31	3.11	3.89	2.57	5.08	5.81	3.54
K3973	2.11	1.24	2.67	2.06	2.88	3.40	3.45	1.52	3.21	1.45	2.55	2.61	0.80	4.01	0.00	1.63	2.70	3.54	1.13	1.85	0.84	3.22	2.70	4.16	0.76
K3875	2.40	1.49	2.38	1.80	2.16	2.25	2.14	0.85	2.81	1.93	1.39	2.01	2.13	3.59	1.63	0.00	1.31	1.96	2.02	2.11	1.16	1.90	1.75	3.31	1.23
K3874	3.45	2.48	2.38	1.67	1.33	1.58	2.60	1.77	2.11	2.61	2.17	1.78	3.06	3.34	2.70	1.31	0.00	1.40	2.68	2.34	2.00	1.01	2.33	2.97	2.33
K3965	3.55	3.36	3.52	2.94	2.67	2.39	1.97	2.59	3.39	3.73	1.81	2.81	3.87	3.47	3.54	1.96	1.40	0.00	3.59	3.29	3.04	1.22	2.46	3.75	3.05
K4145	2.35	2.20	2.93	1.81	2.60	3.60	4.02	2.18	2.74	2.13	3.00	2.62	0.71	3.31	1.13	2.02	2.68	3.59	0.00	0.93	1.36	3.01	3.26	4.66	1.38
K3872	2.96	2.67	2.70	1.69	2.12	3.21	4.07	2.34	2.27	2.44	3.18	2.65	1.52	3.11	1.85	2.11	2.34	3.29	0.93	0.00	1.71	2.65	3.23	4.63	2.00
K4133	2.60	0.97	2.02	1.43	2.12	2.62	3.17	0.97	2.55	1.02	2.42	2.00	1.42	3.89	0.84	1.16	2.00	3.04	1.36	1.71	0.00	2.67	2.38	3.42	0.94
K3347	3.44	3.20	3.36	2.05	1.84	2.48	2.93	2.59	2.38	3.44	2.30	1.93	3.47	2.57	3.22	1.90	1.01	1.22	3.01	2.65	2.67	0.00	3.08	3.63	2.71
K3816	3.48	2.32	2.37	3.30	3.25	2.18	1.63	1.50	4.04	2.57	2.03	3.57	3.13	5.08	2.70	1.75	2.33	2.46	3.26	3.23	2.38	3.08	0.00	3.64	2.66
K2667	5.40	3.10	2.88	3.26	2.99	2.34	3.85	3.01	3.46	3.11	4.05	2.84	4.83	5.81	4.16	3.31	2.97	3.75	4.66	4.63	3.42	3.63	3.64	0.00	3.94
K3861	1.72	1.26	2.92	1.86	2.71	3.29	3.05	1.46	3.09	1.79	2.00	2.15	1.32	3.54	0.76	1.23	2.33	3.05	1.38	2.00	0.94	2.71	2.66	3.94	0.00

13.4. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ “TWO-WAY JOINING”

Виконаємо кластеризацію методом подвійної оцінки **two-way joining** (панель **Two-way joining** / **Двухходовое объединение**), коли одночасно кластеризуються випадки і змінні (панель **Clustering Method** / **Методы кластеризации** рис.13.10 а).

Натиснувши **ОК** перейдемо на панель **Cluster Analysis: Two-Way Joining** / **Кластерный анализ: двухходовое объединение**

(рис. 13.11). Тут, як описано вище, на вкладці **Quick** / **Быстрый** виберемо дані для аналізу і перейдемо на вкладку **Advanced** / **Дополнительно**, де відмітимо ☒ **Computed from data (Std. dev. / 2)** / ☒ **Вычисленное по данным (Стд.откл./2)** (1) і натиснувши **ОК** (2) перейдемо на панель **Two-Way Joining Results** / **Результаты двухходового объединения** (рис. 13.12).

На ній натиснувши кнопки **Summary** / **ОК** (1) або процедури **Summary: Two-way joining graph** / **Диаграмма двухходового объединения** (1) отримуємо результати кластеризації методом **two-way joining** (рис. 13.13).




Рис. 13.10. Панель вибору методу кластеризації **two-way joining**






Рис. 13.11. Вкладка **Advanced** / **Дополнительно** методу кластеризації **two-way joining**

У результаті запуску процедури **Descriptive statistics for cases (rows)** / **Описательные статистики для наблюдений (строк)** (2), отримуємо (табл. 13.7) (дія аналогічна дії кнопки процедури **Descriptive statistics** / **Описательные статистики** панелі **Joining Results** / **Результаты иерархической классификации** (рис. 13.6).

При виконанні процедури  Descriptive statistics for variables /  Описательные статистики для переменных (3) одержуємо середньоарифметичні і СКВ, а так як наші дані стандартизовані, вони відповідно дорівнюють 0 і 1.






Рис. 13.12. Вкладка  Advanced /  Дополнительно панелі вибору дій для методу кластеризації **two-way joining**.






Рис. 13.13. Результати кластеризації методом  Two-way joining /  Двухходовое объединение

За допомогою процедури  **Reordered data matrix** (4), яка є лише в ППП **Statistica 8.0**, одержуємо упорядковану матрицю даних (табл. 13.10).

Таблиця 13.10. Упорядкована матриця даних

Наблюд.	Переупорядоч. матриця (Біометрія-К)			
	Висота рослини-2004	Кількість стручків на гілці-2004	Кількість гілок-2004	Висота штамбу-2004
K3274	-0.56800	-0.15400	-2.24600	1.30200
K3260	0.66200	0.35400	1.97500	-0.09500
K2518	0.73200	0.33200	-0.68100	1.60600
K3973	-1.28500	0.38600	-0.80700	0.04800
K4145	-1.40100	-0.70200	-0.77400	-0.23100
K3861	-0.57700	0.30000	-1.06300	0.14100
K4151	-0.83900	0.66300	1.73900	-0.55500
K4152	-0.61700	1.30400	-0.35500	-0.15000
K4133	-0.74900	0.36100	-0.23000	-0.25200
K3872	-1.18200	-1.28400	-0.07800	-0.25700
K3966	-0.00700	-0.46200	-0.13900	-1.15700
K3875	0.10400	0.20400	-0.10800	0.51200
K3385	0.40600	-0.72400	0.85300	-1.15200
K2104	1.13000	1.00100	0.27800	2.17000
K4060	-1.10300	1.10200	0.22800	-0.64500
K4063	-0.34600	0.79000	0.27800	0.32300
K3816	-0.18800	0.88300	1.04100	1.60600
K3872	-1.78000	-0.22900	-0.90900	0.11700
K3874	0.85500	-0.42900	0.62500	0.04800
K3965	1.63500	-0.62100	0.49700	1.19100
K3347	1.42200	-1.09100	0.12800	0.14500
K2513	0.24600	-1.10700	0.64400	-1.85500
K3381	0.90200	-0.06500	-0.51300	-1.26800
K3811	0.98500	-2.78400	-1.72700	-0.21700
K2667	1.56400	1.97400	1.34600	-1.37600

14. ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

14.1. МЕТОДИ ОБРОБКИ ДАНИХ ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ

14.1.1. Бракування “підозрілих” даних за М. Ф. Деревиським

Значні відхилення врожаїв ділянок від середнього врожаю сорту (варіанти) викликані як випадковими і не випадковими причинами. У першому випадку відхилення не виходять за межі випадкового варіювання вибірових спостережень досліджуваного ознаки в конкретних умовах даного досвіду, і їх не можна визнати належними до іншої генеральної сукупності. Якщо ж буде доведено, що ймовірність появи будь якого відхилення є випадковою, то ця обставина може служити підставою для виключення його з обліку [50, 173].

Щоб виявити “підозрілі” дати (викиди) в дослідях з повтореннями, М. Ф. Деревиський [173] запропонував метод, аналогічний оцінці відхилень поділянкових врожаїв кожного сорту від середнього з урахуванням відмінностей у родючості повторностей. Розглянемо застосування цього метода на прикладі табл. 14.1, де наведені поділянкові урожаї восьми сортів озимої пшениці в п’яти повтореннях, взяті з табл. 14.26 на с. 927 [174].

При її розгляді неважко помітити значні коливання поділянкових врожаїв у деяких сортів. Так, різниця між крайніми врожаєми сорту *Харківська 63* становить 2.25 т/га, тобто 40.2 % середнього врожаю. З деякою підставою можна вважати “підозрілими” і дані інших сортів.

Щоб виявити “підозрілі” дати в дослідях з повтореннями, М. Ф. Деревиський запропонував метод, заснований на оцінці відхилень поділянкових урожаїв кожного сорту від середнього з урахуванням відмінностей у родючості повторностей [50].

Розрахунки виконуються з використанням програми **Excel**. Числові значення вихідних даних наведено в чарунках **B3:F10** табл. 14.1.

Відхилення $\Delta'_{ijн}$ врожаю ділянки одночасно від середнього врожаю сорту (повторності) та середнього врожаю ділянки (повторення) становить

$$\Delta'_{ijн} = \bar{x}_{ij} + \bar{x}_{..} + \bar{x}_{i.} + \bar{x}_{.j}, \quad (14.1)$$

де \bar{x}_{ij} – фактичний урожай i –го сорту на j –й ділянці;

$\bar{x}_{..}$ – середній урожай в досліді;

$\bar{x}_{i.}$ – середній урожай i –го сорту;

$\bar{x}_{.j}$ – середній урожай на j –й ділянці.

Таблиця 14.1. Бракування “підозрілих” даних дослідів
за М. Ф. Деревиським

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Сорт	Урожай ділянки, X					Середнє сортів x_i	Модуль відхилення урожаю Δ'					
2		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V	Макс.
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.19	0.36	0.01	0.32	0.38	0.41	0.41
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.91	0.67	0.11	0.18	0.11	0.27	0.67
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4.98	0.14	0.19	0.08	0.41	0.28	0.41
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.59	0.20	0.06	0.30	0.09	0.25	0.30
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.42	0.51	0.24	0.21	0.29	0.23	0.51
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.77	0.33	0.04	0.23	0.22	0.09	0.33
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.112	6.78	4.53	5.50	0.41	0.43	0.29	1.25	0.71	1.25
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	5.10	0.54	0.38	0.13	0.02	0.81	0.81
11	Середнє ділянок p_i	4.483	5.289	5.257	4.968	4.674	4.934	СКВ $s = 0.600$					
12	B11=CP3HAЧ(B3:B10) G3=CP3HAЧ(B3:F3) G11=CP3HAЧ(B3:F10) M15=M14*M11 M11=СТАНДОТКЛОН.В(B3:F10) M3=МАКС(H3:L3)							Ступінь вільності $\nu = 28$					
13								Рівень значущості $\alpha = 0.05$					
14								Значення критерію $\omega = 1.94$					
15								Випадкові коливання $\Delta = 1.16$					

H3=ABS(B3+\$G\$11-B\$11-\$G3) ... L3=ABS(F3+\$G\$11-F\$11-\$G3)

H10=ABS(B10+\$G\$11-B\$11-\$G10) ... L10=ABS(F10+\$G\$11-F\$11-\$G10)

Абсолютні числові відхилення Δ' для всіх поділянкових врожаїв сортів озимої пшениці, обчислені за рівнянням (14.1), наведені в чарунках **H3:L10** табл. 14.1, а в стовбцю **M3:M10** — їхнє максимальне значення Δ_{\max} .

Щоб знайти межі випадкових коливань відхилень Δ , визначається СКВ s вибірки дослідних даних використанням функції **СТАНДОТКЛОН.В** програми **Excel**. (значення подано у чарунці **M11**).

Вибракування результатів, тобто визнати спостереження помилковим і виключення його з обліку, з певним рівнем статистичної значущості α визначаються межами випадкових коливань величин

$$|\Delta_{\max}| \geq \omega s. \quad (14.2)$$

Критерій ω аналогічний критерію t , знаходять за табл. Д.19 для обраного рівня значущості α і числа ступенів вільності, яке дорівнює

$$\nu = (k-1) \cdot (n-1), \quad (14.3)$$

де k — число варіантів (сортів);
 n — число повторень дослідів (ділянок).

Якщо $\Delta' > \Delta$, то зі ступенем прийнятої довірчої імовірності α можна визнати спостереження помилковим і виключити його з обліку.

За даними табл. 14.1 бачимо, що сумнівним є показник врожаю сорту **Харківська 63** на IV ділянці, який становить 6.78 (чарунка **E9**), так як

$\Delta'=1.25>\Delta=1.16$, проте, бракувати, тобто вилучати його можна лише за умови агрономічної ідентичності всіх ділянок, тобто при однофакторному досліді з повторенням.

Якщо ділянки агрономічно відрізняються, то цей показник може бути достовірною реакцією сорту.

Так як досліджуваний масив є нормально розподіленим (див. табл. 14.2) для порівняння наведемо оцінку статистичної однорідності дисперсій за критеріями Кохрена і Барлетта (див. підрозділи **11.9.4.1 Використання критерію Кохрена** та **11.9.4.2 Застосування критерію згоди Барлетта**), поданого в табл. 14.3.

Таблиця 14.3. Результати перевірки однорідності дисперсій

критерій Кохрена						критерій Барлетта					
I	II	III	IV	V	s^2	I	II	III	IV	V	v
4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	0.27	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	4
3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	0.35	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4
4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	0.19	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4
4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	0.03	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4
4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	0.02	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4
4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	0.05	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4
4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	0.74	4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	4
5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	0.35	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	4
Вільність повторності дослідів v					4	Сума					32
Повторення дослідів досліді k					8						9.97
Рівень значущості α					0.05						2.00
Емпіричний критерій Кохрена G_F					0.3712						$s^2_{CB} = 0.31$
Емпіричний критерій Фішера F					4.4941						$M = 18.924$
Критичний критерій Кохрена G_T					0.3910						$C = 1.094$
											$B = 17.302$
											$v_1 = 7$
											$\alpha = 0.05$
											$\chi^2_{\alpha(k-1)} = 14.067$
											$p = 0.016$
											$v_2 = 1024$
											$b = 1128.60$
											$M^* = 2.278$
											$F_T = 2.019$
											$p = 0.026$

З табл. 14.3 бачимо, що перевірка за критерієм Барлетта підтверджує висновок щодо сумнівності показника врожаю сорту з огляду на те, що $B=17.302>\chi^2_{\alpha(k-1)}=14.067$ і $M^*=2.278>F_{\alpha(v_1,v_2)}=2.019$.

Проте, більш потужний критерій Кохрена підтверджує отриманий висновок, так як $G_{(8,4)}=0.3712<G_{05(8,4)}=0.3910$ — вибіркові дисперсії на 0.05 рівні значущості неоднорідні.

14.1.2. Відновлення втрачених і забракованих даних

14.1.2.1. Відновлення одного втраченого чи забракованого значення

Внаслідок втрачених даних на деяких облікових ділянках певною мірою ускладнюється статистичний аналіз результатів досліджень.

Причинами втрати даних можуть бути погодні явища чи випадкові пошкодження тваринами, птахами, людьми. Втрата ряду даних також можлива і в результаті їх бракування. Це може значно вплинути на значення основних статистичних показників досліджуваного об'єкта, що, в свою чергу, призводить до невірної оцінки і хибних висновків [132].

Проте цьому можна запобігти, відновлюючи втрачені дані за формулою, яка використовується при втраті лише однієї дати [50]

$$x_{\text{відн}} = \frac{k \cdot V + n \cdot P - \sum x}{(k - 1) \cdot (n - 1)}, \quad (14.4)$$

- де $x_{\text{відн}}$ – відновлюваний показник;
 k – кількість варіантів;
 V – сума значень у тому варіанті, де є втрачене;
 n – кількість повторностей;
 P – сума значень у повторенні, де є втрачене;
 $\sum x$ – сума значень у досліді за винятком втраченого.

Наприклад, візьмемо одне вибракуване значення показника врожаю сорту *Харківська 63* на IV ділянці (чарунка **E9**, табл. 14.1, як це представлено табл. 14.4. Результат, розрахований за наведеною формулою, подано в чарунці **G11**.

За розрахунками отримане значення 4.99.

Таблиця 14.4. Відновлення пропущеного значення							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Сорт	Урожай ділянки, X					
2		I	II	III	IV	V	
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11		4.53	
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	
11							4.99

$$G11 = (СУММ(B9:F9) * (СЧЁТ(E3:E9) + 1) + \\ + СУММ(E3:E10) * (СЧЁТ(B9:F9) + 1) - \\ - СУММ(B3:F10)) / ((СЧЁТ(B9:F9) * СЧЁТ(E3:E10)))$$

Якщо вставити це значення в чарунку **E9** табл. 14.1, то максимальне абсолютне значення відхилення Δ' для сорту *Харківська 63* становить 0.61, тобто має місце $\Delta'=0.61 < \Delta=1.01$.

Таким чином всі значення чарунок **B3:F10** не матимуть викидів.

Проте у подальшому ми будемо використовувати табл. 14.1 на с. 906 у такому вигляді, як її подано у першоджерелі [174].

14.1.2.2. Відновлення декількох втрачених чи забракованих значень

Розглянемо застосування цього метода на прикладі табл. 14.1 на с. 906. Для наочності окрім вилученого забракованого значення чарунки **E9** вважаємо до додатково маємо ще і втрачені значення чарунок **B4** і **F10**.

Масив даних з вилученими чарунками представлено в табл. 14.5.

Обчислення ймовірного врожаю (“відновлення” даних) проводять в таблиці, куди записують наявні дані за варіантами (сортами) з випали даними (чарунки **O18:S28**), для яких розраховують середні дані ділянок (рядок **O29:S29**).

Далі використовуючи лише дані рядів і стовбців з вилученими даними (масив **O33:S40**), для них визначаються середні дані сортів (стовбець **T33:T40**).

У стовбці **U33:U40** наведене середнє значення урожайності відповідного сорту, розраховане за масивом **O33:S40** без даних стовпця, у якому знаходиться вилучене значення сорту.

Зіставленням відповідних двох чисел стовбців **T33:T40** і **U33:U40** дає змогу встановити, наскільки даний варіант перевищує (або поступається) по врожайності іншому, взятому у якості бази для порівняння.

Кінцевим результатом буде сума відповідних середніх повторень (рядок **O29:S29**) з цими перевищеннями.

Це досить запутаний спосіб, тому краще користуватися формулами, наведеними на полі табл. 14.5.

За її даними бачимо загально середні вихідного масиву (чарунки **B3:F10** табл. 14.1 на с. 906) та масиву “відновлення” даних (чарунки **O44:S51** табл. 14.5) відрізняються лише на 0.38 %.

Викладений вище прийом відновлення випалих, тобто, втрачених чи заміну вилучених забракованих даних урожайності можна застосовувати лише у тих випадках, коли це властиво менше ніж половині таких ділянок [50].

Таблиця 14.5. Відновлення випалих дат

	N	O	P	Q	R	S	T	U
18	Вихідні дані							
19	Сорт	Урожай на ділянці, X					O29=CP3HA4(O21:O28) T29=CP3HA4(O21:S28) T34=CP3HA4(O34:S34) U34=CP3HA4(P33:S40) U40=CP3HA4(O33:R40)	
20		I	II	III	IV	V		
21	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34		
22	Донецька 65		5.37	5.41	5.05	4.92		
23	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00		
24	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58		
25	Південоукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39		
26	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60		
27	Харківська 63	4.64	5.42	6.11		4.53	Загальне середнє x_i	
28	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16			
29	Середнє ділянок p_i	4.581	5.289	5.257	4.709	4.766	4.939	
30	Проміжний розрахунок							
31	Сорт	Урожай на ділянці, X					Середнє сортів x_i	Загальне середнє x_i
32		I	II	III	IV	V		
33	Дніпровська 782							
34	Донецька 65		5.37	5.41	5.05	4.92	5.188	5.311
35	Краснодарська 46						U39=CP3HA4(O33:Q40;S33:S40)	
36	Лютесценс 505							
37	Південоукраїнська						U52=ABS(G11-T52)*100/G11	
38	Миронівська 808							
39	Харківська 63	4.64	5.42	6.11		4.53	5.176	5.273
40	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16		5.373	5.349
41	Результат							
42	Сорт	Урожай ділянки, X					O52=CP3HA4(O44:O51) T52=CP3HA4(O44:S51) O45=O\$29+\$T34-\$U34 R50=R\$29+\$T39-\$U39 S51=S\$29+\$T40-\$U40	
43		I	II	III	IV	V		
44	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34		
45	Донецька 65	4.46	5.37	5.41	5.05	4.92		
46	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00		
47	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58		
48	Південоукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39		
49	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60		
50	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	4.61	4.53	Загальне середнє x_i	
51	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.79		
52	Середнє ділянок p_i	4.566	5.289	5.257	4.696	4.769	4.915	
53	Питома похибка загальносереднього, %						0.38	

14.1.3. Особливості статистичної обробки однофакторного польового дослід з повторними

При розгляді таблиці поділянкових врожаїв польового досвіду неважко помітити значне загальне варіювання дослідних даних. Наприклад, в досліді з сортами озимої пшениці (табл. 14.1, с. 906) врожайність однієї ділянки варіює від 6.78 до 4.53 т/га, тобто на 40.9 %.

Головними джерелами цього варіювання є, з одного боку, відмінності між варіантами досліді (досліджуваний фактор, у нашому випадку сорт);

варіювання поділянкових урожаїв, через відмінність у родючості ґрунту окремих повторень (контрольований фактор — ділянка); при розміщенні всіх повторень дослідів на вирівняній за родючістю ділянці вплив цього фактору на загальне варіювання поділянкових врожаїв незначне [50].

Таким чином при однофакторному ДА, який полягає у *об'єднанні дисперсії повторення з дисперсією похибки*, тобто повторення чи варіанти розглядаються як одне ціле і не розкладаються на фактори й повторення (див. підрозділи: **10.4.1.2 Дисперсійний аналіз без урахування впливу повторень дослідів**, табл. 10.4 на с. 569 та табл. 10.5 на с. 570; **10.4.2.1 Застосування для ДА інструменту Однофакторный ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ**, табл. 10.7 на с. 573 і **10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**, табл. 10.9 на с. 579, табл. 10.10 на с. 579 та табл. 10.15 на с. 584), для статистичної обробки даних польового дослідів непридатний (див. табл. 14.6).

Для цього слід застосовувати статистичну обробку однофакторних дослідів з повторністю, яка полягає у розчленуванні загального варіювання (дисперсії) поділянкових врожаїв на три складові частини. Із загальної дисперсії виключають дисперсії, що характеризують варіювання: досліджуваного фактору (варіантів, сортів) і контрольованого фактору, яким в польовому досліді є повторність з повним набором ділянок всіх варіантів, що займає певну частину досвідної ділянки з властивим їй родючістю ґрунту. Залишкова дисперсія (загальна дисперсія — варіантів чи повторення) *не об'єднується з дисперсією похибки* і характеризує випадкові помилки дослідів.

Практично ДА такого “однофакторного” дослідів є ДА двофакторного експерименту без повторення (див. табл. 14.7 та підрозділи **10.4.1.2 Дисперсійний аналіз без урахування впливу повторень дослідів**, табл. 10.3 на с. 567; **10.4.2.2 Дисперсійний аналіз подвійним використанням інструменту Однофакторный ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ** табл. 10.8 на с. 574; **10.5.1.1 Застосування пакету Excel при двофакторному ДА без повторення**, табл. 10.17 на с. 588 і **10.5.1.2 Двофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica**, табл. 10.18 на с. 591, табл. 10.19 на с. 591, табл. 10.21 на с. 592 та табл. 10.23 на с. 592).

Таблиця 14.6. Результат однофакторного ДА					
Ефект	Одномерный критерий значимости для Урожай (Таблица данных ¹) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	973.6953	1	973.6953	3126.148	0.000000
Сорт	4.0945	7	0.5849	1.878	0.106285
Ошибка	9.9670	32	0.3115		

Порівнюючи результати табл. 14.6 і 14.7 бачимо, що при однофакторному аналізі не виявлено відмінності у величині урожайності сортів, у той час як

при двофакторному аналізі відмінність у величині урожайності виявлено не тільки для сортів, а і для ділянок.

В інших дослідках загальна дисперсія може бути розкладена на більше число складових частин. Наприклад, в дослідках, поставлених латинським квадратом, із загальної дисперсії відокремлює три джерела варіювання: дисперсію варіантів досліду, дисперсію рядів (повторень) і дисперсію стовпців (блоків), чи багаторічних досліджень з дисперсією стовпців (років).

В цьому випадку дисперсії нашого “однофакторного” досліду можуть представлятися як дисперсії досліджуваного фактору (варіантів, сортів) і залишкова дисперсія двофакторного ДА з повторенням (див. підрозділи

Таблиця 14.7. Результат двофакторного ДА					
Эффект	Одномерный критерий значимости для Урожай (Таблица данных 1) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	973.6953	1	973.6953	4584.782	0.000000
Сорт	4.0945	7	0.5849	2.754	0.026152
Ділянка	4.0205	4	1.0051	4.733	0.004813
Ошибка	5.9465	28	0.2124		

10.5.2.1 Розрахунковий метод дисперсійного аналізу, табл. 10.26 на с. 596; 10.5.2.2 Використання пакету Excel Двофакторный дисперсионный анализ с повторениями, табл. 10.27 на с. 600 і 10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica, табл. 10.27 на 600, табл. 10.28 на 602 та табл. 10.29 на 602.

14.1.4. Оцінка відмінності між середніми

Застосування критерію F дозволяє встановити наявність або відсутність істотних відмінностей у системі вибірових середніх досліду, проте мета дослідження в більшості випадків — це оцінка конкретних відмінностей між середніми.

Іноді сама постановка досліду зумовлює характер порівняння його варіантів:

- порівняння з контролем (стандартом), коли оцінюються відмінності між ним і іншими варіантами;
- попарне порівняння варіантів;
- порівняння вибірових середніх із загальною середньою, що представляє собою досить стійку величину, так як її обчислення базується на великій кількості спостережень.

Залежно від поставленого завдання відмінності між середніми оцінюються різними способами.

Порівняння зі стандартом (контролем) чи **середнім урожаєм досліду** проводять шляхом оцінки різниці між урожаєм кожного сорту (варіанти) і стандарту за допомогою t -критерію Стьюдента (див. табл. 10.21 на с. 592, табл. 10.23 на с. 592).

Порівняння даних нашого прикладу зі стандартом (контролем), за який прийнято сорт Миронівська 808 і середнім урожаєм досліду за допомогою t -критерію Стюдента наведено в табл. 14.8.

Таблиця 14.8. Дисперсійний аналіз з оцінкою різниці між урожаєм за допомогою t -критерію

— порівняння зі стандартом (контролем)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Критерій Стьюдента, <i>t</i>	Рівень значущості, <i>p</i>
2		I	II	III	IV	V			
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.19	1.4479	0.1588
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.91	0.4735	0.6395
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5	4.98	0.7342	0.4689
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.59	-0.6107	0.5463
7	Південоукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.42	-1.1871	0.2452
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.77	-	-
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.112	6.78	4.53	5.50	2.4923	0.0189
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.3	5.16	4.03	5.10	1.1459	0.2615
11	F18=(2*E17/СЧЁТ(B8:F8))^0.5					I3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(H3);\$D\$17)			
12						G3=CPЗНАЧ(B3:F3) H3=(G3-\$G\$8)/\$F\$18			
13	Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p		
14	Корегуючий фактор C	Св. член	973.6953	1	973.6953	4584.782	0.000000		
15	Варіантів C _v	Сорт	4.0945	7	0.5849	2.754	0.026152		
16	Повторення C _p	Ділянка	4.0205	4	1.0051	4.733	0.004813		
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	5.9465	28	0.2124				
18	Похибка різниці середніх, S _d = 0.291					B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)			

— порівняння із середнім значенням

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Критерій Стьюдента, t	Рівень значущості
2		I	II	III	IV	V			
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.19	1.2627	0.2171
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.91	0.4735	0.6395
5	Краснодарська 46	F18=(E17*(1/СЧЁТ(B3:F3)+1/СЧЁТ(B3:F10))*(1-1/СЧЁТ(G3:G10)))^0.							
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.59	-1.6716	0.1058
7	Південоукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.42	-2.4932	0.0188
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4.77	-0.8011	0.4298
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	5.50	2.7514	0.0103
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	5.10	0.8324	0.4122
11	I3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(H3);\$D\$17)				Середнє 4.93		B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)		
12									
13	Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p		
14	Корегуючий фактор C	Св. член	973.6953	1	973.6953	4584.782	0.000000	G3=CPЗНАЧ(B3:F3;H3)=(G3-\$F\$11)/\$F\$11	
15	Варіантів C _v	Сорт	4.0945	7	0.5849	2.754	0.026152	F11=CPЗНАЧ(B3:F3;H3)	
16	Повторення C _p	Ділянка	4.0205	4	1.0051	4.733	0.004813		
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	5.9465	28	0.2124				
18	Похибка різниці середніх, S _d = 0.204								

Однак більш доцільним є інший спосіб, який застосовується в системі державного сортовипробування полягає в розподілі сортів на три групи. До першої групи відносять сорти, істотно перевищують стандарт за врожайністю, до третьої — сорти, поступаються стандарту. Решта сортів, істотно не відрізняються від стандарту за врожайністю, складають другу групу.

Для проведення угруповання обчислюють *критерій суттєвості* представляє собою *найменшу істотну різницю (НІР)* (див. підрозділи 10.9.2 Розрахункове визначення найменшої істотної різниці (НІР Фішера) між середніми і 10.9.2.2 Визначення НІР Фішера застосуванням

ППП Statistica). Значення t -критерію беруть для 5 % чи 1 %-го рівня значимості і числа ступенів свободи залишкової дисперсії.

Ця величина розділяє суттєві і не дуже різниці між стандартом і будь-яким варіантом досліду (див. табл. 10.3 на с. 567, табл. 10.4 на с. 569, табл. 10.7 на с. 573, табл. 10.8 на с. 574, табл. 10.17 на с. 588. Якщо різниця менша за **НІР**, то вона не виходить за межі випадкових коливань врожайності даного досліду.

Порівняння даних нашого прикладу зі стандартом (контролем) і середнім урожаєм досліду за допомогою **НІР** наведено в табл. 14.9.

Таблиця 14.9. Дисперсійний аналіз з оцінкою різниці між урожаєм за допомогою **НІР** Фішера

— порівняння зі стандартом (контролем)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від стандарту	Критерій Стьюдента, <i>t</i>	Рівень значущості, <i>p</i>
2		I	II	III	IV	V				
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.19	0.422	1.4479	0.1588
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.91	0.138	0.4735	0.6395
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5	4.98	0.214	0.7342	0.4689
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.59	-0.178	-0.6107	0.5463
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.42	-0.346	-1.1871	0.2452
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.77			
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.112	6.78	4.53	5.50	0.726	2.4923	0.0189
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.3	5.16	4.03	5.10	0.334	1.1459	0.2615
11	G3=CP3NA4(B3:F3)		α = 0.05			HIP05= 0.597				
12										
13	Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p	B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17) I3=G3-\$G\$8 H11=B18*F18		
14	Корегуючий фактор C	Св. член	973.6953	1	973.6953	4584.782	0.000000	F18=(2*E17/C4ËT(B8:F8))^0.5		
15	Варіантів C _v	Сорт	4.0945	7	0.5849	2.754	0.026152	I3=H3/\$F\$18		
16	Повторення C _p	Ділянка	4.0205	4	1.0051	4.733	0.004813			
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	5.9465	28	0.2124	J3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(I3);\$D\$17)				
18	t = 2.0484		Похибка різниці середніх, S _d = 0.291							

— порівняння із середнім значенням

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від середньої	Критерій Стюдента, <i>t</i>	Рівень значущості
2		I	II	III	IV	V				
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.19	-0.258	-1.2627	0.217
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.91	0.036	0.1262	0.901
5	Краснодарська 46	4.39	F18=(E17*(1/СЧЕТ(B3:F3)+1/СЧЕТ(B3:F10))*(1-1/СЧЕТ(G3:G10)))^6							
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.59	0.342	1.6716	0.105
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.42	0.510	2.4932	0.018
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.77	0.164	0.8011	0.429
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.112	6.78	4.53	5.50	-0.563	-2.7514	0.010
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.3	5.16	4.03	5.10	-0.170	-0.8324	0.412
11	G3=CP3NA4(B3:F3)		α = 0.05		Середнє	4.93	HIP05= 0.419			
12										
13	Дисперсія		SS	Степени свободи	MS	F	p	B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D		
14	Корегуючий фактор C	Св. член	973.6953	1	973.6953	4584.782	0.000000	H3=\$F\$11-G3 I3=H3/\$F\$11		
15	Варіантів C _v	Сорт	4.0945	7	0.5849	2.754	0.026152	H11=B18*F18		
16	Повторення C _p	Ділянка	4.0205	4	1.0051	4.733	0.004813	F11=CP3NA4(B3:F10)		
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	5.9465	28	0.2124			J3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(I3);\$D\$		
18	t = 2.0484		Похибка різниці середніх, S _d = 0.204							

Аналогічним чином оцінюють відносні врожаї.

Порівняння з середнім урожаєм в досліді проводять аналогічним чином (див. табл. 10.5 на с. 570).

Сорти групують за відхиленнями від середнього врожаю в досліді. При цьому сорту, що потрапили в першу групу, характеризуються як найбільш урожайні, в третю групу — найменш урожайні в даному досліді.

Попарне порівняння даних представлено в табл. 10.26 на с. 596 і табл. 10.27, с. 600 та табл. 10.33, с. 606.

Найбільш зручно виконувати це за допомогою ППП **Statistica**, яка дає змогу порівнювати їх, використовуючи **НІР** за критерієм Фішера (див. табл. 10.12 на с. 581, табл. 10.13 а) на с. 582, табл. 10.14 на с. 583, табл. 10.20 на с. 591 та табл. 10.31 на с. 604); за достовірністю значущої різниці (ДЗР) за критерієм Тьюкі в табл. 10.13 б) на с. 582; за критерієм Бонферроні в табл. 10.13 в) на с. 582 та за критерієм Шеффе в табл. 10.13 г) на с. 582.

Попарне порівняння даних за допомогою НІР Фішера, виконане за допомогою ППП **Statistica** (див. підрозділ **10.9.2.2 Визначення НІР Фішера застосуванням ППП Statistica**) наведено в табл. 14.10, де порівняння із стандартом (сорт Миронівська 808) виділено жирним шрифтом.

Таблиця 14.10. Попарне порівняння даних з **НІР** за критерієм Фішера

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Сорти		Різниця середніх	Стандартна похибка	Рівень значущості p	-95 % довірчої межі	+95 % довірчої межі	НІР05
2	Дніпровська 782	Донецька 65	0.2840	0.2915	0.3382	-0.3130	0.8810	0.597
3		Краснодарська 46	0.2080	0.2915	0.4814	-0.3890	0.8050	
3		Лютесценс 505	0.6000	0.2915	0.0489	0.0030	1.1970	
4		Південноукраїнська	0.7680	0.2915	0.0136	0.1710	1.3650	
5		Миронівська 808	0.4220	0.2915	0.1588	-0.1750	1.0190	
6		Харківська 63	-0.3044	0.2915	0.3052	-0.9014	0.2926	
7		Краснодарська 39	0.0880	0.2915	0.7649	-0.5090	0.6850	
8	Донецька 65	Краснодарська 46	-0.0760	0.2915	0.7962	-0.6730	0.5210	
9		Лютесценс 505	0.3160	0.2915	0.2875	-0.2810	1.0810	
10		Південноукраїнська	0.4840	0.2915	0.1080	-0.1130	1.0810	
11		Миронівська 808	0.1380	0.2915	0.6395	-0.4590	0.7350	
12		Харківська 63	-0.5884	0.2915	0.0532	-1.1854	0.0086	
13	Краснодарська 46	Краснодарська 39	-0.1960	0.2915	0.5068	-0.7930	0.4010	
14		Лютесценс 505	0.3920	0.2915	0.1894	-0.2050	0.9890	
15		Південноукраїнська	0.5600	0.2915	0.0649	-0.0370	1.1570	
16		Миронівська 808	0.2140	0.2915	0.4689	-0.3830	0.8110	
17		Харківська 63	-0.5124	0.2915	0.0897	-1.1094	0.0846	
18	Лютесценс 505	Краснодарська 39	-0.1200	0.2915	0.6837	-0.7170	0.4770	
19		Південноукраїнська	0.1680	0.2915	0.5689	-0.4290	0.7650	
20		Миронівська 808	-0.1780	0.2915	0.5463	-0.7750	0.4190	
21		Харківська 63	-0.9044	0.2915	0.0043	-1.5014	-0.3074	
22		Краснодарська 39	-0.5120	0.2915	0.0899	-1.1090	0.0850	
23	Південноукраїнська	Миронівська 808	-0.3460	0.2915	0.2452	-0.9430	0.2510	
24		Харківська 63	-1.0724	0.2915	0.0010	-1.6694	-0.4754	
25		Краснодарська 39	-0.6800	0.2915	0.0271	-1.2770	-0.0830	
26	Миронівська 808	Харківська 63	-0.7264	0.2915	0.0189	-1.3234	-0.1294	
27		Краснодарська 39	-0.3340	0.2915	0.2615	-0.9310	0.2630	
28	Харківська 63	Краснодарська 39	0.3924	0.2915	0.1890	-0.2046	0.9894	

Як бачимо, дані табл. 14.9 при порівнянні зі стандартом (контролем) і 14.10 співпадають.

14.1.5. Обробка дослідів з пропущеними і відновленими даними

Статистична обробка дослідів з пропущеними даними в ППП **Statistica** проводять так само, як і з повним набором (див. 14.9).

Отримані результати такого аналізу наведені в табл. 14.11.

Таблиця 14.11. Дисперсійний аналіз дослідів з пропущеними даними та оцінкою різниці між урожаєм за допомогою **НІР** Фішера — порівняння зі стандартом (контролем)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від середньої	Похибка різниці середніх, Sd	НІР05	Критерій Стьюдента, t	Рівень значущості, p
I	II	III	IV	V							
Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	-0.253	0.1259	0.2593	-2.0077	0.0556
Донецька 65											
Краснодарська 46											
Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	0.347	0.1259	0.2593	2.7582	0.0107
Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	0.515	0.1259	0.2593	4.0926	0.0004
Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.770	0.169	0.1259	0.2593	1.3443	0.1909
Харківська 63	4.64	5.42	6.112		4.53	5.176	-0.236	0.1391	0.2864	-1.6988	0.1018
Краснодарська 39	5.19	5.84	5.3	5.16		5.373	-0.433	0.1391	0.2864	-3.1154	0.0046
	$\alpha = 0.05$					Середнє	4.94				
Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p					
Корегуючий фактор C	Св. член	887.9396	1	887.9396	11128.77	0.000000	B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)				
Варіантів C v	Сорт	3.2701	7	0.4672	5.86	0.000422	G3=CP3НАЧ(B3:F3) K3=H3/I3				
Повторення C p	Ділянка	2.9085	4	0.7271	9.11	0.000110	H3=\$F\$11-G3 J3=\$B\$18*I3				
Залишок (похибка) C z	Ошибка	1.9947	25	0.0798			L3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(K3);D\$D17)				
	t = 2.0595										

— порівняння із середнім значенням

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від стандарту	Похибка різниці середніх, Sd	НІР05	Критерій Стьюдента, t	Рівень значущості, p
I	II	III	IV	V							
Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	0.422	0.1786	0.3679	2.3622	0.0263
Донецька 65		5.37	5.41	5.05	4.92	5.188	0.418	0.1895	0.3903	2.2033	0.0370
Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5	4.984	0.214	0.1786	0.3679	1.1979	0.2422
Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	-0.178	0.1786	0.3679	-0.9964	0.3286
Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	-0.346	0.1786	0.3679	-1.9368	0.0642
Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.6	4.770					
Харківська 63	4.64	5.42	6.112		4.53	5.176	0.405	0.1895	0.3903	2.1400	0.0423
Краснодарська 39	5.19	5.84	5.3	5.16		5.373	0.602	0.1895	0.3903	3.1797	0.0039
	$\alpha = 0.05$										
Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p					
Корегуючий фактор C	Св. член	887.9396	1	887.9396	11128.77	0.000000	G3=CP3НАЧ(B3:F3) H3=G3-G\$G8				
Варіантів C v	Сорт	3.2701	7	0.4672	5.86	0.000422	J3=\$B\$18*I3 K3=H3/I3				
Повторення C p	Ділянка	2.9085	4	0.7271	9.11	0.000110	B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)				
Залишок (похибка) C z	Ошибка	1.9947	25	0.0798			L3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(K3);D\$D17)				
	t = 2.0595										

Так як виконується порівняння двох варіантів з різною повторністю, то для визначення **НІР** застосовується формула (10.37).

Як бачимо з табл. 14.11, на відміну від табл. 14.9 значення **НІР** тут не постійне для всіх сортів, а змінюється у відповідності до наявної кількості повторення.

Статистичну обробку дослідів з відновленими даними проводять так само, як і з повним набором ділянок, однак при обчисленні середнього квадрата похибки (залишкової дисперсії) число ступенів свободи зменшують на число відновлених ділянок (у нашому випадку на 3) (табл. 14.12).

При порівняння сортів у повторності число відновлених даних не враховується, тому варіанти (сорт) мають фактично різну повторність і для визначення **НІР** також застосовується формула (10.37).

Таблиця 14.12. Дисперсійний аналіз дослідів з відновленими даними та оцінкою різниці між урожаєм за допомогою **НІР** Фішера

— порівняння зі стандартом (контролем)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від середньої	Похибка різниці середніх, Sd	HIP05	Критерій різниці Стюдента, t	Рівень значущості, p
2		I	II	III	IV	V						
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	0.422	0.1909	0.3932	2.2106	0.0364
4	Донецька 65	4.46	5.37	5.41	5.05	4.92	5.042	0.272	0.2025	0.4170	1.3411	0.1920
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4.984	0.214	0.1909	0.3932	1.1210	0.2729
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	-0.178	0.1909	0.3932	-0.9324	0.3600
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	-0.346	0.1909	0.3932	-1.8124	0.0819
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4.770					
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	4.61	4.53	5.063	0.293	0.2025	0.4170	1.4449	0.1609
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.79	5.256	0.486	0.2025	0.4170	2.3992	0.0242
11				α = 0.05		E17=C17/D17		L3=СТЮДЕНТ.РАСП.2X(ABS(K3);SD\$17)				
12								B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)				
13	Дисперсія		SS	Степени свободы	MS	F	p	G3=CP3НАЧ(B3:F3) J3=\$B\$18*I3 H3=G3-\$G\$8 K3=H3/I3				
14	Корегуючий фактор C	Св. член	966.3835	1	966.3835	10606.84	0.000000	У стовбці " I " формули копірки I3 для рядків 3, 5, 6-8, тобто, для рядків 3				
15	Варіантів C _v	Сорт	3.0093	7	0.4299	4.7185	0.001737					
16	Повторення C _p	Ділянка	3.5789	4	0.8947	9.8204	0.000065					
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	2.2777	25	0.0911							
18	t = 2.0595											

$$I3=(\$E\$17*(1/СЧЁТ(B3:F3)+1/СЧЁТ(\$B\$8:\$F\$8)))^0.5$$

$$I4=(\$E\$17*(1/(СЧЁТ(B4:F4)-1)+1/СЧЁТ(\$B\$8:\$F\$8)))^0.5$$

У стовбці "I" формули комірки I3 для рядків 3, 5, 6-8, тобто, для рядків з невилученими даними, комірки I4 - для 3, 9 і 10, тобто, для рядків з вилученими даними

— порівняння із середнім значенням

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє	Відхилення від середньої	Похибка різниці середніх, Sd	HIP05	Критерій Стюдента, t	Рівне значущі р
2		I	II	III	IV	V						
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	-0.277	0.1345	0.2771	-2.0572	0.05
4	Донецька 65	4.46	5.37	5.41	5.05	4.92	5.042	-0.126	0.1486	0.3061	-0.8499	0.40
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4.984	-0.069	0.1345	0.2771	-0.5111	0.61
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	0.323	0.1345	0.2771	2.4027	0.02
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	0.491	0.1345	0.2771	3.6515	0.00
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4.770	0.145	0.1345	0.2771	1.0796	0.29
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	4.61	4.53	5.063	-0.147	0.1486	0.3061	-0.9914	0.33
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.79	5.256	-0.341	0.1486	0.3061	-2.2917	0.03
11	α = 0.05			Середнє		4.92						
12												
13	Дисперсія		SS	Степени свободи	MS	F	p	G3=CP3НАЧ(B3:F3) H3=\$F\$11- J3=\$B\$18*I3 K3=H3/I3 F11=CP3НАЧ(B3:F10) E17=C17/D B18=СТЮДРАСПОБР(D11;D17)				
14	Корегуючий фактор C	Св. член	966.3835	1	966.3835	10606.84	0.000000					
15	Варіантів C _v	Сорт	3.0093	7	0.4299	4.7185	0.001737					
16	Повторення C _p	Ділянка	3.5789	4	0.8947	9.8204	0.000065					
17	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	2.2777	25	0.0911							
18	t = 2.0595											

$$I3=(\$E\$17*(1/СЧЁТ(B3:F3)+1/(СЧЁТ(\$B\$3:\$F\$10)-3))*(1-1/СЧЁТ(\$G\$3:\$G\$10)))^0.5$$

$$I4=(\$E\$17*(1/(СЧЁТ(B4:F4)-1)+1/(СЧЁТ(\$B\$3:\$F\$10)-3))*(1-1/СЧЁТ(\$G\$3:\$G\$10)))^0.5$$

Дисперсійний аналіз дослідів з відновленими даними та оцінкою різниці між урожаєм за допомогою **НІР** Фішера найбільш трудомісткий, так як вимагає ручного редагування кількості повторень, у той час. Як всі перелічені вище в табл. 14.8, табл. 14.9 і табл. 14.11 у ППП **Statistica** виконуються програмно.

14.2. ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

14.2.1. Пакетна обробка результатів селекційного експерименту

14.2.1.1. Однофакторний дисперсійний аналіз

Досить часто при оцінці матеріалу, отриманого в результаті селекційно–генетичних досліджень, особливо за морфологічними ознаками, буває необхідно провести ДА більше десятка показників [128]. У цьому разі замість традиційного виконання ДА однофакторного чи двофакторного експерименту, викладених відповідно в підрозділах **10.4 Дисперсійний аналіз однофакторного дослідження** і **10.5 Дисперсійний аналіз двофакторного дослідження**, слід застосовувати пакетний однофакторний ДА, який дозволяє одночасно обробляти всі показники.

Для прикладу використаємо дані, наведені в табл. 14.13, де представлені результати випробування гібридів за п'ятьма ознаками.

Таблиця 14.13. Результати селекційно–генетичних досліджень

Ідентифікатор	Мати	Батько	Гібрид	Висота рослини, см	Висота штамба, см	Кількість гілок, шт.	Кількість стручків, шт.	Кількість насіння, шт.
1	m0	b0	A	169	30	12	30	10
2	m0	b1	B	173	34	12	31	11
3	m0	b2	C	173	34	13	32	11
4	m1	b0	D	176	35	13	32	12
5	m1	b1	E	181	37	13	34	12
6	m1	b2	F	184	38	13	36	12
7	m0	b0	A	169	31	12	30	10
8	m0	b1	B	174	35	13	32	11
9	m0	b2	C	174	35	13	32	12
10	m1	b0	D	181	37	13	33	12
11	m1	b1	E	181	37	13	34	12
12	m1	b2	F	183	38	13	35	12
13	m0	b0	A	167	27	12	29	10
14	m0	b1	B	174	35	13	32	11
15	m0	b2	C	177	36	13	32	12
16	m1	b0	D	177	37	13	32	12
17	m1	b1	E	182	38	13	35	12
18	m1	b2	F	186	40	13	37	12
19	m0	b0	A	172	33	12	30	11
20	m0	b1	B	173	33	12	31	11
21	m0	b2	C	166	27	11	29	10
22	m1	b0	D	177	36	13	32	12
23	m1	b1	E	181	37	13	34	12
24	m1	b2	F	184	40	13	36	12

В ній стовбцями представлено ідентифікатор рядка даних, позначення материнських і батьківських геномів, позначення отриманого гібриду і п'ять стовбців морфологічних ознак.

Спочатку виконаємо порівняльну оцінку гібридів, використовуючи пакетний однофакторний ДА з використанням ППП **Statistica**, вставивши дані табл. 14.13 в лист, задіявши стовбці з позначенням гібридів і даними ознак.

Порядок дій представлено на рис. 14.1.




Рис. 14.1. Порядок дій при одно факторному пакетному аналізі.

Для аналізу в меню **Statistics** / **Анализ** (1) і на панелі **Basic Statistics and Tables** / **Основные статистики и таблицы** використовуємо модуль **Breakdown & one-way ANOVA** / **Группировка и однофакторный ДА** (2) і натиснувши **OK** (3)

перейдемо на панель Statistics by Groups (Breakdown): / Внутригрупповые статистики и корреляции.

Тут після натиснення кнопки Variables / Переменные (4) на панелі Выберите зависимые и группирующие переменные відмічаємо залежні змінні (5) і групує змінну (6) та натиснувши **ОК** (7) повертаємося на панель Statistics by Groups (Breakdown): / Внутригрупповые статистики и корреляции. Тут натискаємо Codes for grouping variables / Коды группирующих переменных (8) і на панелі Коды для независимых факторов: / Коды для независимых факторов: Выберите коды для независимых переменных... вибираємо всі (9) і натискаємо **ОК** (10) для повернення на панель Statistics by Groups (Breakdown): / Внутригрупповые статистики и корреляции, де також натискаємо **ОК** (11).

На виниклій панелі Statistics by Groups (Breakdown): / Внутригрупповые статистики и корреляции приймаємо рівень значущості .050 (12) і переходимо на вкладку ANOVA & tests / Дисперсионный анализ (13) і натискаємо кнопку Analysis of Variance / Дисперсионный анализ (ДА) (14).

У результаті цих дій отримуємо табл. 14.14 з результатами пакетного однофакторного ДА.

Таблица 14.14. Результаты пакетного однофакторного ДА.

Переменная	Дисперсионный анализ (Гибрид) Отмечены эффекты, значимые на уров. $p < .05000$							
	Сум.кв. эффект	Ст. св. эффект	Ср. кв. эффект	Сред. кв. ошибки	Ст. св. ошибки	Ср. кв. ошибки	F	p
Висота	646.8333	5	129.3667	99.00000	18	5.500000	23.52121	0.000000
Штамб	199.0000	5	39.8000	79.00000	18	4.388889	9.06835	0.000191
Гілки	3.3333	5	0.6667	4.00000	18	0.222222	3.00000	0.038427
Стручки	102.0000	5	20.4000	12.00000	18	0.666667	30.60000	0.000000
Насіння	10.3333	5	2.0667	3.50000	18	0.194444	10.62857	0.000071

Для порівняння представимо результат однофакторного ДА висоти рослин опцією One-way ANOVA / Однофакторный ДА з використанням модуля ANOVA / Дисперсионный анализ (ДА), див. підрозділ 10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica, поданого в табл. 14.15.

Таблица 14.15. Результаты однофакторного ДА висоти рослин опцією

Однофакторный ДА.

Эффект	Одномерный критерий значимости для Висота (Гибрид) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
	SS	Степени свободы	MS	F	p
Св. член	746948.2	1	746948.2	135808.8	0.000000
Гибрид	646.8	5	129.4	23.5	0.000000
Ошибка	99.0	18	5.5		

З даних табл. 14.14 і 14.15 бачимо повну тотожність результатів.

Далі вибираємо вкладку **Descriptives** / **Описательные** (15) і на панелі **Statistics by Groups - Results: Гібрид** / **Внутригрупповые статистики и корреляции** задавши виведення ☒ **Стандартное отклонение** / ☒ **Стандартное отклонение** (16) (рис. 14.2) кнопкою **Detailed two-way tables** / **Подробные двухходовые таблицы** (17) отримуємо табл. 14.16.

Далі перейшовши на панелі **Statistics by Groups - Results: Гібрид** / **Внутригрупповые статистики и корреляции** (рис. 14.1) на вкладку **Post-hoc** / **Апостериорные** (17), отримуємо панель (рис. 14.3). Тут приймаємо рівень значущості **.050** (18) і по чергово задаючи кнопкою **Variables** / **Переменные** (19) змінні з подальшим натисненням кнопки **LSD test or planned comparison** / **Критерий наиме...** (20) отримуюмо рівні значущості **НІР** за критерієм Фішера, представлені в табл. 14.17. а не їхні величини при парних порівняннях результатів, як це представлено, наприклад, у табл. 10.12,




Рис. 14.2. Панель отримання описової характеристики результатів.

що дає можливість розраховувати саму величину **НІР** (див. табл. 10.69).




Рис. 14.3. Панель визначення рівня значущості **НІР** за критерієм Фішера.

Гибрид	Висота Среднее	Висота N	Висота Ст.откл.	Штамб Среднее	Штамб N	Штамб Ст.откл.	Гілки Среднее	Гілки N	Гілки Ст.откл.	Стручки Среднее	Стручки N	Стручки Ст.откл.	Насіння Среднее	Насіння N	Насіння Ст.откл.
A	169.2500	4	2.061553	30.25000	4	2.500000	12.00000	4	0.000000	29.75000	4	0.500000	10.25000	4	0.500000
B	173.5000	4	0.577350	34.25000	4	0.957427	12.50000	4	0.577350	31.50000	4	0.577350	11.00000	4	0.000000
C	172.5000	4	4.654747	33.00000	4	4.082483	12.50000	4	1.000000	31.25000	4	1.500000	11.25000	4	0.957427
D	177.7500	4	2.217356	36.25000	4	0.957427	13.00000	4	0.000000	32.25000	4	0.500000	12.00000	4	0.000000
E	181.2500	4	0.500000	37.25000	4	0.500000	13.00000	4	0.000000	34.25000	4	0.500000	12.00000	4	0.000000
F	184.2500	4	1.258306	39.00000	4	1.154701	13.00000	4	0.000000	36.00000	4	0.816497	12.00000	4	0.000000
Всього	176.4167	24	5.694518	35.00000	24	3.476630	12.66667	24	0.564660	32.50000	24	2.226325	11.41667	24	0.775532

	Крит. НЗР; перем.: Висота (Гібрид) Отмечены разности, значимые на уровне $p < .05000$					
Гібрид	{1} M=169.25	{2} M=173.50	{3} M=172.50	{4} M=177.75	{5} M=181.25	{6} M=184.25
A {1}		0.019567	0.065686	0.000071	0.000001	0.000000
B {2}	0.019567		0.554016	0.019567	0.000189	0.000004
C {3}	0.065686	0.554016		0.005349	0.000051	0.000001
D {4}	0.000071	0.019567	0.005349		0.049062	0.001004
E {5}	0.000001	0.000189	0.000051	0.049062		0.087174
F {6}	0.000000	0.000004	0.000001	0.001004	0.087174	

а) висота рослин;

Гибрид	Крит. НЗР; перем.: Штамб (Гибрид) Отмечены разности, значимые на уровне $p < .05000$					
	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
	M=30.250	M=34.250	M=33.000	M=36.250	M=37.250	M=39.000
A {1}		0.014645	0.079843	0.000751	0.000169	0.000014
B {2}	0.014645		0.409847	0.193716	0.057942	0.004892
C {3}	0.079843	0.409847		0.041609	0.010206	0.000751
D {4}	0.000751	0.193716	0.041609		0.508222	0.079843
E {5}	0.000169	0.057942	0.010206	0.508222		0.252840
F {6}	0.000014	0.004892	0.000751	0.079843	0.252840	

б) висота штамбу;

Гібрид	Крит. НЗР; перем.: Гілки (Гібрид) Отмечены разности, значимые на уровне $p < .05000$					
	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
	M=12.000	M=12.500	M=12.500	M=13.000	M=13.000	M=13.000
A {1}		0.150950	0.150950	0.007685	0.007685	0.007685
B {2}	0.150950		1.000000	0.150950	0.150950	0.150950
C {3}	0.150950	1.000000		0.150950	0.150950	0.150950
D {4}	0.007685	0.150950	0.150950		1.000000	1.000000
E {5}	0.007685	0.150950	0.150950	1.000000		1.000000
F {6}	0.007685	0.150950	0.150950	1.000000	1.000000	

в) кількість гілок на рослині;

Гибрид	Крит. НЗР; перем.: Стручки (Гибрид) Отмечены разности, значимые на уровне $p < .05000$					
	{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}
	M=29.750	M=31.500	M=31.250	M=32.250	M=34.250	M=36.000
A {1}		0.007183	0.018173	0.000403	0.000000	0.000000
B {2}	0.007183		0.670150	0.210325	0.000155	0.000000
C {3}	0.018173	0.670150		0.100366	0.000061	0.000000
D {4}	0.000403	0.210325	0.100366		0.002769	0.000004
E {5}	0.000000	0.000155	0.000061	0.002769		0.007183
F {6}	0.000000	0.000000	0.000000	0.000004	0.007183	

г) кількість стручків на центральній гілці;

	Одномерный критерий значимости для Насіння (Г) Сигма-ограниченная параметризация Декомпозиция гипотезы				
Эффект	SS	Степени свободы	MS	F	
Св. член	3128.167	1	3128.167	16087.71	0.
Мати	8.167	1	8.167	42.00	0.
Батько	1.083	2	0.542	2.79	0.
Мати*Батько	1.083	2	0.542	2.79	0.
Ошибка	3.500	18	0.194		

г) кількість насінин у стручку.

Для розрахунку **НІР** використаємо результати, представлені в табл. 14.14, зокрема стовбці другий і шостий зі значеннями ступеня вільності змінної і середньостатистичної похибки. Результати розрахунків, які виконуються за допомогою **MS Excel**, з використанням формули (10.36), представлено в табл. 14.18.

Таблиця 14.18. Визначення НІР				
	A	B	C	D
1	Показник	Число ступенів вільності ν	Середньо-квадратична похибка середнього $s_{\bar{x}}^2$	НІР ₀₅
2	Висота рослини	5	5.500000	3.48058
3	Висота штамбу	5	4.388889	3.10920
4	Гілки	5	0.222222	0.69962
5	Стручки	5	0.666667	1.21178
6	Насіння	5	0.194444	0.65444
7	$\alpha = 0.05$		$t_T = 2.5706$	
D7=СТЮДРАСПОБР(B7;B2)				
D2=D7*((2*C2/(B2+1))^0.5)				
.....				
D6=D7*((2*C6/(B6+1))^0.5)				

З використанням даних табл. 14.16 за формулою (1.100) для показників гібридів розраховуються коефіцієнти варіації, значення яких наведено в табл. 14.19.

Таблиця 14.19. Значення коефіцієнтів варіації, %					
Гібрид	Висота рослини	Висота штамбу	Гілки	Стручки	Насіння
A	1.2	8.3	0.0	1.7	4.9
B	0.3	2.8	0.6	1.8	0.0
C	2.7	12.4	1.0	4.8	8.5
D	1.2	2.6	0.0	1.6	0.0
E	0.3	1.3	0.0	1.5	0.0
F	0.7	3.0	0.0	2.3	0.0
Усі спостереження	3.2	9.9	0.6	6.9	6.8

14.2.1.2. Особливості дисперсійного аналізу результатів системного генетичного схрещування

Генетичний експеримент за своєю структурою є двофакторним, оцінка якого повинна виконуватися двофакторним ДА. Проте, як і в попередньому підрозділі, для оцінки експериментального матеріалу, буває необхідно провести ДА більше десятка показників [128]. У цьому разі замість традиційного виконання ДА двофакторного експерименту, викладеного у підрозділі **10.5 Дисперсійний аналіз двофакторного дослідження**, застосуємо пакетний однофакторний ДА кожного з факторів з подальшим розрахунком за формулами підрозділу **10.1 Основні положення дисперсійного аналізу**.

Для прикладу використаємо дані, наведені в табл. 14.13, де представлені результати випробування гібридів, отриманих від двох материнських і трьох батьківських геномів.

Порядок дій аналогічний представленому на рис. 14.1.

Спершу виконується пакетний одно факторний ДА з застосуванням ППП **Statistica** використовуючи у якості групуючого чинника ідентифікатора. Отриманий результат подано в табл. 14.20.

Таблиця 14.20. Результати пакетного однофакторного ДА при групуванні за ідентифікатором

Переменная	Дисперсионный анализ (Гибрид) Отмечены эффекты, значимые на уров. $p < .05000$						
	Сум.кв. эффект	Ст. св. эффект	Ср.кв. эффект	Сред.кв. ошибки	Ст. св. ошибки	Ср.кв. ошибки	F p
Висота	745.8333	23	32.42754	0.00	0		
Штамб	278.0000	23	12.08696	0.00	0		
Гілки	7.3333	23	0.31884	0.00	0		
Стручки	114.0000	23	4.95652	0.00	0		
Насіння	13.8333	23	0.60145	0.00	0		

Далі виконується пакетний одно факторний ДА показників з почерговим використанням у якості групуючого чинника показників гібрид, мати і батько (табл. 14.14, 14.21 і 14.22).

Таблиця 14.21. Результати пакетного однофакторного ДА при групуванні за материнським геномом

Переменная	Дисперсионный анализ (Гибрид) Отмечены эффекты, значимые на уров. $p < .05000$							
	Сум.кв. эффект	Ст. св. эффект	Ср.кв. эффект	Сред.кв. ошибки	Ст. св. ошибки	Ср.кв. ошибки	F	p
Висота	522.6667	1	522.6667	223.1667	22	10.14394	51.52502	0.000000
Штамб	150.0000	1	150.0000	128.0000	22	5.81818	25.78125	0.000044
Гілки	2.6667	1	2.6667	4.6667	22	0.21212	12.57143	0.001814
Стручки	66.6667	1	66.6667	47.3333	22	2.15152	30.98592	0.000014
Насіння	8.1667	1	8.1667	5.6667	22	0.25758	31.70588	0.000012

Таблиця 14.22. Результати пакетного однофакторного ДА при групуванні за батьківським геномом

Переменная	Дисперсионный анализ (Гибрид) Отмечены эффекты, значимые на уров. $p < .05000$							
	Сум.кв. эффект	Ст. св. эффект	Ср.кв. эффект	Сред.кв. ошибки	Ст. св. ошибки	Ср.кв. ошибки	F	p
Висота	106.0833	2	53.04167	639.7500	21	30.46429	1.741110	0.199696
Штамб	37.0000	2	18.50000	241.0000	21	11.47619	1.612033	0.223207
Гілки	0.3333	2	0.16667	7.0000	21	0.33333	0.500000	0.613570
Стручки	29.2500	2	14.62500	84.7500	21	4.03571	3.623894	0.044460
Насіння	1.0833	2	0.54167	12.7500	21	0.60714	0.892157	0.424742

Далі для розрахунку виконуються за допомогою **MS Excel**. Для цього за формою табл. 14.20 будується табл. 14.23, утворена з перших трьох стов-

Таблиця 14.23. Розрахунок показників ДА

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Показник	Загальний			Варіанти			Мати			Батько			Мати x Батько			Похибка		
		SS	df	MS	SS	df	MS	SS	df	MS	SS	df	MS	SS	df	MS	SS	df	MS
3	Висота рослини	745.833	23	32.428	646.833	5	129.367	522.667	1	522.667	106.083	2	53.042	18.083	2	9.042	99.000	18	5.500
4	Висота штамбу	278.000	23	12.087	199.000	5	39.800	150.000	1	150.000	37.000	2	18.500	12.000	2	6.000	79.000	18	4.389
5	Гілки	7.333	23	0.319	3.333	5	0.667	2.667	1	2.667	0.333	2	0.167	0.333	2	0.167	4.000	18	0.222
6	Стручки	114.000	23	4.957	102.000	5	20.400	66.667	1	66.667	29.250	2	14.625	6.083	2	3.042	12.000	18	0.667
7	Насіння	13.833	23	0.601	10.333	5	2.067	8.167	1	8.167	1.083	2	0.542	1.083	2	0.542	3.500	18	0.194

N3=E3-N3-K3 **P3=N3/O3** **Q3=B3-E3** **S3=Q3/R3**

N7=F7-I7-L7 **P7=N7/O7** **R7=C7-F7** **S7=Q7/R7**

бців, тобто сум квадратів ефектів **SS**, чисел ступенів вільності **ds** та середніх квадратів ефектів, тобто, дисперсій **MS** ефектів, взятих з табл. 14.14, 14.20, 14.21 і 14.22.

За цими даними з використанням формул, наведених у підрозділі **10.1 Основні положення дисперсійного аналізу**, розраховуються ці ж показники для парного поєднання генотипу і похибки.

На основі даних табл. 14.23 виконується визначення критерію Фішера для всіх досліджуваних показників для обох генотипу і їхнього поєднання. Ці дані наведені в табл. 14.24.

З отриманих даних видно, що несуттєвими є вплив батьківського генотипу на кількість гілок та поєднання генотипу на висоту рослини і штамбу та кількість гілок і насіння в стручку, так як у цьому випадку маємо $F < F_{\text{т}}$.

Для перевірки розрахунків виконаємо двофакторний ДА з повторенням кількості гілок опцією  Факторный ДА /  Factorial ANOVA модуля  ANOVA /  Дисперсионный анализ (ДА) ППП Statistica (див. підрозділ **10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з повторенням при використанні ППП Statistica**). Результати аналізу поданого в табл. 14.25.

Порівнюючи результати розрахунків критерію Фішера, наведені в табл. 14.24 і 14.25 бачимо їхню повну тотожність.

Таблиця 14.24. Розрахунок значення критерію Фішера

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Показник	Варіанти		Мати		Батько		Мати x Батько	
	F _ф	F _т	F _ф	F _т	F _ф	F _т	F _ф	F _т
9 Висота рослини	23.521		95.030		9.644		1.644	
10 Висота штамбу	9.068		34.177		4.215		1.367	
11 Гілки	3.000	2.773	12.000	4.414	0.750	3.555	0.750	3.555
12 Стручки	30.600		100.000		21.938		4.563	
13 Насіння	10.629		42.000		2.786		2.786	

B11=G3/S3 **D11=J3/S3** **F11=M3/S3** **H11=P3/S3**

B15=G7/S7 **D15=J7/S7** **F15=M7/S7** **H15=P7/S7**

C11=F.ОБР.ПХ(0.05;F3;R3) **G11=F.ОБР.ПХ(0.05;L3;R3)**

E11=F.ОБР.ПХ(0.05;I3;R3) **I11=F.ОБР.ПХ(0.05;O3;R3)**

Застосування розглянутого пакетного ДА для обробки двофакторних експериментів особливо доцільно при великій кількості досліджуваних властивостей.

Таблиця 14.25. Результати двофакторного ДА з повторенням кількості гілок опцією  Факторный ДА.

Effect	Univariate Tests of Significance for Гілки (Гібрид) Sigma-restricted parameterization Effective hypothesis decomposition				
	SS	Degr. of Freedom	MS	F	p
Intercept	3850.667	1	3850.667	17328.00	0.000000
Мати	2.667	1	2.667	12.00	0.002769
Батько	0.333	2	0.167	0.75	0.486565
Мати*Батько	0.333	2	0.167	0.75	0.486565
Error	4.000	18	0.222		

Загалом, оцінюючи розглянутий в підрозділі **14.2.1 Пакетна обробка результатів селекційного експерименту** метод пакетною обробки результатів селекційного експерименту, представлений в основному за [128], можна сказати, що навряд чи її застосування порівняно з традиційним ДА як одно-, так і двофакторного експерименту із застосуванням відповідних інструментів пакету MS Excel, особливо, ППП Statistica дасть великий вигреш у затраті часу на обробку експериментальних даних. До того ж, Statistica у подальшому доведеться використовувати для поглибленого розгляду результатів як одно-, так і двофакторного ДА.

14.2.2. Визначення екологічної пластичності сортів і гібридів

14.2.2.1. Оцінка пластичності за допомогою ековаленти

У практиці сортовипробування сорти і гібриди оцінюють, як правило, за ступенем прояву тих чи інших показників. Репрезентативну оцінку екологічних параметрів можна отримати і в одному місці, але при різних термінах посіву, а також посів в один термін, але в різних місцях або в за декілька років в одному пункті.

У своїй більшості порівнянні сортозразки значною мірою відрізняються за реакцією на умови вирощування, властиві тій чи іншій сортодільниці.

На першому етапі встановлюють сам факт наявності або відсутності такої взаємодії для всієї сукупності досліджуваних сортів за допомогою ДА багатофакторних комплексів, в яких одним з факторів є сорти. Якщо вивчають реакцію сортів на різних ділянках за один рік або в на одній ділянці в різні роки, то використовують модель двофакторного ДА без повторень, застосовуючи для розрахунку відповідний інструмент пакету **MS Excel**.

Таблиця 14.26. Вивчення ековаленти сортотразків при двофакторному експерименті з використанням інструменту Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P																																			
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Ефекти сортів <i>Ij</i>					Екопластичність <i>Wi</i>	Дисперсія	<i>F</i>	<i>P</i> -Значение	<i>F критическое</i>																																			
2		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V																																								
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	-0.361	0.013	0.315	-0.376	0.408	0.537	0.1343	0.6325	0.6434	2.7141																																			
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	-0.667	0.107	0.179	0.108	0.272	0.574	0.1435	0.6755	0.6146	2.7141																																			
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	-0.143	0.191	0.083	-0.408	0.276	0.306	0.0766	0.3605	0.8346	2.7141																																			
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	0.199	-0.057	-0.305	-0.086	0.248	0.205	0.0512	0.2409	0.9127	2.7141																																			
7	Південоукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	0.507	-0.239	-0.207	-0.288	0.226	0.491	0.1228	0.5780	0.6809	2.7141																																			
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	0.331	0.035	-0.233	-0.224	0.090	0.223	0.0558	0.2628	0.8993	2.7141																																			
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	-0.405	-0.431	0.293	1.250	-0.706	2.497	0.6243	2.9395	0.0380	2.7141																																			
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	0.537	0.381	-0.127	0.022	-0.814	1.113	0.2782	1.3101	0.2904	2.7141																																			
11																																																			
12		L3=G3^2+H3^2+I3^2+J3^2+K3^2					Дисперсионный анализ																																												
		L10=G10^2+H10^2+I10^2+J10^2+K10^2																																																	
13		M3=ДИСП.В(G3:K3)																																																	
		M10=ДИСП.В(G10:K10)																																																	
14		N3=M3/\$M\$16					P3=P15		<table><tr><th>Источник вариации</th><th>SS</th><th>df</th><th>MS</th><th>F</th><th>P-Значение</th><th>F критическое</th></tr><tr><td>Сорти</td><td>8.882E-16</td><td>7</td><td>1.2688E-16</td><td>5.97E-16</td><td>1.00000</td><td>2.3593</td></tr><tr><td>Сортоділянки</td><td>0.00000</td><td>4</td><td>0.00000</td><td>0.00000</td><td>1.00000</td><td>2.7141</td></tr><tr><td>Погрешность</td><td>5.9465138</td><td>28</td><td>0.21237549</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Итого</td><td>5.9465138</td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	Сорти	8.882E-16	7	1.2688E-16	5.97E-16	1.00000	2.3593	Сортоділянки	0.00000	4	0.00000	0.00000	1.00000	2.7141	Погрешность	5.9465138	28	0.21237549				Итого	5.9465138	39				
Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое																																													
Сорти	8.882E-16	7	1.2688E-16	5.97E-16	1.00000	2.3593																																													
Сортоділянки	0.00000	4	0.00000	0.00000	1.00000	2.7141																																													
Погрешность	5.9465138	28	0.21237549																																																
Итого	5.9465138	39																																																	
15		N10=M10/\$M\$16					P10=P15																																												
16																																																			
17																																																			

$$G3=B3+CP3НАЧ(\$B\$3:\$F\$10)-CP3НАЧ(\$B3:\$F3)-CP3НАЧ(B\$3:B\$10)$$

$$K10=F10+CP3НАЧ(\$B\$3:\$F\$10)-CP3НАЧ(\$B10:\$F10)-CP3НАЧ(F\$3:F\$10)$$

$$O3=1-F.ПАСП(N3;\$L\$15;\$L\$16;ИСТИНА)$$

$$O10=1-F.ПАСП(N10;\$L\$15;\$L\$16;ИСТИНА)$$

Нижче представлено виявлення такої важливої властивості, як взаємодія сортотразків з умовами вирощування, виконане із застосуванням **Excel**. При роботі використано урожайності (у т/га) восьми сортів пшениці озимої, отримані при випробуванні на п'яти різних сортоділянках (табл. 14.26) [174].

Коли ДА встановлено наявність в даному комплексі істотної взаємодії “сорт×середовище”, тоді переходять до другого етапу — виявленню індивідуальної характеристики сортів за цією властивістю.

Для цієї мети для кожного сортотразка обчислюється, так звана, ековалента, яка представляє собою частку, яку він вносить даний сорт у загальну (для всього набору сортотразків) взаємодію “сорт × середовище”. Ековалента W_i конкретного сорту певною мірою характеризує його пластичність, тобто чутливість до зміни умов.

Цей показник дорівнюватиме *нулю або величині, близькій до нуля при відсутності взаємодії зі середовищем*. У цьому випадку врожай даного сорту буде таким же (або майже таким же), як і середній урожай для кожної градації умов. І, навпаки, *чим більше W_i відрізняється від нуля, тим сильніша реакція даного сорту на зміну умов середовища* [128, 174].

Обчислення ековаленти виконується за виразом

$$W_i = \Sigma l_{ij}^2, \quad (14.5)$$

де l — ефекти сортів, які обчислюються за формулою, аналогічною (14.1) на с. 905.

Власне табл. 14.26 (чарунками **A1:K10** повторює відповідні чарунки табл. 14.1. У доданих колонках **L1:L10** і **M1:M10** (відповідно у чарунках **L3:K10** і **M3:M10**) подаються відповідно ековаленти W_i конкретних сортів, визначені за виразом (14.1) і дисперсії їх ефектів, розраховані з використанням статистичної функції **ДИСП.В** пакету **Excel**. Тут варто звернути увагу, що величина ековаленти W_i в $k-1$, (тобто в ступінь вільності) раз більше за величину дисперсії.

Оскільки величини ековаленти, як і будь-який інший показник, отриманий у польовому дослід, мають імовірнісний характер, необхідно оцінити їх достовірність відмінностей. Ця оцінка проводиться за фактичним критерієм Фішера F_{ϕ} , який обчислюють як відношення дисперсії ефектів сортів до дисперсії похибки. Проте, з огляду на її відповідність дисперсії ефектів сортів, простіше виконати оцінку відповідних дисперсій.

Для цього за допомогою пакету **Excel** застосовуючи інструмент *Двух-факторный дисперсионный анализ без повторений* виконуємо ДА ефектів сортів (чарунки **G3:K10**). Отриману таблицю результатів поміщаємо в чарунки **I13:P17**. У колонку **N1:N10** (чарунка **N3:N10**) заносимо розрахункове значення критерію Фішера, як частку від ділення відповідного значення дисперсії на і величину похибки, отриманої в результаті ДА ефектів сортів (чарунка **M16**).

В чарунках **O3:O10** подаються розрахункові рівні значущості p , визначені функцією **1-F.PАСП**, які відповідають розрахованим в чарунках **N3:N10** значенням критерію Фішера, ступені вільності сортоділянок чарунка **L15** і ступеню вільності похибки чарунка **L16**).

У колонку **P1:P10** (чарунки **P3:P10**) заносяться критичне значення критерію Фішера для сортоділянки (чарунки **P15**).

Розрахунки при визначенні пластичності сортозразків приведені на полі табл. 14.26. При цьому варто звернути увагу, що визначення і оцінка пластичності сортозразка відбувається без самого розрахунку ековаленти W_i .

З табл. 14.26 видно, що для сорту Харківська 63 отримано найбільше значення ековаленти W_i при її статистичній значущості, так як маємо $p < \alpha$. Таким чином цей сорт високопластичний, добре реагує на умови вирощування, а всі інші практично знаходяться на одному рівні пластичності [174].

14.2.2.2. Оцінка пластичності сортів з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії

Інший спосіб оцінки пластичності сортів полягає у обчисленні двох показників — коефіцієнту регресії R_i , який характеризує реакцію сорту на зміну умов вирощування, і дисперсії s_i^2 , яка є показником стабільності врожаю [128, 174].

Коефіцієнт регресії R_i дорівнює одиниці, якщо зміна показника відповідного сорту точно відповз міні умов середовища, який характеризується середнім показником для всього набору сортів в j -му пункті або році.

Якщо коефіцієнт регресії R_i суттєво перевищує одиницю свідчить про прогресивне збільшення показника під впливом покращання умов вирощування, що властиво сортам інтенсивного типу.

За умови коефіцієнт регресії R_i менше одиниці означає затухання ефекту взаємодії. У цьому випадку зміна умов вирощування не викликає адекватної зміни досліджуваного показника сорту.

Нульове, або близьке до нуля значення коефіцієнту регресії R_i характеризує сорти, які не реагують на зміну умов вирощування.

На основі R_i обчислюють теоретичний, тобто очікуваний урожай даного сорту в конкретних умовах. Відхилення теоретичних величин від фактичних даних характеризує стабільність врожаю; остання виражається величиною s_i^2 , тобто дисперсією цих відхилень. Чим менше s_i^2 , тим менше розбіжність між теоретичним і фактичним урожаєм, тим більше стійкий ця ознака в часі чи просторі.

Таким чином, R_i характеризує реакцію сорту на зміну умов середовища, а s_i^2 — його стабільність [174].

При обчисленні R_i спочатку визначаємо індекс умов вирощування I_j як відхилення середнього врожаю в даному пункті (році) від середнього значення в досліді

$$I_j = \bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..} \quad (14.6)$$

Сукупність індексів характеризує мінливість умов, в яких вирощували сорт у даному досліді.

Значення коефіцієнта регресії R_i для кожного сорту розраховуються за формулою

$$R_i = \frac{\sum (\bar{x}_{ij} \cdot I_j)}{\sum I_j^2}. \quad (14.7)$$

Зауважимо, що $\sum I_j = 0$.

За значенням коефіцієнта регресії R_i дозволяє розділити весь набір сортів на дві групи: в першу входять сорти, у яких він *більше одиниці*, тобто які *добре реагують на зміну умов вирощування*, а в другу — у яких він *менше одиниці*, тобто, які *реагують слабо* [174]. За табл. 14.27 і створеному на її основі рис. 14.4 до першої групи належать сорти: Дніпровська 782, Донецька 65, Краснодарська 46, Харківська 63, Краснодарська 39, до другої Лютеценс 505, Миронівська 808 і Південоукраїнська.

Далі оцінюється стабільність, рівень якої визначає коливання фактичного врожаю навколо лінії регресії. Для цього обчислюють теоретичні врожаї (точки теоретичної лінії регресії) для кожного сорту за формулою

$$\bar{x}'_{ij} = \bar{x}_{ij} + R_i \cdot I_j. \quad (14.8)$$

де \bar{x}'_{ij} — теоретичний врожай i -го сорту в j -му пункті або році.

Визначають різниці d_{ij} тобто відхилення фактичних від теоретичних врожаїв

$$d_{ij} = \bar{x}_{ij} - \bar{x}'_{ij}. \quad (14.9)$$

Правильність обчислення d_i перевіряється рівністю $\sum_{j=1}^i d_{ij}^2 = 0$.

За формулою (14.10) знаходять стандартні відхилення різниць

$$s_i = \sqrt{\sum_{j=1}^i \frac{d_{ij}^2}{n-2}}. \quad (14.10)$$

Оцінка пластичності сортів з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії, виконана за формулами (14.6)–(14.10) із застосуванням пакету **Excel** наведена в табл. 14.27.

Таблиця 14.27 – Розрахунок індексів пластичності сортів з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє рядів, т/га	Коефіцієнт регресії R	Розрахункова урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє рядів, т/га
2		I	II	III	IV	V			I	II	III	IV	V	
3	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	1.299	4.61	5.65	5.61	5.24	4.85	5.192
4	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.908	1.656	4.16	5.50	5.44	4.96	4.48	4.908
5	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4.984	1.146	4.47	5.39	5.35	5.02	4.69	4.984
6	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	0.451	4.39	4.75	4.74	4.61	4.47	4.592
7	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	0.107	4.38	4.46	4.46	4.43	4.40	4.424
8	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4.770	0.516	4.54	4.95	4.94	4.79	4.64	4.770
9	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	5.496	1.697	4.73	6.10	6.04	5.55	5.06	5.496
10	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	5.104	1.128	4.59	5.50	5.47	5.14	4.81	5.104
11	Індекс умов I_j , т/га	-0.45	0.35	0.32	0.03	-0.26								
12														
13	Сорт	Різниця урожайностей за сортоділянками d_i , т/га					Показник стабільності, s_i^2	Нормалізована стабільність, s_{in}^2						
14		I	II	III	IV	V								
15	Дніпровська 782	-0.23	-0.09	0.22	-0.39	0.49	0.1641	-0.14						
16	Донецька 65	-0.37	-0.13	-0.03	0.09	0.44	0.1192	-0.31						
17	Краснодарська 46	-0.08	0.14	0.04	-0.41	0.31	0.0985	-0.40						
18	Лютесценс 505	-0.05	0.14	-0.13	-0.07	0.11	0.0177	-0.72						
19	Південноукраїнська	0.10	0.08	0.08	-0.26	-0.01	0.0300	-0.67						
20	Миронівська 808	0.11	0.21	-0.08	-0.21	-0.04	0.0352	-0.65						
21	Харківська 63	-0.09	-0.68	0.07	1.23	-0.53	0.7511	2.21						
22	Краснодарська 39	0.60	0.34	-0.17	0.02	-0.78	0.3682	0.68						

G3=CPЗНАЧ(B3:F3)

 G10=CPЗНАЧ(B10:F10)

 I3=\$G3+\$H3*B\$11

 M10=\$G10+\$H10*F\$11

 N3=CPЗНАЧ(I3:M3)

 N10=CPЗНАЧ(I10:M10)

 B15=B3-I3

 F22=F10-M10

B11=CPЗНАЧ(B\$3:B\$10)-CPЗНАЧ(\$B\$3:\$F\$10)

 F11=CPЗНАЧ(F\$3:F\$10)-CPЗНАЧ(\$B\$3:\$F\$10)

 H3=(B3*B11+C3*C11+D3*D11+E3*E11+F3*F11)/((ДИСП.В(\$B\$11:\$F\$11)*(СЧЁТ(В3:F3)-1)))

 H10=(B10*B11+C10*C11+D10*D11+E10*E11+F10*F11)/((ДИСП.В(\$B\$11:\$F\$11)*(СЧЁТ(В10:F10)-1)))

 G15=ДИСП.В(В15:F15)*(СЧЁТ(В15:F15)-1)/(СЧЁТ(В15:F15)-2)

 G22=ДИСП.В(В22:F22)*(СЧЁТ(В22:F22)-1)/(СЧЁТ(В22:F22)-2)

 H15=НОРМАЛИЗАЦИЯ(G15;CPЗНАЧ(\$G\$15:\$G\$22);СТАНДОТКЛОН.В(\$G\$15:\$G\$22))

 H22=НОРМАЛИЗАЦИЯ(G22;CPЗНАЧ(\$G\$15:\$G\$22);СТАНДОТКЛОН.В(\$G\$15:\$G\$22))

З неї бачимо, що найбільш стабільними за цією ознакою є сорти Лютеценс 505, Південноукраїнська і Миронівка 808, які мають *найменші* показники стабільності.

У практиці можуть зустрітися різні поєднання R_i і s_i^2 . Найбільш цінними в селекційному і господарському відношенні слід вважати сорти, у яких $R_i > 1$, а s_i^2 несуттєве. Вони добре відгукуються на поліпшення умов ви-

рощування і мають стабільні показники врожаю або інших досліджуваних властивостей. Це — високоінтенсивні сорти.

Сорти з високими показниками R_i і s_i^2 дещо гірше перших, оскільки у них висока чуйність на умови поєднується зі значною варіабельністю врожаю або іншого досліджуваного властивості.

Сорти, у яких R_i значно менше одиниці, незалежно від величини s_i^2 , слід розглядати як малоперспективні. Вони позбавлені такої важливої біолого–господарської особливості, як адекватний відгук на поліпшення умов вирощування [174].

У нашому разі цей розподіл, виконаний за табл. 14.27 представлений на рис. 14.4. Для більшої наочності на ньому наведена не взаємозалежність між s_i^2 і R_i , а між нормалізованим значенням s_i^2 , тобто $s_{ін}^2$ і R_i , що дає змогу розділити сортотразки у яких урожайність більше і менше середнього.




Рис. 14.4. Взаємозалежність між нормалізованим значенням дисперсії $s_{ін}^2$ і коефіцієнту регресії R_i .

Сорт Краснодарська 39 маючи високу реактивність $R_8 = 1.128$, в той же час недостатньо стабільний $s_8^2 = 0.3682$, а Південноукраїнська практично не реагує на покращання умов вирощування $R_5 = 0.107$, але врожай дуже стабільний $s_8^2 = 0.0300$ (див. табл. 14.27). Зрозуміло, цей висновок має відносний характер, оскільки аналізувалися однорічні дані сортовипробування. Більш надійну оцінку екологічної пластичності сортів може дати аналіз даних, отриманих за два–три роки в ряді пунктів.

Отже, ми отримали три показники, що доповнюють звичайну інформацію про господарсько–біологічні особливості сортів, які вивчаються в

сортівипробуванні: ековаленти (підрозділ **14.2.2.1 Оцінка пластичності за допомогою ековаленти**), коефіцієнт регресії і показник стабільності. Причому ековаленти W_i і показник стабільності s_i^2 характеризують одну й ту ж біологічну особливість сортів — давати сталий урожай у змінюваних умовах.

У тих випадках, коли певний набір сортів вивчали два– три роки в декількох пунктах, представляється можливість досліджувати відгук кожного з них на зміну умов вирощування виконанням трифакторного ДА. При цьому найбільший інтерес представляють два парних взаємодії: “сорт × роки” і “сорт × пункти”. Третє взаємодія “роки × пункти” в даному випадку не береться до уваги [174].

14.2.2.3. Оцінка адаптивної здатності сортів

Подальшим розвитком методів оцінки [174] адаптаційних генотипів стали розробки О. В. Кільчевського і Л. В. Хотилевої [175, 176].

Відповідно до пропонованого методу реакція сорту на умови вирощування характеризується *загальною адаптивною здатністю (ЗАЗ)* — середнім значенням ознаки в різних умовах середовища, *специфічною адаптивною здатністю (САЗ)* — відхиленням від загальної в певному середовищі.

Стабільність — здатність генотипу в результаті регуляторних механізмів підтримувати певний фенотип в різних умовах виростання та пластичністю (R_i — коефіцієнтом регресії сорту на середовище) — реакцією генотипу на зміни умов середовища, що виявляється в фенотипічній мінливості.

Коефіцієнт регресії R_i дає близьку інформацію про стабільність (пластичність) сорту порівняно із специфічною адаптивна здатність $\sigma_{САЗ}^2$, але на відміну від нього вказує реакцію сорту на гірші (кращі) умови. При $R_i > 1$ сорт має більше значення ознаки в порівнянні з іншими сортами в кращих умовах, при $R_i < 1$ — в гірших умовах, при $R_i = 0$ не реагує на зміну умов середовища. Обидва показника доповнюють один другого.

Для виведення сортів, що поєднують продуктивність і стабільність, автори пропонують використовувати *селекційну цінність генотипу СЦГ* — комплексного показника селекційної цінності визначати таким чином

$$СЦГ = \bar{x}_i - p \cdot s_{САЗ}, \quad (14.11)$$

де \bar{x}_i і $s_{САЗ}$ — середнє значення і середньостатистичний відхил даних i -го сорту;

p – показник продуктивності;

n – кількість ділянок.

Використання показник продуктивності замість селекційного критерію $p=2.3$ унеможливилює від'ємні значення **СЦГ**. В якості першого наближення до досягнення оптимального балансу при відборі по продуктивності і стабільності пропонується використовувати середнє значення **СЦГ** в популяції, приблизно половині загальної середньої усієї сукупності фенотипів.

Тоді в'язок між відносною стабільністю генотипів в середньому для популяції становить

$$p = \frac{100}{2 \cdot V_{\text{ср}}} . \quad (14.12)$$

Такий підхід означає, що при низькій буде йти більш інтенсивний відбір на стабільність, а при високій — на продуктивності.

Пропонованої для обчислення **СЦГ** формулою (14.11) можна користуватися лише у тому випадку, якщо відбір йде в бік збільшення значення ознаки. Якщо відбираються генотипи з найменшим значенням ознаки, формула має вигляд

$$\text{СЦГ} = \bar{x}_i - p \cdot s_{\text{САЗ}}, \quad (14.13)$$

Специфічна адаптивна здатність $\sigma_{\text{САЗ}}^2$ для кожного сорту визначається за виразом

$$s_{\text{САЗ}}^2 = s_i^2 - \frac{n-1}{n} s_z^2, \quad (14.14)$$

де s_i^2 – дисперсія i -го сорту;
 s_z^2 – похибка дисперсійного комплексу вихідних даних (чарунка **D5** табл. 14.28);
 n – кількість ділянок.

Відносна стабільність сорту (коефіцієнт варіації) визначається за формулою (1.100) і розраховується її середнє значення $V_{\text{ср}}$ для всієї вибірки.

Для прикладу візьмемо матеріал використаний у двох попередніх підрозділах (табл. 14.28).

Дії до визначення коефіцієнта регресії R включно, аналогічні описаним в підрозділі **14.2.2.2 Оцінка пластичності сортів з використанням коефіцієнту регресії і дисперсії**, тому тут їх не розглядаємо.

Далі розрахунки виконуємо за формулами, наведеними на полі табл. 14.28.

У результаті розрахунків виявилося, що на ділянках I і II найбільш продуктивним виявився сорт пшениці Краснодарська 39, на ділянках II і IV — Харківська 63, а на ділянці V — Дніпровська 782.

Максимальний урожай в середньому за всіма ділянками випробування забезпечив сорт Харківська 63, мінімальний — Люцетис 505. Самим стабільним виявився сорт Люцетис 505 (відносна стабільність 1.52 %, коефіцієнт регресії сорту на середовище 0.451). Найбільш чутливим до зміни умов середовища (нестабільністю) був сорт Харківська 63 (відносна стабільність 17.17 %, коефіцієнт регресії сорту на середовище 1.697). Такий сорт не забезпечить гарантованого високого врожаю на будь якій дослідній ділянці.

Для одночасного відбору форм на **ЗАЗ** і стабільність визначена селекційна цінність генотипу **СЦГ**. Серед трьох найбільш продуктивних сортів (Харківська 63, Краснодарська 39 і Дніпровська 782), кращим сортом, що поєднує високу продуктивність зі стійким урожаєм, є сорт пшениці Дніпровська 782, який може вирощуватися на всіх ділянках. Інші сорти, які виявили високу специфічну адаптивну здатність в мовах відповідних сортоділянок, доцільно вирощувати лише на них.

Таблиця 14.28. Оцінювання індексів адаптивності сортів

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Дисперсионный анализ											
2	Источник вариации	SS	df	MS	F	P-Значение	F критическое	I10=ДИСП.В(B10:F10)-(СЧЁТ(B10:F10)-1)* *\$D\$5/(СЧЁТ(B10:F10))^2 J10=100*I10^0.5/G10 ... J17=100*I17^0.5/G17 J18=СРЗНАЧ(J10:J17) J19=100/(2*J18) K10=G10-\$J\$19*I10^0.5				
3	Строки	4.09	7	0.58	2.75	0.026152	2.3592599					
4	Столбцы	4.02	4	1.01	4.73	0.004813	2.7140758					
5	Погрешность	5.95	28	0.21								
6	Итого	14.1	39									
7												
8	Сорт	Фактична урожайність за сортоділянками, т/га					Середнє сорту, т/га	Коефіцієнт регресії R	Специфічна адаптивна здатність s²	Відносна стабільність сорту (коефіцієнт варіації), %	Загальна адаптивна здатність	
9		I	II	III	IV	V						
10	Дніпровська 782	4.38	5.56	5.83	4.85	5.34	5.192	1.299	0.301	10.57	2.06	
11	Донецька 65	3.79	5.37	5.41	5.05	4.92	4.908	1.656	0.400	12.89	1.30	
12	Краснодарська 46	4.39	5.53	5.39	4.61	5.00	4.984	1.146	0.205	9.08	2.40	
13	Лютесценс 505	4.34	4.89	4.61	4.54	4.58	4.592	0.451	0.005	1.52	4.19	
14	Південноукраїнська	4.48	4.54	4.54	4.17	4.39	4.424	0.107	0.019	3.08	3.65	
15	Миронівська 808	4.65	5.16	4.86	4.58	4.60	4.770	0.516	0.026	3.38	3.85	
16	Харківська 63	4.64	5.42	6.11	6.78	4.53	5.496	1.697	0.891	17.17	0.11	
17	Краснодарська 39	5.19	5.84	5.30	5.16	4.03	5.104	1.128	0.402	12.42	1.49	
18	Індекс умов Ij, т/га	-0.45	0.35	0.32	0.03	-0.26	Середнє					8.76
19							Показник продуктності					5.71

14.2.3. Визначення індексу пластичності при двох градаціях експерименту

У селекційній практиці часто необхідною є оцінка пластичності за дво-річним екологічним сортовипробуванням, випробування на двох селекційних середовищах, зокрема паралельно з експериментом в реальних умовах випробування на інфекційному чи іншому експериментально створеному фоні.

При двох градаціях оціночний параметр “коефіцієнт екологічної пластичності” не може бути використаний, через відсутність ступеня вільності, необхідного для оцінки його достовірної відмінності. У цьому разі рекомендується використовувати для цих цілей “індекс пластичності” R_{ij} , обґрунтований в роботі [174]. Він представляє собою відношення i -х значення аналізованих j -х показників x_{i1} , отриманих при випробуванні “нормальних” (реальних комфортних природних) умовах, до значення x_{i2} , одержаного в експерименті, наприклад на інфекційному фоні [177]

$$R_{ij} = x_{ij1} / x_{ij2}. \quad (14.15)$$

Далі індекси пластичності слід розділити на відповідні значення середніх показників і отримати нормовані індекси пластичності R_{ijn} ³³⁾

$$R_{ijn} = R_{ij} / \bar{R}_j. \quad (14.16)$$

Потім за виразом (14.17) визначаються асоційовані індекси пластичності R_{ia} як середні геометричні

$$R_{ia} = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^k \bar{R}_{ij}}. \quad (14.17)$$

та як середні арифметичні (14.18) — середні багаторічні значення \bar{x}_{ij} досліджуваних показників, вони у нашому випадку наведені в табл. 2.13, с. 97

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\bar{x}_{ij1} + \bar{x}_{ij2}}{2}. \quad (14.18)$$

На наш погляд дані розрахунки краще виконувати із застосуванням пакету **Excel**, ніж використовувати ППП **Statistica**, як рекомендовано у [177]. Базуючись на вихідній таблиці *Середні значення біометричних показників колекції за співпадаючими ділянками, 2004–2005 рр.* (табл. 2.12, чарунки **A1:K99**), колонки для запису результатів розрахунку додаємо до неї колонки для внесення результатів розрахунків індекс пластичності R_{ij} за формулою (14.15), нормованих індексів пластичності R_{ijn} , отриманих за формулою

³³⁾ Не зрозуміло для чого це, їх краще, як і вираз (14.17) нормалізувати функцією **НОРМАЛИЗАЦИЯ** пакету **Excel**.

(14.16) і асоційованих індексів пластичності R_{ia} , одержаних за (14.18) (табл. 14.29).

Середні багаторічні значення досліджуваних показників визначені раніше і представлені у табл. 2.12 (с. 96). Для розрахунку **НІР** можна застосовувати “правило однієї сигми”, тобто $НІР_{05}=s_R/k$, де k – коефіцієнт поправки на число варіантів наведений в табл. Д.20 [177], але, так як виконується попарне порівняння, варто розраховувати **НІР** з більшою точністю, особливо при великій кількості вимірів, застосовуючи метод, описаний у підрозділі **10.9 Апостеріорні критерії**, причому для попарного порівняння доцільно використовувати натуральні значення порівнюваних показників з подальшим перерахуванням **НІР** для нормованих індексів.

Далі слід провести поглиблений порівняльний аналіз відмінності селекційного матеріалу за нормою реакції.

На основі нормованих індексів пластичності можна проводити як поглиблений аналіз відмінності селекційного матеріалу за генетичною специфічністю проявлення норми реакції, так і асоціативний аналіз.

Таблиця 14.29. Розрахунок індексів пластичності сортів при двох градаціях експерименту

1	A	B	C	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2	№ п.п.	№ ділянки	Назва сорторозса	Висота рослини- R	Висота штамбу- R	Кількість гілок- R	Кількість стручків на центральній гілці- R	Висота рослини- R _н	Висота штамбу- R _н	Кількість гілок- R _н	Кількість стручків на центральній гілці- R _н	Асоціативний індекс R _a
3	1	2	K-253	1.03	1.46	0.68	0.80	0.89	1.55	0.99	1.06	1.10
4	2	3	K-257	1.07	0.80	0.77	0.77	0.92	0.85	1.13	1.02	0.97
5	3	4	K-339	1.16	1.79	0.69	0.85	1.00	1.90	1.01	1.12	1.21
6	4	5	K-344	1.15	1.94	0.65	0.74	0.98	2.07	L4=D4/H4		
7	5	6	K-349	1.12	1.76	0.63	1.68	0.96	1.88	O99=G99/K99		
8	6	7	K-407	1.27	1.85	0.72	0.85	1.09	1.97	P4=L4/CP3HA4(L\$4:L\$99)		
9	7	8	K-408	1.22	1.75	0.69	0.84	1.12	1.87	S99=O99/CP3HA4(O\$4:O\$99)		
93	91	149	K-4181	0.98	0.90	0.51	0.55	0.85	0.96	T4=CPGEOM(P4:S4)		
94	92	151	K-4182 Чулимський	1.16	0.67	0.55	0.66	0.99	0.71	T99=CPGEOM(P99:S99)		
95	93	152	K-4182 Чулимський	1.08	0.93	0.55	0.62	0.93	0.99			
96	94	153	K-4183	1.03	0.44	0.46	0.57	0.89	0.47			
97	95	154	Ісилькулець	1.05	0.88	0.46	0.52	0.90	0.93			
98	96	156	Степовий 1	1.17	1.15	0.53	0.78	1.00	1.22	0.78	1.03	1.00
99	Мінімальне значення			0.90	0.19	0.33	0.37	0.77	0.20	0.48	0.50	0.68
100	Нижнє довірче значення			1.14	0.84	0.64	0.71	0.98	0.89	0.94	0.94	0.93
101	Середнє значення			1.16	0.94	0.68	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	0.97
102	Верхнє довірче значення			1.19	1.04	0.72	0.80	1.02	1.11	1.06	1.06	1.01
103	Максимальне значення			1.63	3.58	1.41	1.68	1.40	3.81	2.07	2.22	1.71
104	Кількість замів			96	96	96	96	96	96	96	96	96
105	Стандартне відхилення			0.13	0.49	0.20	0.22	0.11	0.53	0.29	0.29	0.20
106	Похибка середнього вибірки			0.01	0.05	0.02	0.02	0.01	0.05	0.03	0.03	0.02
107	Відносна похибка середнього вибірки, %			1.14	5.36	2.97	2.92	1.14	5.36	2.97	2.92	2.05
108	Коефіцієнт варіації, %			11.15	52.51	29.12	28.62	11.15	52.51	29.12	28.62	20.11
109	Похибка коефіцієнта варіації, %			0.81	4.28	2.19	2.15	0.81	4.28	2.19	2.15	1.48

14.2.4. Визначення коефіцієнта успадкування

14.2.4.1. Загальні положення

Статистичні методи оцінки характеру успадкованого із селекційних ознак і комбінаційної здатності вихідних форм є передумовою для раціонального планування підбору батьківських пар для схрещування і орієнтовного прогнозування ефективності селекції. Найбільш важливе значення для цих цілей має коефіцієнт успадкування h^2 .

Загальна фенотипічна мінливість кількісних ознак s_{Φ}^2 може бути розкладена на спадкову, або генетичну s_{Γ}^2 , і неспадкову (модифікаційну), або паратипічну, мінливість s_{Π}^2 , обумовлену факторами зовнішнього середовища

$$s_{\Phi}^2 = s_{\Gamma}^2 + s_{\Pi}^2. \quad (14.19)$$

Припускаючи, що зв'язок генотипу з паратипом відсутній, і приймаючи загальну фенотипічну мінливість s_{Φ}^2 за одиницю, відношення дисперсій ставлення дисперсій s_{Γ}^2/s_{Φ}^2 і s_{Π}^2/s_{Φ}^2 покаже частку (чи відсоток) генетичної і паратипічної мінливості в загальній фенотипічній мінливості сукупності

$$s_{\Gamma}^2/s_{\Phi}^2 + s_{\Pi}^2/s_{\Phi}^2 = 1. \quad (14.20)$$

Частка генетичної мінливості в загальній варіабельності ознаки називається коефіцієнтом успадкування тобто

$$h^2 = s_{\Gamma}^2/s_{\Phi}^2. \quad (14.21)$$

Відомо кілька методів обчислення коефіцієнта успадкування. Найбільшу популярність набув спосіб визначення h^2 за допомогою ДА, який дозволяє розкласти фенотипічну мінливість s_{Φ}^2 на складові її компоненти: дисперсію фенотипічну s_{Γ}^2 і паратипічну s_{Π}^2 [34].

14.2.4.2. Визначення коефіцієнта спадковості

У селекційній роботі часто вирішують питання про генетичну мінливість у Загальній варіабельності певної ознакою, наприклад, яка частка цукристості успадковується гібридом цукрових буряків від материнської форми або яка частка білка успадковується гібридом від материнської форми пшениці тощо. Для вирішенню цих питань визначаються коефіцієнт успадкування h^2 за формулою

$$h^2 = 2 \cdot b, \quad (14.22)$$

де b – коефіцієнт регресії ряду Y за рядом X .

Для визначення коефіцієнта регресії складають варіаційний ряд досліджуваного показника материнської форми X та ряду гібрида Y .

За їх даними обчислюють значення коефіцієнта регресії b за формулою (11.12).

Подвоєне значення цього коефіцієнта покаже частку успадкування досліджуваної ознаки [132].

Краще коефіцієнта регресії b знаходити використанням інструментів пакету **MS Excel**, як це описано у підрозділах **11.4.1.1 Визначення коефіцієнтів однофакторної регресії розрахунковим способом**, **11.4.1.2 Застосування інструменту РЕГРЕССИЯ MS Excel**, **11.4.1.3 Використання лінії тренду для визначення параметрів рівняння регресії за допомогою MS Excel і ППП Statistica**, підрозділ **11.4.1.2 Визначення і оцінка коефіцієнтів однофакторної лінійної регресії за допомогою ППП Statistica**.



При цьому необхідно перевіряти і достовірність оцінки спадковості, виконуючи перевірку коефіцієнта регресії b за t –критерієм Стюдента. Якщо регресія достовірна, то достовірна і спадковість [132].

14.2.4.3. Розрахунок коефіцієнту успадкування при однофакторному експерименті

За даними обліку маси зерна з одного колоса гібридом пшениці (табл. 14.30) [34] обчислити коефіцієнт успадкування методом ДА. Вибірка представляє собою дію чотирьох батьківських форм ($I_B=4$), визначених у п'яти повтореннях, тобто $n=5$.

Розрахунок виконується **однофакторним ДА з повторенням**. Виходячи з підрозділу **10.4.3.2 Однофакторний дисперсійний аналіз із застосуванням ППП Statistica** для цієї мети краще застосувати ППП **Statistica** використавши опцію

Таблиця 14.30. Маса зерна в одному колосі гібрида F						
Назва гібриду		Повторення				
материнська форма	батьківська форма	I	II	III	IV	V
a	b ₁	5.5	4.1	3.0	2.2	3.8
a	b ₂	5.0	3.1	3.0	2.1	4.0
a	b ₃	5.2	3.7	3.2	2.0	3.9
a	b ₄	5.4	5.0	3.4	2.7	4.4

 Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА ,

див. табл. 10.16, с. 586.

Отримані результати ДА, вставлені в таблицю **Excel**, наведено в табл. 14.31.

Таблиця 14.31. Результати однофакторного ДА і визначення показника успадкування.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Дисперсія		Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _ф	Рівень значущості p
2	Корегуючий фактор C	Св. член	279.00450	1	279.0045		
3	Варіантів C _v	Батьківська форма	1.51750	3	0.5058	5.3013	0.0147
4	Залишок (похибка) C _z	Ошибка	1.14500	12	0.0954	F5=(E5/\$E\$4)	
5	Повторення C _p	R1	20.24300	4	5.0608	53.0384	0.0000
6		R1*Батьківська ф.	1.14500	12	0.0954	C4=СУММ(C6:C7) D4=СУММ(D6:D7)	
7		Ошибка		0			
8	Результсти розрахунку				G3=1-F.РАСП(F3;D3;\$D\$4;ИСТИНА) G5=1-F.РАСП(F5;D5;\$D\$4;ИСТИНА) C10=(E3-E6)/(D5+1) C11=C10+E6 C12=C10/C11 F3=(E3/\$E\$4) E4=C4/D4		
9							
10	Генетична мінливість s _г ²		0.0821				
11	Фенотипічна мінливість s _ф ²		0.1775				
12	Коефіцієнт успадкування h ²		0.4624				

В ній також наведені розрахунки коефіцієнту успадкування **h²**, виконувани за виразами (14.23)

$$s_{\phi}^2 = \frac{s_V^2 - s^2}{n} \quad \text{і} \quad s_{\phi}^2 = s_{\Gamma}^2 + s^2. \quad (14.23)$$

Тут **s_V²** — дисперсія варіантів **C_V** (батьківських форм), **s²** — залишок (похибка) **C_z**.

Таким чином коефіцієнт успадкування **h²**, який характеризує ступінь передачі селекційної ознаки від батьківської форми до гібриду становить 0.4624, тобто 46.24 %, тому відбір за цією ознакою ефективний [34].

14.2.4.4. Розрахунок коефіцієнту успадкування при двофакторному експерименті

За даними кількості зернин в колосі гібридів (табл. 14.32) слід розрахувати коефіцієнт успадкування методом двофакторному експерименту [34]. Вибірка представляє собою дію трьох материнських (**l_A**=3) і двох батьківських форм (**l_B**=2), визначених у чотирьох повтореннях, тобто **n** = 4.

Розрахунок виконується двофакторним ДА з повторенням. Виходячи з підрозділу 10.5.2.3 Дисперсійний аналіз двофакторного експерименту з

Таблиця 14.32. Кількість зернин в колосі гібридів

Назва гібриду		Повторення			
Матір (A)	Батько (B)	I	II	III	IV
a ₁	b ₁	20	20	22	21
a ₁	b ₂	18	19	20	19
a ₂	b ₁	23	23	20	22
a ₂	b ₂	22	23	24	24
a ₃	b ₁	29	28	27	28
a ₃	b ₂	29	30	32	32

повторенням при використанні **ППП Statistica** для цієї мети найкраще застосувати **ППП Statistica** застосувавши використавши опцію  Repeated measures ANOVA /  Повторные измерения ДА, див. табл. 10.32, с. 605.

Отримані результати ДА, вставлені і таблицю **Excel**, наведено в табл. 14.33. В ній також наведені вирази для розрахунку коефіцієнту успадкування h^2 , виконувані за виразами (14.24)–(14.27).

У двухфакторному комплексі дисперсія групових середніх має більш складну природу, ніж в однофакторним, і визначається як генетичною мінливістю, обумовленої генотипами материнських і батьківських форм та їх взаємодії, так і випадковою, паратипічну, мінливістю (залишок).

Загальний коефіцієнт успадкування в цьому випадку дорівнює (14.24)

$$h^2 = h_A^2 + h_B^2 + h_{AB}^2. \quad (14.24)$$

Для з'ясування впливу на фенотипічну мінливість генотипів материнських форм s_A^2 , батьківських форм s_B^2 та їх взаємодії s_{AB}^2 виконується на основі ДА двухфакторного експерименту за виразами (14.25)–(14.27)

$$s_A^2 = \frac{MS_A - MS_{AB}}{n \cdot (df_B + 1)}; \quad s_B^2 = \frac{MS_B - MS_{AB}}{n \cdot (df_A - 1)}; \quad (14.25)$$

$$s_{\Phi}^2 = s_A^2 + s_B^2 + s_{AB}^2; \quad (14.26)$$

$$h_A^2 = \frac{s_A^2}{s_{\Phi}^2}, \quad h_B^2 = \frac{s_B^2}{s_{\Phi}^2}, \quad h_{AB}^2 = \frac{s_{AB}^2}{s_{\Phi}^2}. \quad (14.27)$$

У даному випадку незначущим є вплив батьківської форми (табл. 14.33) і в розрахунках не використовуються.

Таблиця 14.33. Результати однофакторного ДА і визначення показника успадкування.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Дисперсія		Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат MS	Критерій Фішера F _ф	Рівень значущості p
2	Корегуючий фактор C	Intercept	13776.04	1	13776.04		
3	Матір	Матір	382.33	2	191.17	144.8842	0.00000
4	Батько	Батько	3.38	1	3.38	2.5579	0.13059
5	Матір*Батько	Матір*Батько	21.00	2	10.50	7.9579	0.00441
6	Залишок (похибка) C _z	Error	19.79	15	1.3194		
7	Повторення C _p	R1	2.46	3	0.82		
8	C7=СУММ(D9:D12)	R1*Матір	4.67	6	0.78		
9	D7=СУММ(E9:E12)	R1*Батько	9.13	3	3.04		
10	E7=D7/E7	R1*Матір*Батько	6.00	6	1.00		
11		Error		0			
12	F3=F3/\$F\$7 G3=1-F.РАСП(G3;E3;\$E\$7;ИСТИНА)					Результати розрахунку	
13	G14=ABS(E3-E5)/((D4+1)*(D7+1))						
14	G15=ABS(E4-E5)/((D3+1)*(D7+1))						
15	G16=ABS(E5-E6)/(D7+1) G17=СУММ(G14:G16)+E6						
16	G18=G14/\$G\$17 G19=G15/\$G\$17						
17	G20=G16/\$G\$17 G21=СУММ(G18:G20)						
18							
19							
20							
21							
						s_A^2	22.5833
						s_B^2	0.5938
						s_{AB}^2	2.2951
						s_ϕ^2	26.7917
						h_A^2	0.8429
						h_B^2	0.0222
						h_{AB}^2	0.0857
						h_0^2	0.9508

Загальний коефіцієнт успадкованого при даному підборі пар для схрещування дорівнює 0.9508, тобто 95.08 % [34].

14.3. ЕЛЕМЕНТИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

14.3.1. Коефіцієнт подібності Серенсена–Чекановського

Дуже часто при обробці результатів екологічних досліджень виникає завдання кількісно оцінити ступінь подібності кількох сукупностей, наприклад — схожість двох видів рослин чи тварин за характером розподілу в різних ареалах або, навпаки, — схожість двох або більше ареалів за складом видів [178].

Для вирішення подібних завдань застосовують велику кількість коефіцієнтів подібності або схожості, які дають подібні результати, тому тут наводиться лише один з найбільш вживаних коефіцієнтів — коефіцієнт подібності Серенсена–Чекановського. Він є найбільш універсальним при оцінках схожості двох або більше сукупностей даних. Зручний він тим, що для його обчислення дані можуть бути представлені як у відсотковому вигляді, так і в абсолютних величинах. Крім того, у цього коефіцієнта є модифікація, за допомогою якої можна оцінювати якісну подібність двох сукупностей за наявністю в них загальних елементів.

Таблиця 14.34. Обчислення коефіцієнта подібності Серенсена–Чекановського

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ділянка	Чисельність (щільність) видів										Сума
2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Поле А	8	45	12	113	81	60	4	247	65	32	667
4	Поле В	25	67	8	548	111	43	6	1391	63	68	2330
5	Мінімум	8	45	8	113	81	43	4	247	63	32	644
6					Коефіцієнт подібності $K_n = 0.4298$							
B5=МИН(C4:C5) L3=СУММ(C4:L4) L3=2*M6/(M4+M5)												

Процедуру обчислення пояснимо на прикладі засміченості двох полів 10 видами бур'янів, кількість яких на мірних ділянках однакової площі наведена в табл. 14.34.

Формула для оцінки подібності кількісних ознак виглядає ³⁴⁾

$$K_n = \frac{\sum \min(a_i, b_i)}{\sum a_i + \sum b_i}, \quad (14.28)$$

де $\sum \min(a_i, b_i)$ – сума мінімальних значень бур'янів на обох полях;
 $\sum a_i, \sum b_i$ – це суми всіх бур'янів на полях А і В.

За цією формулою отримуємо $K_s = 0.4298$.

Оскільки коефіцієнт Серенсена–Чекановського змінюється від 0 до 1 (відсутність подібності — повна подібність), то в даному випадку маємо низький ступінь подібності забур'янення двох досліджених полів.

Оскільки величина подібності, знайдена за допомогою даного коефіцієнта, — величина відносна, доцільним є проведення порівнянь між собою декількох пар сукупностей. Так, наприклад, маючи набір з 5–6 місць існування можна розрахувати коефіцієнти подібності для кожної з пар середовищ існування, і за виявленими значеннями коефіцієнта визначити найбільш подібні і найбільш різні місцеперебування.

Коефіцієнт Серенсена–Чекановського для обчислення подібності за якісними ознаками розраховують за формулою

$$K_s = \frac{2a}{2a + b + c}, \quad (14.29)$$

³⁴⁾ При застосуванні цієї формули для розрахунків подібності за відносними значеннями (відсотки або частки одиниці), розраховується коефіцієнт Шоригіна. Складаються мінімальні з двох рядів значення, і їх сума лежить в межах від 0 (при повній відсутності подібності) до 100 % (1.0) при повному схожості. Даний захід є також досить прийнятною при розрахунках подібності рядів, але вимагає перерахунку абсолютних значень в відносні.

де a – число загальних ознак в обох порівнюваних сукупностях;
 b – число ознак, що належать тільки 1-й сукупності;
 c – число ознак, що належать тільки 2-й сукупності.

Наприклад, при порівнянні забур'янення двох досліджених полів, одне з яких складається з 18, а інше — з 21 видів бур'янів, причому 15 видів зустрічаються на обох полях:

$$K_s = 2 \cdot 15 / [2 \cdot 15 + (18 - 15) + (21 - 15)] = 0.736.$$

Даний коефіцієнт також приймає значення від 0 до 1.

14.3.2. Оцінка екологічного різноманітності

Поняття біологічного (екологічного) різноманітності складається з двох чинників (величин): **видового багатства** (числа видів) і їх **чисельності** (кількості осіб). Різні статистичні моделі дозволяють оцінити як видове багатство окремо, так і видове різноманіття спільноти в цілому [178].

14.3.2.1. Індекси видового багатства

Індекси видового багатства найбільш прості і враховують тільки те, яке число видів припадає на загальне число особин [178].

Індекси видового багатства прості і зручні у використанні, як правило добре вловлюють відмінності між середовищами існування, але істотно залежать від розміру вибірки (числа видів). Бажано при цьому аналізувати приблизно однакові і досить великі обсяги вибірок.

Найбільш швидким способом оцінки видового багатства (легкі розрахунки) є індекси Маргалефа і Менхініка. Вони дозволяють оцінити, скільки доводиться видів на загальне число осіб.

а) Індекс Маргалефа

$$D = (S - 1) / \lg N; \quad (14.30)$$

б) Індекс Менхініка

$$D = S / \sqrt{N}, \quad (14.31)$$

де S – число виявлених видів;
 N – загальне число осіб всіх виявлених видів.

Підкреслимо, що обидва цих індексів дають відносні значення, тобто їх можна використовувати тільки для порівняння спільнот одного і того ж типу (наприклад спільноти різних груп тварин чи рослин у різних місцях проживання, але ні в якому разі не різні спільноти між собою).

14.3.2.2. Індeksi видового різноманіття

Більш складними для розрахунків, але і більш “повними”, тобто добре вловлюють біологічну суть спільнот, є *індекси видового різноманіття*, які, крім видового багатства, враховують ще і велика кількість кожного з видів.

Одним з найбільш популярних в екології є індекс Макінтоша (міра різноманітності Макінтоша) [178]

$$D = \sqrt{\sum_i n_i}, \quad (14.32)$$

де n_i – кількість осіб i -го виду.

Оскільки в даному виді індекс змінюється від 1 до нескінченності (причому чим “різноманітніше” співтовариство, тим індекс нижче, тобто даний індекс є індексом “одноманітності”), автором на його основі розроблений інший, більш точний індекс різноманітності:

$$\Delta' = (N - D) (N - \sqrt{N}), \quad (14.33)$$

де D – стандартна міра різноманітності Макінтоша, розрахована за формулою (14.32).

Процедуру розрахунків пояснимо на прикладі. Нехай на полі виявлено загалом $N = 50$ бур'янів 5-ти видів з наступним їх числом: $n_1 = 30$, $n_2 = 10$, $n_3 = 5$, $n_4 = 3$, $n_5 = 2$.

В даному прикладі

$$D = \sqrt{30^2 + 10^2 + 5^2 + 3^2 + 2^2} = 32,2;$$

$$\Delta' = (50 - 32,2) / (50 - \sqrt{50}) = 0,414.$$

Даний модифікований індекс Макінтоша змінюється в межах від 0 (при наявності тільки одного виду в співтоваристві) до 1 (рівномірний розподіл чисельності за видами, тобто максимальна різноманітність).

14.3.2.3. Оцінка ширини екологічної ніші (місця розповсюдження)

Для вивчення різноманітності природних ресурсів, використовуваних особою або видом, біологи аналізують зазвичай два екологічних параметри: *ширину екологічної ніші* і *рівномірність розподілу по місцю розповсюдження*.

Для оцінки цих показників найчастіше застосовують індекс Сімпсона (індекс “полідомінантності”) [178]

$$S_{\lambda} = 1 / \sum_i p_i^2, \quad (14.34)$$

де p_i – частки зустрічальності видів, які використовують той чи інший ресурс, або частки чисельності видів в тому чи іншому місці розповсюдження.

Показник змінюється в межах від 1 (мінімальна “ширина” ніші, в разі, якщо вид використовує лише один ресурс або зустрічається тільки в одному місці розповсюдження) до нескінченності.

Наприклад, потрібно оцінити ширину екологічної ніші виду, що використовує ті чи інші кормові об’єкти, або розподіленого за рядом місць існування. Є такі вихідні дані розподілу: гіпотетичний вид використовує 7 типів корму (чи зустрічається в 7 місцях проживання), кожен з яких використовує (зустрічається) з частотою — 0,40; 0,25; 0,10; 0,10; 0,08; 0,05; 0,02 (“частки” — це ті ж відсотки, але не від 0 до 100, а від 0 до 1). За виразом (14.34) маємо:

$$S_{\lambda} = 1 / (0.40^2 + 0.25^2 + 0.10^2 + 0.10^2 + 0.08^2 + 0.05^2 + 0.02^2) = 3.941.$$

Обчислена таким чином ширина екологічної ніші або місцеперебування є показником відносним, тобто призначена тільки для порівняння декількох видів між собою.

Проте, даний індекс не враховує загального різноманітності ресурсу або середовища існування, який потенційно може використовуватися видом. Тобто в прикладі, розглянутому вище, крім тих 7 ресурсів (середовища існування) *використовуваних видом*, в даній екосистемі можуть бути також ресурси, які *не використовуються*, видом, але цей факт цією формулою не враховується.

Для “виправлення” цього недоліку отриманий за допомогою індексу Сімпсона показник *нормують* за числом *всіх потенційних* ресурсів (середовища існування)

$$S'_\lambda = S_\lambda / \sum_i N_i, \quad (14.35)$$

де $\sum N_i$ – загальне число всіх ресурсів (середовища існування), які може використовувати (в яких може зустрічатися) досліджуваний вид.

Даний показник також є відносним і лежить в межах від нуля (нескінченно простує до нуля в разі дуже великого числа невикористовуваних ресурсів) до нескінченності.

Описані вище найпростіші статистичні методи не вимагають застосування спеціальних таблиць, необхідних при використанні більшості інших статистичних критеріїв. Для тих, хто в своїй роботі стикається з необхідністю обробки великих масивів даних з високою точністю, а також бажаючим самостійно освоїти інші статистичні методи, рекомендуємо звертатися до спеціальної літератури по математичній статистиці і біометрії.

15. ТАБЛИЧНЕ І ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

15.1. ПОДАННЯ МАТЕРІАЛУ У ТАБЛИЧНОМУ ВИГЛЯДІ

Таблиці використовують для кращого унаочнення та зручності порівнювання показників [179]. Вони є основною формою запису даних про фізичні константи, властивості та характеристики речовин, матеріалів та інших об'єктів. В них також наводиться цифровий або текстовий матеріал, коли його багато або є необхідність у зіставленні певних показників. Подання експериментальних залежностей в виді графіків або формул не повинно замінити їхнього подання в виді таблиць.

Таблиці даних повинна передувати текстова частина, що містить опис процедури експерименту (об'єкт і метод дослідження; умов його проведення; апаратура, в тому числі вимірювальна; обробка експериментальних даних; спосіб розрахунків; оцінка ступінь вірогідності отриманих даних).

За змістом таблиці поділяються на *аналітичні* та *неаналітичні*. *Аналітичні* таблиці є результатом обробки й аналізу цифрових показників. Після таких таблиць завжди наводиться текстовий аналіз і робиться узагальнення про нове (виведене) знання, яке вводиться до тексту словами: “таблиця дає змогу зробити висновок, що...”, “із таблиці видно, що...” і т. ін. Такі таблиці сприяють виявленню і формулюванню певних закономірностей.

До *неаналітичних* таблиць вміщують здебільшого необроблені статистичні дані, необхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей [180].

Наводити слід лише ті таблиці, які не можна передати звичайним текстом (результати експериментальних спостережень, співставлення розбіжностей, детальні довідкові дані і т. ін.). Усі наведені дані мають бути достовірними, однорідними і такими, що можуть зіставитися. Основою їх групування є лише суттєві ознаки.

Так як при використанні методів описової статистики для невеликого числа об'єктів дослідження можна отримати спотворення реальності, вибірки із кількістю об'єктів менше ніж 20, прийнято представляти данні таблицями у початковому вигляді, а методи статистики використовувати як допоміжний спосіб опису [181].

Таблична частина повинна містити результати експериментів у вигляді значень характеристик властивостей речовин і матеріалів, похибки приведених даних, і при запозичення даних —джерело запозичення. Слід вказувати максимальне відхилення між експериментальними і числовими даними.

Цифрові дані слід оформлювати як таблицю відповідно до форми, поданої на рис.15.1 [182].

Таблицю подають безпосередньо після тексту, де її згадано вперше, або на наступній сторінці так, щоб її можна було читати без повороту [184] або з поворотом за стрілкою годинника [183].

Нумерований
заголовок [184]
Таблиця _____ — _____
номер назва таблиці

Тематичний
заголовок [184]

Головка							Заголовки колонок
							Підзаголовки колонок
							Рядки (хвост) [184]
	Боковик (колонка для заголовків рядків)		Колонки Прографа [184]				

Рисунок 15.1. Структура і оформлення таблиць

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, можна не наводити, якщо це не ускладнює користування таблицею.

На кожну таблицю має бути посилання в тексті із зазначенням її номера.

Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами, крім таблиць у додатках.

Дозволено таблиці нумерувати в межах розділу. У цьому разі номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, “Таблиця 2.1” — перша таблиця другого розділу.

Таблиці кожного додатка нумерують окремо. Номер таблиці додатка складається з по значення додатка та порядкового номера таблиці в додатку, відокремлених крапкою. Наприклад, “Таблиця В.1 _____”, тобто перша таблиця додатка В.

Якщо в тексті звіту подано лише одну таблицю, її нумерують.

Назва таблиці має відображати її зміст, бути конкретною та стислою. Якщо з тексту звіту можна зрозуміти зміст таблиці, її назву можна не наводити [184].

Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з абзацного відступу [184]³⁵⁾.

Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці [185]. Головне слово назви наводиться в однині називного відмінку [186].

³⁵⁾ За [183] симетрично до тексту (починаючи над верхнім лівим кутом) [179].

Якщо рядки або колонки таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою або поруч, чи переносять частину таблиці на наступну сторінку. У кожній частині таблиці повторюють її головку без позначення колонок їх номерами та боковик [184].

Таблицю з усіх сторін обмежують лініями. Якщо в кінці сторінки таблиця переривається, то в першій частині таблиці нижню обмежувальну горизонтальну лінію не наводять. Якщо таблиця переривається праворуч, то частина колонок переноситься нижче або на іншу сторінку, у першій частині таблиці праву обмежувальну вертикальну лінію не наводять [179].

У разі поділу таблиці на частини дозволено її головку чи боковик замінити відповідно номерами колонок або рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами в першій частині таблиці [184].

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею [185]. При цьому головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці [179]. Головка таблиці може набиратися шрифтом меншим, ніж її зміст.

Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією або лінією подвійної товщини [188]. Якщо є потреба подати в тексті лише форму таблиці, її подають як заповнену головку таблиці [179].

Слово “Таблиця ___” подають лише один раз над першою частиною таблиці. Над іншими частинами таблиці з абзацного відступу друкують “Продовження таблиці _____” або “Кінець таблиці _____” без повторення її назви [184], а на останній сторінці — “Закінчення таблиці ___” [179].

Заголовки колонок та рядків таблиці починають з великої літери, а підзаголовки — з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком [185].

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик замінити відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці [185]. Заголовок таблиці не повторюють.

Підзаголовки, які мають самостійне значення, подають з великої літери [185]. Висота рядків повинна бути не меншою від 8 мм [183]. Дopusкається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж у тексті [187]. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці слід вносити якщо на них є посилання в тексті, чи вона переноситься на іншу сторінку. За необхідності нумерація вказується у першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед назвою. Перед числовими значеннями величин і позначеннями типів, марок і т.п. порядкові номери не проставляються [179, 188].

Таблиці треба заповнювати за правилами, які відповідають [189, 190].

Перелік таблиць можна наводити у “Змісті” із зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) і сторінок початку таблиць [184].

Таблиці з невеликою кількістю колонок дозволено поділити на частини і розташувати одну частину поряд з іншою на одній сторінці, повторюючи головку таблиці [179].

За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розмішують у боковику, головці чи в них обох, а не у прографці; логічний предикат, або присудок, таблиці (тобто дані, якими характеризується підмет) — у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику — всіх даних цього рядка [183].

Заголовок кожної графи в головці таблиці мусить бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються [183].

У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Переважна форма іменників у заголовках — однині [184] називного відмінку, скорочення слів в заголовках граф не допускається.

Заголовки і підзаголовки граф таблиці друкуються через один інтервал [186]. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається їх перпендикулярне розміщення. Дозволено як виняток додатково нумерувати колонки таблиці арабськими цифрами:

- коли в тексті треба посилатися на певну колонку таблиці;
- коли головка має великі розміри, а таблицю треба переносити на чергову сторінку; у цьому разі головку таблиці на подальших сторінках не наводять [179].

Боковик, як і головка, потребує лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У прографці повторювані елементи, які стосуються до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи збігалися; неоднорідні — посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним [183].

У таблицю числа записують таким чином, щоб вони знаходилися в інтервалі від 1,00 до 1000, при необхідності використовуються приставки і десяткові множники. Числові значення величини в одній графі чи колонці повинні мати, як правило, однакову кількість десяткових знаків і бути вирівняними по класу цифр [179, 186].

Округлення чисел, що приводяться в таблиці, має проводитися з однаковим ступенем точності.

Якщо одна величина перевершує іншу багаторазово, то отримані відносні показники краще висловлювати не у відсотках, а в кількості раз [3].

Граничні відхили і довірчі інтервали, тощо, що стосуються всіх числових значень величин, поданих в одній колонці, зазначають в головці таблиці

під назвою або позначкою показника. Якщо вони стосуються декількох числових значень величин або певного числового значення величини, то їх подають в окремій колонці [188].

Текст, що повторюється в рядках тої самої колонки і складений зі слів, що чергуються з цифрами, замінюють лапками. Якщо в колонці повторюють текст, що складається з двох і більше слів, то в разі першого повторення його замінюють словами “Те саме”, а далі — лапками.

Якщо в колонці (в якій немає горизонтальних розділових ліній) повторюють лише частину речення, цю частину можна замінити словами “Те саме”. За наявності горизонтальних ліній текст у колонці треба повторювати.

Не можна замінювати лапками повторювані в таблиці цифри, математичні знаки і хімічні символи, знаки відсотка й номери, позначки марок матеріалів і типорозмірів продукції, позначення нормативних документів [179].

При заповненні чарунок текстом, крапка в кінці не ставиться [191].

При виконанні текстових документів з застосуванням програмних засобів напис “Продовження таблиці ___” можна не вказувати [188].

У таблицях за потреби використовують східчасті лінії, наприклад, щоб виділити діапазон, віднесений до певного значення, об’єднати позиції у групі та навести основні числові значення показників, розташованих усередині східчастої лінії, або щоб вказати на те, яких значень колонок і рядків стосуються певні відхилення. У такому разі в тексті треба пояснювати, як використовувати ці лінії.

Числові значення величин, однакові для кількох рядків, дозволено подавати один раз об’єднуючи рядки колонки.

Якщо значення величин у колонках подають у різних одиницях фізичних величин, їхні позначки подають у підзаголовку кожної колонки.

Ознаки в рядках і колонках повинні розташовуватися в логічному порядку з урахуванням необхідності їх спільного розгляду. Інформація розміщується від часткового до загального, тобто спочатку показують складові, а в кінці підводять підсумки.

Якщо в таблиці наводяться не всі дані, а тільки найбільш значимі з них то спочатку показують підсумок, а потім виділяють найбільш важливі частини за допомогою оборотів “в тому числі”, “з них”.

Слід розрізняти “Разом” і “Всього”. “Разом” є підсумком для певної частини сукупності, а “Всього” — підсумок для всієї сукупності [3].

Використані в таблиці позначення певних числових величин чи типів (марок тощо) продукції, слід вживати, пояснюючи їх у тексті [179]

Якщо цифрові або інші дані в чарунці таблиці не подають, то в ній ставлять:

- тире, або прочерк (—) [183] якщо явищ не було;
- три крапки (...) — відомості відсутні (або робиться запис “Немає відомостей”);
- якщо відомості є, але числове їх значення менше прийнятої в таблиці точності, воно виражається дробовим числом 0.0;

— символ (×) — заповнення рубрики за характером таблиці не має сенсу [3].

Якщо в таблиці більше 9 граф, розташовують її поперек сторінки.

Текст головки таблиці і боковика повинен давати чітку уяву які дані і в яких одиницях поміщені в прографці. Допускається застосовувати позначення фізичних одиниць в заголовках граф і в найменуванні рядків таблиці [188].

Числове значення показника проставляють на рівні останнього рядка його найменування показника [179, 188]. Значення показника у формі тексту та текст інших колонок — на рівні першого рядка його назви.

Щоб виділити основну номенклатуру або щоб обмежити числові значення величин чи типів (марок) тощо, які стосуються продукції, дозволено подавати в дужках ті їхні значення, які мають обмежене вживання або не рекомендовані для вживання, пояснюючи в примітці дану інформацію.

Якщо же параметри, розміщені в таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, скорочене позначення одиниці фізичної величини наводять в заголовку таблиці.

Позначення одиниці фізичної величини можна виносити в окрему колонку (рядок). Якщо в колонці подано значення тої самої величини, то позначення одиниці фізичної величини наводять у заголовку (підзаголовку) цієї колонки

Позначення одиниць плоского кута треба наводити не в заголовках колонок, а в кожному рядку таблиці як за наявності розділових горизонтальних ліній, так і коли їх немає.

У заголовку колонки або рядка одиницю фізичної величини пишуть після назви цієї величини, між ними ставлять кому.

Якщо всі показники, наведені в колонках таблиці, визначено тією самою одиницею фізичної величини, її позначення розташовують над таблицею праворуч, а для таблиці, поділеної на частини — над кожною частиною. У такому разі в колонках її вже не зазначають.

Якщо в більшості колонок таблиці наведено показники, визначені в однакових одиницях, наприклад у вольтах або штуках, але є колонки з показниками в інших одиницях, над таблицею треба зазначати назву основного показника та назву його одиниць, наприклад “Напруга у вольтах” або “Кількість у штуках”. У заголовках решти колонок треба подавати назви показників і (або) позначення одиниць фізичних величин, в яких їх використано.

Заголовки колонок та текст рядків таблиці розміщують по центру чи зміщують ліворуч на нульову позицію, зважаючи на специфіку таблиці.

Розділяти заголовки та підзаголовки боковика і колонок діагональними лініями заборонено.

Щоб скоротити текст заголовків та підзаголовків колонок, деякі поняття можна замінювати літерними позначками відповідно до ГОСТ 2.321, стандартів комплексу ДСТУ 3651 або іншими позначками, якщо вони пояснені у

тексті або в рисунках, наприклад: *D* — діаметр, *H* — висота, *L* — довжина. *U* — напруга.

Показники з тою самою літерною позначкою групують послідовно відповідно до зростання їхніх індексів.

Обмежувальні поняття “більше”, “менше”, “не менше” тощо треба подавати в одному рядку або колонці таблиці з назвою відповідного показника після позначення його одиниці фізичної величини, якщо вони належать до всього рядка або колонки. Перед обмежувальним поняттям ставлять кому.

Позначення одиниці фізичної величини, спільної для всіх показників у рядку, треба подавати після її назви.

Щоб пояснити окремі дані таблиці, їх треба відмічати надрядковим знаком виноски (зірочкою). Якщо в таблиці є виноски й примітки, спочатку подають виноски, потім — примітки [179].

Інші вимоги до виконання таблиць — відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок на яких вони розміщені [185].

15.2. ТАБЛИЦІ–ВИСНОВКИ

При невеликому за обсягом цифровому матеріалі його доцільно оформлювати як текст, а не таблицею, розташовуючи цифрові дані колонками [179], формуючи **таблиці–висновки**. Висновок, як правило, містить боковик, крапки та одну чи дві графи (стовпчики). Висновок дають без заголовка, якщо він є безпосереднім продовженням матеріалу і граматично пов’язаний із вступною фразою тексту; із заголовком, якщо висновок має самостійне значення. Розмірності виносяться у загальний заголовок, або в заголовки граф чи в боковик [184].

Приклад

Граничні відхили розмірів профілів усіх номерів:

за висотою	$\pm 2,5 \%$
за шириною полиці	$\pm 1,5 \%$
за товщиною стінки	$\pm 0,3 \%$
за товщиною полиці	$\pm 0.3 \%$ [179]

У вигляді висновків найчастіше оформляють технічні дані, характеристики приладів, економічні показники і т. п. [184]

Приклад:

... Основні показники ліній годівлі тварин наведені нижче.

	Лінії господарств		Створена лінія
	“Гори”	“Доли”	“Стіл”
Капітальні вкладення, грн./т	23,4	9,9	3,9
Експлуатаційні витрати, грн./т	4,6	3,3	2,2
Приведені витрати, грн./т	9,2	5,3	3,2
Сумарна потужність електродвигунів, кВт	220	227	104

15.3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Графічне зображення експериментальних даних робить їх наочними, зручними для аналізу, полегшує порівняння експериментальних кривих з відповідними теоретичними. Вигляд графічної залежності дозволяє зробити висновок про якість проведеного експерименту. Графіки використовуються для одержання емпіричних співвідношень між двома величинами.

Користуючись графіком, можна знайти величину функції для невикористаних значень параметрів методом інтерполяції чи методом екстраполяції (якщо характер залежності за межами дослідженого інтервалу постійний і не змінюється).

При побудові графіків слід дотримуватися рекомендацій ЄСКД Р 50-77-88 [192] і таких правил:

- масштаби для величин, що відкладаються по осях незалежні;
- на горизонтальній осі (абсцисі), як правило, відкладається незалежна змінна, тобто величина, яка задається експериментатором, а на вертикальній осі (ординаті) — її функція чи величина, яка вимірюється;
- кожна вісь може починатися не лише з нуля, а з будь-якого значення;
- значення всіх величин записуються в системі **SI**;
- якщо треба навести дуже великі або дуже малі числа, користується нормованою формою запису, наприклад, 5.18×10^{-9} (5.18 — мантиса, 10^{-9} — порядок). Мантиса числа повинна мати одну цифру до коми.
- за одиниці масштабу доцільно вибрати такою, щоб поділки осей були кратні 1, 2, 5 чи 10 одиницям мантиси;
- масштаби слід вибирати таким чином, щоб крива, що відображає залежність, була розміщена поблизу бісектриси координатного кута;
- не слід позначати на осі числові значення величин, які одержані при вимірюваннях;
- символ величини, множник, що визначає порядок числа, та одиницю виміру слід записувати в кінці координатної осі на вільному від експериментальних точок місці;

— експериментальні точки наносяться на графік у вигляді помірно великих добре видимих точок. Щоб розрізнити експериментальні точки що відносяться до різних кривих треба користуватися різними позначеннями (або різними кольорами) і на вільному просторі діаграми вказати, які значки до яких кривих належать;

— стовбці чи сектори діаграм та точки графіків, побудованих за відсутніми у тексті даними, слід **супроводжувати цифровими значеннями**;

— у разі статистичних вимірів для експериментальних точок слід наводити довірчі інтервали (похибки експериментальних значень вимірної величини), або поле довірчого інтервалу (див. рис. 16.37).

Основною вимогою ліній графіків є те, що вони повинні не виходити за межі похибок експериментальних точок чи поля довірчого інтервалу.

Одним із можливих методів представлення похибки на графіку є розмір експериментальної точки на ньому.

15.4. ПОБУДОВА ГРАФІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПАКЕТОМ MS EXCEL

15.4.1. Представлення залежностей між двома вибірками

Для представлення залежностей між двома вибірками використовуються точкові діаграми, у яких одні дані (аргумент) відкладаються по осі x , другі (функція) по осі y , подаючи їх лише маркерами точок із накладеною на них лінією трендів і, діаграма з маркерами, з'єднаними згладженою лінією.

Побудова діаграми (графіка) наведена на рис. 15.2.




Рис. 15.2. Вибір даних і типу діаграми (графіка).

Тут колонками в чарунках **A2:C6** наведено цифровий матеріал залежності питомої теплоти згорання Q (МДж/кг) паливного брикету із соломи і відносного зростання його щільності Dr (%) від вологості матеріалу W (%).

Для цього виділимо чарунки **A2:C6** (1), виберемо в меню **Вставка** (2), тип діаграми **Точечная** (3), далі **Точечная с маркерами** (4).

У результаті буде отримана діаграма, представлена на рис. 15.3. Їхнє редагування внутрішніми засобами пакету аналізу **Excel** з отриманням лінії тренду наведено у підрозділі **16.1.1 Редагування графічних залежностей**.




Рис. 15.3. Залежність питомої теплоти згорання брикету (Ряд1) і відносного зростання його щільності (Ряд2) від вологості соломи.

15.4.1.1. Створення об'ємних гістограм

15.4.1.1.1. Проста об'ємна гістограма

Розглянемо побудову об'ємної гістограми зміни періоду “сходи–цвітіння” трьох сортозразків під дією мутагену різної концентрації за даними, наведеними в чарунках **A2:D7** (рис. 15.4).




Рис. 15.4. Вибір даних і типу гістограми.

Для цього виділимо чарунки A2:D7 (1), виберемо в меню **Вставка** (2), тип діаграми **Гистограмма** (3), тип гістограми **Объемная цилиндрическая** (4).




Рис. 15.5. Гістограма зміни періоду “сходи-цвітіння” різних сорторізків під дією мутагену різної концентрації.

Отримана діаграма представлена на рис. 15.5. Їхнє редагування внутрішніми засобами пакету **Excel** наведено у підрозділі **16.1.2.1 Обробка об’ємних гістограм**.

15.4.1.1.2. Об'ємна нормована гістограма з накопиченням

В якості прикладу побудови об'ємної нормованої гістограми з накопиченням розглянуто представлення видів мутацій у трьох сортозразках рижію ярого. Дані розташовані в чарунках **A2:O8** (рис. 15.6). При цьому для відділення однієї групи даних від іншої варто між ними залишати незаповнені стовбці (у нас це стовбці **F** і **K**).




Рис. 15.6. Вибір даних і типу нормованої гістограми з накопиченням.

Далі при виділенні слід охопивши боковик **A3:A8** таблиці, вибрати **Вставка** (1), далі прийняти тип діаграми **Гистограмма** (2), указати тип гістограми **Объемная нормированная гистограмма с накоплением** (3).




Рис. 15.7. Вихідний вигляд нормованої гістограми з накопиченням.

У результаті цього виникає нормована гістограма з накопиченням у вигляді попереднього варіанту (рис. 15.7). Редагування її внутрішніми засобами пакету **Excel** наведено у підрозділі **16.1.2.2 Редагування об'ємних нормованих гістограм із накопиченням** (с. 1003).

15.4.2. Графічне представлення результатів дисперсійного аналізу

Графічне представлення оцінки дієвості факторів і їх поєднань в дисперсійному комплексі загалом оцінюється сила впливу факторів η^2 , яка представляє собою частку загальної дисперсії, (див. підрозділ **10.10.3 Оцінка роботоздатності дисперсійної моделі**) зручно виконувати за допомогою кругових діаграм, створюваними в **MS Excel** [139].

Для прикладу розглянемо результати трифакторного ДА, визначені поєднанням засобів **MS Excel** і **Statistica** (див. табл. 10.21, 10.23, 10.33, 10.60 і 14.33 відповідно на с 592, 592, 606, 629 та 942), подані в табл. 15.1. Всі розрахунки визначення відшукуваних величин, представлені на її полі.

При оцінці η^2 і роботоздатності моделі задіяно лише *статистично значущі показники*, тому для виключення їх з розрахунку в табл. 15.1 перед незначущими величинами суми квадратів SS ставиться зірочка (*), див. с. 91.

Таблиця 15.1. Підготовка матеріалу для графічного представлення показників ступеня впливу факторів і поєднань

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Джерело варіації	Сума квадратів SS	Число ступенів вільності df	Середній квадрат	Критерій Фішера F ф	Рівень значущості p	Найменша істотна різниця HIP ₀₅	Ступінь впливу фактора η²
2	Загальна варіація	44.04	224	0.20	18.20	6.174E-53		
3	Вільний член	565.2894	1	565.2894	52345.65	1.082E-176		
4	Строк висівання	3.7038	2	1.8519	171.48	8.671E-38	0.03	0.084
5	Норма висівання	6.0759	4	1.5190	140.66	3.950E-47	0.04	0.138
6	Ширина міжряддя	31.3695	2	15.6847	1452.40	5.075E-92	0.03	0.712
7	Строк × Норма	0.7172	8	0.0896	8.30	4.106E-09	0.08	0.016
8	Строк × Міжряддя	0.2906	4	0.0727	6.73	5.733E-05	0.06	0.007
9	Норма × Міжряддя	*0.11355	8	0.0142	1.31	2.415E-01	0.08	#ЗНАЧ!
10	Строк × Норма × Міжряддя	0.4213	16	0.0263	2.44	2.902E-03	0.13	0.010
11	Похибка	1.4579	135	0.0108				0.033
12	Обсяг вибірки n = 45			α= 0.05		t τ= 1.9777		
13	G12=СТЮДРАСПОБР(E12;C11) B17=H4 ... B24=H11				Роботоздатність моделі 0.967			
14								
15	Джерело варіації	Без об'єднання парних і потрійних поєднань		Джерело варіації	З об'єднанням парних і потрійних поєднань		B2=СУММ(B4:B11) C2=СУММ(C4:C11) D2=B2/C2 E2=D2/D11 F2=FPАСП(E2;C2;C11) C12=СУММ(C3:C10) H4=B4/СУММ(B4:B11) H11=B11/СУММ(B4:B11) G8=G12*(2*D11/((C5+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G9=G12*(2*D11/((C4+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G10=G12*(2*D11/((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G4=G12*(2*D11/((C6+1)*(C5+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G5=G12*(2*D11/((C4+1)*(C6+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G6=G12*(2*D11/((C4+1)*(C5+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 G7=G12*(2*D11/((C6+1)*((C2+1)/((C4+1)*(C6+1)*(C5+1))))^0.5 E17=B17 ... E19=B19 E20=B20+B21+B23 E21=B24 F17=C17 ... F9=C19 F20=C20+C21+C23	
16		Діаграма з похибкою	Діаграма без похибки		Діаграми з похибкою	Діаграма без похибки		
17	Строк висівання	0.084	0.087	Строк висівання	0.084	0.087		
18	Норма висівання	0.138	0.143	Норма висівання	0.138	0.143		
19	Ширина міжряддя	0.712	0.737	Ширина міжряддя	0.712	0.737		
20	Строк × Норма	0.016	0.017	Поеднання разом	0.032	0.034		
21	Строк × Міжряддя	0.007	0.007	Похибка	0.033			
22	Норма × Міжряддя	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
23	Строк × Норма × Міжряддя	0.010	0.010					
24	Похибка	0.033						

Беручи до уваги *лише статистично значущі* показники ступеня впливу факторів і поєднань їх вплив можна оцінювати чотирма способами:

а) за усіма статистично значущими факторами, поєднаннями і похибкою (чарунки **A17:B24**);

б) за усіма статистично значущими факторами, поєднаннями без урахування похибки (чарунки **A17:A23** і **B17:B23**);

в) за усіма статистично значущими факторами, з об'єднанням у один показник всіх парних і потрійного поєднання з урахуванням похибки (чарунки **D17:E21**);

г) за усіма статистично значущими факторами, об'єднанням у один показник всіх поєднань і без урахування похибки (чарунки **D17:D20** і **F17:F20**).

Розташування даних у зазначених вище чарунках, дає змогу отримувати відповідні кругові діаграми ступеня впливу (рис. 15.8), які подано вже у редагованому вигляді у *відсотковому представлені*.


При поданні текстової чи графічної інформації про показники ступеня впливу факторів і поєднань варто виходити з того, що об'єднання у один показник всіх парних і потрійного поєднання (рис. 15.8 в) і г) доцільно у тому випадку, коли в роботі не наводиться їхній аналіз, а виключення з розгляду похибки (діаграми рис. 15.8 б) і г) краще приводити якщо її частка співрозмірна чи перевищує впливи факторів.

15.5. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ППП STATISTICA


15.5.1. Побудова полігону розподілу

Для того щоб побудувати полігон розподілу, з наявних даних потрібно сформувати варіаційний ряд, тобто подвійний ряд чисел, в якому містяться значення аналізованого ознаки і частоти їх прояву. Округлена кількість стручків на гілці-2004 до цілих значень за допомогою статистичної функції **MS Excel ОКРУГЛ(число; число_разрядов)** (див. Додаток А) подана колоною **G** табл. 2.12 на с. 96. Далі в розділі головному меню **Statistics/Анализ** (1) (див. рис. 15.18 на с. 975), вибираємо модуль **Basic Statistics/Tables** / **Основная статистика/Таблицы** (2), потім опцію **Frequency tables** / **Таблицы частот** і (3) переходимо на панель **Frequency Tables** / **Таблицы частот** у вкладку **Quick** / **Быстрый** (див. рис. 15.9).


Тут натисненням **Variables/Переменные** (4) відкриваємо вікно вибору змінних **Select the variables for the analysis** / **Выберите переменные для анализа** і відмічаємо необхідну змінну, яку ми збираємося аналізувати (5) і натисканням **OK** (6) повертаємося на панель **Frequency Tables** / **Таблицы частот**, де натисніть або кнопку **Summary: Frequency tables** / (7), або **Summary** / **OK** (7), або просто клавішу **Enter** на клавіатурі отримуємо табл. 15.2.




а) за усіма значущими факторами, поєднаннями і похибкою;



б) за усіма значущими факторами, поєднаннями без похибки;



в) за усіма значущими факторами, з об'єднанням всіх поєднань та з урахуванням похибки;



г) за усіма значущими факторами, з об'єднанням всіх поєднань без урахування похибки.

Рис. 15.8. Графічне представлення показників сили впливу факторів і поєднань.




Рис. 15.9. Вибір об'єктів для побудови гістограм з негрупованими показниками

Вона представляє собою “розширений” варіант варіаційного ряду і містить наступні стовпці: **Category (Категорія)** — містить ранжирування значення аналізованої змінної, відмічені у вибірці, **Count (Рахунок)** — тут наведені частоти, з якими зустрічалися відмічені значення змінної; **Cumulative count** — накопичені частоти; **Percent** — відсоток, який становить кож-

на з частот від загального числа спостережень; **Cumulative percent** — накопичені процентні частоти частот.



Останній рядок таблиці називається **Missing (Відсутні)** — має відношення до невідмічених в вибірці значенням змінної. Таких у нашому прикладі немає (зустрічалися всі можливі значення числа стручків — від 14 до 40), у зв'язку з чим на перетині стовбця **Count** і рядки **Missing** бачимо 0.

Робочу книгу зберігаємо у вигляді самостійного файлу.

Після повернення на панель **Frequency Tables** / **Таблицы частот** натис-

Таблиця 15.2. Розширений варіант варіаційного ряду

Category	Frequency table: Округлена кількість стручків на гілці-2004 (Біометрія)			
	Count	Cumulative Count	Percent	Cumulative Percent
14	1	1	0.71429	0.7143
15	1	2	0.71429	1.4286
17	1	3	0.71429	2.1429
18	2	5	1.42857	3.5714
19	1	6	0.71429	4.2857
20	4	10	2.85714	7.1429
21	4	14	2.85714	10.0000
22	6	20	4.28571	14.2857
23	3	23	2.14286	16.4286
24	9	32	6.42857	22.8571
25	11	43	7.85714	30.7143
26	6	49	4.28571	35.0000
27	8	57	5.71429	40.7143
28	10	67	7.14286	47.8571
29	3	70	2.14286	50.0000
30	7	77	5.00000	55.0000
31	4	81	2.85714	57.8571
32	6	87	4.28571	62.1429
33	2	89	1.42857	63.5714
34	2	91	1.42857	65.0000
35	1	92	0.71429	65.7143
36	2	94	1.42857	67.1429
37	1	95	0.71429	67.8571
40	1	96	0.71429	68.5714
Missing	44	140	31.42857	100.0000

сненням  Histograms /  Гистограммы (8) отримуємо не груповану гістограму досліджуваного показника (рис. 15.10).

Для отримання полігону розподілу слід дані стовбців **Category (Kamegoria)** і **Count** табл. 15.2 занести у вихідну таблицю ППП **Statistica**. Для цього в таблиці виділимо колонку **Count** і скопіюємо її з заголовками на лист **MS Excel**, звідки числові значення стовбців **Category (Kamegoria)** і **Count** перенесімо у вихідну таблицю ППП **Statistica** і перейменуємо колонки (див. рис. 15.11).




Рис. 15.10. Гістограма з негрупованими показниками кількості стручків на гілці у 2004 р..




Рис. 15.11. Вибір об'єктів для побудови полігону розподілу

Для побудови полігону розподілу у розділі головного меню **Graphs** / **Графика** (1) вибираємо **2D Graphs**/ (2), далі **Line Plots (Variables)...**/ (3) і виходимо на діалогове вікно **2D Line Plots - Variables** (рис. 15.11). Тут у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** в полі **Graph type**/ **Тип графика** слід вибрати тип графіка **XY Trace**/ (4), в полі **Fit**/ **Распределение** указати **Off**/ **Выкл** (5), а у випадяючому меню увімкнути відображення точок **Display points: On**/ (6). Далі натисненням **Variables**/ **Переменные** (7) відкриваємо панель **Select Variables for Trace Plot**, де вибираємо необхідну змінні для полігону розподілу (8) і натисканням **OK** (9) повертаємося до діалогового вікна **2D Line Plots - Variables**, де натисненням **OK** (10) отримуємо представлення полігону розподілу (рис. 15.12).




Рис. 15.12. Полігон розподілу кількості стручків на гілці у 2004 р.

Для відключення підписи спостережень у вкладці **Options 1**/**Опции 1** слід у випадковому меню слід відключити підписи спостережень **Display case labels**.

З рис. 15.10 і 15.12 бачимо їхню повну відповідність — гістограма з негрупованими показниками повністю відповідає полігону частот.

15.5.2. Представлення суміщених гістограм

Для демонстрації побудови суміщених гістограм використовуються дані співпадаючих ділянок (табл. 2.12).

У результаті розрахунків видається таблиця частот визначених інтервалів групування в кількісному значенні. Графічно будується гістограма вибраних частот. Математичною моделлю отриманої гістограми служить функція нормального статистичного розподілу ймовірностей проявів (3.16), наведена на с. 134, яка в ППП **Statistica** представляється виразом (15.1)

$$y = n * \lambda * \text{normal}(x; \bar{x}; \sigma), \quad (15.1)$$



де λ — величина групового інтервалу.

Для побудови суміщених гістограм відкривають у меню **Graphs**/**Графика**

(1), вибирається модуль **Histograms** / **Гистограммы** (2) (рис. 15.13).

На панелі **2D Histograms** / **2М Гистограммы** після клацання по кнопці **Multiple** / **Составной** (3) (*суміщені гістограми*) і далі по кнопці **Variables:** / **Переменные:** (4) відкриться вікно **Select Variables for Histogram** / **Выберите переменные для Гистограммы**, де вибираються колонки для побудови гістограм (нами будуються гістограми даних кількості стручків на центральній гілці в 2004–2005 рр.) (5) і натиснути **ОК** (6). Далі слід перейти на вкладку **Advanced** / **Дополнительно** (7).

На вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (рис. 15.14) вибираємо розподіл, за яким



перевірятиметься гістограма, (приймаємо **Normal** / **Нормальное**) (1), відмічаємо необхідність одержання всіх характеристик розподілу (2) (тут слід звернути увагу, що для **дискретних даних статистики не виводяться**) і натискаємо **ОК** (3).

Також для суміщених гісто-





грам не виводяться відсоткові дані незважаючи на вказування їх виведення

Y axis: N & % / Ocb Y: N & %

У результаті маємо гістограми розподілу за ознакою з накладеними кривими щільності нормального статистичного розподілу, наведені на рис. 15.15. На цьому наведено статистичну оцінку і характеристики гістограм, на основі яких представляються вирази (15.2) і (15.3).

$$\mathbf{y}_{2004} = 96 * 5 * \text{normal}(x; 26.4475; 4.8537), \quad (15.2)$$

$$\mathbf{y}_{2005} = 96 * 5 * \text{normal}(x; 36.4076; 6.6667). \quad (15.3)$$

Отриману першу гістограму треба записати у файл. При цьому до заданої назви файлу автоматично додається розширення **stw**. Після цього клацнути на корінцю  **2D Histograms** /  **2М Гистограммы**, розташованому в нижньому лівому куті панелі **Statistica**, при цьому відкриється знову панель  **2D Histograms** /  **2М Гистограммы** у якій слід вибрати дані для пар (або іншої кількості) нових гістограм і продовжувати процес одержання наступної гістограми. І так до побудови всіх гістограм.








Рис. 15.15. Суміщені гістограми розподілу за ознакою, та їх криві щільності нормального статистичного розподілу




























Причому, варто при завершенні побудови чергової гістограми перезаписувати файл.




Після редагування рисунка ППП **Statistica** виконується графічне редагування до досягнення вигляду, представленого на рис. 16.26, с. 1009.

Гістограма у вигляді, наведеному на рис. 16.26 (редагування суміщених гістограм розглядається нижче у підрозділах **16.2.2.1 Редагування зображення** і **16.2.2.2 Редагування поля**), вставляється в текст, але до неї потрібно додати аналіз, який не виконується модулем  /  (представлені в табл. 2.19 (с. 113) і 6.7 (с. 318)).

15.5.3. Елементи аналізу суміщених гістограм

За умовчанням суміщені гістограми виводять числові дані лише у вигляді цілих відсотків, та й то лише на своєму зображенні. Для одержання меж інтервалів, частотних і більш високорозрядних відсоткових даних у них слід двічі клацнути лівою клавішею миші по відсотковому показнику однієї з гістограм, у результаті чого виникне панель  /  (рис. 15.16).

На ній треба активізувати відображення  ,  /  ,  /  і  /  (1). Натиснути кнопку  /  (2) і на панелі  /  у однойменному списку вибрати  /  (3), вигляд відображення чисел,  /  (4) – цілі числа і клацнути  /  (5). Натиснути кнопку  /  (6) і на панелі  /  у однойменному списку вибрати  /  (7), кількість десяткових знаків при відображенні відсотків  /  (8) — один десятковий знак числа і клацнути  /  (9), потім **ОК** (10). Теж саме слід зробити із другою гістограмою.

Отримані значення представлені у вигляді  , де в дужках розмір групового інтервалу, тут від $20 < x \leq 25$. Наступні числа — частота появ у випадках і відсотках. Відповідно запис для першого й останнього групового інтервалу в цьому разі має вигляд  і  (рис. 15.17).

Дані з рис. 15.17 можна вручну занести у табл. 15.3, або краще вставити з першої, третьої і сьомої колонок табл. 15.4 (с. 973).




Рис. 15.16. Установка вихідних параметрів суміщеної гістограми






Рис. 15.17. Суміщена гістограма з відображенням результатів частотного групування

Табл. 15.4 отримані за допомогою інструментів панелі процедур  /  (рис. 2.15, с. 113) аналогічні табл. 2.19, представленим на с. 113.

Таблиця 15.3. Інтервали групування сортозразків за кількістю стручків на центральній гілці і щільність їх нормального статистичного розподілу за цією ознакою

Межі групи, см	2004 р.			2005 р.		
	Кількість, шт.	Частка, %	Щільність нормального розподілу, шт.	Кількість, шт.	Частка, %	Щільність нормального розподілу, шт.
$5 < x \leq 10$	0	0	0	0	0	0
$10 < x \leq 15$	2	2.083	1.4286	0	0	0
$15 < x \leq 20$	5	5.208	3.571	1	1.042	0.714
$20 < x \leq 25$	31	32.297	22.143	5	5.208	3.571
$25 < x \leq 30$	35	36.458	25.000	7	7.292	5.000
$30 < x \leq 35$	18	18.750	12.857	24	25.000	17.143
$35 < x \leq 40$	5	5.208	3.571	34	35.417	24.286
$40 < x \leq 45$	0	0	0	18	18.750	12.857
$45 < x \leq 50$	0	0	0	5	5.208	3.571
$50 < x \leq 55$	0	0	0	1	1.042	0.714
$55 < x \leq 60$	0	0	0	1	1.042	0.714

Таблиця 15.4. Групування сортозразків за кількістю стручків на гілці і щільність їх нормального статистичного розподілу

дані 2004 р.

Група	Таблиця частот: Кількість стручків на гілці-04 (Біометрія-П) K-S d= .04685, p> .20;Лиліефорса p> .20 Шапиро-Уилка W=.99561, p=.98992									
	Частота	Кумул. частота	Процент допуст.	Кумул. % допуст.	% всех наблюд.	Кумул. % от всех	Ожидаем. частота	Кумул. ожидаем.	Процент ожидаем.	Кумул. % ожидаем.
10.00000<x<=15.00000	2	2	2.08333	2.0833	1.42857	1.4286	0.88077	0.88077	0.91746	0.91746
15.00000<x<=20.00000	5	7	5.20833	7.2917	3.57143	5.0000	7.95406	8.83482	8.28548	9.20294
20.00000<x<=25.00000	31	38	32.29167	39.5833	22.14286	27.1429	27.91054	36.74536	29.07348	38.27642
25.00000<x<=30.00000	35	73	36.45833	76.0417	25.00000	52.1429	36.97171	73.71707	38.51220	76.78861
30.00000<x<=35.00000	18	91	18.75000	94.7917	12.85714	65.0000	18.53589	92.25296	19.30822	96.09683
35.00000<x<=40.00000	5	96	5.20833	100.0000	3.57143	68.5714	3.49573	95.74869	3.64139	99.73822
Пропущ.	44	140	45.83333		31.42857	100.0000				






дані 2005 р.

		Таблиця частот: Кількість стручків на гілці-05 (Біометрія-П) K-S d=.06819, p> .20;Лиліефорса p> .20 Шапиро-Уилка W=.99003, p=.69389									
Група	Частота	Кумул. частота	Процент допуст.	Кумул. % допуст.	% всех наблюд.	Кумул. % от всех	Ожидаем. частота	Кумул. ожидаем.	Процент ожидаем.	Кумул. % ожидаем.	
10.00000<x<=15.00000	0	0	0.00000	0.0000	0.00000	0.0000	0.06347	0.06347	0.06611	0.06611	
15.00000<x<=20.00000	1	1	1.04167	1.0417	0.71429	0.7143	0.60137	0.66484	0.62643	0.69254	
20.00000<x<=25.00000	5	6	5.20833	6.2500	3.57143	4.2857	3.51402	4.17886	3.66043	4.35298	
25.00000<x<=30.00000	7	13	7.29167	13.5417	5.00000	9.2857	11.97263	16.15149	12.47149	16.82447	
30.00000<x<=35.00000	24	37	25.00000	38.5417	17.14286	26.4286	23.82213	39.97362	24.81472	41.63919	
35.00000<x<=40.00000	34	71	35.41667	73.9583	24.28571	50.7143	27.70716	67.68078	28.86162	70.50081	
40.00000<x<=45.00000	18	89	18.75000	92.7083	12.85714	63.5714	18.84164	86.52242	19.62671	90.12752	
45.00000<x<=50.00000	5	94	5.20833	97.9167	3.57143	67.1429	7.48723	94.00965	7.79920	97.92672	
50.00000<x<=55.00000	1	95	1.04167	98.9583	0.71429	67.8571	1.73644	95.74609	1.80879	99.73551	
55.00000<x<=60.00000	1	96	1.04167	100.0000	0.71429	68.5714	0.23462	95.98071	0.24439	99.97990	
Пропущ.	44	140	45.83333		31.42857	100.0000					

З табл. 15.4 та рис. 15.15 видно, що межі групування для суміщених гістограм визначаються за умови $a < x \leq b$. Таке ж групування використовується у групуваннях, представлених на рис. 2.10 (с. 107) і 2.17 (с. 115), та табл. 2.19 (с. 113) і 6.7 (с. 318).

15.5.4. Побудова й аналіз одинарних гістограм

Побудова одинарних гістограм із визначенням нормального статистичного розподілу отриманих показників дозволяє за вибіркою знайти кількість дослідів, мінімальне, максимальне і середньоарифметичне та СКВ, одержати таблицю частот інтервалів; побудувати гістограму вибраних частот із нанесенням на неї кривої заданого розподілу з визначенням її параметрів; розрахувати описові статистики.

При побудові одинарних (по одній на рисунку) у меню  **Statistics** / **Аналіз** (1) (рис. 15.18) використовується модуль  **Basic Statistics/Tables** /  **Основныe статистики и таблицы** (2), опція  **Frequency tables** /  **Таблицы частот** (3), тобто власне модуль побудови одинарних гістограм.




Рис. 15.18. Вибір об'єктів для побудови одинарної гістограми

Натиснувши ці кнопки і **ОК** (4) переходимо на панель процедур і установок **Frequency Tables** / **Таблицы частот**, де у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (5) у відповідності з рис. 16.26 вибираємо **starting at: 10** / **начать с: 10** (6) і установлюємо ☐ **Step size: 5** / ☒ **Размер шага: 5** (6), тобто величину групового розміру, проте активізуємо ☒ **"Neat" intervals; approximate no.: 10** / ☒ **Прибл. число интервалов: 10** (7), чим задаємо їх межі $a < x \leq b$. Далі натискуємо **Variables** / **Переменные** (8) і на панелі **Select the variables for the analysis** / **Выберите переменные для анализа** вибираємо колонки для побудови гістограм (нами будуються гістограми кількості стручків на центральній гілці за 2004–2005 рр., за даними табл. 2.11, с. 96) (9) і натиснувши **ОК** (10) (рис. 15.18), повернутися на панель **Frequency Tables** /

Таблицы частот, де перейти на вкладку **Options/Опции** (11). Кнопки перемикачів й активізації на цій панелі повинні бути задіяні згідно з рис. 15.18.


Хоч встановлення початку відліку груп і їхньої величини на рис. 15.18 приймається відповідно з рис. 16.26, с. 1009, але тут вони можуть назначатися самостійно згідно розділу 1 **Статистичні показники генеральної сукупності та вибірки. Варіаційний аналіз**, після декількох пробних побудов гістограм, або ще краще пробної побудови суміщених гістограм (див. підрозділ 15.5.2 **Представлення суміщених гістограм**).

На вкладці **Options/Опции** відмічається представлення всіх опцій (1). Відсутність мітки в полі **Count and report missing data (MD)** / **Считать пропущенные данные (ПД)** (2) дозволяє враховувати пусті чарунки. Далі натискається **Normality/Нормальность** (3) для переходу на вкладку установки перевірочних тестів нормальності статистичного розподілу (рис. 15.19, б).


Після цього у вкладці **Normality/Нормальность** (рис. 15.19, б) вибираємо всі перевірочні тести: **Kolmogorov-Smirnov test, mean/std.dev known** / **Критерий К.-С., ср./ст. откл. известны**, **Lilliefors test, mean/std.dev unknown** / **Критерий Лиллиефорса, ср./ст. откл. неизвестны** і **Shapiro-Wilk's 'W' test** / **Критерий Шапиро-Уилка 'W'** (1) для перевірки прийнятності вибраного нами нормального розподілу і натискаємо **Tests for normality/Критерии нормальности** (2) для виконання перевірки. При цьому видаються результати перевірки прийнятності нормального розподілу за цими тестами (табл. 15.5).

Таблица 15.5. Тести перевірки відповідності нормальному розподілу

Переменная	Описательные статистики (Биометрия-П)					
	Среднее	Ст.откл.	Минимум	Максим.	N	Чис.набл Пропущ.
Кількість стручків-2004	26.49068	4.792194	13.72727	39.90000	101	39
Кількість стручків-2005	36.25908	6.661271	17.90000	55.30000	140	0










а)



б)

Рис. 15.19. Установка процентного представления частоты нормального статистического распределения (а) і перевірочних тестів (б)

Після натиснення кнопки  **Frequency Tables: Бі...** / **Таблицы частот: Біо...**, розміщеної в лівому нижньому куті вікна повертаємося знову до панелі  **Frequency Tables:** / **Таблицы частот** (рис. 15.19, б).

Натиснувши  **Summary** /  **OK** (3) панелі  **Frequency Tables:** / **Таблицы частот** (або кнопку  **Summary: Frequency tables** /  **Таблицы частот** (12) на вкладці **Advanced** / **Дополнительно** (рис. 15.18), отримуємо таблиці інтервалів групування, частоти появ, значень нормального статистичного розподілу для показників 2004 і 2005 рр. (табл. 15.6).

Результати табл. 15.6 за одними і тими ж даними 2004 р. при групуванні з межами $a < x \leq b$ відмінні від даних табл. 2.19, с. 113 і табл. 6.7, с. 318.

Таблиця 15.6. Групування сортозразків за кількістю стручків на гілці і щільність їх нормального статистичного розподілу

дані 2004 р.

— групові межі $a < x \leq b$

		Таблица частот: Кількість стручків-2004 (Біометрія-П)							
От	До	Частота	Кумул. Частота	Процент	Кумул. Процент	100% - Процент	Логиты	Пробиты	Нормал. Ожидаем.
10.00000	$x \leq 15.00000$	2	2	1.42857	1.4286	100.0000	-4.23411	-2.18935	0.80371
15.00000	$x \leq 20.00000$	5	7	3.57143	5.0000	98.5714	-2.94444	-1.64485	8.03483
20.00000	$x \leq 25.00000$	32	39	22.85714	27.8571	95.0000	-0.95156	-0.58709	29.29766
25.00000	$x \leq 30.00000$	38	77	27.14286	55.0000	72.1429	0.20067	0.12566	39.40324
30.00000	$x \leq 35.00000$	19	96	13.57143	68.5714	45.0000	0.78016	0.48374	19.60398
35.00000	$x \leq 40.00000$	5	101	3.57143	72.1429	31.4286	0.95156	0.58709	3.58407
40.00000	$x \leq 45.00000$	0	101	0.00000	72.1429	27.8571	0.95156	0.58709	0.23759
Пропущ.		39	140	27.85714	100.0000	27.8571			

— групові межі $a \leq x < b$

		Таблица частот: Кількість стручків-2004 (Біометрія-П)							
От	До	Частота	Кумул. Частота	Процент	Кумул. Процент	100% - Процент	Логиты	Пробиты	Нормал. Ожидаем.
10.00000	$x \leq 15.00000$	1	1	0.71429	0.7143	100.0000	-4.93447	-2.45000	0.80371
15.00000	$x \leq 20.00000$	5	6	3.57143	4.2857	99.2857	-3.10608	-1.71845	8.03483
20.00000	$x \leq 25.00000$	33	39	23.57143	27.8571	95.7143	-0.95156	-0.58709	29.29766
25.00000	$x \leq 30.00000$	37	76	26.42857	54.2857	72.1429	0.17185	0.10763	39.40324
30.00000	$x \leq 35.00000$	20	96	14.28571	68.5714	45.7143	0.78016	0.48374	19.60398
35.00000	$x \leq 40.00000$	5	101	3.57143	72.1429	31.4286	0.95156	0.58709	3.58407
40.00000	$x \leq 45.00000$	0	101	0.00000	72.1429	27.8571	0.95156	0.58709	0.23759
Пропущ.		39	140	27.85714	100.0000	27.8571			



Таблиця 15.6. Групування сортрозрізків за кількістю стручків на гілці
і щільність їх нормального статистичного розподілу





дані 2005 р.
— групові межі $a < x \leq b$







		Таблиця частот: Кількість стручків-2005 (Біометрія-П)								
От	До	Частота	Кумул. Частота	Процент	Кумул. Процент	100% - Процент	Логиты	Пробиты	Нормал. Ожидаем.	Кумул. Нормал.
15.00000	<x<=20.00000	1	1	0.71429	0.7143	100.0000	-4.93447	-2.45000	0.92663	1.0257
20.00000	<x<=25.00000	8	9	5.71429	6.4286	99.2857	-2.67797	-1.51976	5.34314	6.3689
25.00000	<x<=30.00000	14	23	10.00000	16.4286	93.5714	-1.62668	-0.97700	17.94990	24.3188
30.00000	<x<=35.00000	32	55	22.85714	39.2857	83.5714	-0.43532	-0.27188	35.18688	59.5056
35.00000	<x<=40.00000	47	102	33.57143	72.8571	60.7143	0.98739	0.60850	40.28677	99.7924
40.00000	<x<=45.00000	28	130	20.00000	92.8571	27.1429	2.56495	1.46523	26.94589	126.7383
45.00000	<x<=50.00000	8	138	5.71429	98.5714	7.1429	4.23411	2.18935	10.52253	137.2608
50.00000	<x<=55.00000	1	139	0.71429	99.2857	1.4286	4.93447	2.45000	2.39604	139.6569
55.00000	<x<=60.00000	1	140	0.71429	100.0000	0.7143			0.31756	139.9744
60.00000	<x<=65.00000	0	140	0.00000	100.0000	0.0000			0.02445	139.9989
Пропущ.		0	140	0.00000	100.0000	0.0000				

— групові межі $a \leq x < b$

		Таблиця частот: Кількість стручків-2005 (Біометрія-П)								
От	До	Частота	Кумул. Частота	Процент	Кумул. Процент	100% - Процент	Логиты	Пробиты	Нормал. Ожидаем.	Кумул. Нормал
10.00000	<=x<15.00000	0	0	0.00000	0.0000	100.0000			0.09344	0.0991
15.00000	<=x<20.00000	1	1	0.71429	0.7143	100.0000	-4.93447	-2.45000	0.92663	1.0257
20.00000	<=x<25.00000	8	9	5.71429	6.4286	99.2857	-2.67797	-1.51976	5.34314	6.3689
25.00000	<=x<30.00000	14	23	10.00000	16.4286	93.5714	-1.62668	-0.97700	17.94990	24.3188
30.00000	<=x<35.00000	31	54	22.14286	38.5714	83.5714	-0.46536	-0.29051	35.18688	59.5056
35.00000	<=x<40.00000	45	99	32.14286	70.7143	61.4286	0.88155	0.54506	40.28677	99.7924
40.00000	<=x<45.00000	31	130	22.14286	92.8571	29.2857	2.56495	1.46523	26.94589	126.7383
45.00000	<=x<50.00000	7	137	5.00000	97.8571	7.1429	3.82137	2.02510	10.52253	137.2608
50.00000	<=x<55.00000	2	139	1.42857	99.2857	2.1429	4.93447	2.45000	2.39604	139.6569
55.00000	<=x<60.00000	1	140	0.71429	100.0000	0.7143			0.31756	139.9744
60.00000	<=x<65.00000	0	140	0.00000	100.0000	0.0000			0.02445	139.9989
Пропущ.		0	140	0.00000	100.0000	0.0000				

Натисненням кнопки  **Histograms** /  **Гистограммы** (13) отримуємо відмічені гістограми даних кількості стручків на центральній гілці за 2004–2005 рр. у вигляді, представленому на рис. 15.20.

Повернувшись до панелі  **Frequency Tables** /  **Таблицы частот** (рис. (рис. 15.18), слід перейти на вкладку **Descr.** / **Описательные** (14) (рис. 15.21), де після натиснення кнопки  **Descriptive statistics** /  **Описательные статистики** (1) видається табл. 15.7 з основними параметрами нормального статистичного розподілу, яка представляє собою скорочений варіант табл. 2.16, наведеної на с. 106.

Натиснення кнопки **процедур**  **Box & whisker plot for all variables** /  **Диаграмма размаха для всех переменных (1)** (2) (рис. 15.21) відповідає кнопці  **Box & whisker plot for all variables** /  **Диаграмма размаха для всех переменных** (6) вкладки **Quick** / **Быстрый** панелі  **Descriptive Statistics** /  **Описательные статистики** (рис. 2.18, с. 116), якою одержуємо діаграми розмаху рис. 2.19, с. 117.




Рис. 15.20. Гістограма розподілу за ознакою та її нормальний статистичний розподіл

Дія Normal probability plot / Нормальные вероятностные графики (2) (3),
 Half-normal probability plot / Полунормальные вероятностные графики (3) (4) і
 Detrended normal probability plot / Нормальные графики без тренда (4) (5) (рис. 15.21) відповідає
натисненню кнопок Normal probability plot / Нормальные вероятностные графики (9),
 Half-normal probability plot / Полунормальные вероятностные графики (10) і
 Detrended normal probability plot / Нормальные вероятн. графики без тренда (11) вкладки
Prob. & Scatterplots / Диаграммы панелі Descriptive Statistics / Описательные статистики (рис. 2.20, с. 118). У результаті цих дій маємо графіки, представлені на
рис. 2.31–2.33, зображених на с. 125–126.

Натиснення кнопки 3D histograms, bivariate distributions / 3М гистограммы (5) (6)
(рис. 15.21) виконує таку ж дію, як і кнопки 3D histograms, bivariate distributions /
 3М гистограммы (5) (рис. 2.15) — одержуємо тривимірну гістограму розсію-
вання (рис. 2.16).




Рис. 15.21. Вкладка **Descr.** / **Описательные** для отримання описових статистик (кнопка **Descriptive statistics** / **Описательные статистики**)

Таблица 15.7. Основні параметри нормального статистичного розподілу (описова статистика)

Переменная	Критерии нормальности (Біометрія-П)					
	N	макс.D	К.-С. p	Лиллиеф. p	W	p
Кількість стручків-2004	101	0.043672	p > .20	p > .20	0.995421	0.983854
Кількість стручків-2005	140	0.050046	p > .20	p > .20	0.992783	0.701212

Якщо при установці величини групового розміру **Step size: 5** / **Размер шага: 5** (6) активізувати його, то групові розміри матимуть межі $a \leq x < b$.

Табличне і графічне представлення такого групування подано в табл. 15.6 і на рис. 15.20.

Отримані табл. 15.5–15.7 вставляються у текстовий файл і служать базою для описової оцінки аналізованого явища.

При порівнянні гістограм за даними 2004 р. (рис. 15.15 на с. 970 та 15.20) і табличних даних цих років (табл. 15.4 на с. 973 та 15.6 на с. 977) бачимо певну відмінність між ними. Це пояснюється різним підходом до визначення меж інтервалів груп. У суміщених гістограм (рис. 15.15 і табл. 15.4), а також представлених на рис. 2.10 (с. 107) і 2.17 (с. 115), та табл. 2.19 (с. 113) і 6.7 (с. 318) межі групи визначаються за умови $a < x \leq b$, у той час, як для одинарних гістограм (рис. 15.20 і табл. 15.6, с. 977) вони мають межі $a \leq x < b$.

Слід звернути увагу, що використання модуля **Histograms** / **Гистограммы** меню **Graphs** / **Графика** (див. підрозділ **15.5.2 Представлення суміщених гістограм**) для отримання одинарних гістограм недоцільно, як ска-

зано вище, ним не виконується статистичний аналіз розподілу. Єдиною перевагою є змога представляти гістограми у відсотковій шкалі (рис. 15.22) встановивши **Y axis: N & %** / **Ось Y: N & %** (див. рис. 15.14).




Рис. 15.22. Гістограма розподілу за ознакою та її нормальний статистичний розподіл

15.6. ДІАГРАМИ ДІАПАЗОНІВ

Діаграми діапазонів (*Whisker plots*) застосовуються для опису часової динаміки або просторового градієнта досліджуваних величин. Точки на таких графіках найчастіше відповідають середньому арифметичному або медіані аналізованого ознаки. Відмінною особливістю є наявність у точок так званих “вусів” (від англ. “*Whiskers*”) — вертикальних або горизонтальних відрізків, що відходять від них і довжина яких відповідає величині обраного дослідником показника розкиду даних (мінімум і максимум, стандартне відхилення, дисперсія, квартилі) або точності оцінки генеральних параметрів (стандартна похибка, довірчий інтервал) [120].

Розглянемо зміну кількості стручків на рослині (шт.) у залежності від основного обробітку ґрунту, виконану заміром 20-ти зразків (табл. 15.8).

Дані табл. 15.8 у файлі ППП **Statistica** представлено двома колонками: колонкою значень досліджуваної (залежної) змінної **Dependent variable:** / **Зависимые:** **Кількість стручків на рослині, шт.** і групуючою змінною **Grouping variable:** / **Группирующие:** — колонкою **Обробіток ґрунту**.

Таблиця 15.8. Кількість стручків на рослині (шт.) у залежності від основного обробітку ґрунту.

Повторення	Оранка	Дискування	Чизелювання
1	75.0	94.3	84.8
2	62.3	82.0	72.8
3	93.0	95.0	90.3
4	70.8	94.8	97.5
5	62.5	84.5	87.8
6	89.5	95.3	95.5
7	61.3	85.3	79.5
8	57.3	76.3	87.5
9	89.5	93.3	88.5
10	56.5	83.0	67.3
11	75.5	83.5	63.5
12	82.0	93.0	87.0
13	64.3	89.0	70.5
14	67.8	83.5	72.0
15	91.0	99.5	88.0
16	62.3	93.3	90.3
17	56.0	77.5	80.8
18	97.0	100.0	94.0
19	67.5	92.5	81.3
20	73.0	86.0	102.3
Обсяг вибірки	20	20	20
Мінімальне значення вибірки	56.0	76.3	63.5
Нижнє значення середнього	66.5	85.8	79.1
Середнє значення	72.7	89.1	84.0
Верхнє значення середнього	78.9	92.3	88.9
Максимальне значення вибірки	97.0	100.0	102.3
Похибка середнього вибірки	21.69	22.36	22.86
Рівень значущості p	0.05	0.05	0.05
Похибка результату вимірювання	6.23	3.25	4.91

Для побудови діаграми розмахів у розділі головного меню **Graphs** / **Графіка** (1) вибираємо **2D Graphs** / **2М Графики** (2) (рис. 15.11, с. 967), а потім — **Means w/Error Plots...** / **Графики средних с ошибками...** і виходимо в діалогове вікно **Means with Error Plots** / **Графики средних с ошибками** (рис. 15.23).

Тут у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** в полі **Graph type** / **Тип графика** вибираємо тип графіка **Whiskers** / **Отрезки** і **Regular** / **Простой** (1). Натисненням **Variables** / **Переменные** (2) відкриваємо вікно вибору змінних **Select Variables for Means with Error Plots** / **Выберите переменные для средних в графиках ошибок**

і вказуємо, що залежною **Dependent variable:** / **Зависимая переменная:** є **Кількість стручків на рослині, шт.**, а групуючою **Grouping variable:** / **Группирующая переменная:** **Обробіток ґрунту** (3) і натисканням **ОК** (4) повертаємося у діалогове вікно **Means with Error Plots** / **Means with Error Plots**.

У полі **Grouping variable:** / **Группирующие:** потрібно вказати на які інтервали слід розбити вісь X. Для цього в полі **Grouping intervals** / **Группирующие интервалы** вибираємо опцію **Codes** / **Коды** (5), натискаємо кнопку **Specify Codes** / **Задать коды** (6) виходимо на панель **Category Codes** / **Коды категорий:**, де задаємо які види обробітку ґрунту будуть брати участь в аналізі. Вибираємо **All** / **Все** (7), так як ми хочемо, щоб на графіку були відображені дані для всіх видів обробітку ґрунту, і натискаємо **ОК** (8).




Рис. 15.23. Вибір об'єктів для побудови діаграми діапазонів змiну кількості стручків на рослині (шт.) у залежності від основного обробітку ґрунту

У випадяючому меню **Value:** / **Значение:** поля **Middle point** / **Средняя точка** вибираємо **Mean** / **Среднее** (9). Цим визначаємо, що на графіку у якості точок слід зображати середні значення показника.

Залишилося вказати, чому на графіку будуть відповідати “вуса” — відрізки, що відходять від точок.

Для цього служить поле **Whisker** / **Отрезок**. Якщо ми хочемо, щоб їх довжина дорівнювала похибці результату вимірювання, яка визначається виразом $t_{\alpha(v)_T} S_{\bar{x}}$, яка використовується при виконанні інтервальної оцінки середніх і за сучасними вимогами повинна наводитися разом із середнім значенням при кінцевому представленні результатів досліджень, то у випадяючому меню **Value:** / **Значение:** поля **Whisker** / **Отрезок** вибираємо **Std error** / **Довер. інтервал** (10), а величину **Coefficient** / **Коэффициент** (11) задаємо відповідно похибці результату вимірювання $t_{\alpha(v)_T} S_{\bar{x}}$. Значення t -тесту Стюдента, який розрахований статистичною функцією **Excel СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х**, і при $\alpha = 0.05$ та величині вибірок $n = 20$ дорівнює $t_{0.05(19)} = 2.093024$.

У полі **Outliers** / **Выбросы** (12) можна вибрати виведення на графіку точок-викидів **Outliers** / **Выбросы**, екстремальних значень (крайніх точок) **Extremes** / **Крайние точки** (див. рис. 2.12 на с. 109), а також їх одночасне зображення **Outl. & Extremes** / **Выбросы и крайние точки** чи відключення **Off** / **Выкл.** [120]. Вибираємо **Outl. & Extremes** / **Выбросы и крайние точки**.

Інші налаштування можна залишити без змін. Після натискання на кнопку **OK** (13) з'явиться графік, наведений на рис. 15.24.




Рис. 15.24. Діаграма діапазонів зміни кількості стручків на рослині (шт.) у залежності від основного обробітку ґрунту

На ньому добре видно, що його значення відповідають, статистичній характеристиці даних, наведених в табл. 15.8.

15.7. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ РОЗМАХІВ

Діаграми розмаху, або “ящики з вусами” (від англ. “**Box-whisker plots**”), отримали свою назву за характерний вигляд: точку, яка відповідає середній арифметичній або медіані, оточує вертикально розташований прямокутник — “ящик”, довжина якого відповідає одному з показників розкиду або точності оцінки генерального параметра. Додатково від цього прямокутника відходять “вуса”, також відповідні по довжині одному з показників розкиду або точності. Таким чином, графіки цього типу дозволяють дати дуже повну статистичну характеристику для кожної аналізованої вибірки. Діаграми розмаху можна використовувати для візуальної експрес-оцінки різниці між двома або більше групами (наприклад, між датами відбору проб, експериментальними групами, ділянками простору і т. п.) [120].

Для прикладу розглянутому *Кількість стручків на гілці у 2004 і 2005 рр.* за співпадаючими ділянками відповідно даних даними табл. 2.12, представленої на с. 96.

Задачею є візуальне порівняти, чи відрізняється середня кількість стручків за роками досліджень (виконавши інтервальну оцінку середніх).

Вихідні дані у файлі ППП **Statistica** представлено двома колонками: колонкою значень досліджуваної змінної *Кількість стручків на гілці у 2004 і 2005 рр.* і групуючою змінною — колонкою *Рік*.

Для побудови діаграми розмахів у розділі головного меню **Graphs** / **Графика** (1) вибираємо **2D Graphs** / **2М Графики** (2) (рис. 15.11, с. 967), далі **Box Plots...** / **Прямоуг.-Отрезки** і виходимо на діалогове вікно **2D Box Plots** / **2М Диаграммы размаха** (рис. 15.25). Тут у вкладці **Advanced** / **Дополнительно** в полі **Graph type** / **Тип графика** слід вибрати тип графіка **Box-Whiskers** / **Диаграммы размаха...** і **Regular** / **Простой** (1). Натисненням **Variables:** / **Переменные:** (2) відкриваємо вікно вибору змінних **Select Variables for Box Plot** / **Выберите переменные для диаграммы размаха** і вказуємо, що залежною **Dependent variable:** / **Зависимая переменная:** є *Кількість стручків на гілці у 2004 і у 2005*, а групуючою **Grouping variable:** / **Группирующая переменная:** *Рік* (3). Далі натисненням **OK** (4) повертаємося в діалогове вікно **2D Box Plots** / **2М Диаграммы размаха**.

В полі **Grouping intervals** / **Группирующие интервалы** вибираємо опцію **Codes** / **Коды** (5), натискаємо кнопку **Specify Codes** / **Задать коды** (6), щоб вказати які види обробітку ґрунту використовуються в аналізі. На панелі **Category Codes:** / **Коды категорий:** вибираємо **All** / **Все** (7), так як ми хочемо, щоб на графіку були відображені дані для всіх видів обробітку ґрунту, і натискаємо **OK** (8).




Рис. 15.25. Вибір об'єктів для побудови діаграми розмахів кількості стручків на гілці у 2004 і 2005 рр.

У випадяючому меню **Value/Значение:** поля **Middle point/Средняя точка** вибираємо **Mean/Среднее** (9), чим задаємо зображення на графіку у якості точок середніх значень показник а.

У випадяючому меню **Value/Значение:** поля **Box/Прямоугольник** вибираємо статистичний показник, який буде визначати вигляд ящика — у нашому випадку це **Std error/Довер. інтервал** (10). Величину **Coefficient/Коеффициент** встановлюємо рівним 1 (11).

У випадяючому меню **Value/Значение:** поля **Whisker/Отрезок** вибираємо **Std error/Довер. інтервал** (12). Величину **Coefficient/Коеффициент** (13) вибираємо за похибкою результату вимірювання $t_{\alpha(v)_T} s_{\bar{x}}$, яка використовується при

виконанні інтервальної оцінки середніх і за сучасними вимогами повинна наводитися разом із середнім значенням при кінцевому представленні результатів досліджень. Для цього статистичною функцією Excel **СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х** розраховуємо значення t -тесту Стьюдента, яке при $\alpha = 0.05$ та величині вибірок $n = 99$ рівне $t_{0.05(95)} = 1.985251$.

У полі **Outliers/Выбросы** (14) можна вибрати виведення на графіку точок-викидів **Outliers** / **Выбросы**, екстремальних значень (крайніх точок) **Extremes** / **Крайние точки** (див. рис. 2.12 на с. 109), а також їх одночасне зображення **Outl. & Extremes** / **Выбросы и крайние точки** чи відключення **Off** / **Выкл** [120]. Вибираємо **Outl. & Extremes** / **Выбросы и крайние точки**.

Інші налаштування можна залишити без змін. Після натискання на кнопку **ОК** (14) з'явиться графік, наведений на рис. 15.26.

На отриманому графіку добре видно, що його значення відповідають даним табл. 15.9, отриманій на основі табл. 2.12, с. 96.




Рис. 15.26. Діаграма розмахів кількості стручків на гілці у 2004 і 2005 рр.

Таблиця 15.9. Основні статистичні показники кількості стручків на гілці у 2004 і 2005 рр., шт.

Показник	2004 р.	2005 р.
Обсяг вибірки	96	96
Мінімальне значення вибірки	13.7	17.9
Нижнє значення середнього	26.0	35.7
Середнє значення	26.4	36.4
Верхнє значення середнього	26.9	37.1
Максимальне значення вибірки	39.9	55.3
Похибка середнього вибірки	0.50	0.68
Рівень значущості p	0.05	0.05
Похибка результату вимірювання	0.98	1.35

15.8. НАВЕДЕННЯ КОРЕЛЯЦІЙНИХ КВАДРАТНИХ МАТРИЦЬ У ВИГЛЯДІ ПРЯМОКУТНИХ

Розглядаючи квадратні кореляційні матриці, отримані як інструментом **MS Excel** [Корреляция] (табл. 9.8 на с. 505), так і одержаних ППП **Statistica** (табл. 9.10 на с. 507), бачимо, що їх верхні рядки (**Висота рослини-2004**) і останні колонки (**Кількість стручків на гілці-2004**) не містять ніякої цінної інформації. Числова інформація табл. 9.10 займає 16 чарунок (4×4) у яких всі шість показників дублюються відносно діагоналі матриці, представленої чотирма чарунками. Це також стосується і відображення квадратної кореляційної матриці, наведеної на рис. 2.21, с. 119.

Якщо для більш компактного представлення інформації для вилучення першого рядка і останньої колонки з табл. 9.8 і 9.10 їх можна просто відредагувати при поданні їх текстово чи графічно, із відображенням квадратної ко-




Рис. 15.27. Панель вибору колонок для прямокутної матриці

реляційної матриці (рис. 2.21) це зробити неможливо.

З цієї метою при використанні ППП **Statistica** пропонується замість отримання квадратної кореляційної матриці одержувати прямокутну матрицю з рядками без першого фактору і колонками без останнього фактору.

Отримання прямокутної кореляційної матриці і її графічного відображення викладено у підрозділі 9.2.8.1 Визначення кореляційних залежностей і побудова прямокутних матриць. Вибір колонок для прямокутної матриці представлено на рис. 15.27. При цьому слід пам'ятати, що для кореляційної матриці назви рядків формує **First variable list**/Первый список переменных, а колонок — **Second variable list**/Второй список, а для графічного відображення кореляційної квадратної матриці — навпаки.

У результаті виконання відповідних дій отримується прямокутна матриця коефіцієнтів кореляції показників і їхні ймовірності (табл. 15.10) та її графічне відображення (рис. 15.28).

Порівнюючи форми табл. 15.10 і 9.10 бачимо, до її числова інформація займає лише дев'ять чарунок (3×3), тобто кількість чарунок зменшується на **$2n - 1$** одиниць, де n – кількість факторів. У табл. 15.10 дублюється лише один показник, а даних які були діагоналлю матриці — два.

Таблиця 15.10. Коефіцієнти кореляції показників прямокутної матриці та їхні ймовірності

Переменная	Корреляции (Биометрия) Отмеченные корреляции значимы на уровне $p < .05000$ N=101 (Построчное удаление ПД)		
	Висота рослини-2004	Висота штамбу-2004	Кількість гілок-2004
Висота штамбу-2004	.3981 $p=.000$	1.0000 $p=---$	-.1110 $p=.269$
Кількість гілок-2004	.2418 $p=.015$	-.1110 $p=.269$	1.0000 $p=---$
Кількість стручків на гілці-2004	.2651 $p=.007$.2846 $p=.004$.2774 $p=.005$

Хоч рис. 15.28 і рис. 2.21 однакові за кількістю кадрів, проте відмінність між ними така ж як і у табл. 15.10 і 9.10.




Рис. 15.28. Графічне відображення кореляційної прямокутної матриці, наведеної в табл. 15.10

16. РЕДАГУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ПРЕДСТАВЛЕНЬ ВНУТРІШНІМИ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМ

16.1. РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗАСОБАМИ MICROSOFT EXCEL

16.1.1. Редагування графічних залежностей




Рис. 16.1. Початок форматування осі x

вані межі зміни осі x , ціну основних і проміжних поділок, а також розташування основних міток осі назовні і проміжних — всередину діаграми.

Редагування графічної залежності, представленої на рис. 15.3 (с. 958), краще почати з осі x . Для цього слід активізувати вісь x , клацнувши по її даним лівою клавiшею миші (1), потім натиснути праву клавiшу й у меню вибрати вкладку **Формат осі...** (2) (рис. 16.1).

На панелі **Формат осі** у вкладці **Параметры осі**

(рис. 16.2) задати фіксо-

вані межі зміни осі x , ціну основних і проміжних поділок, а також розташу-

вання основних міток осі назовні і проміжних — всередину діаграми.




Рис. 16.2. Вибір параметрів осі x

Перейшовши на вкладку **Число** встановлюємо необхідну кількість десяткових знаків (у даному випадку два), у **Цвет линии** задаємо **Сплошная линия** чорного кольору (рис. 16.3 а), у **Тип линии** приймаємо **Составной тип:** — суцільну товщиною **1.5 пт.**, у **Тип штриха:** — безперервний (рис. 16.3 б). Натиснувши **Закрыть** закриваємо панель **Формат осі**. Такі ж операції проводимо і з віссю y .

Так як ми маємо на одній діаграмі два відмінні між собою графіка, призначимо для кожного з них свою ось. Для цього виділимо лівою клавішею миші маркерні точки **Ряд1** (1), натиснемо праву клавішу і виберемо **Формат ряда данных...** (2) (рис. 16.4).

На панелі **Формат ряда данных** у вкладці **Параметры ряда** вказуємо **По вспомогательной оси** (3) і натиснувши **Заккрыть** отримуємо діаграму (рис. 16.5).

Проведемо із цією віссю такі ж операції, як і із правою віссю у.

Для полегшення користування діаграмою необхідно, щоб поділки правої осі співпадали з поділками лівої, принаймні основні поділки з додатковими. Тому для правої осі аналогічно рис. 16.2 змінюємо максимальне значення і ціну проміжних поділок (рис. 16.6).

Знову активізуємо дані осі **x** (див. рис. 16.1), натискаємо праву клавішу миші і у відкритому меню вибираємо **Добавить основные линии сетки**. Аналогічні виконуються подібні дії із проміжними лініями сітки **Добавить промежуточные линии сетки**.

Далі активізуємо вертикальні чи горизонтальні лінії сітки, натискаємо праву клавішу миші й у меню вибираємо **Формат линий сетки...** (рис. 16.7). Аналогічно (рис. 16.3 а і б) в **Цвет линии** вибрати **Сплошная линия** чорний колір, в **Тип линии** прийняти **Составной тип:** – суцільна товщиною **1.0 пт.**, **Тип штриха:** — **безперервний**. У кінці закриваємо панель **Формат оси** натиснувши **Заккрыть**. Такі ж самі операції проводимо для інших основних осей, а також і для проміжних, з тою різницею, що для проміжних товщина ліній приймається меншою — **0.7 пт.**




Рис. 16.3. Вибір кольору (а) і типу (б) лінії осі **x**




Рис. 16.4. Додавання правої осі




Рис. 16.5. Вигляд двовісної діаграми





Рис. 16.6. Вибір параметрів правої осі

Для редагування зображення залежностей виділяємо лівою клавiшею миші маркерні точки **Ряд1** (1), потім натискаємо праву клавiшу і виберемо **Формат ряда данных...** (2) (рис. 16.8). На панелі **Формат ряда данных** у вкладці **Параметры маркера** (3) виберемо **Встроенный**, **Тип:** , розмір **5** пт. (4). У вкладці **Заливка маркера** указуємо **Нет заливки**. Аналогічно рис. 16.3 для **Цвет линии маркера** вибираємо **Сплошная линия** чорного кольору, в **Тип линии маркера** приймаємо **Составной тип:** — суцільна лінія товщиною **0.7** пт, **Тип штриха:** — безперервний.




Рис. 16.7. Вибір форматування вертикальної сітки





Рис. 16.8. Вибір параметрів маркера

Закриваємо панель **Формат ряда данных** натиснувши **Закреть**.

Такі ж операції проводяться із другим рядом, змінюючи тип маркера.

Для представлення лінії тренду виділимо лівою клавiшею миші маркерні точки **Ряд1** (1), потім натиснемо праву і виберемо **Добавить линию тренда...** (2) (рис. 16.9). На панелі **Формат линии тренда** у вкладці **Параметры линии тренда** (3) виберемо ☒ **показывать уравнение на диаграмме** (4), ☒ **поместить на диаграмму... (R^2)**, тобто коефіцієнт детермінації (5), вибираємо тип рівняння  **Полиномиальная** (6) і ступінь **Степень: 2** (7). У процесі вибору виду рівняння, а також ступеня поліноміального рівняння на діаграмі буде змінюватися вигляд кривої, математична залежність і коефіцієнт детермінації. Слід прийняти рівняння з найбільшим коефіцієнтом детермінації.

Так як і вище (рис. 16.3 а і б) у вкладці **Цвет линии** для лінії тренду варто вибрати ☒ **Сплошная линия** чорного кольору, в **Тип линии** прийняти **Составной тип** — суцільна товщиною **2.0 пт.**, **Тип штриха:** — безперервний. У кінці закрити панель **Формат оси** натиснувши **Заккрыть**.

Аналогічні операції проводимо з другим рядом даних, змінивши лише у разі необхідності **Параметры линии тренда** та **Тип штриха:**, наприклад на пунктир.




Рис. 16.9. Параметри лінії тренду

Одержані рівняння та їхні коефіцієнти детермінації слід скопіювати, вставити в текстовий файл, краще безпосередньо у формули, наприклад (16.1) та (16.2), відредагувавши їх.

$$Q = -74.69W^2 + 3.624W + 13.21, \quad (16.1)$$

$$\Delta p = 65.67W - 7.874. \quad (16.2)$$

Коефіцієнти детермінації виразів (16.1) і (16.2) відповідно становлять $R^2 = 0.999$ і $R^2 = 1$ ³⁶⁾.

Потім рівняння та їхні коефіцієнти детермінації доцільно прибрати з поля діаграми. Також слід прибрати легенду та збільшити область діаграми, надавши їй необхідних розмірів.

Далі слід активізувати лівою клавішею миші дані осі **x**, потім натиснути праву клавішу й у відкритому меню вибрати не **Формат осі...**, як це наведено на рис. 16.1, а **Шрифт...**. Установити необхідний тип і розмір шрифту (у нас **Arial 14** **пт.**) і таким же чином призначити його для вертикальних осей.

Для додавання підписів осей із розділу **Работа с диаграммами** (1) (рис. 16.10), заходимо у підрозділ **Макет** (2) і у вкладці **Названия осей** (3) вибираємо назву осі **Название основной горизонтальной оси** (4) та її розташування **Название под осью** (5).




Рис. 16.10. Підписування назв осей

Аналогічно призначаємо підписи іншим осям.

Виконавши необхідні підписи осей задаємо їм необхідний формат (у нас **Arial 13** **пт.**).

Далі додаємо підписи графічних залежностей, представлених на діаграмі. Для цього вибираємо **Вставка** (1) (рис. 16.11) потім **Надпис** (2) і у відкритому полі (3) вносимо необхідні написи.

Для отримання графічного файлу необхідно скопіювавши **область діаграми** вставляємо її в графічний редактор, наприклад **Paint**, редагування яким в основному полягає в зменшенні навколишнього вільного поля.

Проте, графічні файли найкращої якості отримуються з використанням програми **Universal Document Converter**.

Остаточний вигляд діаграми представлено на рис. 16.12.

³⁶⁾ Можливість безпосереднього отримання коефіцієнту детермінації ряду видів рівнянь є суттєвою перевагою ПА **Excel** порівняно з ППП **Statistica**.




Рис. 16.11. Підписування графіків




Рис. 16.12. Остаточний вигляд діаграми

16.1.2. Редагування гістограм

16.1.2.1. Обробка об'ємних гістограм

Редагування осей і підписів гістограми, представленої на рис. 15.5 (с. 959), аналогічне викладеному у підрозділі **16.1.1 Редагування графічних залежностей** із доданням можливості повороту підписів, який виконується з панелі **Формат осей** у вкладці **Выравнивание** (1).

При цьому повинно бути встановлено вихідний **горизонтальний напрям** тексту (2). Поворот здійснюється установкою даних **Другой угол: 6°** (3) (рис. 16.13).

Також є змога повертати зображення гістограми. Для цього слід клацнути на полі діаграми лівою клав'яшею миші й у відкритому меню вибрати **Поворот объемной фигуры...** (1) (рис. 16.14).

У вкладці **Поворот объемной фигуры** (2) панелі **Формат области диаграммы** слід установити **Оси под прямым углом** (3) і **Автомасштабирование** (4). Далі виконуємо необхідний поворот фігури навколо осей **x** і **y** (5). Слід також відмітити, що при активації **Оси под прямым углом** недоступна зміна перспективи. Установивши необхідне положення фігури на панелі **Формат области диаграммы** слід натиснути кнопку **Закерить** (6).

Варто зауважити, що об'ємні діаграми з активацією **Оси под прямым углом** мають більш строгий вигляд і майже виключають необхідність повороту підписів на нефіксовані кути.

Активізація ряду даних (як на рис. 16.8 с. 996) дає змогу **Добавить подписи данных**. Для цього на панелі **Формат подписей данных** і **Заливка** установлюємо їхні положення у відповідності з рис. 16.15 а і рис. 16.15 б та рис. 16.16.

Далі активізуються лівою клав'яшею миші ряди підписів (цифр), яким призначаємо необхідний тип і розмір шрифту (у нас **Arial 14 пт.**). Подвійне клацання лівою клав'яшею миші на цифрі активізує лише цю цифру, що дає змогу переміщати її на зображення гістограми (рис. 16.17).




Рис. 16.13. Поворот тексту підпису осей




Рис. 16.14. Установка кутів повороту зображення об'ємної гістограми




Рис. 16.15. Установка параметров подпису (а) і фону цифр рядів даних (б)

Після цього активізувати лівою клавішею миші ряд гістограм, натиснути **Формат ряду даних...** і на панелі **Формат ряду даних** вибрати **Заливка** та установити відповідну заливку рядів (аналогічно рис. 16.15 б), також на панелі **Формат ряду даних** слід установити для рядів **Цвет границы** і **Стили границ** (аналогічно вибору **Формат линий сетки...** (рис. 16.7 та рис. 16.3 а і б) прийнявши чорний колір суцільної лінії товщиною **0.5–0.7** пт.

У результаті гістограма набуває остаточного вигляду (рис. 16.17).

Отримання графічного файлу виконується як описано вище у підрозділі 16.1.1 Редагування графічних залежностей.




Рис. 16.16. Поворот тексту підпису даних




Рис. 16.17. Остаточний вигляд об'ємної гістограми

16.1.2.2. Редагування об'ємних нормованих гістограм із накопиченням

Для одержання підпису стовпчиків гістограми рис. 15.7 (с. 960) слід клацнути правою клавішею миші на полі гістограми і на отриманій вкладці натиснути **Выбрать данные...** (рис. 16.18).




Рис. 16.18. Вибір даних для одержання підпису стовпчиків гістограми

На відкритій панелі **Выбор источника данных** (рис. 16.19) треба у вікні **Подписи горизонтальной оси (категории)** (1) натиснути **Изменить** (2).




Рис. 16.19. Вибір джерела даних для підпису стовпчиків гістограми

Виникає панель **Подписи оси**, на якій треба задати **Диапазон подписей оси:** (1), виділивши в таблиці діапазон чарунок **B2:O2** (2) (рис. 16.20), після чого натиснути **ОК** (3).




Рис. 16.20. Вибір підпису стовпчиків гістограми

Далі, натиснувши **ОК** (рис. 16.19) закрити панель **Выбор источника данных**.




Рис. 16.21. Остаточний вигляд стовпчикової гістограми

Після цього активізувати лівою клавішею миші ряд гістограми, натиснути **Формат ряда данных...** і на панелі **Формат ряда данных** вибрати **Заливка** та уста-

новити відповідну заливку рядів (аналогічно рис. 16.15 б), також на панелі **Формат ряда данных** слід установити для рядів **Цвет границы** і **Стили границ** (аналогічно вибору **Формат линий сетки...**) (рис. 16.7, с. 996 та рис. 16.3 а і б, с. 994) прийнявши чорний колір суцільної лінії товщиною **0.5–0.7** пт.

Подальші дії аналогічні викладеному у підрозділах 16.1.1 Редагування графічних залежностей та 16.1.2.1 Обробка об'ємних гістограм. Остаточний вигляд гістограми наведено на рис. 16.21.

16.2. РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ППП STATISTICA

16.2.1. Загальні моменти

Як показує аналіз оформлення як вітчизняних, так і зарубіжних наукових видань, графічні матеріали, отримані ППП **Statistica** представляються в основному з тими параметрами, які встановлені за умовчужанням і зовсім не редагуються, що негативно впливає не лише на зовнішній вигляд оформлення статті і видання в цілому, а й на сприйняття викладеного матеріалу.

Виходячи із власного досвіду, нами розглядається редагування зображень, одержаних ППП **Statistica** у поєднанні з рекомендаціями установки тих чи інших параметрів оформлення, а в разі необхідності й меж значення вихідних чи отриманих величин. При цьому дотримано порядок згадування зображень у даній роботі.

Хоч редагування зображення, отриманого ППП **Statistica** можна виконати з одного меню, яке отримується подвійним клацанням лівою кнопкою миші поза полем рисунка (див. рис. 16.25, с. 1009), для наочності розглядатимемо окремо редагування зображення гістограми і її поля.

16.2.2. Обробка суміщених гістограм

16.2.2.1. Редагування зображення

Взагалі для редагування слід двічі клацнути правою клав'єшею миші на необхідному елементі. На зображенні суміщених гістограм (рис. 15.15, с. 970) у першу чергу слід прибрати рівняння нормального статистичного розподілу і статистичні характеристики, зробивши почергово їх активними, натискаючи один раз праву клав'єшу миші, і далі натискаючи клав'єшу **Delete** на клавіатурі. Далі слід двічі клацнути на процентах над стовбцем і в меню прибрати галочку ☒ Percentages / ☒ Проценты, у вікні **Plot** / **График** вибрати іншу гіс-

тограму і з нею проробити те ж саме, натиснувши **All Options...** / **Параметры...** і перейти на вкладку **Bars** / **Столбцы** панелі **Plot Layout** / **Шаблон графика**.¹⁰⁷

Для редагування кольору і растру гістограм на вкладці **Bars** / **Столбцы** (рис. 16.22 а) натиснути **Area...** / **Фон...** (1) і вибрати растр (2). У **Foreground color:** / **Передний фон:** (3) установити **чорний колір** (4) обмеження стовпчиків і колір точок растру, перейти на **Background color:** / **Задний фон:** (5) і вибрати необхідний колір стовпчиків (у даному випадку жовтий) (6). Натиснути **Close** / **Закрьть** (7) і у вікні **Plot:** / **График:** (8) вибрати іншу гістограму і з нею проробити те ж саме. Після цього перейти на вкладку **Histogram** / **Гистограмма** (9).

У вкладці **Histogram** / **Гистограмма** установити величину інтервалу заповнення стовбцями **Bar width: 90** % / **Ширина столбца: 90** %. У вікні **Plot:** / **График:** вибрати іншу гістограму і з виконати те ж саме і перейти на вкладку **Fitting** / **Подгонка**.¹⁰⁸

На вкладці **Histogram** / **Гистограмма** за допомогою **Categories: 12** / **Категории: 12** можна задавати кількість стовбців гістограми, проте в більшості випадків робити це не варто, автоматичне групування виконується майже бездоганно.




Рис. 16.22. Редагування засобами **Statistica** кольору і растру гістограм (а) та лінії щільності нормального статистичного розподілу (б)

На вкладці **Fitting** / **Подгонка** (рис. 16.22 б) для **Plot: 1: Кількість стручки** / **График: 1: Кількість стручки** вибрати ☒ **Pattern...** / ☒ **Шаблон...** (1) (установка кольору і товщини лінії нормального статистичного розподілу), натиснути його і у **Foreground color:** / **Передний фон:** (2) встановити **суцільну лінію** (3) товщиною **2.0** пт. (4) **чорного кольору** (5). Натиснути **Close** / **Закрьть** (6) і у вікні **Plot:**

/ **График** (7) вибрати лінію нормального статистичного розподілу **Plot: 2: Кількість стручки** / **График: 2: Кількість стручки** і з нею проробити те ж саме, після чого натиснути **ОК** (8) і завершити редагування зображення.

16.2.2.2. Редагування поля

Двічі клацнувши на цифрі горизонтальної осі (1) потрапляємо на вкладку **Scale Values** / **Значения шкалы** панелі **Axis Layout** / **Задание параметров оси** (рис. 16.23), де натиснувши **Font...** / **Шрифт...** (2) встановлюємо **шрифт Arial** **прямий, жирний, 11 пт.** (3), натиснувши **ОК** (4) переходимо на **Axis: Y left** / **Ось: Левая Y** (5) і встановлюємо ті ж самі параметри шрифту і повернувшись на ось **Axis: X** / **Ось: X**, відкриваємо вкладку **Scaling** / **Разметка** (6).




Рис. 16.23. Установка шрифтов координатных осей

На вкладці **Scaling**/Разметка (рис. 16.24 а) для **Axis: [X]**/Ось: [X] (1) вибрати **Mode: Manual**/Режим: Ручной (2) і встановити у даному випадку межі змін від **Minimum: 5**/Минимум: 5 (3) до **Maximum: 60**/Максимум: 60 (4).

При необхідності перейти на **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y] (5) і використовуючи **Mode: Manual**/Режим: Ручной (2) установити необхідні параметри **min** (3) і **max** (4) значень **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y] (5). При цьому слід взяти до уваги, що редагування кроку цифрового позначення **Edit step...** / Изменить шаг... (6) **Mode: Manual**/Режим: Ручной (7) і **Step size: 5**/Размер шага: 5 (8) у суміщених гістограмах можливе лише для осі **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y]. Після цього повернутися на **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y] і перейти на вкладку **General**/Общие настройки (9).




Рис. 16.24. Установка цифровых позначень (а) і товщини ліній осей (б)

На вкладці **General**/Общие настройки (рис. 16.24 б) для осі **Axis: [X]**/Ось: [X] (1) активізувавши лінії осей ☒ **Axis Line** / ☒ **Линия оси** (2) по чергово для осей **Axis: [X]**/Ось: [X] і **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y] у **Foreground color**/Передний фон: (3) слід задати **чорний колір** лінії, прийнявши її **суцільною** (4) з товщиною **1.5** **пт.** (5) (установка параметрів виконується аналогічно рис. 16.22). Натиснути **Close**/Закреть (6) і перейти на ось **Axis: [Y left]**/Ось: [Левая Y], установити такі ж параметри і повернутися на **Axis: [X]**/Ось: [X] і перейти на вкладку **Major Units**/Большие риски, тобто основні лінії сітки (7).

На цій вкладці для осі **Axis: [X]**/Ось: [X] активізувати ☒ **Gridlines...** / ☒ **Сетка...** і в **Foreground color**/Передний фон: встановити **штрихову лінію товщиною 1.0** **пт. чорного кольору** (основні лінії горизонтальної сітки), перей-

ти на **Axis: Y left** / **Ось: Левая Y** в відкрити **Gridlines...** / **Сетка...** і в **Foreground color: / Передний фон** встановити пунктирну лінію товщиною 1.0 пт.

чорного кольору (основні лінії вертикальної сітки). Вкладка **Minor Units / Малые риски** діє аналогічно **Major Units / Большие риски**, але для проміжних значень ліній сітки, які задати іншого виду або товщини. Далі перейти на вкладку **Title / Заголовок** і по осі **Axis: X** / **Ось: X** написати назву горизонтальної осі задавши **шрифт Arial** похилий, жирний, 11 пт., перейти на **Axis: Y left** / **Ось: Левая Y** і також тим же шрифтом підписати назву осі ординат.¹⁰⁹

Двічі клацнути по легенді і відредагувати її, вибравши **шрифт Arial** прямий, жирний, 10 пт.

Двічі клацнути поза полем рисунка і на вкладці **Graph Window / Окно графика** у меню **All Options / Все параметры графика** відкрити **Outside Background Color / Внешний цвет фона** (1) і вибрати **білий** (2) колір поля (рис. 16.25), натиснути **ОК** (4) і за-




Рис. 16.25. Установка цвета поля




Рис. 16.26. Остаточный вид сумищеної гістограми (рис. 15.15, с. 970)

крити панель.


Також до перелічених полів можна дістатися з меню, яке виникає при подвійному клацанні лівою клав'яшею миші поза полем рисунка.

Після редагування рисунка ППП **Statistica** його слід зберегти як графічний файл. Для цього клацнути правою клав'яшею миші на полі графіка, вибрати **Сохранить График** і у випадному меню указати тип графічного файлу (рис. 16.26). Проте найкращу якість мають отримувані графічні файли, включаючи і зображення таблиць, при використанні програми **Universal Document Converter**.

16.2.3. Обробка одинарних гістограм

При редагуванні одинарних гістограм (рис. 15.20), її обробка відрізняється від обробки суміщених (див. підрозділ **16.2.2.1 Редагування зображення**) тим, що із вкладки **Fitting/Подгонка** не можна перейти до **Pattern...** / **Шаблон...** (для установки кольору і товщини лінії щільності нормального статистичного розподілу). Для цього слід двічі клацнути на лінії нормального статистичного розподілу, перейти до **Pattern...** / **Шаблон...** і встановити за допомогою **Foreground color:** / **Передний фон:** суцільну лінію товщиною **2.0 пт. чорного кольору**. При цьому у вкладці **Fitting/Подгонка** представлено рівняння $Y = y = \text{normal}(x; 26.49603960396; 4.7942657580088) * 5 * 101$ нормального статистичного розподілу, яке можна скопіювати і вставити в текстовий файл.

На вкладці **General** / **Общие настройки** відсутня кнопка встановлення кількості колонок **Categories: 12** / **Категории: 12**, так як може задаватися і редагуватися для осі **Axis: [x]** / **Ось: [x]** крок цифрового позначення: **Edit step...** / **Изменить шаг...**, **Mode: Manual** / **Режим: Ручной** і **Step size: 5** / **Размер шага: 5**.



Ця обробка відрізняється від обробки суміщених гістограм (див. під-розділ 16.2.2.2) тим, що є можливість встановлення і редагування кроку цифрового позначення **Edit step...** / **Изменить шаг...**, **Mode: Manual** / **Режим: Ручной** і **Step size: 5** / **Размер шага: 5** також для осі **Axis: []** / **Ось: []**. При цьому межі осей **Axis: []** / **Ось: []** і **Axis: []** / **Ось: []** для парних гістограм повинні бути однакові. Крім того є зайвими основні лінії вертикальної сітки.

Подальша обробка гістограми графічним редактором до досягнення відповідного вигляду (рис. 16.27) описана на с. 1010.

Слід зауважити, що невміла побудова графіків призводить до того, що останні виходять або у вигляді гостровершинних геометричних фігур з вузькою основою, або плосковершинних, надто розтягнутих по осі абсцис. В обох випадках графіки виявляються погано виглядають і нечітко відображають закономірність варіювання.

Для уникнення цих недоліків використовується правило “золотого перетину”, згідно з яким відношення сторін рисунка повинно бути 1.62.

Наприклад при побудові варіаційної кривої масштаби на осях прямокутних координат слід вибирати з таким розрахунком, щоб основа кривої було в 1.5–2.0 рази більше за висоту, тобто максимальну ординату.

Відкладаючи по осі абсцис класи варіаційного ряду, слід також доводити крайні з них до нульових класів, в яких не міститься жодної варіанти. В результаті варіаційної кривої надається закінчений добре доступний для огляду і аналізу вигляд [15].

16.2.4. Редагування кореляційних матриць. Обробка зображення

Двічі клацнути на кореляційній лінії матриці (рис. 2.21, с. 119 або рис. 9.8, с. 511) і у відкритій панелі **Fitting** / **Подгонка** для **Plot: 1: Scatterplot** / **График: 1: Диагр. расс** натиснувши **All Options...** / **Параметры...**, перейти на вкладку **Fitting** / **Подгонка** панелі **Plot Layout** / **Шаблон графика** (рис. 16.28 а).




Рис. 16.28. Редагування лінії кореляційної залежності (а) і вигляду експериментальних точок (б)

У вкладці за допомогою **Fit type: Polynomial** / **Тип: Полиномиальная** (1) є можливість встановлювати характер рівняння кореляційної залежності. При виборі полінома **Fit type: Polynomial** / **Тип: Полиномиальная** (1) за допомогою **Polynomial order: Quartic** / **Степ. полинома: Вторая** (2) установлюється його ступінь (рис. 16.28 а) У ній за допомогою **Pattern...** / **Шаблоны...** (3) аналогічно рис. 16.22 (с. 1006) або рис. 16.29 а) установлюється колір і товщини лінії кореляційної залежності, потім у **Foreground color:** / **Передний фон:** слід установити **суцільну лінію товщиною 2.0 пт. чорного кольору** і перейти на вкладку **General** / **Общие настройки** (4).

На ній натиснувши **Markers...** / **Метки...** (1) (рис. 16.28 б) за допомогою **Marker pattern:** / **Размер метки:** встановлюємо для позначення точок **суцільний маркер** (2) **чорного** (3, 4) кольору величиною 4 пт. 4 points / 4 пунктов (5). Натискаємо **Close** / **Закреть** (6) і переходимо на вкладку **Ellipse** / **Эллипс** (7).

На вкладці **Ellipse** / **Эллипс** (рис. 16.29 а) натисненням **Add new ellipse** / **Новый эллипс** (1) установлюються параметри еліпса, який застосовується для позначення довірчого інтервалу для передбачених значень одиничного спостереження. Його параметри обчислюються із припущення, що обидві змінні мають нормальний статистичний розподіл. Орієнтація еліпса визначається знаком лінійної кореляції між змінними (більше довга вісь еліпса накладається на лінію регресії).




Рис. 16.29. Редагування параметрів довірчих еліпса (а) і меж (б)

Імовірність того, що нові значення пари змінних (x і y) потраплять в область, обмежену еліпсом, дорівнює значенню коефіцієнта, який охоплює кількість точок, які установлюються вибором **Coefficient: 0.95** / **Коеффициент: 0.95** (2). За допомогою ☒ **Pattern...** / ☒ **Шаблон...** (3) для еліпса прийняти **суцільну лінію** (4) **червоного кольору** (5) (вибір кольору як на рис. 16.22 або рис. 16.29 а) **товщиною 1.5 пт.** (6). Натискаємо **Close** / **Закреть** (7) і переходимо на вкладку **Regr. Bands** / **Регрес. границы** (8).

За допомогою вкладки **Regr. Bands** / **Регрес. границы** (рис. 16.29 б) редагуються обмежувальні лінії довірчих меж, які визначають область навколо середнього, де із заданим рівнем довіри представлено дійсне середнє. Слід натиснути **Add new pair of bands** / **Новая пара границ** (1), прийняти ☒ **Confidence** / ☒ **Доверительные** (2), задати необхідний довірчий інтервал **Level: 0.95** / **Уровень: 0.95** (3) і за допомогою ☒ **Pattern...** / ☒ **Шаблон...** (4) вибрати **суцільну лінію** (5) **синього кольору** (6, 7) **товщиною 1.0 пт.** (8) (рис. 16.29 б) і натиснути **Close** / **Закреть** (9) перейти на вкладку **Bars** / **Столбцы** (10).

На вкладці **Bars** / **Столбцы** (рис. 16.30, а) вибрати **Plot: 2: Histogram** / **График: 2: Гистограмма** (1) і для поля гістограми **Area...** / **Фон...** (2) призначити растр (3) і у **Foreground color:** / **Передний фон:** (4) синій колір (5), натиснути **Close** / **Закреть** (6) і перейти на вкладку **Histogram** / **Гистограмма** (7).




Рис. 16.30. Редагування кольору і растру (а) гістограми та кількості стовбців і зазору між ними (б) у кореляційній матриці

На вкладці **Histogram**/Гистограмма (рис. 16.30 б) установлюється кількість стовбців **Categories: 9** / Категории: 9 (1) і зазор між ними **Bar width: 80** / Ширина столбца: 80 (2). Це визначено автоматично і їх змінювати не варто.

Натиснення кнопки **ОК** (3) редагування завершується. Для редагування графічним редактором до досягнення вигляду, представленого на рис. 16.31, слід виконати дії, описані на с. 1010.




Рис. 16.31. Кінцевий вигляд редагованої кореляційної матриці, представлена на рис. 2.21 (с. 119).

На кореляційній матриці, представлений на рис. 16.31, межі довірчого інтервалу позначено блакитним, довірчого еліпсу — жовтим кольором, а неістотні кореляційні залежності не редаговані.

16.2.5. Редагування двовимірних діаграм розсіювання

16.2.5.1. Обробка зображення двовимірних діаграм

Слід двічі клацнути на лінії двовимірної діаграми розсіювання (рис. 2.22, с. 120), в результаті чого відкриється панель **Fitting/Подгонка** (див. рис. 16.35, с. 1018). На ній натиснути **All Options.../Параметры...** і перейти на вкладку **Fitting/Подгонка** панелі **Plot Layout/Шаблон графика** для роботи з **Plot:1:Y** / **График:1:Y** (рис. 16.32).

У цій же вкладці за допомогою **Fit type: Polynomial** / **Тип: Полиномиальная** (1) є можливість вибрати характер рівняння для лінії **Fit: 1** / **Подгонка: 1**. При виборі полінома **Fit type: Polynomial** / **Тип: Полиномиальная** (1) за допомогою **Polynomial order: Quartic** / **Степ. полинома: Вторая** (2) установлюється його ступінь. Вибирається **Pattern: —** / **Шаблон: —** (3) (установка кольору і товщини лінії рів-

няння виконується аналогічно рис. 16.22 (с. 1006) або рис. 16.29 а) (с. 1013), натиснувши його у **Foreground color:** / **Передний фон:** слід установити **суцільну лінію товщиною 2.0 пт. червоного кольору**. Потім слід відкрити **Value format...** / **Формат значення...** (4), де встановлюється числовий формат (5) із трьома знаками після нуля (6), натискається кнопки **Close** / **Закреть** (7) і **ОК** (8).

Знову двічі клацнути на лінії двовимірної діаграми розсіювання, у результаті чого відкриється вкладка **Fitting** / **Подгонка** для **Plot:1:Y** / **График:1:Y** панелі **Plot Layout** / **Шаблон графика** (рис. 16.33). У цій вкладці натиснути кнопку




Рис. 16.32. Редагування основної лінії рівняння

Add new fit / **Новая подгонка** (1) і на відкритій панелі **Add Legend** /

Добавить условные обозначения натиснути **ОК** (2). Утво-

риться додаткова лінія **Fit: 2** / **Подгонка:2**. Для неї за допомогою **Fit type: Polynomial** /

Тип: Полиномиальная (3) установлювати характер рівняння. Вибір показника полінома виконується за допомогою

Polynomial order: Quartic / **Степ. полинома: Вторая** (4).

Вибирається **Pattern...** / **Шаблон...** (5) (установка кольору і товщини лінії рівняння виконується аналогічно рис. 16.22 (с. 1006) або рис. 16.29 а) (с. 1013),

натиснувши його у **Foreground color:** / **Передний фон:** слід установити **лінію відмінну за кольором товщиною 1.0 пт**. Потім відкрити **Value format...** /

Формат значення... (4), де

встановлюється числовий формат (5) із трьома знаками після нуля (6), далі натискаються кнопки **Close** / **Закреть** (7) і **ОК** (8).




Рис. 16.33. Створення та редагування додаткової лінії рівняння

У цьому разі у верхній частині діаграми виникає рівняння кожної з ліній **Fit: 1** / **Подгонка: 1** і **Fit: 2** / **Подгонка: 2** (рис. 16.34). Ще раз двічі клацнути на лінії двовимірної діаграми розсіювання і на панелі **Fitting** / **Подгонка** перейти на лінію **Fit: 2** / **Подгонка: 2** (1), прибрати її кнопкою **Delete** / **Удалить** (2) і закрити панель натисненням **OK** (3) (рис. 16.35).

У результаті цього у верхній частині діаграми буде представлено лише математична залежність основної лінії рівняння (рис. 16.36), яка буде змінюватися у відповідності з задаванням ступені полінома.

Scatterplot: Висота рослини-04 vs. Кількість гілок-04 (Casewise MD deletion)

$$Y = -827.143 + 81.672 \cdot x - 2.930 \cdot x^2 + 0.050 \cdot x^3 - 0.000 \cdot x^4 + 0.000 \cdot x^5$$

$$Y = -827.143 + 81.672 \cdot x - 2.930 \cdot x^2 + 0.050 \cdot x^3 - 0.000 \cdot x^4 + 0.000 \cdot x^5$$

Рис. 16.34. Математичні залежності основної та додаткової лінії рівняння.




Рис. 16.35. Видалення додаткової лінії рівняння

Scatterplot: Висота рослини-04 vs. Кількість гілок-04 (Casewise MD deletion)
 $Y = -827.143 + 81.672 \cdot x - 2.930 \cdot x^2 + 0.050 \cdot x^3 - 0.000 \cdot x^4 + 0.000 \cdot x^5$

а)

Scatterplot: Висота рослини-04 vs. Кількість гілок-04 (Casewise MD deletion)
 $Y = 84.004 - 3.622 \cdot x + 0.055 \cdot x^2 - 0.000 \cdot x^3$

б)

Рис. 16.36. Математична залежність основної лінії рівняння:
 а – квінтиктне (5-го ступеня); б – кубічне.

Редагування вигляду експериментальних точок і параметрів довірчого еліпса та довірчого інтервалу представлено вище на рис. 16.22 (с. 1006) та 16.29 б) (с. 1013), а редагування гістограм, наведених на рис. 2.22 б) (с. 120) — представлено також вище на рис. 16.30 а) і 16.30 б) (с. 1014).

16.2.5.2. Редагування поля двовимірних діаграм

Усі елементи редагування зображення двовимірних діаграм розсіювання представлені у підрозділі **16.2.2.2 Редагування поля**, тому повторно описувати цей процес недоцільно. По закінченні редагування зображення засобами **Statistica** виконуються дії, викладені на с. 1010, до досягнення вигляду, представленого на рис. 16.37. Поле довірчого інтервалу позначено блакитним кольором.




Рис. 16.37. Кінцевий вигляд редагованої двовимірної діаграми розсіювання (рис. 2.22, с. 120).

16.2.5.3. Редагування графічної залежності

При редагуванні графічної залежності, поданої на рис. 11.16 (с. 700) до набуття вигляду, представленого рис. 16.38 використовуються засоби і методи, перелічені у викладених вище підрозділах, тому цей процес додаткового опису не потребує.




Рис. 16.38. Кінцевий вигляд редагованої графічної залежності (рис. 11.16).

16.2.6. Редагування об'ємних представлень залежностей

16.2.6.1. Тривимірна гістограма розсіювання

При дворазовому клацанні лівою кнопкою миші на самому зображенні гістограми розсіювання – стовпчиків (рис. 2.16, с. 114) виникає панель **General** / **Общие** (рис. 16.39), на якій встановлюються кольори і відтінки для верху/низу (1) та сторін (2, 3) стовпчиків і ліній їх обмеження (4). Причому змінювати вигляд точок і ліній (5), представлених на цій панелі, неможливо.




Рис. 16.39. Редагування кольорів і відтінків стовпчиків гістограми

Натисненням кнопки **All Options...** / **Параметры...** (6) переходимо на вкладку **Graph Window** / **Окно графика** панелі **All Options** / **Все параметры графика**, де як і на рис. 16.25 (с. 1009)

за допомогою **Outside Background Color** / **Внешний цвет фона** (1) слід вибрати білий (2) колір поля і перейти на вкладку **Axis: Title** / **Ось: Заголовок** (рис. 16.41). У ній редагуються підписи осей і встановлюється шрифт, для цього по осі **Axis: X** / **Ось: X** написати назву горизонтальної осі задавши шрифт **Arial** (1) *похилий* (2), **жирний** (3), **14** пт. (4), потім перейти на осі **Axis: Y** / **Ось: Y** (5) і




Рис. 16.40. Редагування цифрових величин. осей тривимірної гістограми

Axis: Z / **Ось: Z** та зробити теж саме і перейти на вкладку **Axis: Scaling** / **Ось: Разметка** (6).




Рис. 16.41. Редагування підписів осей тривимірної гістограми

У вкладці **Axis: Scaling** / **Ось:Разметка** (рис. 16.40) в **Edit range...** / **Изменить шаг...** встановлюються режим **Mode: Manual** / **Режим: Ручной** (1) для осі **Axis: X** / **Ось: X**, її початок **Minimum: 55** / **Минимум: 55** (2) і кінець **Maximum: 90** / **Максимум: 90** (3) та крок числового позначення **Edit step...** / **Изменить шаг...** (4). Величина кроку **Step size: 5** / **Размер шага: 5** (6) також

задається вручну **Mode: Manual** / **Режим: Ручной** (5). Після чого слід натиснути **Edit range...** / **Изменить шаг...** (7) і перейти до осі **Axis: Y** / **Ось: Y** (8) та ви-

конати також перелічені вище операції, потім те ж саме зробити для осі **Axis: Z** / **Ось: Z** та перейти на вкладку **Axis: General** / **Ось:Общие**. Слід мати на увазі, що ручне редагування кроку **Edit range...** / **Изменить шаг...** можливе лише для осі **Axis: Z** / **Ось: Z**.

У вкладці **Axis: General** / **Ось:Общие** (рис. 16.42) редагуються лінії ко-

























Рис. 16.42. Редагування товщини ліній осей тривимірної гістограми

ординатних осей, спочатку, наприклад, для осі **Axis: X** / **Ось: X** встановлюється необхідне відображення осей об'ємної фігури **1** та задається вигляд лінії осі (2) — суцільна (3) чорна (4) товщиною 1.25 пт. (5) і кнопкою **Close** / **Закреть** (6) виконується перехід на іншу ось (7).









Для осі  /  встановлюємо відображення осей об'ємної фігури    і така ж лінія, для осі  /  відображаються осі    із використанням такої ж лінії, після чого переходимо на вкладку  /  (8).





У вкладці  /  (рис. 16.42) редагуються основні лінії для координатних осей  /  ,  /  і  /  , приймається **суцільна чорна** лінія товщиною **1.0** пт. У вкладці  /  визначаємо параметри допоміжних ліній для цих осей, застосовуємо **суцільну чорну** лінію меншої товщини, але **пунктирну**.







 /  , проте робити це не варто, краще залишити автоматичну розбивку.



По закінченні редагування зображення тривимірної гістограми розсіювання (рис. 2.16, с. 114) засобами **Statistica**, виконується графічне редагування (див. с. 1010.) до досягнення вигляду, який вона має на рис. 16.43.

На вкладці  /  є можливість вибору шрифту і розміру представлення чисел для осей  /  ,  /  і  /  (рис. 16.23) (прийнято **шрифт Arial** **прямий, жирний, 14** пт.) і відповідну кількість десяткових знаків для цих чисел (аналогічно рис. 16.32 і 16.33).

У вкладці  /  можна редагувати кількість стовбців, розташованих по осях  ,  і

Далі визначаємо параметри ліній ☒ X axis... / ☒ Ось X... (4), які проходять по поверхні паралельно осі Axis:  / ☒ Ось:  (4), задаючи за допомогою **Line Properties** / **Свойства линии** їхній вигляд (суцільна (5) чорна (6) лінія товщиною 1 пт. (7)). Натиснувши **Close** / **Закрыть** (8), переходимо до ліній ☒ Y axis... / ☒ Ось Y... (9), паралельних осі Axis:  / ☒ Ось: , а потім до ліній ☒ Level... / ☒ Уровень... (10) рівнів. Для всіх їх за допомогою **Line Properties** / **Свойства линии** також задається суцільна (5) чорна (6) лінія товщиною 1 пт. (7).

Після цього у **Contour lines** / **Линии** встановлюється **Lines: Custom defined** / **Линии: Пользовательские** (11) і вибираються лінії проєкцій горизонтальних перетинів **Pattern:** / **Шаблон:** (12), встановлюючи за допомогою **Line Properties** / **Свойства линии** їхній вигляд (лінія товщиною 1 пт., відповідного типу і кольору). Далі натискається **General surface options...** / **Общие параметры поверхности...** (13) і на відкритій панелі **Surface** / **Поверхность** відмічаємо ☒ Display / ☒ Видна (14), ☒ Auto / ☒ Авто (15), далі ☒ Lines / ☒ Линии (16) – представлення лініями (рис. 16.47 а і в) чи ☒ Areas / ☒ Области (17) – областю (рис. 16.47 б). По закінченні редагування натискається **Close** / **Закрыть** (18) для закриття панелі **Surface** / **Поверхность**, **Close** / **Закрыть** (19) для закриття панелі **Surface Specifications** / **Свойства поверхности** і кнопку **OK** для закриття **All Options** / **Все параметры графика** (рис. 16.45).

Щоб поверхню не зафарбовувати на панелі **Surface Specifications** / **Свойства поверхности** приймається ☒ Solid / ☒ Сплошная (1) і у **Top:**  / **Верх:**  (2) задати білий колір (3) (рис. 16.46). Прийнявши **Transparent** / **Прозрачный** її можна зробити прозорою. Далі редагування продовжується за рис. 16.45.




Рис. 16.45. Редагування багатокольорового відображення поверхні

По закінченні редагування за допомогою ППП **Statistica** виконується графічне редагування (див. с. 1010) до досягнення вигляду, представленого на рис. 16.47.




Рис. 16.46. Встановлення чорно-білого відображення поверхні




Рис. 16.47. Різні варіанти остаточного вигляду поверхні другого порядку (рис. 11.109, с. 847)

16.2.6.3. Редагування тернарних графіків

Редагування тернарних графіків (рис. 11.114 і 11.115, с. 857) багато у чому повторює редагування гістограм, матриць, двовимірних діаграм розсіювання та об'ємних залежностей (див. підрозділи **16.2.2–16.2.6**).

Редагування точок графіків представлено на рис. 16.28, б), с. 1012.

Далі параметри вибираються аналогічно (рис. 16.44, с. 1023). Після цього треба пройти по вкладкам **Axis: Title** / **Ось: Заголовок**, **Axis: Scaling** / **Ось: Разметка** (слід мати на увазі, що ручне редагування кроку **Edit step...** / **Изменить шаг...** на вкладці **Axis: Scaling** / **Ось: Разметка** тут можливе лише для осі **Axis: [V]** / **Ось: [V]**), **Axis: Major Units** / **Ось: Большие риски**, **Axis: Minor Units** / **Ось: Малые риски**, **Axis: Scale Values** / **Ось: Значения шкалы**, **Axis: General** / **Ось: Общие**, установлюючи їхні параметри у відповідності з підрозділом **16.2.6.2 Редагування тривимірних поверхонь** (рис. 16.40, с. 1020), у кінці перейти на вкладку **Plot: Fitting** / **График: Подгонка** і відредагувати багатокольорове відображення поверхні згідно з (рис. 16.45, с. 1025). Далі редагування виконується як викладено у підрозділі **16.2.6 Редагування об'ємних представлень залежностей**.

Після редагування засобами ППП **Statistica** зображення редагується графічно (див. с. 1010) до досягнення вигляду, наведеного на рис. 16.48.




Рис. 16.48. Остаточний вигляд тернарних графіків:
а – тернарна тримірна поверхня; б – тримірна карта ліній.

ДОДАТКИ

Додаток А

ВИКОРИСТАНІ РОЗРАХУНКОВІ ФУНКЦІЇ ПАКЕТУ
MICROSOFT EXCEL

Функція	Синтаксис і призначення
EXP	EXP (число). Повертає число е , зведене в зазначену ступінь. Число е = 2.71828182845904 і є основою натурального логарифма. Число – обов’язковий аргумент. Показник ступеня, в який зводиться основа е .
FRASPOBR	FRASPOBR(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2). Повертає значення, зворотне (правобічному) F –розподілу ймовірностей. Якщо p=FRASP(x;...) , то FRASPOBR(p; ...)=x . Замінено функцією F.OBR.PX
F.OBR	F.OBR(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2). Повертає значення, зворотне F –розподілу ймовірності. Якщо p=F.RASP(x;...) , то F.OBR(p;...)=x . F –розподіл може використовуватися в F –тесті, який порівнює ступеня розкиду двох множин даних (див. табл. В.7–В.9, с. 1057–1060; рис. 3.18, с. 159)
F.OBR.PX	F.OBR.PX(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2). Повертає значення, зворотне (правобічне) F –розподілу ймовірностей. Якщо p=F.RASP.PX(x; ...) , то F.OBR.PX(p;...)=x . F –розподіл може використовуватися в F –тесті, який порівнює ступеня розкиду двох множин даних (рис. 3.17, с. 158)
F.RASP	F.RASP(x;степени_свободы1;степени_свободы2;интегральная). Повертає F –розподіл імовірності (розподіл Фішера). Ця функція дозволяє визначити, чи мають дві множини даних різні ступені розкиду результатів. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , функція F.RASP повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь , повертається функція щільності розподілу (рис. 3.16, с. 157)
F.RASP.PX	F.RASP.PX(x,степени_свободы1,степени_свободы2) Ця функція дозволяє визначити, чи мають два безлічі даних різні ступені розкиду результатів. Можна, наприклад, проаналізувати результати тестування старшокласників і визначити, чи відрізняється розкид результатів хлопців і дівчат (рис. 3.18, с. 159)

Функція	Синтаксис і призначення
БИНОМ.ОБР	БИНОМ.ОБР(число_испытаний;вероятность_успеха;альфа) Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл більше заданого значення критерію або дорівнює йому. Якщо число_испытаний не ціле, воно усікається до цілих (рис. 3.29, с. 178)
БИНОМ.РАСП	<p>БИНОМ.РАСП(число_успехов;число_испытаний;вероятность_успеха;интегральная) Повертає окреме значення біноміального розподілу. Функція БИНОМ.РАСП використовується при фіксованому числі випробувань, якщо результатом будь-якого випробування може бути тільки успіх або невдача, випробування незалежні, а ймовірність успіху залишається постійною протягом усього експерименту. Наприклад, за допомогою функції БИНОМ.РАСП можна обчислити вірогідність того, що двоє з трьох наступних новонароджених будуть хлопчиками. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент. Якщо аргумент “интегральная” має значення истина, функція БИНОМ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу, тобто ймовірність того, що число успішних випробувань буде не більше значення аргументу “число_успехов”; якщо цей аргумент має значення ложь, то повертається функція імовірнісної міри, тобто ймовірність того, що число успішних випробувань буде дорівнює значенню аргументу “число_успехов”.</p> <p>Число_успехов і число_испытаний усікаються до цілих. Якщо x=число_успехов, n=число_испытаний і p=вероятность_успеха, то вагова функція біноміального розподілу розраховується за формулою (3.109), с. 176.</p> <p>Якщо x=число_успехов, n=число_испытаний і p=вероятность_успеха, то інтегральний біноміальний розподіл виглядає таким чином: $F_{n,p}(x) = \sum_{y=0}^x f_{n,p}(y)$</p> <p>(рис. 3.28, с. 178)</p>
ВЕЙБУЛЛ.РАСП	<p>ВЕЙБУЛЛ.РАСП (x, альфа, бета, интегральная). Повертає розподіл Вейбулла. Аргументи x значення, для якого обчислюється функція, Альфа і Бета – параметри розподілу. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “интегральная” має значення истина, функція ВЕЙБУЛЛ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь, повертається вагова функція розподілу.</p> <p>Якщо альфа=1, то функція ВЕЙБУЛЛ.РАСП повертає експоненціальне розподіл.</p>

Функція	Синтаксис і призначення
ГАММАНЛОГ	ГАММАНЛОГ(х) . Повертає натуральний логарифм гамма-функції - $\Gamma(x)$. Число е , зведене в ступінь ГАММАНЛОГ(і) , де і – ціле число, повертає такий же результат, що і (і-1)! .
ДИСП	ДИСП(число1;[число2];...] ³⁷⁾ . Оцінює дисперсію за вибіркою. Замінено функцією ДИСП.В(число1; [число2];...]
ДИСПР	ДИСПР(число1;[число2];...] . Обчислює дисперсію для генеральної сукупності. Замінено функцією ДИСП.Г(число1;[число2];...]
ДИСП.В	ДИСП.В(число1;[число2];...] . Оцінює дисперсію за вибіркою. Логічні значення та текст ігноруються
ДИСП.Г	ДИСП.Г(число1;[число2];...] . Обчислює дисперсію для генеральної сукупності. Логічні значення та текст ігноруються
ДОВЕРИТ	ДОВЕРИТ(альфа;станд_откл;размер) . Повертає довірчий інтервал для середнього генеральної сукупності з нормальним статистичним розподілом. Замінено функцією ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа; стандартное_откл; размер)
ДОВЕРИТ.НОРМ	ДОВЕРИТ.НОРМ(альфа;стандартное_откл; размер) . Повертає довірчий інтервал для середнього генеральної сукупності з використанням нормального статистичного розподілу
ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ	ДОВЕРИТ.СТЮДЕНТ(альфа;стандартное_откл; размер) . Повертає довірчий інтервал для середнього генеральної сукупності з використанням розподілу Стюдента
ЕСЛИ	ЕСЛИ(лог_выражение,[значение_если_истина], [значение_если_ложь]) . Функція ЕСЛИ повертає одне значення, якщо зазначена умова дає в результаті значення ИСТИНА , й інше значення, якщо умова дає в результаті значення ЛОЖЬ . Наприклад, формула =ЕСЛИ(А1>10, "Більше 10", "10 або менше") повертає рядок "Більше 10", якщо значення в чарунці А1 більше 10, і "10 або менше", якщо воно менше або дорівнює 10. Функція ЕСЛИ має аргументи — значення, яке надає інформацію для дії, події, методу, властивості, функції або процедури, зазначені нижче. Лог_выражение – обов'язковий аргумент. Будь-яке значення або вираз, що дає в результаті зна-

³⁷⁾ У квадратних дужках представлені необов'язкові аргументи.

Функція	Синтаксис і призначення
	<p>чення истина або ложь. Наприклад, A10 = 100 - логічне вираження; якщо значення в чарунці A10 дорівнює 100, це вираз приймає значення истина, в іншому випадку - значення ложь. У цьому аргументі може використовуватися будь-який оператор порівняння.</p> <p>Значение_если_истина - необов'язковий аргумент. Значення, яке повертається, якщо аргумент лог_выражение відповідає значенню истина. Наприклад, якщо даний аргумент — рядок "В межах бюджету", а аргумент лог_выражение відповідає значенню истина, функція ЕСЛИ повертає текст "В межах бюджету". Якщо аргумент лог_выражение відповідає значенню истина, а аргумент значение_если_истина опущений (тобто, після аргументу лог_выражение є тільки кома), повертається значення 0. Щоб відобразити слово истина, використовуйте логічне значення истина в якості цього аргументу.</p> <p>Значение_если_ложь - необов'язковий аргумент. Значення, яке повертається, якщо аргумент лог_выражение відповідає значенню ложь. Наприклад, якщо даний аргумент - рядок "Перевищення бюджету", а аргумент лог_выражение відповідає значенню ложь, функція ЕСЛИ повертає текст "Перевищення бюджету". Якщо аргумент лог_выражение відповідає значенню ложь, а аргумент значение_если_ложь опущений (тобто після аргументу значение_если_ложь немає коми), повертається логічне значення ложь. Якщо аргумент лог_выражение відповідає значенню ложь, а значення аргументу значение_если_ложь опущено (тобто, якщо у функції ЕСЛИ немає коми після аргументу значение_если_истина), повертається значення 0.</p>
КВАРТИЛЬ.ВКЛ	КВАРТИЛЬ.ВКЛ(массив;часть) . Повертає квартиль набору даних на основі значень процентиля від 0 до 1 (включно)
КОРРЕЛ	<p>КОРРЕЛ(массив1; массив2). Повертає коефіцієнт кореляції між діапазонами чарунок "массив1" і "массив2". Рівняння для коефіцієнта кореляції має наступний вигляд</p> $r_{x,y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$ <p>де X і Y – середні значення вибірок СРЗНАЧ (массив1) і СРЗНАЧ (массив2)</p>

Функція	Синтаксис і призначення
ЛОГНОРМ.ОБР	ЛОГНОРМ.ОБР(вероятность;среднее;станд_откл) . Повертає зворотну функцію інтегрального логнормального розподілу x , де $\ln(x)$ має нормальний розподіл з параметрами "среднее" і "стандартное_отклонение". Якщо $p=\text{ЛОГНОРМ.РАСП}(x;...)$, то $\text{ЛОГНОРМ.ОБР}(p;...)=x$. Вероятность – імовірність, пов'язана з логнормальний розподілом, Среднее – середнє $\ln(x)$, Стандартное_отклонение – середній квадратичний відхил $\ln(x)$.
ЛОГНОРМ.РАСП	ЛОГНОРМ.РАСП(x;среднее;стандартное_откл;интегральная) . Функція використовується для аналізу даних, які були логарифмічно перетворені. Среднее – середнє $\ln(x)$. Стандартное_откл – середньоквадратичний відхил $\ln(x)$. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент "інтегральна" має значення ИСТИНА , функція ЛОГНОРМ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ЛОЖЬ , повертається функція щільності розподілу.
МАКС	МАКС(число1;[число2];...) . Повертає найбільше значення з набору значень
МЕДИАНА	МЕДИАНА(число1;[число2];...) . Повертає медіану заданих чисел.
МИН	МИН(число1;[число2];...) . Повертає найменше значення у списку аргументів
МОДА.ОДН	МОДА.ОДН(число1;[число2];...) . Повертає значення, які найбільш часто зустрічаються чи повторюються у масиві або діапазоні даних
МОДА.НСК	МОДА.НСК((число1;[число2];...)) . Повертає значення, які найбільш часто зустрічаються чи повторюються у вертикальному масиві чи діапазоні даних. Для отримання горизонтального масиву використовується функція ТРАНСП(МОДА.НСК(число1;число2...))
МОПРЕД	МОПРЕД повертає визначник матриці – число, яке обчислюється на основі значень елементів масиву (матриця зберігається в масиві). Числовий масив повинен бути з рівною кількістю рядків і стовпців і може задаватися як інтервал, наприклад A1: C3, як масив констант, наприклад {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}, чи як ім'я для інтервалу або масиву.
НАИБОЛЬШИЙ	НАИБОЛЬШИЙ (массив;k) . Повертає k -те найбільше значення масиву даних. Вона використовується для визначення величини, що займає задане відносне положення в масиві.

Функція	Синтаксис і призначення
НАИМЕНЬШИЙ	НАИМЕНЬШИЙ(массив;k) . Повертає k -те найменше значення масиву даних. Вона використовується для визначення величини, що займає задане відносне положення в масиві
НОРМ.РАСП	НОРМ.РАСП(x;среднее;стандартное_откл;интегральная) . Повертає нормальну функцію розподілу для вказаного середнього і стандартного відхилення. Ця функція дуже широко застосовується в статистиці, у тому числі при перевірці гіпотез. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , функція НОРМ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь , повертається вагова функція розподілу. Якщо значення “ среднее ”=0, “ стандартное_откл ”=1 і “ интегральная ” = истина , то функція НОРМ.РАСП повертає стандартний нормальний розподіл, як функція НОРМ.СТ.РАСП . Якщо у рівнянні для щільності нормального розподілу аргумент “ интегральная ” має значення ложь , то рівняння набуває вигляду (3.16), с. 136. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , формула описує інтеграл з межами від $-\infty$ до x (рис. 3.7, с. 141)
НОРМ.СТ.РАСП	НОРМ.СТ.РАСП(z;интегральная) . Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл. Цей розподіл має середнє, рівне нулю, і стандартне відхилення, рівне одиниці. Дана функція використовується замість таблиці площ стандартної нормальної кривої. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , функція НОРМ.СТ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь , повертається вагова функція розподілу (3.23), с. 139; рис. 3.7, с. 141
НОРМ.ОБР	НОРМ.ОБР(вероятност;среднее,стандартное_откл) . Повертає зворотне значення нормального статистичного розподілу для зазначеного середнього і стандартного відхилення (рис. 3.9, с. 142)
НОРМ.СТ.ОБР	НОРМ.СТ.ОБР(вероятност) . Повертає зворотне значення стандартного нормального статистичного розподілу. Цей розподіл має середнє, рівне нулю, і стандартний відхил, рівний одиниці (рис. 3.9, с. 142)
НОРМАЛИЗАЦИЯ	НОРМАЛИЗАЦИЯ(x;среднее;стандартное_откл) . Повертає нормалізоване значення для розподілу, що характеризується середнім і стандартним відхилом
ОКРУГЛ	ОКРУГЛ(число;число_разрядов) . Округляє число до вказаної кількості десяткових розрядів. У разі від’ємного представлення числа розрядів округляє до числа розрядів цілих.

Функція	Синтаксис і призначення
ПУАССОН.РАСП	<p>ПУАССОН.РАСП(х;среднее;интегральная) Повертає розподіл Пуассона. Звичайне застосування розподілу Пуассона полягає в передбаченні кількості подій, що відбуваються за певний час, наприклад кількості машин, що з'являються на площі за одну хвилину.</p> <p>Интегральная логічне значення, що визначає форму повернення розподілу ймовірностей. Якщо аргумент “интегральная” має значення истина, то функція ПУАССОН.РАСП повертає інтегральний розподіл Пуассона, тобто ймовірність того, що число випадкових подій виявиться в діапазоні від 0 до x включно. Якщо цей аргумент має значення ложь, то повертається вагова функція розподілу Пуассона (3.119), с. 179, тобто ймовірність точного рівності числа подій, що відбулися значенню x.</p> <p>Якщо інтегральна =истина, то обчислення виконуються за</p> $f(x) = \sum_{k=0}^x e^{-a} \cdot \frac{a^x}{k!} \quad (\text{рис. 3.30, с. 181})$
РАНГ.СР	<p>РАНГ.СР(число;ссылка;[порядок]). Повертає ранг числа у списку чисел, тобто його величину щодо інших значень у списку. Якщо кілька значень мають однаковий ранг, повертається середнє. Ссылка – масив або посилання на список чисел. Нечислові значення ігноруються. Порядок – число, що визначає спосіб упорядкування, якщо значення цього аргументу дорівнює 0 або опущено, ранг числа визначається так, якби посилання було списком, відсортованим в порядку убутання; якщо значення аргументу будь-яке число, крім нуля, то ранг числа визначається за списком, відсортованим в порядку зростання.</p>
СКОС	<p>СКОС(число1;[число2];...). Повертає асиметрію розподілу. Асиметрія характеризує ступінь несиметричності розподілу щодо його середнього</p>
СРЗНАЧ	<p>СРЗНАЧ(число1;[число2];...). Повертає середнє значення (середнє арифметичне) аргументів. Наприклад, якщо діапазон (дві або більше чарунок листа, осередки діапазону можуть бути як суміжними, так і несуміжними) A1:A20 містить числа, формула СРЗНАЧ(A1:A20) повертає середнє значення цих чисел)</p>
СРГЕОМ	<p>СРГЕОМ(число1;[число2];...). Повертає середнє геометричне значень масиву або інтервалу додатних чисел</p>
СРГАРМ	<p>СРГАРМ(число1;[число2];...). Повертає середнє гармонійне безлічі даних. Середнє гармонійне — величина, зворотна середньому арифметичному обернених величин</p>

Функція	Синтаксис і призначення
СРОТКЛ	СРОТКЛ(число1;[число2];...) Повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього і є мірою розкиду безлічі даних. Число1, число2, ... – аргумент "число1" є обов'язковим, наступні за ним – ні. Аргументи повинні бути або числами, або іменами, масивами або посиланнями, що містять числа. Рівняння для середнього відхилення представлено виразом (1.41).
СТАНДОТКЛОН	СТАНДОТКЛОН(число1;[число2];...]). Оцінює стандартний відхил за вибіркою. Замінено функцією СТАНДОТКЛОН.В
СТАНДОТКЛОН.В	СТАНДОТКЛОН.В(число1;[число2];...]). Оцінює стандартний відхил за вибіркою. Логічні значення та текст ігноруються
СТАНДОТКЛОН.Г	СТАНДОТКЛОН.Г(число1;[число2];...]). Обчислює стандартний відхил за генеральною сукупністю, заданої аргументами. При цьому логічні значення і текст ігноруються
СТЬЮДРАСПОБР	СТЬЮДРАСПОБР(вероятност;степени_свободы) . Повертає двобічний зворотний t -розподіл Стьюдента. Замінено функцією СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х
СТЬЮДЕНТ.ОБР	СТЬЮДЕНТ.ОБР(вероятност;степени_свободы) . Повертає лівобічний зворотний t -розподіл Стьюдента (див. табл. В.5, с. 1051; рис. 3.15, с. 155)
СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х	СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятност;степени_свободы) . Повертає двобічний зворотний t -розподіл Стьюдента (див. табл. В.5, с. 1051; рис. 3.15, с. 155)
СТЬЮДЕНТ.РАСП	СТЬЮДЕНТ.РАСП (х, степени_свободы, интегральная) Повертає t -розподіл Стьюдента, який використовується для перевірки гіпотез при малому обсязі вибірки. Дану функцію можна використовувати замість таблиці критичних значень t -розподілу. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент "интегральная" має значення истина , функція СТЬЮДЕНТ.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь , повертається функція щільності розподілу (рис. 3.13, с. 153)
СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х	СТЬЮДЕНТ.РАСП.2Х(х,степени_свободы) Повертає двобічний t -розподіл Стьюдента, який використовується для перевірки гіпотез при малому обсязі вибірки. Дану функцію можна використовувати замість таблиці критичних значень t -розподілу (рис. 3.14, с. 154)

Функція	Синтаксис і призначення
СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ	СТЬЮДЕНТ.РАСП.ПХ (х, степе-ни_свободы) Повертає правобічний t -розподіл Стьюдента, який використовується для перевірки гіпотез при малому обсязі вибірки. Дану функцію можна застосовувати замість таблиці критичних значень t -розподілу (рис. 3.14, с. 154)
СУММ	СУММ(число1, [число2],...) . Обчислює суму всіх чисел, вказаних в якості аргументів
СУММКВ	СУММКВ(число1, [число2],...) . Повертає суму квадратів аргументів
СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ	СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ(массив1,массив2,хвосты, тип) Повертає ймовірність, відповідну t -тесту Стьюдента. Функція СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ дозволяє визначити ймовірність того, що дві вибірки взяті з генеральних сукупностей, які мають одне й те ж середнє. Массив1 – перший набір даних, массив2 – другий набір даних, хвосты – число хвостів розподілу. Якщо значення “хвосты”=1, функція СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ повертає однобічний розподіл. Якщо значення “хвосты”=2, функція СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ повертає двобічний розподіл, тип – вид виконуваного t -тесту: 1 – парний; 2 – двовибірковий з рівними дисперсіями (гомоскедастичний); 3 – двовибірковий з нерівними дисперсіями (гетероскедастичний).
СЧЁТ	СЧЁТ(значение1; [значение2]; ...) . Підраховує кількість чарунок, які містять числа, і кількість чисел у списку аргументів. Функція використовується для отримання кількості числових осередків у діапазонах або масивах чисел. Наприклад, для обчислення кількості чисел в діапазоні A1:A20 можна ввести формулу: СЧЁТ(A1:A20)
ФИШЕР	ФИШЕР(аргумент) . Повертає перетворення Фішера для аргументу x . Це перетворення будує функцію, яка має нормальний, а не асиметричний розподіл. Ця функція використовується для перевірки гіпотез за допомогою коефіцієнта кореляції. Якщо числове значення аргументу $x \leq -1$ або $x \geq 1$, функція ФИШЕР повертає значення помилки #ЧИСЛО! . Рівняння для перетворення Фішера має наступний вигляд (9.14), с. 496.
ФИШЕРОБР	ФИШЕРОБР(аргумент) . Повертає зворотне значення для перетворення Фішера. Це перетворення використовується при аналізі кореляції між масивами або інтервалами даних. Якщо y=ФИШЕР(x) , то ФИШЕРОБР(y)=x . Рівняння для зворотного перетворення Фішера виконуване за формулою (9.15), с. 496.

Функція	Синтаксис і призначення
ХИ2.ОБР	ХИ2.ОБР(вероятность;степени_свободы) Повертає значення, зворотне лівобічної ймовірності розподілу хі –квадрат. Функція розподілу хі –квадрат зазвичай використовується для вивчення варіації в процентах будь–якої величини між вибірками — наприклад, частини дня, яку люди проводять біля телевізора (див. табл. В.10, с. 1061; рис. 3.22, с. 162)
ЧИСЛКОМБ	ЧИСЛКОМБ(число;число_выбранных) Повертає кількість комбінацій для заданого числа елементів. Функція використовується для визначення загального числа всіх груп, які можна скласти з елементів даної множини. Число – обов’язковий аргумент. Кількість елементів. Число_выбранных – обов’язковий аргумент. Кількість елементів в кожній комбінації. Числові аргументи усікаються до цілих чисел. Комбінацією є будь–яка множина або підмножина елементів незалежно від їх внутрішнього порядку. Комбінації відрізняються від перестановок , для яких порядок істотний. Число комбінацій визначається за такою формулою $C_n^m = \frac{n!}{m(n-m)!}$
ЧИСЛСТОЛБ	ЧИСЛСТОЛБ(массив). Повертає кількість стовбців у посиланні або масиві
ЧСТРОК	ЧСТРОК(массив). Повертає кількість рядків у посиланні або масиві
ХИ2.ОБР	ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы) Повертає значення, зворотне лівобічної ймовірності розподілу хі –квадрат, див. табл. В.10, с. 1061 та рис. 3.22 а) на с. 162
ХИ2.ОБР.ПХ	ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы) Повертає значення, зворотне правобічної ймовірності розподілу хі –квадрат. Якщо ймовірність ХИ2.РАСП.ПХ(х,...) , то ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность,...)=х . Ця функція дозволяє порівнювати результати спостережень з очікуваними для визначення вірності вихідної гіпотези, див. табл. В.10, с. 1061; рис. 3.22 б) на с. 162
ХИ2.РАСП	ХИ2.РАСП(х;степени_свободы;интегральная) Повертає розподіл хі –квадрат. Функція розподілу хі –квадрат зазвичай використовується для вивчення варіації в процентах будь–якої величини між вибірками — наприклад, частини дня, яку люди проводять біля телевізора. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , функція ХИ2.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу; якщо цей аргумент має значення ложь , повертається функція щільності розподілу (рис. 3.19, с. 161 і 3.20, с. 161)

Функція	Синтаксис і призначення
ХИ2.РАСП.ПХ	ХИ2.РАСП.ПХ(х;степени_свободы) Повертає правобічну ймовірність розподілу χ^2 -квадрат. Розподіл χ^2 пов'язано з критерієм χ^2 . Критерій χ^2 використовується для порівняння передбачуваних і спостережуваних значень. Припустимо, наприклад, що в генетичному експерименті висувається гіпотеза, що наступне покоління рослин буде мати певної забарвленням. Порівнюючи спостережувані результати з передбачуваними, можна визначити, вірна вихідна гіпотеза (рис. 3.21, с. 162)
ЭКСП.РАСП	ЭКСП.РАСП(х,лямбда,интегральная) Повертає експоненціальне розподіл. Функція ЭКСП.РАСП використовується для моделювання тимчасових затримок між подіями, наприклад часу, який буде потрібно на доставку грошового переказу через автоматизовану банківську систему. Зокрема, за допомогою функції ЭКСП.РАСП можна визначити ймовірність того, що цей процес займе не більше 1 хвилини. Інтегральна - обов'язковий аргумент. Логічне значення, що визначає форму експонентної функції, яку слід використовувати. Интегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо аргумент “ интегральная ” має значення истина , функція ЭКСП.РАСП повертає інтегральну функцію розподілу (3.84), с. 167; якщо має значення ложь , повертається функція щільності розподілу (3.82), с. 167; рис. 3.24, с. 168
ЭКСЦЕСС	ЭКСЦЕСС(число1;[число2];...). Повертає ексцес масиву даних

Додаток Б
ГРАНИЧНІ ПОХИБКИ ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ВИМІРІВ

Таблиця Б.1 Граничні похибки способів і засобів вимірювання

Спосіб виміру, інструмент, прилад	Гранична похибка, у % до верхньої (найбільшої) межі вимірів [12]
Сталева 2–метрова стрічка	0.2–0.3
Планіметри лінійні й полярні	0.4–0.7
Інтерферометри	1.0–10.0
Кутоміри оптичні	0.5–2.0
Світлодалечаруни	0.01–0.02
Тахометри відцентрові	0.4–2.5
Тахогенератори	2.5–4.0
Тахоскопи	0.8–1.1
Стробоскопи	0.1–1.0
Ваги:	
торговельні й автомобільні	0.8–1.2
технічні	0.1–0.2
аналітичні	0.0001–0.01
Динамометри тягові:	
пружинні	1.0–3.5
гідравлічні	0.7–2.0
електричні (датчики без підсилювача)	0.2–0.5
Гальма:	
балансирні	0.4–1.0
гідравлічні	1.5–2.5
пневматичні	1.5–4.0
Манометри із трубкою Бурдона	1.0–10.0
Ртутні манометри	1.0–2.5
Фотоелектричні датчики	0.4–2.0
Стандартні секундоміри	0.4–0.7
Термопары (без підсилювача)	0.5–2.5
Фотометри	0.05–2.00
Спектрометри	0.1–5.0
Полярнографи	1.0–5.0
Газоаналізатори з поглинанням	0.5–5.0
Хроматографічні газоаналізатори	0.1–2.0
Диференційні калориметри	0.01–1.00
Стандартні віскозиметри	1.0–4.0
Ртутні технічні термометри	0.3–2.0
Напівпровідникові термометри	0.1–1.0
Твердоміри ударної дії	7.0–15.0
Запис осцилографом при посиленні	1.5–4.5
Магнітний запис при частотній модуляції	2.0–5.0
Пневматичні й масляні калібратори	1.0–10.0

Способи позначення класу точності приладів див. [19].

Таблиця Б.2 Допустимі похибки вимірів [193]

Найменування показника	Відносна похибка вимірювання
Тривалість вимірювання	$\pm 0.2 \text{ с}^{38)}$
Довжина шляху	$\pm 1.0 \%$
Частота обертання	$\pm 1.0 \%$
Тяговий опір сільгоспмашини	$\pm 2.5 \%$
Кількість використаного пального за час вимірювання	$\pm 1.5 \%$
Крутний момент	$\pm 2.5 \%$
Тиск робочої рідини	$\pm 2.0 \%$
Витрати робочої рідини	$\pm 2.0 \%$

Таблиця Б.3 Допуск для мірного посуду [11]
(максимальна допустима абсолютна похибка $\pm 3s$, мл)

Мірний посуд	Об'єм в мм				
	2000	1000	500	250	100
Колби, мірні циліндри	0.5	0.25	0.14	0.08	0.08
	Об'єм в мм				
	100	50	25	10	2
Бюретки, піпетки	0.07	0.05	0.025	0.02	0.006

³⁸⁾ Абсолютна похибка.

Таблиця Б.4 Наближене визначення похибок функції одного змінного [8]

Вид функції $z = z(x)$	Абсолютна похибка Δz	Відносна похибка $\varepsilon = \frac{\Delta z}{z}$
$cx,$ $c = \text{const}$	$c\Delta x$	$\frac{\Delta x}{\bar{x}}$
$x^n,$ $n > 0$	$n \bar{x}^{(n-1)} \Delta x$	$n \frac{\Delta x}{\bar{x}}$
$\frac{x}{1 \pm x}$	$\frac{\Delta x}{(1 \pm \bar{x})^2}$	$\frac{\Delta x}{\bar{a}(1 \pm \bar{x})}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} \cdot \frac{\sqrt[n]{x}}{\bar{x}} \cdot \Delta x$	$\frac{1}{n} \cdot \frac{\Delta x}{\bar{x}}$
$e^{x/c},$ $c = \text{const}$	$e^{\bar{x}/c} \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\frac{\Delta x}{c}$
$A^{x/c},$ $c = \text{const},$ $A = \text{const}$	$A^{\bar{x}/c} \cdot \ln A \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\ln A \cdot \frac{\Delta x}{c}$
$\ln x$	$\frac{\Delta x}{\bar{x}}$	$\frac{\Delta x}{\ln \bar{x} \cdot \bar{x}}$
$\sin\left(\frac{x}{c}\right),$ $c = \text{const}$	$\cos\left(\frac{\bar{x}}{c}\right) \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\text{ctg}\left(\frac{\bar{x}}{c}\right) \cdot \frac{\Delta x}{c}$
$\cos\left(\frac{x}{c}\right),$ $c = \text{const}$	$\sin\left(\frac{\bar{x}}{c}\right) \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\text{tg}\left(\frac{\bar{x}}{c}\right) \cdot \frac{\Delta x}{c}$
$\text{tg}\left(\frac{x}{c}\right),$ $c = \text{const}$	$\frac{1}{\cos^2\left(\frac{\bar{x}}{c}\right)} \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\frac{2}{\sin\left(\frac{2\bar{x}}{c}\right)} \cdot \frac{\Delta x}{c}$
$\text{ctg}\left(\frac{x}{c}\right),$ $c = \text{const}$	$\frac{1}{\sin^2\left(\frac{\bar{x}}{c}\right)} \cdot \frac{\Delta x}{c}$	$\frac{2}{\cos\left(\frac{2\bar{x}}{c}\right)} \cdot \frac{\Delta x}{c}$

Таблиця Б.5 Наближене визначення похибок функції з декількох змінних [8]

Вид функції $f=f(x,y,z,\dots)$	Абсолютна похибка Δz	Відносна похибка $\varepsilon = \frac{\Delta f}{f}$
$Ax \pm By \pm Cz$, $A = \text{const}$, $B = \text{const}$, $C = \text{const}$	$\sqrt{A^2 \Delta x^2 + B^2 \Delta y^2 + C^2 \Delta z^2}$	$\frac{\sqrt{A^2 \Delta x^2 + B^2 \Delta y^2 + C^2 \Delta z^2}}{A\bar{x} \pm B\bar{y} \pm C\bar{z}}$
Ax , $Ax \pm B$, $A = \text{const}$, $B = \text{const}$	$A\Delta x$	$\frac{\Delta x}{\bar{x}}$
xyz	$\sqrt{\bar{y}^2 \bar{z}^2 \Delta x^2 + \bar{x}^2 \bar{z}^2 \Delta y^2 + \bar{x}^2 \bar{y}^2 \Delta z^2}$	$\sqrt{\frac{\Delta x^2}{\bar{x}^2} + \frac{\Delta y^2}{\bar{y}^2} + \frac{\Delta z^2}{\bar{z}^2}}$
$\frac{x}{y}$	$\sqrt{\frac{\Delta x^2}{\bar{y}^2} + \frac{\bar{x}^2 \Delta y^2}{\bar{y}^4}}$	$\sqrt{\frac{\Delta x^2}{\bar{x}^2} + \frac{\Delta y^2}{\bar{y}^2}}$
$x^\alpha y^\beta z^\gamma$, $\alpha = \text{const}$, $\beta = \text{const}$, $\gamma = \text{const}$	$[\alpha^2 \bar{x}^{2(\alpha-1)} \bar{y}^{2\beta} \bar{z}^{2\gamma} \Delta x^2 + \beta^2 \bar{x}^{2\alpha} \bar{y}^{2(\beta-1)} \bar{z}^{2\gamma} \Delta y^2 + \gamma^2 \bar{x}^{2\alpha} \bar{y}^{2\beta} \bar{z}^{2(\gamma-1)} \Delta z^2]^{0.5}$	$\sqrt{\alpha^2 \frac{\Delta x^2}{\bar{x}^2} + \beta^2 \frac{\Delta y^2}{\bar{y}^2} + \gamma^2 \frac{\Delta z^2}{\bar{z}^2}}$
A^x , $A = \text{const}$	$A^x \cdot \ln A \cdot \Delta x$	$A^x \cdot \ln A \cdot \frac{\Delta x}{\bar{x}}$
$\ln x$	$\frac{\Delta x}{\bar{x}}$	$\frac{\Delta x}{\bar{x}^2}$
$\frac{x}{x \pm y}$	$\frac{\sqrt{\bar{y}^2 \Delta x^2 + \bar{x}^2 \Delta y^2}}{(\bar{x} \pm \bar{y})^2}$	$\frac{\sqrt{\bar{y}^2 \Delta x^2 + \bar{x}^2 \Delta y^2}}{\bar{x}(\bar{x} \pm \bar{y})}$
$\frac{x^2}{y} + y$	$\sqrt{\frac{4\bar{x}\Delta x^2}{\bar{y}^2} + \left(1 - \frac{\bar{x}^2}{\bar{y}^2}\right) \Delta y^2}$	$\frac{\sqrt{4\bar{x}^2 \bar{y}^2 \Delta x^2 + (\bar{y}^2 - \bar{x}^2) \Delta y^2}}{\bar{y}(\bar{x}^2 + \bar{y}^2)}$
$xy+z$	$\sqrt{\bar{y}^2 \Delta x^2 + \bar{x}^2 \Delta y^2 + \Delta z^2}$	$\frac{\sqrt{\bar{y}^2 \Delta x^2 + \bar{x}^2 \Delta y^2 + \Delta z^2}}{\bar{x}\bar{y} + \bar{z}}$
$x(y+z)$	$\sqrt{(\bar{y}^2 + \bar{z}^2) \Delta x^2 + \bar{x}^2 (\Delta y^2 + \Delta z^2)}$	$\frac{\sqrt{(\bar{y}^2 + \bar{z}^2) \Delta x^2 + \bar{x}^2 (\Delta y^2 + \Delta z^2)}}{\bar{x}(\bar{y} + \bar{z})}$


Додаток В
ТАБЛИЦІ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ

Таблиця В.1 Значення функції розподілу $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ ³⁹⁾ [78]

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.3989	0.3989	0.3989	0.3988	0.3986	0.3984	0.3982	0.3980	0.3977	0.3973
0.1	0.3970	0.3965	0.3961	0.3956	0.3951	0.3945	0.3939	0.3932	0.3925	0.3918
0.2	0.3910	0.3902	0.3894	0.3885	0.3876	0.3867	0.3857	0.3847	0.3836	0.3825
0.3	0.3814	0.3802	0.3790	0.3778	0.3765	0.3752	0.3739	0.3726	0.3712	0.3697
0.4	0.3683	0.3668	0.3653	0.3637	0.3621	0.3605	0.3589	0.3572	0.3555	0.3538
0.5	0.3521	0.3503	0.3485	0.3467	0.3448	0.3429	0.3410	0.3391	0.3372	0.3352
0.6	0.3332	0.3312	0.3292	0.3271	0.3251	0.3230	0.3209	0.3187	0.3166	0.3144
0.7	0.3123	0.3101	0.3079	0.3056	0.3034	0.3011	0.2989	0.2966	0.2943	0.2920
0.8	0.2897	0.2874	0.2850	0.2827	0.2803	0.2780	0.2756	0.2732	0.2709	0.2685
0.9	0.2661	0.2637	0.2613	0.2589	0.2565	0.2541	0.2516	0.2492	0.2468	0.2444
1.0	0.242	0.2396	0.2371	0.2347	0.2323	0.2299	0.2275	0.2251	0.2227	0.2203
1.1	0.2179	0.2155	0.2131	0.2107	0.2083	0.2059	0.2036	0.2012	0.1989	0.1965
1.2	0.1942	0.1919	0.1895	0.1872	0.1849	0.1826	0.1804	0.1781	0.1758	0.1736
1.3	0.1714	0.1691	0.1669	0.1647	0.1626	0.1604	0.1582	0.1561	0.1539	0.1518
1.4	0.1497	0.1476	0.1456	0.1435	0.1415	0.1394	0.1374	0.1354	0.1334	0.1315
1.5	0.1295	0.1276	0.1257	0.1238	0.1219	0.1200	0.1182	0.1163	0.1145	0.1127
1.6	0.1109	0.1092	0.1074	0.1057	0.1040	0.1023	0.1006	0.0989	0.0973	0.0957
1.7	0.0940	0.0925	0.0909	0.0893	0.0878	0.0863	0.0848	0.0833	0.0818	0.0804
1.8	0.0790	0.0775	0.0761	0.0748	0.0734	0.0721	0.0707	0.0694	0.0681	0.0669
1.9	0.0656	0.0644	0.0632	0.0620	0.0608	0.0596	0.0584	0.0573	0.0562	0.0551
2.0	0.054	0.0529	0.0519	0.0508	0.0498	0.0488	0.0478	0.0468	0.0459	0.0449
2.1	0.0440	0.0431	0.0422	0.0413	0.0404	0.0396	0.0387	0.0379	0.0371	0.0363
2.2	0.0355	0.0347	0.0339	0.0332	0.0325	0.0317	0.0310	0.0303	0.0297	0.0290
2.3	0.0283	0.0277	0.0270	0.0264	0.0258	0.0252	0.0246	0.0241	0.0235	0.0229
2.4	0.0224	0.0219	0.0213	0.0208	0.0203	0.0198	0.0194	0.0189	0.0184	0.0180
2.5	0.0175	0.0171	0.0167	0.0163	0.0158	0.0154	0.0151	0.0147	0.0143	0.0139
2.6	0.0136	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110	0.0107
2.7	0.0104	0.0101	0.0099	0.0096	0.0093	0.0091	0.0088	0.0086	0.0084	0.0081
2.8	0.0079	0.0077	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0067	0.0065	0.0063	0.0061
2.9	0.0060	0.0058	0.0056	0.0055	0.0053	0.0051	0.0050	0.0048	0.0047	0.0046
3.0	0.0044	0.0043	0.0042	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036	0.0035	0.0034
3.1	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026	0.0025	0.0025

³⁹⁾ Представлено значення даних нормованої функції щільності нормального розподілу, розрахованих статистичною функцією **Excel НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значеннями **ЛОЖЬ** (Додаток А) для $x \geq 0$ – крива, рис. 3.7, а) на с. 141, наприклад, **НОРМ.СТ.РАСП(0.93;ложь) = 0.258881**.

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0020	0.0020	0.0019	0.0018	0.0018
3.3	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014	0.0013	0.0013
3.4	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0009
3.5	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0006
3.6	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004
3.7	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
3.8	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.9	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001




НОРМ.СТ.РАСП(0.93;ложь) = 0.258881

Рис. В.1.1. Розрахунок значення функції нормального розподілу $\phi(z)$


Таблиця В.2 Стандартні нормальні ймовірності

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.44404	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	<p>У табл. В.2 указані значення площі під кривою одиничного нормального розподілу, яка знаходиться справа від z, тобто використовуючи статистичною функцією Excel НОРМ.СТ.РАСП з логічними значенням истина (Додаток А) для $x \geq 0$ (крива 1, рис. 3.7 б, с. 141), це одиниця мінус НОРМ.СТ.РАСП. Наприклад, НОРМ.СТ.РАСП(0.93;истина) = 0.823814. За табл. В.2 маємо 1-0.823814=0.176186</p>								
3.3	0.0005									
3.4	0.0003									
3.5	0.00023									
3.6	0.00016									
3.7	0.00011									
3.8	0.00007									
3.9	0.00005									
4.0	0.00003									



$$\text{НОРМ.СТ.РАСП}(0.93; \text{истина}) = 0.823814$$

Рис. В.2.1. Розрахунок значення площі під кривою одиничного нормального розподілу, яка знаходиться зліва від z



$$1 - \text{НОРМ.СТ.РАСП}(0.93; \text{истина}) = 0.176186$$

Рис. В.2.2. Розрахунок значення площі під кривою одиничного нормального розподілу, яка знаходиться справа від z


Таблиця В.3 Значення функції Лапласа $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ [78]

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.00	0.0000	0.50	0.1915	1.00	0.3413	1.50	0.433	2.00	0.4772
0.01	0.0040	0.51	0.1950	1.01	0.3438	1.51	0.435	2.02	0.4783
0.02	0.0080	0.52	0.1985	1.02	0.3461	1.52	0.436	2.04	0.4793
0.03	0.0120	0.53	0.2019	1.03	0.3485	1.53	0.437	2.06	0.4803
0.04	0.0160	0.54	0.2054	1.04	0.3508	1.54	0.438	2.08	0.4812
0.05	0.0199	0.55	0.2088	1.05	0.3531	1.55	0.439	2.10	0.4821
0.06	0.0239	0.56	0.2123	1.06	0.3554	1.56	0.441	2.12	0.483
0.07	0.0279	0.57	0.2157	1.07	0.3577	1.57	0.442	2.14	0.4838
0.08	0.0319	0.58	0.2190	1.08	0.3599	1.58	0.443	2.16	0.4846
0.09	0.0359	0.59	0.2224	1.09	0.3621	1.59	0.444	2.18	0.4854
0.10	0.0398	0.60	0.2257	1.10	0.3643	1.60	0.445	2.20	0.4861
0.11	0.0428	0.61	0.2291	1.11	0.3665	1.61	0.446	2.22	0.4868
0.12	0.0478	0.62	0.2324	1.12	0.3686	1.62	0.447	2.24	0.4875
0.13	0.0517	0.63	0.2357	1.13	0.3708	1.63	0.448	2.26	0.4881
0.14	0.0557	0.64	0.2389	1.14	0.3729	1.64	0.45	2.28	0.4887
0.15	0.0596	0.65	0.2422	1.15	0.3749	1.65	0.451	2.30	0.4893
0.16	0.0636	0.66	0.2454	1.16	0.3770	1.66	0.452	2.32	0.4898
0.17	0.0675	0.67	0.2486	1.17	0.3790	1.67	0.453	2.34	0.4904
0.18	0.0714	0.68	0.2517	1.18	0.3810	1.68	0.454	2.36	0.4909
0.19	0.0753	0.69	0.2549	1.19	0.3830	1.69	0.455	2.38	0.4913
0.20	0.0793	0.70	0.2580	1.20	0.3849	1.70	0.455	2.40	0.4918
0.21	0.0832	0.71	0.2611	1.21	0.3869	1.71	0.456	2.42	0.4922
0.22	0.0871	0.72	0.2642	1.22	0.3883	1.72	0.457	2.44	0.4927
0.23	0.0910	0.73	0.2673	1.23	0.3907	1.73	0.458	2.46	0.4931
0.24	0.0948	0.74	0.2703	1.24	0.3925	1.74	0.459	2.48	0.4934
0.25	0.0987	0.75	0.2734	1.25	0.3944	1.75	0.46	2.50	0.4938
0.26	0.1026	0.76	0.2764	1.26	0.396	1.76	0.461	2.52	0.4941
0.27	0.1064	0.77	0.2794	1.27	0.398	1.77	0.462	2.54	0.4945
0.28	0.1103	0.78	0.2823	1.28	0.4	1.78	0.463	2.56	0.4948
0.29	0.1141	0.79	0.2852	1.29	0.402	1.79	0.463	2.58	0.4951
0.30	0.1179	0.80	0.2881	1.30	0.403	1.80	0.464	2.60	0.4953
0.31	0.1217	0.81	0.2910	1.31	0.405	1.81	0.465	2.62	0.4956
0.32	0.1255	0.82	0.2939	1.32	0.407	1.82	0.466	2.64	0.4959
0.33	0.1293	0.83	0.2967	1.33	0.408	1.83	0.466	2.66	0.4961
0.34	0.1331	0.84	0.2995	1.34	0.41	1.84	0.467	2.68	0.4963
0.35	0.1368	0.85	0.3023	1.35	0.412	1.85	0.468	2.70	0.4965
0.36	0.1406	0.86	0.3051	1.36	0.413	1.86	0.469	2.72	0.4967
0.37	0.1443	0.87	0.3078	1.37	0.415	1.87	0.469	2.74	0.4969
0.38	0.1480	0.88	0.3106	1.38	0.416	1.88	0.47	2.76	0.4971
0.39	0.1517	0.89	0.3133	1.39	0.418	1.89	0.471	2.78	0.4973
0.40	0.1554	0.90	0.3159	1.40	0.419	1.90	0.471	2.80	0.4974

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.41	0.1591	0.91	0.3186	1.41	0.421	1.91	0.472	2.82	0.4976
0.42	0.1628	0.92	0.3212	1.42	0.422	1.92	0.473	2.84	0.4977
0.43	0.1664	0.93	0.3238	1.43	0.424	1.93	0.473	2.86	0.4979
0.44	0.1700	0.94	0.3264	1.44	0.425	1.94	0.474	2.88	0.498
0.45	0.1736	0.95	0.3289	1.45	0.427	1.95	0.474	2.90	0.4981
0.46	0.1772	0.96	0.3315	1.46	0.428	1.96	0.475	2.92	0.4982
0.47	0.1808	0.97	0.3340	1.47	0.429	1.97	0.476	2.94	0.4984
0.48	0.1844	0.98	0.3365	1.48	0.431	1.98	0.476	2.96	0.4985
0.49	0.1879	0.99	0.3389	1.49	0.432	1.99	0.477	2.98	0.4986

В табл. В.3 наведено *зменшені на 0.5* значення даних нормованої інтегральної функції нормального розподілу, розрахованих статистичною функцією **Excel НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значенням **истина** (Додаток А) для $x \geq 0$ (крива 1, рис. 3.7 б, с. 141), наприклад, **НОРМ.СТ.РАСП(0.93;истина)=0.823814**. За табл. В.3 маємо **$\Phi(0.93)=0.823814-0.5 = 0.323814$** .

3.00	0.49865
3.20	0.49931
3.40	0.49966
3.60	0.49984
3.80	0.49993
4.00	0.49997
4.50	0.499997
5.00	0.499997



$$\text{НОРМ.СТ.РАСП}(0.93;\text{истина})-0.5=0.823814-0.5=0.323814$$

Рис. В.3.1. Розрахунок значення даних нормованої інтегральної функції нормального розподілу

Таблиця В.4 Величини, зв'язані з інтегралом імовірності $\Phi(z)$ функції $t = \Phi(\alpha)$, яка є оберненою до $\alpha = \Phi(z)$ [31]

z	$\Phi(z)$	$1 - 2\Phi(z)$	α	$z = z(\alpha)$	$1 - \alpha$
2.5	0.49379	0.01242	0.05	1.960	0.95
2.6	0.49534	0.00932	0.04	2.054	0.96
2.7	0.49653	0.00693	0.03	2.170	0.97
2.8	0.49744	0.00511	0.02	2.326	0.98
2.9	0.49813	0.00373	0.01	2.576	0.99
3.0	0.49865	0.0027	0.009	2.612	0.991
3.1	0.49903	0.00194	0.008	2.652	0.992
3.2	0.49931	0.00137	0.007	2.697	0.993
3.3	0.49952	0.00097	0.006	2.748	0.994
3.4	0.49966	0.00067	0.005	2.807	0.995
3.5	0.499767	0.000465	0.004	2.878	0.996
3.6	0.499841	0.000318	0.003	2.968	0.997
3.7	0.499892	0.000216	0.002	3.090	0.998
3.8	0.499927	0.000145	0.001	3.291	0.999
3.9	0.499952	0.000096	0.0009	3.320	0.9991
4.0	0.499968	0.000063	0.0008	3.353	0.9992
4.1	0.499979	0.000041	0.0007	3.390	0.9993
4.2	0.499987	0.000027	0.0006	3.432	0.9994
4.3	0.499991	0.000017	0.0005	3.481	0.9995
4.4	0.499995	0.000011	0.0004	3.540	0.9996
4.5	0.499997	6.8E-06	0.0003	3.615	0.9997
4.6	0.499998	4.1E-06	0.0002	3.720	0.9998
4.7	0.499999	2.5E-06	0.0001	3.891	0.9999
4.8	0.499999	1.6E-06	1.00E-05	4.417	0.99999
4.9	0.4999995	9E-07	1.00E-06	4.892	0.9999990
5.0	0.4999997	6E-07	1.00E-07	5.327	0.9999999

В табл. В.4 для $\Phi(z)$ наведено *зменшені на 0.5* значення даних нормованої інтегральної функції нормального розподілу, розрахованих статистичною функцією Excel **НОРМ.СТ.РАСП** з логічними значенням **истина** (Додаток А) для $x \geq 0$ (крива 1, рис. 3.7 б, с. 141), наприклад, для 3.4 за табл. В.4 маємо $\Phi(3.4) = 0.49966$. Відповідно **НОРМ.СТ.РАСП(3.4;истина)** = $= 0.999663 - 0.5 = 0.499663$.

Величина для $1 - 2\Phi(z)$ для $z = 3.4$ за табл. В.4 становить **0.00067**, розраховується за виразом **2-2*НОРМ.СТ.РАСП** зі значенням **истина**, наприклад, **2-2*НОРМ.СТ.РАСП(3.4;истина)** = $2 - 2 * 0.999663 = 0.000674$.

Значення $z = z(\alpha)$ за табл. В.4 маємо $z = 1.960$. За статистичною функцією MS Excel **НОРМ.СТ.ОБР(1- $\alpha/2$)** (див. Додаток А) при $\alpha = 0.05/2$ маємо $z = 1.959964$.

Таблиця В.5 Критичні значення t -критерію Стюдента, $t_{\alpha(v)}$

ν	$\alpha^{40)}$														
	<i>0.9</i>	<i>0.8</i>	<i>0.7</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.02</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.002</i>	<i>0.001</i>
	<i>0.45</i>	<i>0.4</i>	<i>0.35</i>	<i>0.3</i>	<i>0.25</i>	<i>0.2</i>	<i>0.15</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.025</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.0025</i>	<i>0.001</i>	<i>0.0005</i>
1	0.1584	0.3249	0.5095	0.7265	1.0000	1.3764	1.9626	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	127.3213	318.3088	636.6192
2	0.1421	0.2887	0.4447	0.6172	0.8165	1.0607	1.3862	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	14.0890	22.3271	31.5991
3	0.1366	0.2767	0.4242	0.5844	0.7649	0.9785	1.2498	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	7.4533	10.2145	12.9240
4	0.1338	0.2707	0.4142	0.5686	0.7407	0.9410	1.1896	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	5.5976	7.1732	8.6103
5	0.1322	0.2672	0.4082	0.5594	0.7267	0.9195	1.1558	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	4.7733	5.8934	6.8688
6	0.1311	0.2648	0.4043	0.5534	0.7176	0.9057	1.1342	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	4.3168	5.2076	5.9588
7	0.1303	0.2632	0.4015	0.5491	0.7111	0.8960	1.1192	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.0293	4.7853	5.4079
8	0.1297	0.2619	0.3995	0.5459	0.7064	0.8889	1.1081	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	3.8325	4.5008	5.0413
9	0.1293	0.2610	0.3979	0.5435	0.7027	0.8834	1.0997	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	3.6897	4.2968	4.7809
10	0.1289	0.2602	0.3966	0.5415	0.6998	0.8791	1.0931	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	3.5814	4.1437	4.5869
11	0.1286	0.2596	0.3956	0.5399	0.6974	0.8755	1.0877	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	3.4966	4.0247	4.4370
12	0.1283	0.2590	0.3947	0.5386	0.6955	0.8726	1.0832	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.4284	3.9296	4.3178
13	0.1281	0.2586	0.3940	0.5375	0.6938	0.8702	1.0795	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.3725	3.8520	4.2208
14	0.1280	0.2582	0.3933	0.5366	0.6924	0.8681	1.0763	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.3257	3.7874	4.1405
15	0.1278	0.2579	0.3928	0.5357	0.6912	0.8662	1.0735	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.2860	3.7328	4.0728

⁴⁰⁾ Верхній рядок — двобічний критерій, нижній — односторонній.


Верхній рядок визначається статистичною функцією Excel **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятность;степени_свободы)**, **вероятность** = α , (α верхнього ряду), наприклад, **СТЮДЕНТ.ОБР.2Х(0.05;10)**= **2.228139**.

Нижній рядок визначається функцією **СТЮДЕНТ.ОБР(вероятность;степени_свободы)**, де **вероятность** = $1-\alpha$ (α нижнього ряду), наприклад, **СТЮДЕНТ.ОБР(1-0,0025;9)**= **2.26216**. Якщо взяти **вероятность** = α (α нижнього ряду) буде мати **СТЮДЕНТ.ОБР(0.0025;9)**= **-2.26216** (отримується значення зі знаком “мінус”), див. Додаток А.


ν	$\alpha^{40)}$														
	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
16	0.1277	0.2576	0.3923	0.5350	0.6901	0.8647	1.0711	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.2520	3.6862	4.0150
17	0.1276	0.2573	0.3919	0.5344	0.6892	0.8633	1.0690	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.2224	3.6458	3.9651
18	0.1274	0.2571	0.3915	0.5338	0.6884	0.8620	1.0672	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.1966	3.6105	3.9216
19	0.1274	0.2569	0.3912	0.5333	0.6876	0.8610	1.0655	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.1737	3.5794	3.8834
20	0.1273	0.2567	0.3909	0.5329	0.6870	0.8600	1.0640	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.1534	3.5518	3.8495
21	0.1272	0.2566	0.3906	0.5325	0.6864	0.8591	1.0627	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.1352	3.5272	3.8193
22	0.1271	0.2564	0.3904	0.5321	0.6858	0.8583	1.0614	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.1188	3.5050	3.7921
23	0.1271	0.2563	0.3902	0.5317	0.6853	0.8575	1.0603	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.1040	3.4850	3.7676
24	0.1270	0.2562	0.3900	0.5314	0.6848	0.8569	1.0593	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.0905	3.4668	3.7454
25	0.1269	0.2561	0.3898	0.5312	0.6844	0.8562	1.0584	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.0782	3.4502	3.7251
26	0.1269	0.2560	0.3896	0.5309	0.6840	0.8557	1.0575	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.0669	3.4350	3.7066
27	0.1268	0.2559	0.3894	0.5306	0.6837	0.8551	1.0567	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.0565	3.4210	3.6896
28	0.1268	0.2558	0.3893	0.5304	0.6834	0.8546	1.0560	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.0469	3.4082	3.6739
29	0.1268	0.2557	0.3892	0.5302	0.6830	0.8542	1.0553	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.0380	3.3962	3.6594
30	0.1267	0.2556	0.3890	0.5300	0.6828	0.8538	1.0547	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.0298	3.3852	3.6460
31	0.1267	0.2555	0.3889	0.5298	0.6825	0.8534	1.0541	1.3095	1.6955	2.0395	2.4528	2.7385	3.0149	3.3653	3.6218
32	0.1267	0.2555	0.3888	0.5297	0.6822	0.8530	1.0535	1.3086	1.6939	2.0369	2.4487	2.7284	3.0020	3.3479	3.6007
33	0.1266	0.2554	0.3887	0.5295	0.6820	0.8526	1.0530	1.3077	1.6924	2.0345	2.4448	2.7195	2.9905	3.3326	3.5821
34	0.1266	0.2553	0.3886	0.5294	0.6818	0.8523	1.0525	1.3070	1.6909	2.0322	2.4411	2.7116	2.9803	3.3190	3.5657
35	0.1266	0.2553	0.3885	0.5292	0.6816	0.8520	1.0520	1.3062	1.6896	2.0301	2.4377	2.7045	2.9712	3.3069	3.5510
36	0.1266	0.2552	0.3884	0.5291	0.6814	0.8517	1.0516	1.3055	1.6883	2.0281	2.4345	2.6981	2.9630	3.2960	3.5377
37	0.1265	0.2552	0.3883	0.5289	0.6812	0.8514	1.0512	1.3049	1.6871	2.0262	2.4314	2.6923	2.9555	3.2861	3.5258
38	0.1265	0.2551	0.3882	0.5288	0.6810	0.8512	1.0508	1.3042	1.6860	2.0244	2.4286	2.6870	2.9488	3.2771	3.5150
39	0.1265	0.2551	0.3882	0.5287	0.6808	0.8509	1.0504	1.3036	1.6849	2.0227	2.4258	2.6822	2.9426	3.2689	3.5051
40	0.1265	0.2550	0.3881	0.5286	0.6807	0.8507	1.0500	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.6778	2.9370	3.2614	3.4960
41	0.1264	0.2550	0.3880	0.5285	0.6805	0.8505	1.0497	1.3025	1.689	2.0195	2.4208	2.6682	2.9247	3.2451	3.4764

ν	$\alpha^{40)}$														
	<i>0.9</i>	<i>0.8</i>	<i>0.7</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.02</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.002</i>	<i>0.001</i>
	<i>0.45</i>	<i>0.4</i>	<i>0.35</i>	<i>0.3</i>	<i>0.25</i>	<i>0.2</i>	<i>0.15</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.025</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.0025</i>	<i>0.001</i>	<i>0.0005</i>
42	0.1264	0.2550	0.3880	0.5284	0.6804	0.8503	1.0494	1.3020	1.6820	2.0181	2.4185	2.6603	2.9146	3.2317	3.4602
43	0.1264	0.2549	0.3879	0.5283	0.6802	0.8501	1.0491	1.3016	1.6811	2.0167	2.4163	2.6536	2.9060	3.2204	3.4466
44	0.1264	0.2549	0.3878	0.5282	0.6801	0.8499	1.0488	1.3011	1.6802	2.0154	2.4141	2.6479	2.8987	3.2108	3.4350
45	0.1264	0.2549	0.3878	0.5281	0.6800	0.8497	1.0485	1.3006	1.6794	2.0141	2.4121	2.6387	2.8870	3.1953	3.4163
46	0.1264	0.2548	0.3877	0.5281	0.6799	0.8495	1.0483	1.3002	1.6787	2.0129	2.4102	2.6316	2.8779	3.1833	3.4019
47	0.1263	0.2548	0.3877	0.5280	0.6797	0.8493	1.0480	1.2998	1.6779	2.0117	2.4083	2.6259	2.8707	3.1737	3.3905
48	0.1263	0.2548	0.3876	0.5279	0.6796	0.8492	1.0478	1.2994	1.6772	2.0106	2.4066	2.6213	2.8648	3.1660	3.3812
49	0.1263	0.2547	0.3876	0.5278	0.6795	0.8490	1.0475	1.2991	1.6766	2.0096	2.4049	2.6174	2.8599	3.1595	3.3735
50	0.1263	0.2547	0.3875	0.5278	0.6794	0.8489	1.0473	1.2987	1.6759	2.0086	2.4033	2.6142	2.8557	3.1541	3.3669
55								1.2971	1.6730	2.0040	2.3961	2.6114	2.8522	3.1495	3.3614
60								1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6090	2.8492	3.1455	3.3566
65								1.2947	1.6686	1.9971	2.3851	2.6069	2.8465	3.1419	3.3524
70								1.2938	1.6669	1.9944	2.3808	2.6051	2.8441	3.1389	3.3487
80								1.2922	1.6641	1.9901	2.3739	2.6034	2.8421	3.1361	3.3454
90								1.2910	1.6620	1.9867	2.3685	2.6020	2.8402	3.1337	3.3425
100								1.2901	1.6602	1.9840	2.3642	2.6006	2.8385	3.1315	3.3398
110								1.2893	1.6588	1.9818	2.3607	2.5956	2.8322	3.1232	3.3299
120								1.2886	1.6577	1.9799	2.3578	2.5923	2.8279	3.1176	3.3233
130								1.2881	1.6567	1.9784	2.3554	2.5899	2.8249	3.1137	3.3185
140								1.2876	1.6558	1.9771	2.3533	2.5882	2.8227	3.1107	3.3150
150								1.2872	1.6551	1.9759	2.3515	2.5868	2.8209	3.1084	3.3123
160								1.2869	1.6544	1.9749	2.3499	2.5857	2.8195	3.1066	3.3101
170								1.2866	1.6539	1.9740	2.3485	2.5848	2.8184	3.1051	3.3083
180								1.2863	1.6534	1.9732	2.3472	2.5840	2.8175	3.1039	3.3068
190								1.2860	1.6529	1.9725	2.3461	63.6567	127.3213	318.3088	636.6192
200								1.2858	1.6525	1.9719	2.3451	9.9248	14.0890	22.3271	31.5991


ν	$\alpha^{40)}$														
	<i>0.9</i>	<i>0.8</i>	<i>0.7</i>	<i>0.6</i>	<i>0.5</i>	<i>0.4</i>	<i>0.3</i>	<i>0.2</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.02</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.002</i>	<i>0.001</i>
	<i>0.45</i>	<i>0.4</i>	<i>0.35</i>	<i>0.3</i>	<i>0.25</i>	<i>0.2</i>	<i>0.15</i>	<i>0.1</i>	<i>0.05</i>	<i>0.025</i>	<i>0.01</i>	<i>0.005</i>	<i>0.0025</i>	<i>0.001</i>	<i>0.0005</i>
250								1.2849	1.6510	1.9695	2.3414	5.8409	7.4533	10.2145	12.9240
300								1.2844	1.6499	1.9679	2.3388	4.6041	5.5976	7.1732	8.6103
350								1.2840	1.6492	1.9668	2.3370	4.0321	4.7733	5.8934	6.8688
400								1.2837	1.6487	1.9659	2.3357	3.7074	4.3168	5.2076	5.9588
450								1.2834	1.6482	1.9652	2.3347	3.4995	4.0293	4.7853	5.4079
500								1.2832	1.6479	1.9647	2.3338	3.3554	3.8325	4.5008	5.0413
550								1.2831	1.6476	1.9643	2.3331	3.2498	3.6897	4.2968	4.7809
600								1.2830	1.6474	1.9639	2.3326	3.1693	3.5814	4.1437	4.5869
1000	0.1257	0.2534	0.3854	0.5246	0.6747	0.8420	1.0370	1.2824	1.6464	1.9623	2.3301				
∞	0.12566	0.25335	0.38532	0.52440	0.67449	0.84162	1.03643	1.28155	1.64485	1.95996	2.326358				



$$\text{СТЮДЕНТ.ОБР.}2\chi(0.05;10)=2.228139$$



$$\text{СТЮДЕНТ.ОБР}(1-0.0025;9)=2.26216$$



$$\text{СТЮДЕНТ.ОБР}(0.0025;9)=-2.26216$$

Рис.В.5.1. Розрахунок значень значення t -критерію Стюдента

Таблиця В.6 Значення гама-функції Ейлера $F(x) = \int_0^x e^{-t} t^{x-1} dt$ [81]


[illegible]

Таблиця В.7 Значення критерію Фішера (F -критерію) для спрямованих альтернатив при рівні значущості $\alpha=0.05$ ⁴¹⁾ [194]

v_2	v_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	245.95	248.0
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.20	2.12
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.18	2.10
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.15	2.07
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.13	2.05
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.11	2.03
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.09	2.01
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.07	1.99
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.06	1.97
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.04	1.96
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.03	1.94
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.01	1.93

v_1 — число ступенів вільності більшої дисперсії (знаменника);
 v_2 — число ступенів вільності меншої дисперсії (чисельника).

⁴¹⁾ Дані в табл. В.7–В.9 визначається статистичною функцією Excel **F.ОБР(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2)**, тут **вероятность=1- α** , наприклад, **F.ОБР(1-0.05;5;10)=3.32583**. Або ж функцією **F.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы1;степени_свободы2)**, де значення **вероятность= α** , тобто **F.ОБР.ПХ(0.05;5;10)=3.32583**, див. Додаток А.



$$F.OБР(1-0.05;5;10)=3.32583$$

$$F.OБР.ПХ(0.05;5;10)=3.32583$$

Рис. В.7.1. Розрахунок значення площі під кривою розподілу
Фішера, яка знаходиться справа від z

Таблиця В.8 Значення критерію Фішера (F -критерію) для спрямованих альтернатив при рівні значущості $\alpha=0.02$

v_2	v_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	1012.5	1249.5	1350.5	1405.8	1440.6	1464.5	1481.8	1495.0	1505.3	1513.7	1539.1	1551.9
2	48.51	49.00	49.17	49.25	49.30	49.33	49.36	49.37	49.39	49.40	49.43	49.45
3	20.62	18.86	18.11	17.69	17.43	17.25	17.11	17.01	16.93	16.86	16.66	16.55
4	14.04	12.14	11.34	10.90	10.62	10.42	10.27	10.16	10.07	10.00	9.78	9.67
5	11.32	9.45	8.67	8.23	7.95	7.76	7.61	7.50	7.42	7.34	7.12	7.01
6	9.88	8.05	7.29	6.86	6.58	6.39	6.25	6.14	6.05	5.98	5.76	5.65
7	8.99	7.20	6.45	6.03	5.76	5.58	5.44	5.33	5.24	5.17	4.95	4.84
8	8.39	6.64	5.90	5.49	5.22	5.04	4.90	4.79	4.70	4.63	4.42	4.30
9	7.96	6.23	5.51	5.10	4.84	4.65	4.52	4.41	4.33	4.26	4.04	3.92
10	7.64	5.93	5.22	4.82	4.55	4.37	4.23	4.13	4.04	3.97	3.76	3.64
11	7.39	5.70	4.99	4.59	4.34	4.15	4.02	3.91	3.83	3.76	3.54	3.43
12	7.19	5.52	4.81	4.42	4.16	3.98	3.85	3.74	3.66	3.59	3.37	3.25
13	7.02	5.37	4.67	4.28	4.02	3.84	3.71	3.60	3.52	3.45	3.23	3.11
14	6.89	5.24	4.55	4.16	3.90	3.72	3.59	3.48	3.40	3.33	3.11	3.00
15	6.77	5.14	4.45	4.06	3.81	3.63	3.49	3.39	3.30	3.23	3.02	2.90
16	6.67	5.05	4.36	3.97	3.72	3.54	3.41	3.30	3.22	3.15	2.93	2.82
17	6.59	4.97	4.29	3.90	3.65	3.47	3.34	3.23	3.15	3.08	2.86	2.74
18	6.51	4.90	4.22	3.84	3.59	3.41	3.27	3.17	3.09	3.02	2.80	2.68
19	6.45	4.84	4.16	3.78	3.53	3.35	3.22	3.12	3.03	2.96	2.74	2.63
20	6.39	4.79	4.11	3.73	3.48	3.30	3.17	3.07	2.98	2.91	2.70	2.58
21	6.34	4.74	4.07	3.69	3.44	3.26	3.13	3.02	2.94	2.87	2.65	2.53
22	6.29	4.70	4.03	3.65	3.40	3.22	3.09	2.99	2.90	2.83	2.61	2.49
23	6.25	4.66	3.99	3.61	3.36	3.19	3.05	2.95	2.87	2.80	2.58	2.46
24	6.21	4.63	3.96	3.58	3.33	3.15	3.02	2.92	2.83	2.77	2.55	2.43
25	6.18	4.59	3.93	3.55	3.30	3.13	2.99	2.89	2.81	2.74	2.52	2.40
26	6.14	4.56	3.90	3.52	3.28	3.10	2.97	2.86	2.78	2.71	2.49	2.37
27	6.11	4.54	3.87	3.50	3.25	3.07	2.94	2.84	2.76	2.69	2.46	2.34
28	6.09	4.51	3.85	3.47	3.23	3.05	2.92	2.82	2.73	2.66	2.44	2.32
29	6.06	4.49	3.83	3.45	3.21	3.03	2.90	2.80	2.71	2.64	2.42	2.30
30	6.04	4.47	3.81	3.43	3.19	3.01	2.88	2.78	2.69	2.62	2.40	2.28

Таблиця В.9 Значення критерію Фішера (F -критерію) для спрямованих альтернатив при рівні значущості $\alpha=0.01$


v_2	v_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20
1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8	6157.3	6208.7
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.43	99.45
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	26.87	26.69
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.20	14.02
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.72	9.55
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.56	7.40
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.31	6.16
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.52	5.36
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	4.96	4.81
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.56	4.41
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.25	4.10
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.01	3.86
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.82	3.66
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.66	3.51
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.52	3.37
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.41	3.26
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.31	3.16
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.23	3.08
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.15	3.00
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.09	2.94
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.03	2.88
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	2.98	2.83
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	2.93	2.78
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	2.89	2.74
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.85	2.70
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.81	2.66
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.78	2.63
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.75	2.60
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.73	2.57
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.70	2.55

Таблиця В.10 Критичні значення критерію χ^2 для різної довірчої ймовірності α і ступеня вільності ν ⁴²⁾ [195]

ν	α							
	0.500	0.250	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
1	0.455	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.83
2	1.386	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.60	13.82
3	2.366	4.108	6.251	7.815	9.348	11.34	12.84	16.27
4	3.357	5.385	7.779	9.488	11.14	13.28	14.86	18.47
5	4.351	6.626	9.236	11.07	12.83	15.09	16.75	20.52
6	5.348	7.841	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55	22.46
7	6.346	9.037	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28	24.32
8	7.344	10.22	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96	26.12
9	8.343	11.39	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59	27.88
10	9.342	12.55	15.99	18.31	20.48	22.81	25.19	29.59
11	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76	31.26
12	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30	32.91
13	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.79	29.82	34.53
14	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32	36.14
15	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80	37.70
16	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27	39.25
17	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72	40.79
18	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16	42.31
19	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58	43.82
20	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00	45.32
21	20.34	24.93	29.62	33.67	35.48	38.93	41.40	46.80
22	21.34	26.04	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80	48.27
23	22.34	27.14	32.01	35.18	38.08	41.64	44.18	49.73
24	23.34	28.24	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56	51.18
25	24.34	29.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93	52.62
26	25.34	30.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29	54.05
27	26.34	31.51	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64	55.48
28	27.34	32.62	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99	56.89
29	28.34	33.71	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34	58.30
30	29.34	34.80	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67	59.70
40	39.34	45.62	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77	73.40
50	49.33	56.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49	86.66
60	59.33	66.98	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95	99.61
70	69.33	77.58	85.53	90.53	95.02	100.40	104.20	112.30

⁴²⁾ Дані в табл. В.10 визначається статистичною функцією Excel **ХИ2.ОБР(вероятность;степени_свободы)**, **вероятность=1- α** , наприклад, **ХИ2.ОБР(1-0.05;5)=11.0705**. Або ж функцією **ХИ2.ОБР.ПХ(вероятность;степени_свободы)**, де значення **вероятность= α** , тобто **ХИ2.ОБР.ПХ(0.05;5)=11.0705**, див. Додаток А.

ν	α							
	0.500	0.250	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
80	79.33	88.13	96.58	101.90	106.60	112.30	116.30	124.80
90	89.33	98.65	107.60	113.10	118.10	124.10	128.30	137.20
100	99.33	109.10	118.50	124.30	129.60	135.80	140.20	149.40



$$\chi^2_{0.05}(5) = 11.0705$$

$$\chi^2_{0.05}(5) = 11.0705$$

Рис. В.10.1. Розрахунок значення площі під кривою розподілу χ^2 , яка знаходиться справа від z

Таблиця В.11 Значення $P(x)$ для розподілу Вейбулла–Гніденка (для

$$\text{імовірності без відмов})^{43)} P(x) = 1 - F_{k,\lambda}(x) = e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} \quad [81]$$


x/λ	Постійна величина k											
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
0.1	0.4519	0.5321	0.6058	0.6716	0.7289	0.7779	0.8191	0.8534	0.8817	0.9048	0.9236	0.9389
0.2	0.4268	0.4844	0.5395	0.5914	0.6394	0.6834	0.7232	0.7589	0.7906	0.8187	0.8434	0.8651
0.3	0.4121	0.4557	0.4982	0.5391	0.5783	0.6153	0.6502	0.6827	0.7129	0.7408	0.7665	0.7899
0.4	0.4015	0.4349	0.4673	0.5000	0.5313	0.5615	0.5906	0.6185	0.6451	0.6703	0.6942	0.7168
0.5	0.3934	0.4187	0.4439	0.4687	0.4931	0.5170	0.5403	0.5631	0.5852	0.6065	0.6272	0.6471
0.6	0.3867	0.4054	0.4240	0.4426	0.4609	0.4790	0.4969	0.5145	0.5318	0.5488	0.5655	0.5817
0.7	0.3810	0.3941	0.4072	0.4202	0.4332	0.4460	0.4588	0.4715	0.4841	0.4966	0.5089	0.5211
0.8	0.3761	0.3843	0.3925	0.4007	0.4088	0.4170	0.4251	0.4332	0.4413	0.4493	0.4573	0.4653
0.9	0.3718	0.3756	0.3795	0.3834	0.3873	0.3911	0.3950	0.3989	0.4027	0.4066	0.4104	0.4143
1.0	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679
1.1	0.3644	0.3609	0.3574	0.3539	0.3504	0.3469	0.3434	0.3399	0.3364	0.3329	0.3294	0.3259
1.2	0.3612	0.3545	0.3478	0.3411	0.3344	0.3277	0.3211	0.3144	0.3078	0.3012	0.2946	0.2881
1.3	0.3582	0.3486	0.3390	0.3293	0.3198	0.3102	0.3007	0.2913	0.2819	0.2725	0.2633	0.2541
1.4	0.3555	0.3431	0.3308	0.3185	0.3063	0.2941	0.2821	0.2701	0.2583	0.2466	0.2351	0.2237
1.5	0.3530	0.3381	0.3232	0.3085	0.2938	0.2793	0.2650	0.2508	0.2368	0.2231	0.2097	0.1966
1.6	0.3506	0.3334	0.3162	0.2991	0.2823	0.2656	0.2492	0.2331	0.2173	0.2019	0.1869	0.1724
1.7	0.3484	0.3289	0.3096	0.2904	0.2715	0.2529	0.2346	0.2168	0.1995	0.1827	0.1665	0.1510
1.8	0.3463	0.3247	0.3034	0.2822	0.2614	0.2410	0.2211	0.2018	0.1832	0.1653	0.1482	0.1321
1.9	0.3443	0.3208	0.2975	0.2745	0.2520	0.2300	0.2086	0.1880	0.1683	0.1496	0.1319	0.1153
2.0	0.2424	0.3170	0.2920	0.2673	0.2673	0.2431	0.2197	0.1970	0.1753	0.1547	0.1172	0.1005

x/λ	Постійна величина k											
	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
0.1	0.9511	0.9610	0.9689	0.9752	0.9802	0.9843	0.9875	0.9900	0.9968	0.9990	0.9997	0.9999
0.2	0.8839	0.9003	0.9144	0.9267	0.9372	0.9463	0.9541	0.9608	0.9823	0.9920	0.9964	0.9984
0.3	0.8114	0.8308	0.8485	0.8644	0.8788	0.8918	0.9000	0.9139	0.9519	0.9734	0.9853	0.9919
0.4	0.7380	0.7579	0.7765	0.7939	0.8101	0.8252	0.8392	0.8521	0.9038	0.9380	0.9603	0.9747
0.5	0.6662	0.6846	0.7022	0.7190	0.7351	0.7504	0.7650	0.7788	0.8380	0.8825	0.9154	0.9394
0.6	0.5976	0.6132	0.6283	0.6430	0.6573	0.6712	0.6846	0.6977	0.7566	0.8057	0.8459	0.8784
0.7	0.5331	0.5450	0.5567	0.5683	0.5796	0.5908	0.6018	0.6126	0.6637	0.7096	0.7505	0.7865
0.8	0.4732	0.4811	0.4889	0.4967	0.5044	0.5121	0.5197	0.5273	0.5642	0.5993	0.6326	0.6639
0.9	0.4181	0.4220	0.4258	0.4296	0.4334	0.4373	0.4411	0.4449	0.4637	0.4824	0.5008	0.5189
1.0	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679	0.3679
1.1	0.3224	0.3189	0.3155	0.3120	0.3085	0.3051	0.3016	0.2982	0.2811	0.2642	0.2476	0.2313
1.2	0.2815	0.2751	0.2686	0.2622	0.2558	0.2495	0.2432	0.2369	0.2065	0.1776	0.1500	0.1257

⁴³⁾ Дані в табл. В.11 визначається як $P=1-p$, де p знаходиться за статистичною функцією Excel **ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х;альфа;бета;ИСТИНА)**, тут **альфа** — k ; **бета** — λ .


Наприклад, **1-ВЕЙБУЛЛ.РАСП(1;3;2;ИСТИНА)**=0.882497. За табл. В.11 для $x/\lambda=1/2=0,5$ маємо **0.8825**.

x/λ	Постійна величина k											
	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
1.3	0.2450	0.2360	0.2271	0.2184	0.2097	0.2012	0.1928	0.1845	0.1456	0.1111	0.0817	0.0575
1.4	0.2125	0.2016	0.1908	0.1803	0.1700	0.1600	0.1503	0.1409	0.0984	0.0643	0.0389	0.0215
1.5	0.1838	0.1713	0.1593	0.1476	0.1364	0.1256	0.1153	0.1054	0.0636	0.0342	0.0160	0.0063
1.6	0.1585	0.1450	0.1321	0.1199	0.1082	0.0973	0.0869	0.0773	0.0392	0.0166	0.0056	0.0014
1.7	0.1362	0.1222	0.1090	0.0966	0.0850	0.0743	0.0645	0.0556	0.0231	0.0074	0.0017	0.0002
1.8	0.1168	0.1026	0.0894	0.0772	0.0661	0.0561	0.0471	0.0392	0.0129	0.0029	0.0004	-
1.9	0.0999	0.0858	0.0729	0.0613	0.0509	0.0418	0.0339	0.0271	0.0069	0.0010	-	-
2.0	0.0852	0.0714	0.0591	0.0482	0.0388	0.0307	0.0239	0.0183	0.0035	0.0003	-	-



1-ВЕЙБУЛЛ.РАСП(1;3;2;ИСТИНА)=0.8825

а)



1-ВЕЙБУЛЛ.РАСП(100;3;200;ИСТИНА)=0.8825

б)

Рис. В.11.1. Розрахунок значення площі під кривою розподілу Вейбулла, яка знаходиться справа від x

$a - x = 1, \lambda = 2$; $b - x = 100, \lambda = 200$.

Таблиця В.12 Значення функції $T_f(x)$ розподілу Вейбулла–Гніденка

$$\text{(для щільності розподілу)} \quad {}^{44)} T_{\lambda}(x) = k \left(\frac{x}{\lambda} \right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda} \right)^k} \quad [81]$$

x/λ	Постійна величина k											
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0
0.1	0.6714	1.0695	1.1724	1.0821	0.9048	0.7109	0.5356	0.3919	0.2808	0.1980	0.0300	0.0040
0.2	0.3511	0.6213	0.7805	0.8376	0.8187	0.7524	0.6621	0.5645	0.4700	0.3843	0.1190	0.0319
0.3	0.2388	0.4441	0.5976	0.6949	0.7408	0.7451	0.7186	0.6716	0.6127	0.5484	0.2628	0.1071
0.4	0.1811	0.3466	0.4861	0.5943	0.6703	0.7161	0.7354	0.7330	0.7136	0.6817	0.4502	0.2495
0.5	0.1458	0.2841	0.4093	0.5174	0.6065	0.6760	0.7264	0.7590	0.7758	0.7788	0.6619	0.4697
0.6	0.1220	0.2405	0.3526	0.4559	0.5488	0.6303	0.6998	0.7572	0.8028	0.8372	0.8702	0.7590
0.7	0.1048	0.2082	0.3087	0.4051	0.4966	0.5823	0.6616	0.7341	0.7995	0.8577	0.0432	1.0791
0.8	0.0919	0.1832	0.2736	0.3624	0.4493	0.5340	0.6160	0.6951	0.7711	0.8437	0.1506	1.3597
0.9	0.0817	0.1634	0.2448	0.3259	0.4066	0.4868	0.5664	0.6453	0.7234	0.8007	0.1722	1.5130
1.0	0.0736	0.1472	0.2207	0.2943	0.3679	0.4415	0.5150	0.5886	0.6622	0.7358	0.1036	1.4715
1.1	0.0669	0.1337	0.2003	0.2668	0.3329	0.3986	0.4639	0.5286	0.5927	0.6560	0.9591	1.2314
1.2	0.0613	0.1223	0.1828	0.2425	0.3012	0.3585	0.4142	0.4680	0.5195	0.5686	0.7674	0.8691
1.3	0.0565	0.1125	0.1676	0.2211	0.2725	0.3213	0.3670	0.4089	0.4467	0.4798	0.5635	0.5052
1.4	0.0524	0.1041	0.1543	0.2020	0.2466	0.2871	0.3228	0.3530	0.3770	0.3944	0.3782	0.2355
1.5	0.0489	0.0967	0.1425	0.1850	0.2231	0.2558	0.2821	0.3012	0.3127	0.3162	0.2310	0.0855
1.6	0.0458	0.0903	0.1320	0.1697	0.2019	0.2273	0.2450	0.2543	0.2550	0.2474	0.1278	0.0233
1.7	0.0430	0.0845	0.1227	0.1560	0.1827	0.2015	0.2116	0.2125	0.2046	0.1890	0.0637	0.0046
1.8	0.0406	0.0793	0.1143	0.1436	0.1653	0.1782	0.1817	0.1758	0.1616	0.1410	0.0285	-
1.9	0.0384	0.0747	0.1067	0.1323	0.1496	0.1573	0.1552	0.1441	0.1257	0.1028	0.0114	-
2.0	0.0364	0.0705	0.0999	0.1221	0.1353	0.1386	0.1320	0.1170	0.0963	0.0733	0.0040	-
2.1	0.0346	0.0667	0.0936	0.1128	0.1225	0.1218	0.1117	0.0942	0.0728	0.0511	0.0013	-
2.2	0.0330	0.0633	0.0879	0.1044	0.1108	0.1069	0.0941	0.0752	0.0542	0.0348	-	-
2.3	0.0315	0.0601	0.0827	0.0966	0.1003	0.0937	0.0789	0.0595	0.0398	0.0232	-	-
2.4	0.0302	0.0572	0.0779	0.0896	0.0907	0.0819	0.0659	0.0467	0.0288	0.0151	-	-
2.5	0.0289	0.0545	0.0735	0.0831	0.0821	0.0716	0.0548	0.0364	0.0206	0.0097	-	-

⁴⁴⁾ Дані в табл. В.12 визначається статистичною функцією Excel **ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х;альфа;бета;ЛОЖЬ)**, де **альфа** — k ; **бета** — λ за виразом **бета*ВЕЙБУЛЛ.РАСП(х,альфа,бета,ЛОЖЬ)**.

Наприклад, маємо **ВЕЙБУЛЛ.РАСП(100;3;200;ЛОЖЬ)=0.003309**, тоді **200·ВЕЙБУЛЛ.РАСП(100;3;200;ЛОЖЬ)=200·0.003309=0.661873**.

Таблиця В.13 Значення функції $T_h(x)$ розподілу Вейбулла–Гніденка

$$\text{(для інтенсивності відмов) } T_h(x) = k \left(\frac{x}{\lambda} \right)^{k-1} \quad [81]$$

x/λ	Постійна величина k											
	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	3.0	4.0
0.1	1.2618	1.5925	1.5071	1.2680	1.000	0.7571	0.5573	0.4019	0.2853	0.2000	0.3000	0.0040
0.2	0.7248	1.0506	1.1421	1.1037	1.000	0.8697	0.7354	0.6092	0.4967	0.4000	0.1200	0.0320
0.3	0.5240	0.8238	0.9712	1.0179	1.000	0.9433	0.8649	0.7770	0.6870	0.6000	0.2700	0.1080
0.4	0.4164	0.6932	0.8657	0.9609	1.000	0.9990	0.9703	0.9233	0.8648	0.8000	0.4800	0.2560
0.5	0.3482	0.6061	0.7917	0.9188	1.000	1.0447	1.0611	1.0556	1.0338	1.0000	0.7500	0.5000
0.6	0.3009	0.5434	0.7361	0.8861	1.000	1.0835	1.1412	1.1776	1.1961	1.2000	1.0801	0.8641
0.7	0.2659	0.4955	0.6922	0.8592	1.000	1.1174	1.2139	1.2917	1.3532	1.4000	1.4701	1.3721
0.8	0.2391	0.4572	0.6561	0.8366	1.000	1.1476	1.2804	1.3994	1.5058	1.6000	1.9199	2.0480
0.9	0.2175	0.4262	0.6259	0.8170	1.000	1.1750	1.3422	1.5021	1.6542	1.8000	2.4299	2.9158
1.0	0.2001	0.4001	0.5999	0.7999	1.000	1.2001	1.3998	1.5999	1.7999	2.0000	2.9997	3.9997
1.1	0.1854	0.3778	0.5774	0.7849	1.000	1.2231	1.4547	1.6942	1.9426	2.2000	3.6302	5.3238
1.2	0.1729	0.3585	0.5578	0.7713	1.000	1.2444	1.5056	1.7849	2.0822	2.4000	4.3209	6.9141
1.3	0.1621	0.3416	0.5403	0.7590	1.000	1.2645	1.5551	1.8723	2.2202	2.8000	5.0720	8.7861
1.4	0.1527	0.3268	0.5247	0.7479	1.000	1.2834	1.6012	1.9578	2.3563	3.0000	5.8818	-
1.5	0.1446	0.3135	0.5102	0.7376	1.000	1.3011	1.6468	2.0407	2.4896	3.2000	6.7544	-
1.6	0.1374	0.3019	0.4970	0.7280	1.000	1.3184	1.6897	2.1209	2.6208	3.4000	7.6988	-
1.7	0.1307	0.2910	0.4852	0.7196	1.000	1.3344	1.7316	2.1998	2.7537	3.8000	8.6081	-
1.8	0.1250	0.2810	0.4743	0.7116	1.000	1.3490	1.7710	2.2772	2.8806	4.0000	9.8276	-
1.9	0.1197	0.2721	0.4639	0.7037	1.000	1.3643	1.8089	2.3507	3.0072	4.2000	-	-
2.0	0.1148	0.2637	0.4547	0.6965	1.000	1.3791	1.8487	2.4274	3.1368	4.4000	-	-

Таблиця В.14 Значення функції нецентрального розподілу Релея

$$F_R(r,d)=W(r/\sigma,d/\sigma) [90]$$

r	d									
	0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0.0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.1	0.0050	0.0050	0.0049	0.0048	0.0046	0.0044	0.0042	0.0039	0.0036	0.0033
0.2	0.0198	0.0197	0.0194	0.0189	0.0183	0.0175	0.0166	0.0155	0.0144	0.0133
0.3	0.0440	0.0438	0.0431	0.0421	0.0407	0.0389	0.0369	0.0346	0.0322	0.0296
0.4	0.0769	0.0765	0.0754	0.0736	0.0712	0.0681	0.0646	0.0607	0.0565	0.0521
0.5	0.1175	0.1169	0.1152	0.1126	0.1089	0.1044	0.0992	0.0933	0.0870	0.0803
0.6	0.1647	0.1639	0.1617	0.1580	0.1530	0.1469	0.1397	0.1317	0.1229	0.1138
0.7	0.2173	0.2162	0.2134	0.2087	0.2024	0.1945	0.1853	0.1749	0.1637	0.1519
0.8	0.2739	0.2725	0.2691	0.2634	0.2557	0.2462	0.2349	0.2223	0.2086	0.1940
0.9	0.3330	0.3315	0.3275	0.3209	0.3119	0.3007	0.2876	0.2728	0.2566	0.2395
1.0	0.3935	0.3917	0.3872	0.3799	0.3697	0.3571	0.3423	0.3255	0.3071	0.2875
1.1	0.4539	0.4520	0.4471	0.4391	0.4280	0.4142	0.3979	0.3794	0.3591	0.3373
1.2	0.5132	0.5112	0.5060	0.4975	0.4857	0.4709	0.4535	0.4336	0.4118	0.3882
1.3	0.5704	0.5684	0.5630	0.5541	0.5418	0.5264	0.5082	0.4874	0.4643	0.4394
1.4	0.6247	0.6226	0.6171	0.6081	0.5956	0.5799	0.5612	0.5398	0.5160	0.4902
1.5	0.6753	0.6732	0.6678	0.6588	0.6464	0.6307	0.6119	0.5904	0.5663	0.5400
1.6	0.7220	0.7199	0.7146	0.7058	0.6936	0.6782	0.6597	0.6384	0.6144	0.5881
1.7	0.7643	0.7623	0.7572	0.7487	0.7370	0.7222	0.7042	0.6835	0.6600	0.6341
1.8	0.8021	0.8002	0.7954	0.7874	0.7764	0.7623	0.7452	0.7253	0.7027	0.6776
1.9	0.8355	0.8337	0.8293	0.8219	0.8116	0.7984	0.7824	0.7636	0.7422	0.7182
2.0	0.8647	0.8630	0.8590	0.8522	0.8427	0.8306	0.8158	0.7983	0.7783	0.7557
2.1	0.8897	0.8882	0.8846	0.8785	0.8700	0.8589	0.8454	0.8294	0.8109	0.7900
2.2	0.9111	0.9097	0.9065	0.9011	0.8935	0.8836	0.8715	0.8570	0.8402	0.8210
2.3	0.9290	0.9278	0.9250	0.9202	0.9135	0.9048	0.8941	0.8811	0.8660	0.8487
2.4	0.9439	0.9428	0.9404	0.9363	0.9305	0.9229	0.9135	0.9021	0.8887	0.8732
2.5	0.9561	0.9551	0.9530	0.9496	0.9446	0.9381	0.9299	0.9201	0.9083	0.8947
2.6	0.9660	0.9651	0.9634	0.9605	0.9563	0.9507	0.9438	0.9353	0.9252	0.9132
2.7	0.9739	0.9732	0.9717	0.9693	0.9658	0.9612	0.9553	0.9481	0.9394	0.9292
2.8	0.9802	0.9795	0.9784	0.9764	0.9735	0.9696	0.9648	0.9587	0.9514	0.9427
2.9	0.9851	0.9845	0.9836	0.9820	0.9796	0.9765	0.9725	0.9675	0.9614	0.9540
3.0	0.9889	0.9884	0.9877	0.9864	0.9845	0.9819	0.9787	0.9746	0.9696	0.9634
3.1	0.9918	0.9914	0.9908	0.9898	0.9883	0.9863	0.9836	0.9803	0.9762	0.9712
3.2	0.9940	0.9937	0.9932	0.9924	0.9912	0.9896	0.9875	0.9849	0.9816	0.9775
3.3	0.9957	0.9953	0.9950	0.9944	0.9935	0.9922	0.9906	0.9885	0.9859	0.9826
3.4	0.9969	0.9966	0.9963	0.9959	0.9952	0.9942	0.9930	0.9913	0.9892	0.9866
3.5	0.9978	0.9975	0.9973	0.9970	0.9965	0.9957	0.9948	0.9935	0.9919	0.9898
3.6	0.9985	0.9982	0.9981	0.9978	0.9974	0.9969	0.9961	0.9952	0.9939	0.9923
3.7	0.9989	0.9987	0.9986	0.9984	0.9981	0.9977	0.9971	0.9964	0.9955	0.9942
3.8	0.9993	0.9990	0.9990	0.9988	0.9986	0.9983	0.9979	0.9974	0.9966	0.9957
3.9	0.9995	0.9993	0.9992	0.9991	0.9990	0.9988	0.9985	0.9981	0.9975	0.9968
4.0	0.9997	0.9994	0.9994	0.9993	0.9992	0.9991	0.9989	0.9986	0.9982	0.9977

Таблиця В.15 Значення розподілу Пуассона $P_m = \frac{a^m}{m!} e^{-a}$ [81]

[illegible]

Додаток Г
ВЕЛИЧИНА ПОВТОРНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕНІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таблиця Г.1 Значення показника достовірності t [2]

Імовірність результату P	Показник t	Імовірність результату P	Показник t
0.683	1.001	0.970	2.170
0.700	1.036	0.980	2.326
0.750	1.150	0.990	2.576
0.800	1.282	0.995	2.807
0.850	1.440	0.997	2.968
0.900	1.645	0.999	3.291
0.950	1.960	0.9995	3.481
0.955	2.005	0.9999	3.891
0.960	2.054	-	-

Таблиця Г.2 Визначення кількості n у залежності від α і q [31]

Відношення $q = \Delta_{\bar{x}}/s$	Рівень значущості α				
	0.10	0.05	0.02	0.01	0.001
1.0	5	7	9	11	17
0.5	13	18	25	31	50
0.4	19	27	37	46	74
0.3	32	46	64	78	127
0.2	70	99	139	171	277
0.1	273	387	545	668	1089
0.05	1084	1540	2168	2659	4338

Таблиця Г.3 Необхідна кількість дослідів (вимірів) [12]

Похибка $s_{\bar{x}}$ у частках стандарту s	Надійність досліду, H							
	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	0.99	0.999
3.0	1	1	1	1	2	3	4	5
2.0	1	1	1	2	3	4	5	7
1.0	2	2	3	4	5	7	11	17
0.5	3	4	6	9	13	18	31	50
0.4	4	6	8	12	19	27	46	74
0.3	6	9	13	20	32	46	78	127
0.2	13	19	29	43	70	99	171	277
0.1	47	72	169	266	273	387	668	1089
0.05	183	285	431	659	1084	1540	2659	4338
0.01	4543	7090	10732	16436	27161	38416	66358	108307

Таблиця Г.4 Значення коефіцієнта $q = q_{\alpha(v)}$ [31]

Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α			Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α		
	0.05	0.01	0.001		0.05	0.01	0.001
17	0.4	0.639	0.961	55	0.196	0.28	0.398
18	0.385	0.602	0.916	60	0.187	0.266	0.375
19	0.371	0.578	0.875	65	0.179	0.253	0.356
20	0.358	0.556	0.838	70	0.172	0.242	0.339
22	0.336	0.518	0.776	80	0.16	0.224	0.311
24	0.318	0.487	0.724	90	0.15	0.209	0.289
26	0.302	0.46	0.679	100	0.142	0.196	0.271
28	0.288	0.437	0.641	110	0.135	0.186	0.257
30	0.276	0.416	0.609	120	0.129	0.177	0.246
35	0.253	0.375	0.544	150	0.115	0.159	0.22
40	0.234	0.343	0.494	200	0.099	0.135	0.184
45	0.219	0.318	0.455	250	0.089	0.12	0.162
50	0.207	0.297	0.424	300	0.081	0.109	0.146

Таблиця Г.5 Необхідна кількість дослідів (вимірів) [31]

Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α			Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α		
	0.05	0.05	0.05		0.05	0.05	0.05
17	0.400	0.639	0.961	55	0.196	0.280	0.398
18	0.385	0.602	0.916	60	0.187	0.266	0.375
19	0.371	0.578	0.875	65	0.179	0.253	0.356
20	0.358	0.556	0.838	70	0.172	0.242	0.339
22	0.336	0.518	0.776	80	0.160	0.224	0.311
24	0.318	0.487	0.724	90	0.150	0.209	0.289
26	0.302	0.460	0.679	100	0.142	0.196	0.271
28	0.288	0.437	0.641	110	0.135	0.186	0.257
30	0.276	0.416	0.609	120	0.129	0.177	0.246
35	0.253	0.375	0.544	150	0.115	0.159	0.220
40	0.234	0.343	0.494	200	0.099	0.135	0.184
45	0.219	0.318	0.455	250	0.089	0.120	0.162
50	0.207	0.297	0.424	300	0.081	0.109	0.146

Додаток Д
ОЦІНКА СУМНІВНИХ І ВИКЛЮЧЕННЯ ПОМИЛКОВИХ
ЗНАЧЕНЬ

Таблиця Д.1 Критичні значення q для визначення довірчих меж
середньоквадратичного відхилу [48]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α			Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.05	0.01	0.001		0.05	0.01	0.001
5	1.37	2.67	5.64	20	0.37	0.58	0.88
6	1.09	2.01	3.88	25	0.32	0.49	0.73
7	0.92	1.62	2.98	30	0.28	0.43	0.63
8	0.80	1.38	2.42	35	0.26	0.38	0.56
9	0.71	1.20	2.06	40	0.24	0.35	0.50
10	0.65	1.08	1.80	45	0.22	0.32	0.46
11	0.59	0.98	1.60	50	0.21	0.30	0.43
12	0.55	0.90	1.45	60	0.188	0.269	0.38
13	0.52	0.83	1.33	70	0.174	0.245	0.34
14	0.48	0.78	1.23	80	0.161	0.226	0.31
15	0.46	0.73	1.15	90	0.151	0.211	0.29
16	0.44	0.70	1.07	100	0.143	0.198	0.27
17	0.42	0.66	1.01	150	0.115	0.160	0.221
18	0.40	0.63	0.96	200	0.099	0.136	0.185
19	0.39	0.60	0.92	250	0.089	0.120	0.162

Таблиця Д.2 Критичні значення відношення $t_{\alpha(n)}$ для бракування
аномальних значень методом виключення при невідомому
 s [31]

Число прийнятих результатів n	Рівень значущості α				Число прийнятих результатів n	Рівень значущості α			
	0.05	0.02	0.01	0.001		0.05	0.02	0.01	0.001
5	3.04	4.11	5.04	9.43	20	2.145	2.602	2.932	3.979
6	2.78	3.64	4.36	7.41	25	2.105	2.541	2.852	3.819
7	2.62	3.36	3.96	6.37	30	2.079	2.503	2.802	3.719
8	2.51	3.18	3.71	5.73	35	2.061	2.476	2.768	3.652
9	2.43	3.05	3.54	5.31	40	2.048	2.456	2.742	3.602
10	2.37	2.96	3.41	5.01	45	2.038	2.441	2.722	3.565
11	2.33	2.89	3.31	4.79	50	2.03	2.429	2.707	3.532
12	2.29	2.83	3.23	4.62	60	2.018	2.411	2.683	3.492
13	2.26	2.78	3.17	4.48	70	2.009	2.399	2.667	3.462
14	2.24	2.74	3.12	4.37	80	2.003	2.389	2.655	3.439
15	2.22	2.71	3.08	4.28	90	1.998	2.382	2.646	3.423
16	2.2	2.68	3.04	4.2	100	1.994	2.377	2.639	3.409
17	2.18	2.66	3.01	4.13	∞	1.96	2.326	2.576	3.291
18	2.17	2.64	2.98	4.07					

Таблиця Д.3 Критичні значення відношення $r_{\alpha(n)}$ для бракування аномальних значень [104]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α				Обсяг вибірки n	Рівень значущості α			
	0.10	0.05	0.025	0.01		0.10	0.05	0.025	0.01
3	1.406	1.412	1.414	1.414	15	2.326	2.493	2.638	2.800
4	1.645	1.689	1.710	1.723	16	2.354	2.523	2.670	2.837
5	1.791	1.869	1.917	1.955	17	2.380	2.551	2.701	2.871
6	1.894	1.996	2.067	2.130	18	2.404	2.577	2.728	2.903
7	1.974	2.093	2.182	2.265	19	2.426	2.600	2.754	2.932
8	2.041	2.172	2.273	2.374	20	2.447	2.623	2.778	2.959
9	2.097	2.237	2.349	2.464	21	2.467	2.644	2.801	2.984
10	2.146	2.294	2.414	2.540	22	2.486	2.664	2.823	3.008
11	2.190	2.343	2.470	2.606	23	2.504	2.683	2.843	3.030
12	2.229	2.387	2.519	2.663	24	2.520	2.701	2.862	3.051
13	2.264	2.426	2.562	2.714	25	2.537	2.717	2.880	3.071
14	2.297	2.461	2.602	2.759					

Таблиця Д.4 Критичні значення критерію М. В. Смирнова t_α для випадку відомого генерального стандартного відхилу [59]

Обсяг вибірки n	Граничне значення t_α при рівні значущості α		
	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
3	1.50	1.74	2.22
4	1.70	1.94	2.43
5	1.84	2.08	2.57
6	1.94	2.18	2.68
7	2.02	2.27	2.76
8	2.09	2.33	2.83
9	2.15	2.39	2.88
10	2.20	2.44	2.93
11	2.24	2.48	2.97
12	2.28	2.52	3.01
13	2.32	2.56	3.04
14	2.35	2.59	3.07
15	2.38	2.62	3.10
16	2.41	2.64	3.12
17	2.43	2.67	3.15
18	2.46	2.69	3.17
19	2.48	2.71	3.19
20	2.50	2.73	3.21
21	2.52	2.75	3.22
22	2.54	2.77	3.24
23	2.56	2.78	3.26
24	2.57	2.80	3.27
25	2.59	2.82	3.28
30	2.70	2.93	3.40
40	2.70	3.02	3.48
50	2.86	3.08	3.54
100	3.08	3.29	3.72
250	3.34	3.53	3.95
500	3.53	3.70	4.11

Таблиця Д.5 Критичні значення критерію М. В. Смирнова U_α для випадку невідомого генерального стандартного відхилення [59, 102]

Обсяг вибірки n	Граничне значення U_α при рівні значущості α				
	0.100	0.075	0.050	0.025	0.01
3	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
4	1.42	1.44	1.46	1.48	1.49
5	1.60	1.64	1.67	1.72	1.75
6	1.73	1.77	1.82	1.89	1.94
7	1.83	1.88	1.94	2.02	2.10
8	1.91	1.96	2.03	2.13	2.22
9	1.98	2.04	2.11	2.21	2.32
10	2.03	2.10	2.18	2.29	2.41
11	2.09	2.14	2.23	2.36	2.48
12	2.13	2.20	2.29	2.41	2.55
13	2.17	2.24	2.33	2.47	2.61
14	2.21	2.28	2.37	2.50	2.66
15	2.25	2.32	2.41	2.55	2.70
16	2.28	2.35	2.44	2.58	2.75
17	2.31	2.38	2.48	2.62	2.78
18	2.34	2.41	2.50	2.66	2.82
19	2.36	2.44	2.53	2.68	2.85
20	2.38	2.46	2.56	2.71	2.88
21	2.41		2.58		2.91
22	2.43		2.60		2.94
23	2.45		2.62		2.96
24	2.47		2.64		2.99
25	2.49		2.66		3.01

Таблиця Д.6 Критичні значення критерію Шарльє $K_{ш}$ при рівні значущості $\alpha = 0.05$ [102]

Обсяг вибірки n	5	10	20	30	40	50	100
Критичні значення $K_{ш}$	1.3	1.65	1.96	2.13	2.24	2.32	2.58

Таблиця Д.7 Критичні значення критерію Граббса ⁴⁵⁾ [105]

Обсяг вибірки n	Одне найбільше чи одне найменше		Два найбільших чи два найменших	
	$\alpha > 0.01$	$\alpha > 0.05$	$\alpha < 0.01$	$\alpha < 0.05$
3	1.155	1.155	-	-
4	1.496	1.481	0.0000	0.0002
5	1.764	1.715	0.0018	0.0090
6	1.973	1.887	0.0116	0.0349
7	2.139	2.020	0.0308	0.0708
8	2.274	2.126	0.0563	0.1101
9	2.387	2.215	0.0851	0.1492
10	2.482	2.290	0.1150	0.1864
11	2.564	2.355	0.1448	0.2213
12	2.636	2.412	0.1738	0.2537
13	2.699	2.462	0.2016	0.2836
14	2.755	2.507	0.2280	0.3112
15	2.806	2.549	0.2530	0.3367
16	2.852	2.585	0.2767	0.3603
17	2.894	2.620	0.2990	0.3822
18	2.932	2.651	0.3200	0.4025
19	2.968	2.681	0.3398	0.4214
20	3.001	2.709	0.3585	0.4391
21	3.031	2.733	0.3761	0.4556
22	3.060	2.758	0.3927	0.4711
23	3.087	2.781	0.4085	0.4857
24	3.112	2.802	0.4234	0.4994
25	3.135	2.822	0.4376	0.5123
26	3.157	2.841	0.4510	0.5245
27	3.178	2.859	0.4638	0.5360
28	3.199	2.876	0.4759	0.5470
29	3.218	2.893	0.4875	0.5574
30	3.236	2.908	0.4985	0.5672
31	3.253	2.924	0.5091	0.5766
32	3.270	2.938	0.5192	0.5856
33	3.286	2.952	0.5288	0.5941
34	3.301	2.965	0.5381	0.6023
35	3.316	2.979	0.5469	0.6101
36	3.330	2.991	0.5554	0.6175
37	3.343	3.003	0.5636	0.6247
38	3.356	3.014	0.5714	0.6316
39	3.369	3.025	0.5789	0.6382
40	3.381	3.036	0.5862	0.6445

⁴⁵⁾ Grubbs, F.E. and Beck, G. Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observations. Technometrics. 14. 1972. PP 847-854.

Таблиця Д.8 Критичні значення ν_{\max} залежно від обсягу вибірки n і рівня значущості α [8]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α				Число вимірів n	Рівень значущості α		
	0.1	0.05	0.025	0.01		0.1	0.05	0.01
3	1.406	1.412	1.414	1.414	28	2.58	2.76	3.12
4	1.645	1.689	1.710	1.723	29	2.60	2.78	3.14
5	1.731	1.867	1.917	1.955	30	2.61	2.79	3.16
6	1.894	1.996	2.067	2.133	31	2.62	2.80	3.17
7	1.974	2.093	2.128	2.265	32	2.63	2.82	3.18
8	2.041	2.172	2.273	2.374	33	2.65	2.83	3.20
9	2.092	2.237	2.349	2.464	34	2.66	2.84	3.21
10	2.146	2.294	2.414	2.540	35	2.67	2.85	3.22
11	2.190	2.338	2.470	2.606	36	2.68	2.86	3.24
12	2.229	2.387	2.519	2.663	37	2.69	2.87	3.25
13	2.264	2.426	2.562	2.714	38	2.70	2.88	3.26
14	2.297	2.461	2.602	2.759	39	2.71	2.89	3.27
15	2.328	2.493	2.638	2.808	40	2.72	2.90	3.28
16	2.354	2.523	2.670	2.837	41	2.73	2.91	3.29
17	2.380	2.551	2.701	2.871	42	2.74	2.92	3.30
18	2.404	2.587	2.728	2.903	43	2.74	2.93	3.31
19	2.426	2.600	2.754	2.932	44	2.75	2.94	3.32
20	2.447	2.623	2.778	2.959	45	2.76	2.95	3.33
21	2.467	2.644	2.801	2.984	46	2.77	2.96	3.34
22	2.486	2.664	2.823	3.008	47	2.78	2.96	3.35
23	2.504	2.683	2.843	3.030	48	2.78	2.97	3.35
24	2.520	2.701	2.863	3.051	49	2.79	2.98	3.36
25	2.537	2.717	2.880	3.071	50	2.80	2.99	3.37
26	2.55	2.73		3.09	51	2.81	2.99	3.38
27	2.57	2.75		3.11	52	2.81	3.00	3.39

Таблиця Д.9 Критичні значення ν_{\max} залежно від обсягу вибірки n і рівня значущості α [100]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.10	0.05	0.01
3	1.412	1.414	1.414
4	1.689	1.710	1.728
5	1.869	1.917	1.972
6	1.996	2.067	2.161
7	2.093	2.182	2.310
8	2.172	2.273	2.431
9	2.237	2.349	2.5 32
10	2.294	2.414	2.616
12	2.387	2.519	2.753
14	2.461	2.602	2.855
16	2.523	2.670	2.946

Таблиця Д.10 Коефіцієнт β_{α, n_y} для різних значень α і числа вимірювань n для критерію Романовського [102]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α			
	0.05	0.02	0.01	0.005
2	15.56	38.97	77.96	779.70
3	4.97	8.04	11.46	36.50
4	3.56	5.08	6.53	14.46
5	3.06	4.10	5.04	9.43
6	2.73	3.64	4.36	7.41
7	2.62	3.36	3.96	6.37
8	2.51	3.18	3.71	5.73
9	2.43	3.05	3.54	5.31
10	2.37	2.96	3.41	5.01
11	2.33	2.89	3.31	4.79
12	2.29	2.83	3.23	4.62
13	2.26	2.78	3.17	4.48
14	2.24	2.74	3.12	4.37
15	2.22	2.71	3.08	4.28
16	2.20	2.68	3.04	4.20
17	2.18	2.66	3.01	4.13
18	2.17	2.64	3.00	4.07
19	2.16	2.62	2.95	4.02
20	2.14	2.60	2.93	3.98
∞	1.96	2.33	2.58	3.29

Таблиця Д.11 Критичні значення процентних точок критерія
Романовського для β_{α, n_y} для різних значень α [59]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.10	0.05	0.01
4	2.631	3.558	6.530
6	2.117	2.777	4.355
8	2.010	2.508	3.712
10	1.923	2.291	3.408
12	1.869	2.215	3.233
15	1.819	2.145	3.074
20	1.772	2.079	2.932
30	1.727	2.079	2.802
40	1.706	2.048	2.742
50	1.963	2.030	2.707
100	1.660	1.904	2.640

Таблиця Д.12 Критичні значення процентних точок критерія
Романовського для β_{α, n_T} для різних значень α [59]

Для максимального значення вибірки							
Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α			Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α		
	0.01	0.05	0.10		0.01	0.05	0.10
2	118.256	23260	11.634	16	4.115	3.302	2.954
3	16.255	7.170	4.966	17	4.085	3.294	2.953
4	9.026	5.090	3.900	18	4.052	3.284	2.952
5	6.859	4.335	3.488	19	4.021	3.278	2.951
6	5.862	3.969	3.288	20	4.003	3.275	2.954
7	5.335	3.768	3.177	30	3.886	3.261	2.980
8	4.961	3.627	3.102	40	3.849	3.280	3.018
9	4.747	3.535	3.052	50	3.844	3.303	3.052
10	4.568	3.466	3.015	60	3.849	3.325	3.085
11	4.448	3.420	2.996	70	3.855	3.350	3.114
12	4.347	3.387	2.980	80	3.865	3.372	3.142
13	4.262	3.355	2.971	90	3.878	3.391	3.164
14	4.204	3.337	2.962	100	3.883	3.409	3.186
15	4.154	3.316	2.957				
Для мінімального значення вибірки							
Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α			Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α		
	0.01	0.05	0.10		0.01	0.05	0.10
2	116.713	23.435	11.622	19	4.002	3.271	2.952
9	4.741	3.543	3.057	70	3.855	3.349	3.113
14	4.214	3.336	2.962	100	3.881	3.405	3.182

Таблиця Д.13 Рівняння для розрахунку критичного значення β_T для рівня значущості α і обсяг вибірки n без урахування сумнівної значення [59]

Рівень значимості α	β_T
0.01	$(1.386n^{-2}-0.2988n^{-1.5}-1.3218n^{-1}+0.3718n^{-0.5}+0.1597)^{-0.8}$
0.05	$(1.688n^{-2}-0.2988n^{-1.5}-0.737n^{-1}+0.4096n^{-0.5}+0.18422)^{-0.8}$
0.10	$(0.912n^{-2}-0.804n^{-1.5}-0.9357n^{-1}+0.535n^{-0.5}+0.19218)^{-0.8}$

Таблиця Д.14 Критичні значення критерію Ірвіна η_T [108]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α	
	0.05	0.01
2	2.8	3.7
3	2.2	2.9
10	1.5	2.0
20	1.3	1.8
30	1.2	1.7
50	1.1	1.6
100	1.0	1.5
400	0.9	1.3
1000	0.8	1.2

Таблиця Д.15 . Критичні значення критерію Ірвіна η_T , отримані за розрахунковими формулами табл. 5.15 на с. 264

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.10	0.05	0.01
2	2.014	2.518	3.271
3	1.755	2.193	2.882
10	1.232	1.541	2.099
20	1.047	1.309	1.821
30	0.965	1.206	1.698
50	0.883	1.104	1.574
100	0.800	1.000	1.450
400	0.700	0.875	1.300
1000	0.663	0.829	1.245

Таблиця Д.16 Табличні значення критерію Ірвіна для крайніх елементів варіаційного ряду [59]

Обсяг вибірки <i>n</i>	За генеральним СВ			За вибіркоvim СКВ		
	Рівень значущості			Рівень значущості		
	$\alpha=0.1$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.1$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$
2	2.33*	2.77*	3.64*	-	-	-
3	1.79*	2.17*	2.90*	1.62	1.68	1.72
4	1.58	1.92	2.6	1.55	1.70	1.88
5	1.45	1.77	2.43	1.45	1.64	1.93
6	1.37	1.67	2.3	1.38	1.60	1.94
7	1.31	1.6	2.22	1.32	1.55	1.93
8	1.26	1.55	2.14	1.27	1.51	1.92
9	1.22	1.5	2.09	1.23	1.47	1.90
10	1.18	1.46	2.04	1.20	1.44	1.88
11	1.15	1.43	2	1.17	1.42	1.87
12	1.13	1.4	1.97	1.15	1.39	1.85
13	1.11	1.38	1.94	1.13	1.37	1.83
14	1.09	1.36	1.91	1.11	1.35	1.82
15	1.08	1.34	1.89	1.09	1.33	1.80
20	1.03	1.27	1.80	1.03	1.27	1.75
25	0.99	1.23	1.74	0.99	1.22	1.70
30	0.96	1.20	1.70	0.96	1.19	1.66
35	0.93	1.17	1.66	0.94	1.16	1.63
40	0.91	1.15	1.63	0.92	1.14	1.61
45	0.89	1.13	1.61	0.90	1.12	1.59
50	0.88	1.11	1.59	0.89	1.10	1.57
60	0.86	1.08	1.56	0.87	1.08	1.54
70	0.84	1.06	1.53	0.85	1.06	1.52
80	0.83	1.04	1.51	0.83	1.04	1.50
90	0.82	1.03	1.49	0.82	1.03	1.48
100	0.81	1.02	1.47	0.81	1.02	1.46
200	0.75	0.95	1.38	0.75	0.95	1.38
300	0.72	0.91	1.33	0.72	0.91	1.33
500	0.69	0.88	1.28	0.69	0.88	1.28
1000	0.65	0.83	1.22	0.65	0.83	1.22

Примітка: Значення, відмічені жирним шрифтом, розраховані за даними Ірвіна і при необхідності уточнені при статистичному комп'ютерному моделюванні. Решта значення розраховані при статистичному комп'ютерному моделюванні.

Таблиця Д.17 Табличні значення критерію Ірвіна для других значень варіаційного ряду при обліку перших

Обсяг вибірки <i>n</i>	За генеральним СВ			За вибіркоvim СКВ		
	Рівень значущості			Рівень значущості		
	$\alpha=0.1$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.1$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$
3	1.79	2.17	2.90	1.62	1.68	1.72
4	1.29	1.58	2.17	1.28	1.42	1.6
5	1.09	1.35	1.87	1.1	1.27	1.52
6	0.97	1.21	1.69	0.99	1.16	1.45
7	0.9	1.12	1.57	0.91	1.09	1.4
8	0.84	1.06	1.49	0.86	1.04	1.35
9	0.8	1.01	1.43	0.82	0.99	1.31
10	0.77	0.97	1.38	0.78	0.96	1.28
11	0.75	0.94	1.34	0.76	0.93	1.25
12	0.73	0.91	1.3	0.73	0.9	1.23
13	0.71	0.89	1.27	0.71	0.88	1.21
14	0.69	0.87	1.24	0.7	0.86	1.19
15	0.68	0.85	1.22	0.68	0.84	1.17
20	0.63	0.79	1.15	0.62	0.78	1.1
25	0.59	0.75	1.08	0.59	0.74	1.06
30	0.57	0.73	1.05	0.57	0.72	1.03
35	0.55	0.71	1.02	0.55	0.7	1
40	0.54	0.69	1.00	0.54	0.68	0.98
45	0.52	0.67	0.98	0.52	0.66	0.96
50	0.51	0.65	0.96	0.51	0.65	0.94
60	0.50	0.63	0.94	0.5	0.63	0.92
70	0.49	0.62	0.91	0.49	0.61	0.9
80	0.48	0.61	0.89	0.48	0.6	0.88
90	0.47	0.60	0.88	0.47	0.59	0.87
100	0.46	0.59	0.87	0.46	0.58	0.86
200	0.42	0.54	0.80	0.42	0.54	0.79
300	0.40	0.51	0.76	0.4	0.51	0.76
500	0.38	0.48	0.72	0.38	0.48	0.72
1000	0.35	0.45	0.68	0.35	0.45	0.68

Примітка: Значення, відмічені жирним шрифтом, розраховані за даними Ірвіна і при необхідності уточнені при статистичному комп'ютерному моделюванні. Решта значення розраховані при статистичному комп'ютерному моделюванні.

Таблиця Д.18 Відбір промахів за критерієм Шовене

<i>Z</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>M</i>	<i>Z</i>	<i>M</i>
1.00	2	1.40	3	1.80	7	2.20	18	2.60	54
1.02	2	1.42	3	1.82	7	2.22	19	2.62	57
1.04	2	1.44	3	1.84	8	2.24	20	2.64	60
1.06	2	1.46	3	1.86	8	2.26	21	2.66	64
1.08	2	1.48	4	1.88	8	2.28	22	2.68	68
1.10	2	1.50	4	1.90	9	2.30	23	2.70	72
1.12	2	1.52	4	1.92	9	2.32	25	2.72	77
1.14	2	1.54	4	1.94	10	2.34	26	2.74	81
1.16	2	1.56	4	1.96	10	2.36	27	2.76	87
1.18	2	1.58	4	1.98	10	2.38	29	2.78	92
1.20	2	1.60	5	2.00	11	2.40	30	2.80	98
1.22	2	1.62	5	2.02	12	2.42	32	2.82	104
1.24	2	1.64	5	2.04	12	2.44	34	2.84	111
1.26	2	1.66	5	2.06	13	2.46	36	2.86	118
1.28	2	1.68	0	2.08	13	2.48	38	2.88	126
1.30	3	1.70	6	2.10	14	2.50	40	2.90	134
1.32	3	1.72	6	2.12	15	2.52	43	2.92	143
1.34	3	1.74	6	2.14	16	2.54	45	2.94	152
1.36	3	1.76	6	2.16	16	2.56	48	2.96	163
1.38	3	1.78	7	2.18	17	2.58	51	2.98	173

Таблиця Д.19 Значення критерію ω (за М. Ф. Деревиським) [50]

Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α		Число ступенів вільності ν	Рівень значущості α	
	0.05	0.01		0.05	0.01
2	1.41	1.41	19	1.93	2.45
3	1.64	1.72	20	1.93	2.45
4	1.76	1.92	21	1.93	2.46
5	1.81	2.05	22	1.93	2.46
6	1.85	2.14	23	1.94	2.47
7	1.87	2.21	24	1.94	2.47
8	1.88	2.26	25	1.94	2.48
9	1.90	2.29	26	1.94	2.48
10	1.90	2.32	27	1.94	2.49
11	1.91	2.34	28	1.94	2.49
12	1.92	2.35	29	1.94	2.50
13	1.92	2.38	30	1.94	2.50
14	1.92	2.39	35	1.94	2.50
15	1.92	2.41	40	1.94	2.51
16	1.93	2.42	50	1.95	2.53
17	1.93	2.43	60	1.95	2.54
18	1.93	2.44	120	1.96	2.55
			∞	1.96	2.58

Таблиця Д.20 Залежність кратності відношення s_R/HIP_{05} від повторності обліків [177]

Типи найменшої істотної різниці	Повторність обліків					
	2	4	6	10	20	30
Попарне порівняння	6.25	3.20	2.00	1.40	0.94	0.37
Порівняння за середнім значенням	3.05	1.60	1.00	0.70	0.47	0.37

Таблиця Д.21 Критичне значення критерію Діксона
 r_T для виключення промахів [59]

Обсяг вибірки n	Довірчий рівень значущості α				Позначення коефіцієнта Діксона
	0.1	0.05	0.01	0.005	
3	0.886	0.941	0.988	0.994	r_{10}
4	0.679	0.765	0.889	0.926	
5	0.557	0.642	0.780	0.821	
6	0.482	0.560	0.698	0.740	
7	0.434	0.507	0.637	0.680	
8	0.479	0.554	0.683	0.725	r_{11}
9	0.441	0.512	0.635	0.677	
10	0.409	0.477	0.597	0.639	
4	0.935	0.967	0.992	0.996	r_{20}
5	0.782	0.845	0.929	0.950	
6	0.670	0.736	0.836	0.865	
7	0.596	0.661	0.778	0.814	
8	0.545	0.607	0.710	0.746	
9	0.505	0.565	0.667	0.700	
10	0.474	0.531	0.632	0.664	r_{21}
11	0.517	0.576	0.679	0.713	
12	0.490	0.546	0.642	0.675	
13	0.467	0.521	0.615	0.649	r_{22}
14	0.492	0.546	0.641	0.674	
15	0.472	0.525	0.616	0.647	
16	0.454	0.507	0.595	0.624	
17	0.438	0.490	0.577	0.605	
18	0.424	0.475	0.561	0.589	
19	0.412	0.462	0.547	0.575	
20	0.401	0.450	0.537	0.562	
20	0.401	0.450	0.537	0.562	
21	0.391	0.440	0.524	0.551	
22	0.382	0.430	0.514	0.541	
23	0.374	0.421	0.505	0.532	
24	0.367	0.413	0.497	0.524	
25	0.360	0.406	0.489	0.516	
26	0.354	0.399	0.486	0.508	
27	0.348	0.393	0.475	0.501	
28	0.342	0.387	0.469	0.495	
29	0.337	0.381	0.463	0.489	
30	0.332	0.376	0.457	0.483	

Таблиця Д.22 Критичне значення критерію Діксона
 r_T для виключення промахів [72, 106]

Число вимірів <i>n</i>	Рівень значущості					
	$\alpha = 0.05$			$\alpha = 0.01$		
	відношення ⁴⁶⁾					
	випадає одна з варіант	випадають верхня й нижня варіанти	випадають дві верхні або дві нижні	випадає одна з варіант	випадають верхня й нижня варіанти	випадають дві верхні або дві нижні
	$\frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}$	$\frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2}$	$\frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_1}$	$\frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_1}$	$\frac{x_n - x_{n-1}}{x_n - x_2}$	$\frac{x_n - x_{n-2}}{x_n - x_1}$
	$\frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$	$\frac{x_2 - x_1}{x_n - x_2}$	$\frac{x_3 - x_1}{x_n - x_1}$	$\frac{x_2 - x_1}{x_n - x_1}$	$\frac{x_2 - x_1}{x_n - x_2}$	$\frac{x_3 - x_1}{x_n - x_1}$
3	0.941	1.000	1.000	0.988	1.000	1.000
4	0.765	0.955	0.967	0.889	0.991	0.992
5	0.642	0.807	0.845	0.780	0.916	0.929
6	0.500	0.689	0.736	0.698	0.805	0.836
7	0.507	0.610	0.661	0.637	0.740	0.778
8	0.468	0.554	0.607	0.590	0.683	0.710
9	0.437	0.512	0.565	0.555	0.636	0.667
10	0.412	0.477	0.531	0.527	0.597	0.632
11	0.392	0.450	0.504	0.502	0.566	0.603
12	0.376	0.428	0.481	0.482	0.541	0.579
15	0.338	0.381	0.430	0.438	0.486	0.522
20	0.300	0.334	0.372	0.391	0.430	0.464
24	0.281	0.309	0.347	0.367	0.400	0.434
30	0.260	0.283	0.322	0.341	0.369	0.402

⁴⁶⁾ Верхній ряд відношень призначений для оцінки випадання найбільших варіант, нижчий — для найменших.

Таблиця Д.23 Критичне значення критерію
 τ для виключення промахів [122]

Число вимірів n	$\tau_{\alpha,n}$		Число вимірів n	$\tau_{\alpha,n}$	
	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$		$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$
4	0.991	0.955	17	0.460	0.359
5	0.916	0.807	18	0.449	0.349
6	0.805	0.689	19	0.439	0.341
7	0.740	0.610	20	0.430	0.334
8	0.683	0.554	21	0.421	0.327
9	0.635	0.512	22	0.414	0.320
10	0.597	0.477	23	0.407	0.314
11	0.566	0.450	24	0.400	0.309
12	0.541	0.428	25	0.394	0.304
13	0.520	0.410	26	0.389	0.299
14	0.502	0.395	27	0.383	0.295
15	0.486	0.381	28	0.378	0.291
16	0.472	0.369	30	0.369	0.283

Таблиця Д.24 Критичні значення k залежно від обсягу n і рівня значущості
 α при застосування розмаху усіченої вибірки [72, 106]

Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг усіченої вибірки n	Рівень значущості α	
	0.05	0.01		0.05	0.01
2	3.157	15.910	12	0.158	0.241
3	0.885	2.111	13	0.147	0.224
4	0.529	1.023	14	0.138	0.209
5	0.388	0.685	15	0.131	0.197
6	0.312	0.523	16	0.124	0.186
7	0.263	0.429	17	0.118	0.177
8	0.230	0.366	18	0.113	0.168
9	0.205	0.322	19	0.108	0.161
10	0.186	0.288	20	0.104	0.154
11	0.170	0.262			

Таблиця Д.25 Критичні значення k залежно від обсягу при рівні значущості $\alpha = 0.05$ при застосування розмаху повної вибірки [49]

Число вимірів n	Критичне значення k	Число вимірів n	Критичне значення k
5	1.7	12–15	1.2
6	1.6	16–22	1.1
7	1.5	23–35	1.0
8–9	1.4	36–63	0.9
10–11	1.3	64–150	0.8

Таблиця Д.26 Критичні значення Q залежно від обсягу та рівня значущості α [86]

Число вимірів n	$\alpha = 0.1$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.01$
3	0.89	0.94	0.99
4	0.68	0.77	0.89
5	0.56	0.64	0.76
6	0.48	0.56	0.70
7	0.43	0.51	0.64
8	0.48	0.55	0.68
9	0.44	0.51	0.64
10	0.41	0.48	0.60

Додаток Е
ТАБЛИЦІ ЗНАЧЕНЬ СТАТИСТИЧНИХ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ

Таблиця Е.1 Критичні значення коефіцієнта асиметрії As_T [1, 15]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг вибірки n	Рівень значущості α	
	0.05	0.01		0.05	0.01
8	0.99	1.42	400	0.200	0.285
9	0.97	1.41	450	0.188	0.269
10	0.95	1.39	500	0.179	0.255
12	0.91	1.34	550	0.171	0.243
15	0.85	1.26	600	0.163	0.233
20	0.77	1.15	650	0.157	0.224
25	0.711	1.061	700	0.151	0.215
30	0.661	0.982	750	0.146	0.208
35	0.621	0.921	800	0.142	0.202
40	0.587	0.869	850	0.138	0.196
45	0.558	0.825	900	0.134	0.190
50	0.533	0.787	950	0.130	0.185
60	0.492	0.723	1000	0.127	0.180
70	0.459	0.673	1200	0.12	0.16
80	0.432	0.631	1400	0.11	0.15
90	0.409	0.596	1600	0.10	0.14
100	0.389	0.567	1800	0.10	0.13
125	0.350	0.508	2000	0.09	0.13
150	0.321	0.464	2500	0.08	0.11
175	0.298	0.430	3000	0.07	0.10
200	0.280	0.403	3500	0.07	0.10
250	0.251	0.360	4000	0.06	0.09
300	0.230	0.403	4500	0.06	0.08
350	0.213	0.360	5000	0.06	0.08

Таблиця Е.2 Критичні значення коефіцієнта ексцесу Ex_T [15]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α			Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.1	0.05	0.01		0.1	0.05	0.01
11	0.890	0.907	0.936	61	0.835	0.843	0.859
16	0.873	0.888	0.914	71	0.832	0.840	0.855
21	0.863	0.877	0.900	81	0.830	0.838	0.852
26	0.857	0.869	0.890	91	0.828	0.835	0.848
31	0.851	0.863	0.883	101	0.826	0.834	0.846
36	0.847	0.858	0.877	201	0.818	0.823	0.832
41	0.844	0.854	0.872	301	0.814	0.818	0.826
46	0.841	0.851	0.868	401	0.812	0.816	0.822
51	0.839	0.848	0.865	501	0.810	0.814	0.820

Таблиця Е.3 Критичні значення q -критерію Ньюмена–Кейлса
і критерію Тьюкі

$\alpha = 0.05$

Ступінь вільності ν	Інтервал порівняння l / Кількість груп k ⁴⁷⁾								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17.97	26.98	32.82	37.08	40.41	43.12	45.40	47.36	49.07
2	6.085	8.331	9.798	10.88	11.74	12.44	13.03	13.54	13.99
3	4.501	5.910	6.825	7.502	8.037	8.478	8.853	9.177	9.462
4	3.927	5.040	5.757	6.287	6.707	7.053	7.347	7.602	7.826
5	3.635	4.602	5.218	5.673	6.033	6.330	6.582	6.802	6.995
6	3.461	4.339	4.896	5.305	5.628	5.895	6.122	6.319	6.493
7	3.344	4.165	4.681	5.060	5.359	5.606	5.815	5.998	6.158
8	3.261	4.041	4.529	4.886	5.167	5.399	5.597	5.767	5.918
9	3.199	3.949	4.415	4.756	5.024	5.244	5.432	5.595	5.739
10	3.151	3.877	4.327	4.654	4.912	5.124	5.305	5.461	5.599
11	3.113	3.82	4.256	4.574	4.823	5.028	5.202	5.353	5.487
12	3.082	3.773	4.199	4.508	4.751	4.950	5.119	5.265	5.395
13	3.055	3.735	4.151	4.453	4.690	4.885	5.049	5.192	5.318
14	3.033	3.702	4.111	4.407	4.639	4.829	4.990	5.131	5.254
15	3.014	3.674	4.076	4.367	4.595	4.782	4.940	5.077	5.198
16	2.998	3.649	4.046	4.333	4.557	4.741	4.897	5.031	5.15
17	2.984	3.628	4.020	4.303	4.524	4.705	4.858	4.991	5.108
18	2.971	3.609	3.997	4.277	4.495	4.673	4.824	4.956	5.071
19	2.960	3.593	3.977	4.253	4.469	4.645	4.794	4.924	5.038
20	2.950	3.578	3.958	4.232	4.445	4.620	4.768	4.896	5.008
24	2.919	3.532	3.901	4.166	4.373	4.541	4.684	4.807	4.915
30	2.888	3.486	3.845	4.102	4.302	4.464	4.602	4.720	4.824
40	2.858	3.442	3.791	4.039	4.232	4.389	4.521	4.635	4.735
60	2.829	3.399	3.737	3.977	4.163	4.314	4.441	4.550	4.646
120	2.800	3.356	3.685	3.917	4.096	4.241	4.363	4.468	4.560
∞	2.772	3.314	3.633	3.858	4.030	4.170	4.286	4.387	4.474

⁴⁷⁾ Для q -критерію Ньюмена–Кейлса береться інтервал порівняння l , для критерію Тьюкі — кількість груп k .

$\alpha = 0.01$

Ступінь вільності ν	Інтервал порівняння I / Кількість груп k								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	90.03	135.0	164.3	185.6	202.2	215.8	227.2	237	245.6
2	14.04	19.02	22.29	24.72	26.63	28.2	29.53	30.68	31.69
3	8.261	10.62	12.17	13.33	14.24	15.0	15.64	16.2	16.69
4	6.512	8.12	9.173	9.958	10.58	11.1	11.55	11.93	12.27
5	5.702	6.976	7.804	8.421	8.913	9.321	9.669	9.972	10.24
6	5.243	6.331	7.033	7.556	7.973	8.318	8.613	8.869	9.097
7	4.949	5.919	6.543	7.005	7.373	7.679	7.939	8.166	8.368
8	4.746	5.635	6.204	6.625	6.96	7.237	7.474	7.681	7.863
9	4.596	5.428	5.957	6.348	6.658	6.915	7.134	7.325	7.495
10	4.482	5.27	5.769	6.136	6.428	6.669	6.875	7.055	7.213
11	4.392	5.146	5.621	5.97	6.247	6.476	6.672	6.842	6.992
12	4.32	5.046	5.502	5.836	6.101	6.321	6.507	6.67	6.814
13	4.26	4.964	5.404	5.727	5.981	6.192	6.372	6.528	6.667
14	4.21	4.895	5.322	5.634	5.881	6.085	6.258	6.409	6.543
15	4.168	4.836	5.252	5.556	5.796	5.994	6.162	6.309	6.439
16	4.131	4.786	5.192	5.489	5.722	5.915	6.079	6.222	6.349
17	4.099	4.742	5.14	5.43	5.659	5.847	6.007	6.147	6.27
18	4.071	4.703	5.094	5.379	5.603	5.788	5.944	6.081	6.201
19	4.046	4.67	5.054	5.334	5.554	5.735	5.889	6.022	6.141
20	4.024	4.639	5.018	5.294	5.51	5.688	5.839	5.97	6.087
24	3.956	4.546	4.907	5.168	5.374	5.542	5.685	5.809	5.919
30	3.889	4.455	4.799	5.048	5.242	5.401	5.536	5.653	5.756
40	3.825	4.367	4.696	4.931	5.114	5.265	5.392	5.502	5.559
60	3.762	4.282	4.595	4.818	4.991	5.133	5.253	5.356	5.447
120	3.702	4.2	4.497	4.709	4.872	5.005	5.118	5.214	5.299
∞	3.643	4.12	4.403	4.603	4.757	4.882	4.987	5.078	5.157

Таблиця Е.4 Критичні значення q' -критерію Даннета [45] $\alpha = 0.05$

Ступінь вільності ν	Інтервал порівняння m													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	21
5	2.57	3.03	3.29	3.48	3.62	3.73	3.82	3.90	3.97	4.03	4.09	4.14	4.26	4.42
6	2.45	2.86	3.10	3.26	3.39	3.49	3.57	3.64	3.71	3.76	3.81	3.86	3.97	4.11
7	2.36	2.75	2.97	3.12	3.24	3.33	3.41	3.47	3.53	3.58	3.63	3.67	3.78	3.91
8	2.31	2.67	2.88	3.02	3.13	3.22	3.29	3.35	3.41	3.46	3.50	3.54	3.64	3.76
9	2.26	2.61	2.81	2.95	3.05	3.14	3.20	3.26	3.32	3.36	3.40	3.44	3.53	3.65
10	2.23	2.57	2.76	2.89	2.99	3.07	3.14	3.19	3.24	3.29	3.33	3.36	3.45	3.57
11	2.20	2.53	2.72	2.84	2.94	3.02	3.08	3.14	3.19	3.23	3.27	3.30	3.39	3.50
12	2.18	2.50	2.68	2.81	2.90	2.98	3.04	3.09	3.14	3.18	3.22	3.25	3.34	3.45
13	2.16	2.48	2.65	2.78	2.87	2.94	3.00	3.06	3.10	3.14	3.18	3.21	3.29	3.40
14	2.14	2.46	2.63	2.75	2.84	2.91	2.97	3.02	3.07	3.11	3.14	3.18	3.26	3.36
15	2.13	2.44	2.61	2.73	2.82	2.89	2.95	3.00	3.04	3.08	3.12	3.15	3.23	3.33
16	2.12	2.42	2.59	2.71	2.80	2.87	2.92	2.97	3.02	3.06	3.09	3.12	3.20	3.30
17	2.11	2.41	2.58	2.69	2.78	2.85	2.90	2.95	3.00	3.03	3.07	3.10	3.18	3.27
18	2.10	2.40	2.56	2.68	2.76	2.83	2.89	2.94	2.98	3.01	3.05	3.08	3.16	3.25
19	2.09	2.39	2.55	2.66	2.75	2.81	2.87	2.92	2.96	3.00	3.03	3.06	3.14	3.23
20	2.09	2.38	2.54	2.65	2.73	2.80	2.86	2.90	2.95	2.98	3.02	3.05	3.12	3.22
24	2.06	2.35	2.51	2.61	2.70	2.76	2.81	2.86	2.90	2.94	2.97	3.00	3.07	3.16
30	2.04	2.32	2.47	2.58	2.66	2.72	2.77	2.82	2.86	2.89	2.92	2.95	3.02	3.11
40	2.02	2.29	2.44	2.54	2.62	2.68	2.73	2.77	2.81	2.85	2.87	2.90	2.97	3.06
60	2.00	2.27	2.41	2.51	2.58	2.64	2.69	2.73	2.77	2.80	2.83	2.86	2.92	3.00
120	1.98	2.24	2.38	2.47	2.55	2.60	2.65	2.69	2.73	2.76	2.79	2.81	2.87	2.95
∞	1.96	2.21	2.35	2.44	2.51	2.57	2.61	2.65	2.69	2.72	2.74	2.77	2.83	2.91

$\alpha = 0.01$

Ступінь вільності ν	Інтервал порівняння m													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	I3	16	21
5	4.03	4.63	4.98	5.22	5.41	5.56	5.69	5.80	5.89	5.98	6.05	6.12	6.30	6.52
6	3.71	4.21	4.51	4.71	4.87	5.00	5.10	5.20	5.28	5.35	5.41	5.47	5.62	5.81
7	3.50	3.95	4.21	4.39	4.53	4.64	4.74	4.82	4.89	4.95	5.01	5.06	5.19	5.36
8	3.36	3.77	4.00	4.17	4.29	4.40	4.48	4.56	4.62	4.68	4.73	4.78	4.90	5.05
9	3.25	3.63	3.85	4.01	4.12	4.22	4.30	4.37	4.43	4.48	4.53	4.57	4.68	4.82
10	3.17	3.53	3.74	3.88	3.99	4.08	4.16	4.22	4.28	4.33	4.37	4.42	4.52	4.65
II	3.11	3.45	3.65	3.79	3.89	3.98	4.05	4.11	4.16	4.21	4.25	4.29	4.30	4.52
12	3.05	3.39	3.58	3.71	3.81	3.89	3.96	4.02	4.07	4.12	4.16	4.19	4.29	4.41
I3	3.01	3.33	3.52	3.65	3.74	3.82	3.89	3.94	3.99	4.04	4.08	4.11	4.20	4.32
14	2.98	3.29	3.47	3.59	3.69	3.76	3.83	3.88	3.93	3.97	4.01	4.05	4.13	4.24
15	2.95	3.25	3.43	3.55	3.64	3.71	3.78	3.83	3.88	3.92	3.95	3.99	4.07	4.18
16	2.92	3.22	3.39	3.51	3.60	3.67	3.73	3.78	3.83	3.87	3.91	3.94	4.02	4.13
17	2.90	3.19	3.36	3.47	3.56	3.63	3.69	3.74	3.79	3.83	3.86	3.90	3.98	4.08
18	2.88	3.17	3.33	3.44	3.53	3.60	3.66	3.71	3.75	3.79	3.83	3.86	3.94	4.04
19	2.86	3.15	3.31	3.42	3.50	3.57	3.63	3.68	3.72	3.76	3.79	3.83	3.90	4.00
20	2.85	3.13	3.29	3.40	3.48	3.55	3.60	3.65	3.69	3.73	3.77	3.80	3.87	3.97
24	2.80	3.07	3.22	3.32	3.40	3.47	3.52	3.57	3.61	3.64	3.68	3.70	3.78	3.87
30	2.75	3.01	3.15	3.25	3.33	3.39	3.44	3.49	3.52	3.56	3.59	3.62	3.69	3.78
40	2.70	2.95	3.09	3.19	3.26	3.32	3.37	3.41	3.44	3.48	3.51	3.53	3.60	3.68
60	2.66	2.90	3.03	3.12	3.19	3.25	3.29	3.33	3.37	3.40	3.42	3.45	3.51	3.59
120	2.62	2.85	2.97	3.06	3.12	3.18	3.22	3.26	3.29	3.32	3.35	3.37	3.43	3.51
∞	2.58	2.79	2.92	3.00	3.06	3.11	3.15	3.19	3.22	3.25	3.27	3.29	3.35	2.42

Таблиця Е.5 Критичні значення критерію U Манна–Уїтні
для перевірки неспрямованих альтернатив

$$\alpha = 0.05$$

n_2	n_1													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13
5	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20
6	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27
7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
8	10	13	15	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41
9	12	15	17	20	23	26	28	31	34	37	39	42	45	48
10	14	17	20	23	26	29	33	36	39	42	45	48	52	55
11	16	19	23	26	30	33	37	40	44	47	51	55	58	62
12	18	22	26	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69
13	20	24	28	33	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76
14	22	26	31	36	40	45	50	55	59	64	67	74	78	83
15	24	29	34	39	44	49	54	59	64	70	75	80	85	90
16	26	31	37	42	47	53	59	64	70	75	81	86	92	98
17	28	34	39	45	51	57	63	67	75	81	87	93	99	105
18	30	36	42	48	55	61	67	74	80	86	93	99	106	112
19	32	38	45	52	58	65	72	78	85	92	99	106	113	119
20	34	41	48	55	62	69	76	83	90	98	105	112	119	127

$\alpha = 0.01$

n_2	n_1													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3			0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3
4	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	8
5	1	2	3	4	4	6	7	7	8	9	10	11	12	13
6	3	4	5	6	6	9	10	11	12	13	15	16	17	18
7	4	6	7	9	9	12	13	15	16	18	19	21	22	24
8	6	7	9	11	11	15	17	18	20	22	24	26	28	30
9	7	9	11	13	13	18	20	22	24	27	29	31	33	36
10	9	11	13	16	16	21	24	26	29	31	34	37	39	42
11	10	13	16	18	18	24	27	30	33	36	39	42	45	48
12	12	15	18	21	21	27	31	34	37	41	44	47	51	54
13	13	17	20	24	24	31	34	38	42	45	49	53	56	60
14	15	18	22	26	26	34	38	42	46	50	54	58	63	67
15	16	20	24	29	29	37	42	46	51	55	60	64	69	73
16	18	22	27	31	31	41	45	50	55	60	65	70	74	79
17	19	24	29	34	34	44	49	54	60	65	70	75	81	86
18	21	26	31	37	37	47	53	58	64	70	75	81	87	92
19	22	28	33	39	39	51	56	63	69	74	81	87	93	99
20	24	30	36	42	42	54	60	67	73	79	86	92	99	105

Таблиця Е.6 Критичні значення критерію Манна–Уїтні для спрямованих альтернатив при рівні значущості $\alpha = 0.05$ [123]

Обсяг вибірки n_2	Обсяг вибірки n_1													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8
4	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	13
5	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20
6	6	8	10	11	13	14	16	17	19	21	22	24	25	27
7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
8	10	13	15	17	19	22	24	26	29	31	34	36	38	41
9	12	15	17	20	23	26	28	30	34	37	39	42	45	48
10	14	17	20	23	26	29	33	36	39	42	45	48	52	55
11	16	19	23	26	30	33	37	40	44	48	51	55	58	62
12	18	22	26	29	33	37	41	45	49	53	57	61	65	69
13	20	24	28	33	37	41	45	50	54	59	63	67	72	76
14	22	26	31	36	40	45	50	55	59	64	67	74	78	83
15	24	29	34	39	44	49	54	59	64	70	75	80	85	90
16	26	31	37	42	47	53	59	64	70	75	81	86	92	98
17	28	34	39	45	51	57	63	67	75	81	87	93	99	105
18	30	36	42	48	55	61	67	74	80	86	93	99	106	112
19	32	38	45	52	58	65	72	78	85	92	99	106	113	119
20	34	41	48	55	62	69	76	83	90	98	105	112	119	127

Таблиця Е.7 Критичні значення критерію Манна–Уїтні для спрямованих альтернатив при рівні значущості $\alpha = 0.01$ [123]

Обсяг вибірки n_2	Обсяг вибірки n_1													
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3			0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3
4	0	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	8
5	1	2	3	4	4	6	7	7	8	9	10	11	12	13
6	3	4	5	6	6	9	10	11	12	13	15	16	17	18
7	4	6	7	9	9	12	13	15	16	18	19	21	22	24
8	6	7	9	11	11	15	17	18	20	22	24	26	28	30
9	7	9	11	13	13	18	20	22	24	27	29	31	33	36
10	9	11	13	16	16	21	24	26	29	31	34	37	39	42
11	10	13	16	18	18	24	27	30	33	36	39	42	45	48
12	12	15	18	21	21	27	31	34	37	41	44	47	51	54
13	13	17	20	24	24	31	34	38	42	45	49	53	56	60
14	15	18	22	26	26	34	38	42	46	50	54	58	63	67
15	16	20	24	29	29	37	42	46	51	55	60	64	69	73
16	18	22	27	31	31	41	45	50	55	60	65	70	74	79
17	19	24	29	34	34	44	49	54	60	65	70	75	81	86
18	21	26	31	37	37	47	53	58	64	70	75	81	87	92
19	22	28	33	39	39	51	56	63	69	74	81	87	93	99
20	24	30	36	42	42	54	60	67	73	79	86	92	99	105

Таблиця Е.8 Критичні значення T -критерію Уайта
для рівня значущості $\alpha = 0.05$

Більший обсяг вибірки	Менший обсяг вибірки													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4			11											
5		6	11	17										
6		7	12	18	26									
7		7	13	20	27	36								
8	3	8	14	21	29	38	49							
9	3	8	15	22	31	40	51	63						
10	3	9	15	23	32	42	53	65	78					
11	4	9	16	24	34	44	55	68	81	96				
12	4	10	17	26	35	46	58	71	85	99	115			
13	4	10	18	27	37	48	60	73	88	103	119	137		
14	4	11	19	28	38	50	63	76	91	106	123	141	160	
15	4	11	20	29	40	52	65	79	94	110	127	145	164	185
16	4	12	21	31	42	54	67	82	97	114	131	150	169	
17	5	12	21	32	43	56	70	84	100	117	135	154		
18	5	13	22	33	45	58	72	87	103	121	139			
19	5	13	23	34	46	60	74	90	107	124				
20	5	14	24	35	48	62	77	93	110					
21	6	14	25	37	50	64	79	95						
22	6	15	26	38	51	66	82							
23	6	15	27	39	53	68								
24	6	16	28	40	55									
25	6	16	28	42										
26	7	17	29											
27	7	17												

Таблиця Е.9 Імовірність $P(\lambda_\alpha)$ для різних значень λ
(розподіл О. М. Колмогорова) [2, 118]

λ	$P(\lambda) = 1 - \alpha$	λ	$P(\lambda) = 1 - \alpha$	λ	$P(\lambda) = 1 - \alpha$
0	1.0000	0.70	0.7112	1.50	0.0222
0.10	1.0000	0.75	0.6272	1.60	0.0120
0.20	1.0000	0.80	0.5441	1.70	0.0062
0.30	1.0000	0.85	0.4653	1.80	0.0032
0.35	0.9997	0.90	0.3927	1.90	0.0015
0.40	0.9972	0.95	0.3275	2.00	0.0007
0.45	0.9874	1.00	0.2700	2.10	0.0003
0.50	0.9639	1.10	0.1777	2.20	0.0001
0.55	0.9228	1.20	0.1122	2.30	0.0001
0.60	0.8643	1.30	0.0681	2.40	0.0000
0.65	0.7920	1.40	0.0397	2.50	0.0000

Таблиця Е.10 Критичні значення $\delta_{\alpha,n}$ критерію Колмогорова для різного довірчого рівня значущості α і ступеня вільності ν [194]

Обсяг вибірки n	Перевірка одиничної вибірки ⁴⁸⁾		
	δ_{10}	δ_{05}	δ_{01}
1	0.950	0.975	0.995
2	0.776	0.842	0.929
3	0.642	0.708	0.828
4	0.564	0.624	0.733
5	0.510	0.565	0.669
6	0.470	0.521	0.618
7	0.438	0.486	0.577
8	0.411	0.457	0.543
9	0.388	0.432	0.513
10	0.368	0.410	0.490
11	0.352	0.391	0.468
12	0.338	0.375	0.450
13	0.325	0.361	0.433
14	0.314	0.349	0.418
15	0.304	0.338	0.404
16	0.295	0.328	0.392
17	0.286	0.318	0.381
18	0.278	0.309	0.371
19	0.272	0.301	0.363
20	0.264	0.294	0.356
25	0.240	0.270	0.320
30	0.220	0.240	0.290
35	0.210	0.230	0.270
Більш ніж 35	$\frac{1.22}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.36}{\sqrt{n}}$	$\frac{1.63}{\sqrt{n}}$

Числові коефіцієнти 1.22, 1.36 і 1.63 формул представляють собою значення λ_{α} , розраховані за виразом (6.15) відповідно для α рівних 0.01, 0.05 і 0.10.

⁴⁸⁾ Використовується для оцінки близькості вибірових значень до теоретичного розподілу.

Таблиця Е.11 Критичні значення $\delta_{n;\alpha}$ критерію Колмогорова–Смирнова для різного довірчого рівня значущості α і ступеня вільності ν для перевірка одиничної вибірки [17]

n	$\delta_{.10}$	$\delta_{.05}$	n	$\delta_{.10}$	$\delta_{.05}$	n	$\delta_{.10}$	$\delta_{.05}$
3	0.636	0.708	17	0.286	0.318	31	0.214	0.238
4	0.565	0.624	18	0.278	0.309	32	0.211	0.234
5	0.509	0.563	19	0.271	0.301	33	0.208	0.231
6	0.468	0.519	20	0.265	0.294	34	0.205	0.227
7	0.436	0.483	21	0.259	0.287	35	0.202	0.224
8	0.410	0.454	22	0.253	0.281	36	0.199	0.221
9	0.387	0.430	23	0.247	0.275	37	0.196	0.218
10	0.369	0.409	24	0.242	0.269	38	0.194	0.215
11	0.352	0.391	25	0.238	0.264	39	0.191	0.213
12	0.338	0.375	26	0.233	0.259	40	0.189	0.210
13	0.325	0.361	27	0.229	0.254	50	0.170	0.177
14	0.314	0.349	28	0.225	0.250	100	0.121	0.134
15	0.304	0.338	29	0.221	0.246			
16	0.295	0.327	30	0.218	0.242			

Таблиця Е.12 Критичні значення $\delta_{n;\alpha}$ двовибіркового тесту Колмогорова–Смирнова [194]

Обсяг вибірки n	Рівні значущості			
	спрямована перевірка		неспрямована перевірка	
	$\delta_{.05}$	$\delta_{.01}$	$\delta_{.05}$	$\delta_{.01}$
3	3	—	—	—
4	4	—	4	—
5	4	5	5	5
6	5	6	5	6
7	5	6	6	6
8	5	6	6	7
9	6	7	6	7
10	6	7	7	8
11	6	8	7	8
12	6	8	7	8
13	7	8	7	9
14	7	8	8	9
15	7	9	8	9
20	8	10	9	11
25	9	11	10	12
30	10	12	11	13
35	11	13	12	—
40	11	14	13	—
більше ніж 40			$1.36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$	$1.63 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}}$

Таблиця Е.13 Критичні значення $\delta_{\alpha;n}$ двовибіркового критерію Колмогорова для різного довірчого рівня значущості α і ступеня вільності ν [194] ⁴⁹⁾

Обсяг вибірки n	δ_{05}	δ_{01}	Обсяг вибірки n	δ_{05}	δ_{01}
4	1.000	1.000	14	0.571	0.643
5	1.000	1.000	15	0.533	0.636
6	0.833	1.000	16	0.500	0.625
7	0.857	0.857	17	0.471	0.588
8	0.750	0.875	18	0.500	0.556
9	0.668	0.778	19	0.474	0.526
10	0.700	0.800	20	0.450	0.550
11	0.636	0.727	25	0.400	0.480
12	0.583	0.667	30	0.370	0.430
13	0.538	0.682	35	0.340	0.390
			Більш ніж 35	$1.36 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}}$	$1.63 \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 \cdot n_2}}$

Числові коефіцієнти 1.22, 1.36 і 1.63 формул представляють собою значення λ_{α} , розраховані за виразом (6.15) відповідно для α рівних 0.01, 0.05 і 0.10.

⁴⁹⁾ Використовується для визначення приналежності двох вибірок обсягами n_1 і n_2 до одного і того ж розподілу. При малих обсягах вибірки $n = n_1 = n_2$.

Таблиця Е.14 Значення функції $\psi=R/(n+1)$ Ван-дер-Вердена [15]

$R/(n+1)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.00	$-\infty$	-3.09	-2.88	-2.75	-2.65	-2.58	-2.51	-2.46	-2.41	-2.37
0.01	-2.53	-2.29	-2.26	-2.23	-2.20	-2.17	-2.14	-2.12	-2.10	-2.07
0.02	-2.05	-2.03	-2.01	-2.00	-1.98	-1.96	-1.94	-1.93	-1.91	-1.90
0.03	-1.88	-1.87	-1.85	-1.84	-1.83	-1.81	-1.80	-1.79	-1.77	-1.76
0.04	-1.75	-1.74	-1.73	-1.72	-1.71	-1.70	-1.68	-1.67	-1.66	-1.65
0.05	-1.64	-1.64	-1.63	-1.62	-1.61	-1.60	-1.59	-1.58	-1.57	-1.57
0.06	-1.55	-1.55	-1.54	-1.53	-1.52	-1.51	-1.51	-1.50	-1.49	-1.48
0.07	-1.48	-1.47	-1.46	-1.45	-1.45	-1.44	-1.43	-1.43	-1.42	-1.41
0.08	-1.41	-1.40	-1.39	-1.39	-1.38	-1.37	-1.37	-1.36	-1.35	-1.35
0.09	-1.34	-1.33	-1.33	-1.32	-1.32	-1.31	-1.30	-1.30	-1.29	-1.29
0.10	-1.28	-1.28	-1.27	-1.26	-1.26	-1.25	-1.25	-1.24	-1.24	-1.23
0.11	-1.23	-1.22	-1.22	-1.21	-1.21	-1.20	-1.20	-1.19	-1.19	-1.18
0.12	-1.18	-1.17	-1.17	-1.16	-1.16	-1.15	-1.15	-1.14	-1.14	-1.13
0.13	-1.13	-1.12	-1.12	-1.11	-1.11	-1.10	-1.10	-1.09	-1.09	-1.09
0.14	-1.08	-1.08	-1.07	-1.07	-1.06	-1.06	-1.05	-1.05	-1.05	-1.04
0.15	-1.04	-1.03	-1.03	-1.02	-1.02	-1.02	-1.01	-1.01	-1.01	-1.00
0.16	-0.99	-0.99	-0.99	-0.98	-0.98	-0.97	-0.97	-0.97	-0.96	-0.96
0.17	-0.95	-0.95	-0.95	-0.94	-0.94	-0.93	-0.93	-0.93	-0.92	-0.92
0.18	-0.92	-0.91	-0.91	-0.90	-0.90	-0.90	-0.89	-0.89	-0.89	-0.88
0.19	-0.88	-0.87	-0.87	-0.87	-0.86	-0.86	-0.86	-0.85	-0.85	-0.85
0.20	-0.84	-0.84	-0.83	-0.83	-0.83	-0.82	-0.82	-0.82	-0.81	-0.81
0.21	-0.81	-0.80	-0.80	-0.80	-0.79	-0.79	-0.79	-0.78	-0.78	-0.78
0.22	-0.77	-0.77	-0.76	-0.76	-0.76	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.74
0.23	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.71
0.24	-0.71	-0.70	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68
0.25	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.66	-0.66	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65
0.26	-0.64	-0.64	-0.64	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.62	-0.62	-0.62
0.27	-0.61	-0.61	-0.61	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.59	-0.59	-0.59
0.28	-0.58	-0.58	-0.58	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.56	-0.56	-0.56
0.29	-0.55	-0.55	-0.55	-0.54	-0.54	-0.54	-0.54	-0.53	-0.53	-0.53
0.30	-0.53	-0.52	-0.52	-0.52	-0.51	-0.51	-0.51	-0.50	-0.50	-0.50
0.31	-0.50	-0.49	-0.49	-0.49	-0.48	-0.48	-0.48	-0.47	-0.47	-0.47
0.32	-0.47	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.45	-0.45	-0.45	-0.45	-0.44
0.33	-0.44	-0.44	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.42	-0.42	-0.42
0.34	-0.41	-0.41	-0.41	-0.40	-0.40	-0.40	-0.40	-0.39	-0.39	-0.39
0.35	-0.39	-0.38	-0.38	-0.38	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.36	-0.36
0.36	-0.36	-0.36	-0.35	-0.35	-0.35	-0.35	-0.34	-0.34	-0.34	-0.33
0.37	-0.33	-0.33	-0.33	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.31	-0.31	-0.31
0.38	-0.31	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.29	-0.29	-0.29	-0.28	-0.28
0.39	-0.28	-0.28	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
0.40	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.24	-0.24	-0.23	-0.23
0.41	-0.23	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.20

$R/(n+1)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.42	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18
0.43	-0.18	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15
0.44	-0.15	-0.15	-0.15	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13
0.45	-0.13	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10
0.46	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08
0.47	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05
0.48	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03
0.49	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
0.50	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
0.51	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
0.52	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
0.53	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
0.54	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12
0.55	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15
0.56	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17
0.57	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20
0.58	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.23
0.59	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25
0.60	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28
0.61	0.28	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30
0.62	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33
0.63	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36
0.64	0.36	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38
0.65	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41
0.66	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.43	0.43	0.43	0.44
0.67	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46
0.68	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49
0.69	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52
0.70	0.52	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55
0.71	0.55	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58
0.73	0.61	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.64
0.74	0.64	0.65	0.65	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67
0.75	0.67	0.68	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70
0.76	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73	0.74
0.77	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.76	0.76	0.76	0.77	0.77
0.78	0.77	0.78	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80
0.79	0.81	0.81	0.81	0.82	0.82	0.82	0.83	0.83	0.83	0.84
0.80	0.84	0.85	0.85	0.85	0.86	0.86	0.86	0.87	0.87	0.87
0.81	0.88	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90	0.90	0.90	0.91	0.91
0.82	0.92	0.92	0.92	0.93	0.93	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95
0.83	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.99	0.99
0.84	0.99	1.00	1.00	1.01	1.01	1.02	1.02	1.02	1.03	1.03
0.85	1.04	1.04	1.05	1.05	1.05	1.06	1.06	1.07	1.07	1.08
0.86	1.08	1.09	1.09	1.09	1.10	1.10	1.11	1.11	1.12	1.12
0.87	1.13	1.13	1.14	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	1.17	1.17

$R/(n+1)$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.88	1.18	1.18	1.19	1.19	1.20	1.20	1.21	1.21	1.22	1.22
0.89	1.23	1.23	1.24	1.24	1.25	1.25	1.26	1.26	1.27	1.28
0.90	1.28	1.29	1.29	1.30	1.30	1.31	1.32	1.32	1.33	1.33
0.91	1.34	1.35	1.35	1.36	1.37	1.38	1.37	1.39	1.39	1.40
0.92	1.41	1.41	1.42	1.43	1.43	1.44	1.45	1.45	1.46	1.47
0.93	1.48	1.48	1.49	1.50	1.51	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55
0.94	1.55	1.56	1.57	1.58	1.59	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64
0.95	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.70	1.71	1.72	1.73	1.74
0.96	1.75	1.76	1.77	1.79	1.80	1.81	1.83	1.84	1.85	1.87
0.97	1.88	1.90	1.91	1.93	1.94	1.96	1.98	2.00	2.01	2.03
0.98	2.05	2.07	2.10	2.12	2.14	2.17	2.20	2.23	2.26	2.29
0.99	2.33	2.37	2.41	2.46	2.51	2.58	2.65	2.75	2.88	3.09

Таблиця Е.15 Критичні значення X -критерію Ван-дер-Вердена [15]

Обсяг вибірок $n_1 - n_2$	$n_1 - n_2 = 0$ чи 1		$n_1 - n_2 = 2$ чи 3		$n_1 - n_2 = 3$ чи 4	
	Рівень значущості α		Рівень значущості α		Рівень значущості α	
	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01
8	2.40	—	2.30	—	—	—
9	2.48	—	2.40	—	—	—
10	2.60	3.20	2.49	3.10	2.30	—
11	2.72	3.40	2.58	3.40	2.40	—
12	2.86	3.60	2.79	3.58	2.68	3.40
13	2.96	3.71	2.91	3.64	2.78	3.50
14	3.11	3.94	3.06	3.88	3.00	3.76
15	3.24	4.07	3.19	4.05	3.06	3.88
16	3.39	4.26	3.36	4.25	3.28	4.12
17	3.49	4.44	3.44	4.37	3.36	4.23
18	3.63	4.60	3.60	4.58	3.53	4.50
19	3.73	4.77	3.69	4.71	3.61	4.62
20	3.86	4.94	3.84	4.92	3.78	4.85
21	3.96	5.10	3.92	5.05	3.85	4.96
22	4.08	5.26	4.06	5.24	4.01	5.17
23	4.18	5.40	4.15	5.36	4.08	5.27
24	4.29	5.55	4.27	5.53	4.23	5.48
25	4.39	5.68	4.36	5.65	4.30	5.58
26	4.50	5.83	4.48	5.81	4.44	5.76
27	4.59	5.95	4.56	5.92	4.51	5.85
28	4.68	6.09	4.68	6.07	4.64	6.03
29	4.78	6.22	4.76	6.19	4.72	6.13
30	4.88	6.35	4.87	6.34	4.84	6.30
31	4.97	6.47	4.95	6.44	4.91	6.39
32	5.07	6.60	5.06	6.58	5.03	6.55
33	5.15	6.71	5.13	6.69	5.10	6.64
34	5.25	6.84	5.24	6.82	5.21	6.79
35	5.33	6.95	5.31	6.92	5.28	6.88
36	5.42	7.06	5.41	7.05	5.38	7.02
37	5.50	7.17	5.48	7.15	5.45	7.11
38	5.59	7.28	5.58	7.27	5.55	7.25
39	5.67	7.39	5.65	7.37	5.62	7.33
40	5.75	7.50	5.74	7.49	5.72	7.47
41	5.83	7.62	5.81	7.60	5.79	7.56
42	5.91	7.72	5.90	7.71	5.88	7.69
43	5.99	7.82	5.97	7.81	5.95	7.77
44	6.04	7.93	6.06	7.92	6.04	7.90
45	6.14	8.02	6.12	8.01	6.10	7.98
46	6.21	8.13	6.21	8.12	6.19	8.10
47	6.29	8.22	6.27	8.21	6.25	8.18

Обсяг вибірок $n_1 - n_2$	$n_1 - n_2 = 0$ чи 1		$n_1 - n_2 = 2$ чи 3		$n_1 - n_2 = 3$ чи 4	
	Рівень значущості α		Рівень значущості α		Рівень значущості α	
	0.05	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01
48	6.36	8.32	6.35	8.31	6.34	8.29
49	6.43	8.41	6.42	8.40	6.39	8.37
50	6.50	8.51	6.51	8.50	6.48	8.48

Таблиця Е.16 Кванти $d_{\alpha/2}$ і $d_{1-\alpha/2}$ розподілу статистики d [21, 49]

Обсяг вибірки n	$d_{\alpha/2}$			$d_{1-\alpha/2}$		
	0.01	0.05	0.1	0.90	0.95	0.99
11	0.9359	0.9073	0.8899	0.7409	0.7153	0.6675
16	0.9137	0.8884	0.8733	0.7452	0.7236	0.6829
21	0.9001	0.8768	0.8631	0.7495	0.7304	0.6950
26	0.8901	0.8625	0.8570	0.7530	0.7360	0.7040
31	0.8827	0.8625	0.8511	0.7559	0.7404	0.7110
36	0.8769	0.8578	0.8468	0.7583	0.7440	0.7167
41	0.8722	0.8540	0.8436	0.7604	0.7470	0.7216
46	0.8682	0.8508	0.8409	0.7621	0.7496	0.7256
51	0.8648	0.8481	0.8385	0.7636	0.7518	0.7291

Таблиця Е.17 Значення m і P , що відповідають різним n і α

Обсяг вибірки n	Кількість різниць m	P при рівні значущості α		
		0.01	0.02	0.05
10	1	0.98	0.98	0.96
11-14	1	0.99	0.98	0.97
15-20	1	0.99	0.99	0.98
21-22	2	0.98	0.97	0.96
23	2	0.98	0.98	0.96
24-27	2	0.98	0.98	0.97
28-32	2	0.99	0.98	0.98
33-35	2	0.99	0.98	0.98
36-49	3	0.99	0.99	0.98

Таблиця Е.18 Критичні значення критерію ω^2 для довільного розподілу [59]

\square	0.1	0.05	0.01
ω_T^2	0.347	0.461	0.743

Таблиця Е.19 Критичні значення критерію ω^2 для нормального розподілу [59]

\square	0.1	0.05	0.01
ω_T^2	0.104	0.126	0.179

Таблиця Е.20 Критичні значення критерію Андерсона–Дарлінга для довільного розподілу [59]

\square	0.1	0.05	0.01
A_T	1.933	2.492	3.878

Таблиця Е.21 Критичні значення критерію Андерсона–Дарлінга для нормального розподілу [59]

\square	0.1	0.05	0.01
A_T	0.630	0.750	1.032

Таблиця Е.22 Критичні значення критерію Андерсона–Дарлінга для експонентного розподілу [59]

\square	0.1	0.05	0.01
A_T	1.060	1.319	1.954

Таблиця Е.23 Ранги, за допомогою яких розраховується довірчий інтервал для медіани розподілу [5]

Обсяг вибірки	Довірчий рівень значущості			Обсяг вибірки	Довірчий рівень значущості		
	0.10	0.05	0.10		0.10	0.05	0.10
				51	20; 32	19; 33	16; 36
				52	20; 33	19; 34	17; 36
				53	21; 33	19; 35	17; 37
				54	21; 34	20; 35	18; 37
				55	21; 35	20; 36	18; 38
6	1; 6	1; 6	–	56	22; 35	21; 36	18; 39
7	1; 7	1; 7	–	57	22; 36	21; 37	19; 39
8	2; 7	1; 8	1; 8	58	23; 36	22; 37	19; 40
9	2; 8	2; 8	1; 9	59	23; 37	22; 38	20; 40
10	2; 9	2; 9	1; 10	60	24; 37	22; 39	20; 41
11	3; 9	2; 10	1; 11	61	24; 38	23; 39	21; 41
12	3; 10	3; 10	2; 11	62	25; 38	23; 40	21; 42
13	4; 10	3; 11	2; 12	63	25; 39	24; 40	21; 43
14	4; 11	3; 12	2; 13	64	25; 40	24; 41	22; 43
15	4; 12	4; 12	3; 13	65	26; 40	25; 41	22; 44
16	5; 12	4; 13	3; 14	66	26; 41	25; 42	23; 44
17	5; 13	5; 13	3; 15	67	27; 41	26; 42	23; 45
18	6; 13	5; 14	4; 15	68	27; 42	26; 43	23; 46
19	6; 14	5; 15	4; 16	69	28; 42	26; 44	24; 46
20	6; 15	6; 15	4; 17	70	28; 43	27; 44	24; 47
21	7; 15	6; 16	5; 17	71	29; 43	27; 45	25; 47
22	7; 16	6; 17	5; 18	72	29; 44	28; 45	25; 48
23	8; 16	7; 17	5; 19	73	29; 45	28; 46	26; 48
24	8; 17	7; 18	6; 19	74	30; 45	29; 46	26; 49
25	8; 18	8; 18	6; 20	75	30; 46	29; 47	26; 50
26	9; 18	8; 19	7; 20	76	31; 46	29; 48	27; 50
27	9; 19	8; 20	7; 21	77	31; 47	30; 48	27; 51
28	10; 19	9; 20	7; 22	78	32; 47	30; 49	28; 51
29	10; 20	9; 21	8; 22	79	32; 48	31; 49	28; 52
30	11; 20	10; 21	8; 23	80	33; 48	31; 50	29; 52
31	11; 21	10; 22	8; 24	81	33; 49	32; 50	29; 53
32	11; 22	10; 23	9; 24	82	34; 49	32; 51	29; 54
33	12; 22	11; 23	9; 25	83	34; 50	33; 51	30; 54
34	12; 23	11; 24	10; 25	84	34; 51	33; 52	30; 55
35	13; 23	12; 24	10; 26	85	35; 51	33; 53	31; 55
36	13; 24	12; 25	10; 27	86	35; 52	34; 53	31; 56
37	14; 24	13; 25	11; 27	87	36; 52	34; 54	32; 56
38	14; 25	13; 26	11; 28	88	36; 53	35; 54	32; 57
39	14; 26	13; 27	12; 28	89	37; 53	35; 55	32; 58
40	15; 26	14; 27	12; 29	90	37; 54	36; 55	33; 58

Обсяг вибірки	Довірчий рівень значущості			Обсяг вибірки	Довірчий рівень значущості		
	0.10	0.05	0.10		0.10	0.05	0.10
41	15; 27	14; 28	12; 30	91	38; 54	36; 56	33; 59
42	16; 27	15; 28	13; 30	92	38; 55	37; 56	34; 59
43	16; 28	15; 29	13; 31	93	39; 55	37; 57	34; 60
44	17; 28	16; 29	14; 31	94	39; 56	38; 57	35; 60
45	17; 29	16; 30	14; 32	95	39; 57	38; 58	35; 61
46	17; 30	16; 31	14; 33	96	40; 57	38; 59	35; 62
47	18; 30	17; 31	15; 33	97	40; 58	39; 59	36; 62
48	18; 31	17; 32	15; 34	98	41; 58	39; 60	36; 63
49	19; 31	18; 32	16; 34	99	41; 59	40; 60	37; 63
50	19; 32	18; 33	16; 35	100	42; 59	40; 61	37; 64

Значення в таблиці — ранги в упорядкованому за зростанням списку спостережень, які дають приблизно 0.10, 0.05 і 0.01 довірчого рівня значущості для медіани популяції на підставі однієї вибірки. Наприклад, для довірчого рівня значущості $\alpha = 0.01$ інтервал для популяційної медіани, обчисленої за вибіркою обсягом $n = 20$ спостережень, визначається спостереженнями з рангами **6** і **15** (див. підрозділ **7.4.3.2 Обчислення заданого довірчого інтервалу для медіани**).

Таблиця Е.24 Критичне значення критерію знаків

n	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.10$	n	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.10$
9	1	1	16	3	4
10	1	1	17	4	4
11	1	2	18	4	5
12	2	2	19	4	5
13	2	3	20	5	5
14	2	3	25	7	7
15	3	3	30	9	10

Таблиця Е.25 Критичні значення z -критерію знаків для рівнів значущості $\alpha = 0.01$ і 0.05 [15]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг вибірки n	Рівень значущості α	
	0.05	0.10		0.05	0.10		0.05	0.10		0.05	0.10
6	6	—	30	21	23	54	35	37	78	49	51
7	7	—	31	22	24	55	36	38	79	49	52
8	8	8	32	23	24	56	36	39	80	50	52
9	8	9	33	23	25	57	37	39	81	50	53
10	9	10	34	24	25	58	37	40	82	51	54
11	10	11	35	24	26	59	38	40	83	51	54
12	10	11	36	25	27	60	39	41	84	52	55
13	11	12	37	25	27	61	39	41	85	53	55
14	12	13	38	26	28	62	40	42	86	53	56
15	12	13	39	27	28	63	40	43	87	54	56
16	13	14	40	27	29	64	41	43	88	54	57
17	13	15	41	28	30	65	41	44	89	55	58
18	14	15	42	28	30	66	42	44	90	55	58
19	15	16	43	29	31	67	42	45	91	56	59
20	15	17	44	29	31	68	43	46	92	56	59
21	16	17	45	30	32	69	44	46	93	57	60
22	17	18	46	31	33	70	44	47	94	57	60
23	17	19	47	31	33	71	45	47	95	58	61
24	18	19	48	32	34	72	45	48	96	59	62
25	18	20	49	32	34	73	46	48	97	59	62
26	19	20	50	33	35	74	46	49	98	60	63
27	20	21	51	33	36	75	47	50	99	60	63
28	20	22	52	34	36	76	48	50	100	61	64
29	21	22	53	35	37	77	48	51	—	—	—

Таблиця Е.26 Критерій Шапіро–Уїлка. p -квантилі статистики
для $\alpha = 0.01$ і 0.05 [74]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		Обсяг вибірки n	Рівень значущості α	
	0.01	0.05		0.01	0.05
8	0.749	0.818	31	0.902	0.929
9	0.764	0.829	32	0.904	0.930
10	0.781	0.842	33	0.906	0.931
11	0.792	0.850	34	0.908	0.933
12	0.805	0.859	35	0.910	0.934
13	0.814	0.866	36	0.912	0.935
14	0.825	0.874	37	0.914	0.936
15	0.835	0.881	38	0.916	0.938
16	0.844	0.887	39	0.917	0.939
17	0.851	0.892	40	0.919	0.940
18	0.858	0.897	41	0.920	0.941
19	0.863	0.901	42	0.922	0.942
20	0.868	0.905	43	0.923	0.943
21	0.873	0.908	44	0.924	0.944
22	0.878	0.911	45	0.926	0.945
23	0.881	0.914	46	0.927	0.945
24	0.884	0.916	47	0.928	0.946
25	0.888	0.918	48	0.929	0.947
26	0.891	0.920	49	0.929	0.947
27	0.894	0.923	50	0.930	0.947
28	0.896	0.924			
29	0.898	0.926			
30	0.900	0.927			

Таблиця Е.27 Критичні значення T -критерію Вілкоксона
(для перевірки неспрямованих альтернатив)⁵⁰⁾ [194]

Обсяг вибірки <i>n</i>	Рівень значущості для однобічного критерію				Обсяг вибірки <i>n</i>	Рівень значущості для однобічного критерію			
	0.05	0.025	0.01	0.005		0.05	0.025	0.01	0.005
	Рівень значущості для двобічного критерію					Рівень значущості для двобічного критерію			
	0.10	0.05	0.02	0.01		0.10	0.05	0.02	0.01
5	0				28	130	116	101	91
6	2	0	—	—	29	140	126	110	100
7	3	2	0	—	30	153	137	120	109
8	5	3	1	0	31	163	147	130	118
9	8	5	3	1	32	175	159	140	128
10	10	8	5	3	33	187	170	151	138
11	13	10	7	5	34	200	182	162	148
12	17	13	9	7	35	213	195	173	159
13	21	17	12	9	36	227	208	185	171
14	25	21	15	12	37	241	221	198	182
15	30	25	19	15	38	256	235	211	194
16	35	29	23	19	39	271	249	224	207
17	41	34	27	23	40	286	264	238	220
18	47	40	32	27	41	302	279	252	233
19	53	46	37	32	42	319	294	266	247
20	60	52	43	37	43	336	310	281	261
21	67	58	49	42	44	353	327	296	276
22	75	65	55	48	45	371	343	312	291
23	83	73	62	54	46	389	361	328	307
24	91	81	69	61	47	407	378	345	322
25	100	89	76	68	48	426	396	362	339
26	110	98	84	75	49	446	415	379	355
27	119	107	92	83	50	466	434	397	373

⁵⁰⁾ Дані в табл. Е.27 критичні значення T -критерію Вілкоксона визначені залежніс-

тю $T_T = \frac{n(n+1)}{4} - t_{\alpha(v)} \sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$ (7.59). Для $n = 49$ і $\alpha = 0.05$ за нею

маємо $T_T = 410$, для $n = 14$ і $\alpha = 0.05$ — $T_T = 18$. Проте за табл. Е.27 відповідно одержуємо $T_T = 415$ і $T_T = 21$. Тобто у першому випадку результати майже співпадають, у другому наявна суттєва відмінність. Відповідно до цього розрахунок за формулою можна виконувати лише за умови $n > 25(30)$.

Таблиця Е.28 Критичні значення для критерію Дункана в залежності від числа ступенів вільності ν і рангового порядку k [86]

$\alpha = 0.05$

Ступінь вільності ν	Ранговий порядок m													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
1	18.80	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
2	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09	6.09
3	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
4	3.93	4.01	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02	4.02
5	3.64	3.74	3.79	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83
6	3.46	3.58	3.64	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68	3.68
7	3.35	3.47	3.54	3.58	3.60	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
8	3.26	3.39	3.47	3.52	3.55	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56	3.56
9	3.20	3.34	3.41	3.47	3.50	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52	3.52
10	3.15	3.30	3.37	3.43	3.46	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.47	3.48
11	3.11	3.27	3.35	3.39	3.43	3.44	3.45	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.47	3.48
12	3.08	3.23	3.33	3.36	3.40	3.42	3.44	3.44	3.46	3.46	3.46	3.46	3.47	3.48
13	3.06	3.21	3.30	3.35	3.38	3.41	3.42	3.44	3.45	3.46	3.46	3.46	3.47	3.47
14	3.03	3.18	3.27	3.33	3.37	3.39	3.41	3.43	3.44	3.45	3.46	3.46	3.47	3.47
15	3.01	3.16	3.25	3.31	3.36	3.38	3.40	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.47
16	3.00	3.15	3.23	3.30	3.34	3.37	3.39	3.41	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.47
17	2.98	3.13	3.22	3.28	3.33	3.36	3.38	3.40	3.42	3.44	3.45	3.46	3.47	3.47
18	2.97	3.12	3.21	3.27	3.32	3.35	3.37	3.39	3.41	3.43	3.45	3.46	3.47	3.47
19	2.96	3.11	3.19	3.26	3.31	3.35	3.37	3.39	3.41	3.43	3.44	3.46	3.47	3.47
20	2.95	3.10	3.18	3.25	3.30	3.34	3.36	3.38	3.40	3.43	3.44	3.46	3.46	3.47
22	2.93	3.08	3.17	3.24	3.29	3.32	3.35	3.37	3.39	3.42	3.44	3.45	3.46	3.47
24	2.92	3.07	3.15	3.22	3.28	3.31	3.34	3.37	3.38	3.41	3.44	3.45	3.46	3.47
26	2.91	3.06	3.14	3.21	3.27	3.30	3.34	3.36	3.38	3.41	3.43	3.45	3.46	3.47
28	2.90	3.04	3.13	3.20	3.26	3.30	3.33	3.35	3.37	3.40	3.43	3.45	3.46	3.47

Ступінь вільності ν	Ранговий порядок m													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20
30	2.89	3.04	3.12	3.20	3.25	3.29	3.32	3.35	3.37	3.40	3.43	3.44	3.46	3.47
40	2.86	3.01	3.10	3.17	3.22	3.27	3.30	3.33	3.35	3.39	3.42	3.44	3.46	3.47
60	2.83	2.98	3.08	3.14	3.20	3.24	3.28	3.31	3.33	3.37	3.40	3.43	3.45	3.47
100	2.80	2.95	3.05	3.12	3.18	3.22	3.26	3.29	3.32	3.36	3.40	3.42	3.45	3.47
∞	2.77	2.92	3.02	3.09	3.15	3.19	3.23	3.26	3.29	3.34	3.38	3.41	3.44	3.47

Таблиця Е.29 Значення критерію Дарбіна–Уотсона для рівня
значущості 1 %

Число спостережень, n	Число незалежних змінних <i>першого порядку</i> рівняння регресії (без постійного члена)									
	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0.390	1.142	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.433	1.036	0.294	1.676	-	-	-	-	-	-
8	0.497	1.003	0.343	1.489	0.229	2.102	-	-	-	-
9	0.554	0.998	0.408	1.389	0.279	1.873	0.183	2.433	-	-
10	0.604	1.001	0.466	1.333	0.340	1.733	0.230	2.193	-	-
11	0.633	1.010	0.319	1.297	0.396	1.640	0.286	2.030	-	-
12	0.697	1.023	0.369	1.274	0.449	1.373	0.339	1.913	-	-
13	0.738	1.038	0.616	1.261	0.499	1.326	0.391	1.826	-	-
14	0.776	1.034	0.660	1.234	0.347	1.490	0.441	1.737	-	-
15	0.811	1.070	0.700	1.232	0.391	1.464	0.488	1.704	0.39	1.96
16	0.844	1.086	0.737	1.232	0.633	1.446	0.532	1.663	0.44	1.90
17	0.874	1.102	0.772	1.233	0.672	1.432	0.574	1.630	0.48	1.85
18	0.902	1.118	0.803	1.239	0.708	1.422	0.613	1.604	0.52	1.80
19	0.928	1.132	0.833	1.263	0.742	1.413	0.630	1.584	0.56	1.77
20	0.932	1.147	0.863	1.271	0.773	1.411	0.683	1.567	0.60	1.74
21	0.973	1.161	0.890	1.277	0.803	1.408	0.718	1.534	0.63	1.71
22	0.997	1.174	0.914	1.284	0.831	1.407	0.748	1.543	0.66	1.69
23	1.018	1.187	0.938	1.291	0.838	1.407	0.777	1.534	0.70	1.67
24	1.037	1.199	0.960	1.298	0.882	1.407	0.803	1.528	0.72	1.66
25	1.033	1.211	0.981	1.303	0.906	1.409	0.831	1.523	0.75	1.65
26	1.072	1.222	1.001	1.312	0.928	1.411	0.833	1.518	0.78	1.64
27	1.089	1.233	1.019	1.319	0.949	1.413	0.878	1.513	0.81	1.63
28	1.104	1.244	1.037	1.323	0.969	1.413	0.900	1.513	0.83	1.62
29	1.119	1.234	1.034	1.332	0.988	1.418	0.921	1.512	0.85	1.61
30	1.133	1.263	1.070	1.339	1.006	1.421	0.941	1.511	0.88	1.61
31	1.15	1.27	1.08	1.34	1.02	1.42	0.96	1.51	0.90	1.60
32	1.16	1.28	1.10	1.35	1.04	1.43	0.98	1.51	0.92	1.60
33	1.17	1.29	1.11	1.36	1.05	1.43	1.00	1.51	0.94	1.59
34	1.18	1.30	1.13	1.36	1.07	1.43	1.01	1.51	0.95	1.59
35	1.193	1.307	1.140	1.370	1.083	1.439	1.028	1.512	0.97	1.59
36	1.21	1.32	1.15	1.38	1.10	1.44	1.04	1.51	0.99	1.59
37	1.22	1.32	1.16	1.38	1.11	1.45	1.06	1.51	1.00	1.59
38	1.23	1.33	1.18	1.39	1.12	1.45	1.07	1.52	1.02	1.58
39	1.24	1.34	1.19	1.39	1.14	1.45	1.09	1.52	1.03	1.58
40	1.246	1.344	1.198	1.398	1.148	1.437	1.098	1.518	1.05	1.58
45	1.29	1.38	1.24	1.42	1.20	1.48	1.16	1.53	1.11	1.58
50	1.324	1.403	1.283	1.446	1.243	1.491	1.203	1.538	1.16	1.59
55	1.36	1.43	1.32	1.47	1.28	1.51	1.25	1.55	1.21	1.59
60	1.38	1.45	1.35	1.48	1.32	1.52	1.28	1.56	1.25	1.60
65	1.41	1.47	1.38	1.50	1.35	1.53	1.31	1.57	1.28	1.61
70	1.43	1.49	1.40	1.52	1.37	1.55	1.34	1.58	1.31	1.61
75	1.45	1.50	1.42	1.53	1.39	1.56	1.37	1.59	1.34	1.62

Число спостережень, n	Число незалежних змінних <i>першого порядку</i> рівняння регресії (без постійного члена)									
	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
80	1.47	1.52	1.44	1.54	1.42	1.57	1.39	1.60	1.36	1.62
85	1.48	1.53	1.46	1.55	1.43	1.58	1.41	1.60	1.39	1.63
90	1.50	1.54	1.47	1.56	1.45	1.59	1.43	1.61	1.41	1.64
95	1.51	1.55	1.49	1.57	1.47	1.60	1.45	1.62	1.42	1.64
100	1.522	1.562	1.503	1.583	1.482	1.604	1.462	1.623	1.44	1.65

Таблиця Е.30 Значення критерію Дарбіна–Уотсона для рівня
значущості 5 %

Число спостережень, n	Число незалежних змінних <i>першого порядку</i> рівняння регресії (без постійного члена)									
	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
6	0.61	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0.70	1.31	0.47	1.90	-	-	-	-	-	-
8	0.76	1.31	0.56	1.78	0.37	2.29	-	-	-	-
9	0.82	1.32	0.63	1.70	0.46	2.13	-	-	-	-
10	0.88	1.32	0.70	1.64	0.53	2.02	-	-	-	-
11	0.93	1.32	0.76	1.60	0.60	1.93	-	-	-	-
12	0.97	1.33	0.81	1.58	0.66	1.86	-	-	-	-
13	1.01	1.35	0.86	1.56	0.72	1.82	-	-	-	-
14	1.05	1.35	0.91	1.55	0.77	1.78	-	-	-	-
15	1.08	1.36	0.95	1.54	0.82	1.75	0.69	1.97	0.56	2.21
16	1.10	1.37	0.98	1.54	0.86	1.73	0.74	1.93	0.62	2.15
17	1.13	1.38	1.02	1.54	0.90	1.71	0.78	1.90	0.67	2.10
18	1.16	1.39	1.05	1.53	0.93	1.69	0.82	1.87	0.71	2.06
19	1.18	1.40	1.08	1.53	0.97	1.68	0.86	1.85	0.75	2.02
20	1.20	1.41	1.10	1.54	1.00	1.68	0.90	1.83	0.79	1.99
21	1.22	1.42	1.13	1.54	1.03	1.67	0.93	1.81	0.83	1.96
22	1.24	1.43	1.15	1.54	1.05	1.66	0.96	1.80	0.86	1.94
23	1.26	1.44	1.17	1.54	1.08	1.66	0.99	1.79	0.90	1.92
24	1.27	1.45	1.19	1.55	1.10	1.66	1.01	1.78	0.93	1.90
25	1.29	1.45	1.21	1.55	1.12	1.66	1.04	1.77	0.95	1.89
26	1.30	1.46	1.22	1.55	1.14	1.65	1.06	1.76	0.98	1.88
27	1.32	1.47	1.24	1.56	1.16	1.65	1.08	1.76	1.01	1.86
28	1.33	1.48	1.26	1.56	1.18	1.65	1.10	1.75	1.03	1.85
29	1.34	1.48	1.27	1.56	1.20	1.65	1.12	1.74	1.05	1.84
30	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83
31	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.74	1.09	1.83
32	1.37	1.50	1.31	1.57	1.24	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82
33	1.38	1.51	1.32	1.58	1.26	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81
35	1.40	1.52	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.73	1.16	1.80
36	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.18	1.80
37	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.19	1.80
38	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.21	1.79
39	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.22	1.79
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.23	1.79
45	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.29	1.78
50	1.50	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.77
55	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.38	1.77
60	1.55	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.73	1.41	1.77

Число спостережень, n	Число незалежних змінних <i>першого порядку</i> рівняння регресії (без постійного члена)									
	$k = 1$		$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$		$k = 5$	
	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
65	1.57	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.47	1.73	1.44	1.77
70	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.74	1.46	1.77
75	1.60	1.65	1.57	1.68	1.54	1.71	1.51	1.74	1.49	1.77
80	1.61	1.66	1.59	1.69	1.56	1.72	1.53	1.74	1.51	1.77
85	1.62	1.67	1.60	1.70	1.57	1.72	1.55	1.75	1.52	1.77
90	1.63	1.68	1.61	1.70	1.59	1.73	1.57	1.75	1.54	1.78
95	1.64	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.58	1.75	1.56	1.78
100	1.65	1.69	1.63	1.72	1.61	1.74	1.59	1.76	1.57	1.78

Таблиця Е.31 Значення коефіцієнта Q критерію Тьюкі для 5 %-го рівня значущості [50]

Число ступенів вільності ν	Число варіантів																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	18.0	26.7	32.8	37.2	40.5	43.1	45.4	47.3	49.1	50.6	51.9	53.2	54.3	55.4	56.3	57.2	58.0	58.8	59.9
2	6.09	8.28	9.80	10.89	11.73	12.43	13.03	13.54	13.99	14.39	14.75	15.03	15.38	15.65	15.91	16.14	16.36	16.57	16.77
3	4.50	5.88	6.83	7.51	8.04	8.47	8.85	9.18	9.46	9.72	9.95	10.16	10.35	10.52	10.69	10.84	10.98	11.12	11.24
4	3.93	5.00	5.76	6.31	6.73	7.06	7.35	7.60	7.83	8.03	8.21	8.37	8.52	8.67	8.80	8.92	9.03	9.14	9.24
5	3.93	5.00	5.18	5.64	5.99	6.28	6.52	6.74	6.93	7.10	7.25	7.39	7.52	7.64	7.75	7.86	7.95	8.04	8.13
6	3.61	4.54	4.90	5.31	5.63	5.89	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79	6.92	7.04	7.14	7.24	7.34	7.43	7.51	7.59
7	3.46	4.34	4.68	5.06	5.35	5.59	5.80	5.99	6.15	6.29	6.42	6.54	6.65	6.75	6.84	6.93	7.01	7.08	7.16
8	3.34	4.16	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18	6.29	6.39	6.48	6.57	6.65	6.73	6.80	6.87
9	3.20	3.95	4.42	4.76	5.02	5.24	5.43	5.60	5.74	5.87	5.93	6.09	6.19	6.28	6.36	6.44	6.51	6.58	6.65
10	3.15	3.88	4.33	4.66	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.12	6.20	6.27	6.34	6.41	6.47
12	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.40	5.51	5.61	5.71	5.80	5.88	5.95	6.02	6.09	6.15	6.21
14	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46	5.56	5.64	5.72	5.79	5.86	5.92	5.98	6.03
16	3.00	3.65	4.05	4.34	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35	5.44	5.52	5.59	5.66	5.73	5.79	5.84	5.90
18	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.83	4.96	5.07	5.17	5.27	5.35	5.44	5.53	5.57	5.63	5.69	5.74	5.79
20	2.95	3.58	3.96	4.24	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.28	5.34	5.43	5.50	5.56	5.61	5.66	5.71
30	2.89	3.48	3.84	4.11	4.30	4.46	4.60	4.72	4.83	4.92	5.00	5.08	5.28	5.21	5.27	5.33	5.38	5.43	5.48
40	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.74	4.82	4.90	4.98	5.08	5.11	5.17	5.22	5.27	5.32	5.36
60	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	4.81	4.88	4.94	5.00	5.06	5.11	5.15	5.20	5.24
120	2.80	3.36	3.69	3.92	4.10	4.24	4.26	4.47	4.56	4.64	4.71	4.78	4.84	4.90	4.95	5.00	5.04	5.09	5.13
∞	2.77	3.32	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	4.63	4.74	4.80	4.84	4.89	4.93	4.97	5.01

Додаток Ж
АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ: КРИТЕРІЙ СЕРІЙ

Таблиця Ж.1 Критичні значення для числа серій (для перевірки
 ненапрямлених гіпотез для $\alpha = 0.05$) при $W_{0.025}^{51)}$ [123]

m	n																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2																				
3																				
4																				
5			2	2																
6		2	2	3	3															
7		2	2	3	3	3														
8		2	3	3	3	4	4													
9		2	3	3	4	4	5	5												
10		2	3	3	4	5	5	5	6											
1!		2	3	4	4	5	5	6	6	7										
12	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	7									
13	2	2	3	4	5	5	6	6	7	7	8	8								
14	2	2	3	4	5	5	6	7	7	8	8	9	9							
15	2	3	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10						
16	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8	9	9	10	10	11					
17	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	9	10	10	11	11	11				
18	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12			
19	2	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13		
20	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	10	11	12	12	13	13	14		

⁵¹⁾ Нульова гіпотеза відхиляється, якщо емпіричне число серій W менше або дорівнює $W_{0.025}$ або більше або дорівнює $W_{0.975}$.

Таблиця Ж.2 Критичні значення для числа серій (для перевірки неспрямованих гіпотез для $\alpha = 0.05$) при $W_{0.925}$

m	n																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	4																			
3	5	6																		
4	5	7	8																	
5	5	7	8	9																
6	5	7	8	9	10															
7	5	7	9	10	11	12														
8	5	7	9	10	11	12	13													
9	5	7	9	11	12	13	13	14												
10	5	7	9	11	12	13	14	15	15											
1!	5	7	9	И	12	13	14	15	16	16										
12	5	7	9	11	12	13	15	15	16	17	18									
13	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19								
14	5	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	19	20							
15	5	7	9	11	13	14	15	17	17	18	19	20	21	21						
16	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	20	21	22	23					
17	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23	24				
18	5	7	9	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	25			
19	5	7	9	11	13	15	16	17	19	20	21	22	22	23	24	25	25	26		
20	5	7	9	11	13	15	16	17	19	20	21	22	23	24	24	25	26	26	27	

Таблиця Ж.3 Критичні значення для числа серій (для перевірки ненапрямлених гіпотез для $\alpha = 0.05$ при $n \geq 20$ і $m \geq 20$)

$n = m$	$W_{0.025}$	$W_{0.975}$	$n = m$	$W_{0.025}$	$W_{0.975}$
20	14	27	40	31	50
21	15	28	42	33	52
22	16	29	44	35	54
23	16	31	46	37	56
24	17	32	48	38	59
25	18	33	50	40	61
26	19	34	55	45	66
27	20	35	60	49	72
28	21	36	65	54	77
29	22	37	70	58	83
30	22	39	75	63	88
32	24	41	80	68	93
34	26	43	85	72	99
36	28	45	90	77	104
38	30	47	95	82	109
			100	86	115

Таблиця Ж.4 Критичні значення критерію Кохрена для повторення дослідів k (числа порівнюваних дисперсій), ступеня вільності ν і довірчого рівня статистичної значущості α .

Верхній рядок при $\alpha = 0.05$, нижній — при $\alpha = 0.01$ ⁵²⁾ [122]

Число ступенів вільності ν	Повторення дослідів k							
	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.967	0.906	0.841	0.781	0.727	0.680	0.638	0.602
	0.993	0.968	0.928	0.883	0.838	0.794	0.754	0.718
2	0.871	0.768	0.684	0.616	0.561	0.516	0.478	0.445
	0.942	0.864	0.788	0.722	0.664	0.615	0.573	0.534
3	0.798	0.684	0.598	0.532	0.480	0.438	0.403	0.373
	0.883	0.781	0.696	0.626	0.568	0.521	0.481	0.447
4	0.746	0.629	0.544	0.480	0.431	0.391	0.358	0.331
	0.834	0.721	0.633	0.564	0.508	0.463	0.425	0.393
5	0.707	0.590	0.506	0.445	0.397	0.360	0.329	0.303
	0.793	0.676	0.688	0.520	0.466	0.423	0.387	0.357
6	0.677	0.560	0.478	0.418	0.373	0.336	0.307	0.282
	0.761	0.641	0.663	0.487	0.435	0.393	0.369	0.331
7	0.653	0.536	0.456	0.398	0.354	0.318	0.290	0.267
	0.734	0.613	0.626	0.461	0.410	0.370	0.338	0.311
8	0.633	0.518	0.439	0.382	0.338	0.304	0.277	0.254
	0.711	0.590	0.504	0.440	0.391	0.352	0.321	0.294
9	0.617	0.502	0.424	0.368	0.326	0.293	0.266	0.244
	0.691	0.670	0.485	0.423	0.376	0.337	0.307	0.281
10	0.602	0.488	0.412	0.357	0.315	0.283	0.257	0.235
	0.674	0.564	0.470	0.408	0.302	0.325	0.295	0.270
12	0.580	0.466	0.392	0.339	0.298	0.267	0.244	0.224
	0.647	0.527	0.445	0.384	0.340	0.305	0.277	0.254
14	0.560	0.450	0.377	0.325	0.285	0.256	0.232	0.213
	0.625	0.503	0.425	0.368	0.322	0.290	0.263	0.240


⁵²⁾ Критичне значення функції розподілу Кохрена можна апроксимувати розподі-

лом Фішера $G_{(k,\nu)_T} = \frac{F_{\alpha/k, \nu, (k-1) \cdot \nu}}{F_{\alpha/k, \nu, (k-1) \cdot \nu} + k - 1}$ (11.77). Наприклад для $\nu=2$, $k=10$ і

$\alpha=0.05$ використовуючи функцію **F.ОБР.ПХ(0.05/10;2;(10-1)*2)** маємо $F=7.05332$. Тоді $G_{(k,\nu)_T} = 7.0533/(7.0533+10-1) = 0.444953$. Слід зауважити, що зі збільшенням ν і k різниця між табличними і апроксимованими даними зростає. Так при $\nu=144$, $k=120$ і $\alpha=0.05$ табличне значення становить **0.0120** (див. табл. Ж.6), а апроксимоване 0.013533. Проте, навряд комусь із нас випаде використовувати такі повторності і ступеневі вільності.

Число ступенів вільності ν	Повторення дослідів k							
	3	4	5	6	7	8	9	10
16	0.547	0.437	0.364	0.313	0.277	0.246	0.223	0.203
	0.606	0.488	0.409	0.353	0.310	0.278	0.251	0.230
18	0.536	0.425	0.353	0.305	0.267	0.239	0.217	0.199
	0.690	0.474	0.397	0.340	0.298	0.269	0.243	0.221
20	0.526	0.416	0.335	0.298	0.259	0.230	0.210	0.191
	0.677	0.461	0.845	0.330	0.289	0.260	0.235	0.215
25	0.504	0.397	0.329	0.282	0.245	0.219	0.198	0.180
	0.660	0.438	0.363	0.312	0.270	0.243	0.219	0.200
30	0.490	0.383	0.315	0.270	0.233	0.209	0.190	0.173
	0.633	0.420	0.349	0.299	0.259	0.230	0.209	0.190
35	0.479	0.372	0.306	0.262	0.227	0.201	0.183	0.216
	0.618	0.408	0.337	0.288	0.250	0.222	0.200	0.182
40	0.469	0.364	0.298	0.255	0.220	0.195	0.177	0.162
	0.605	0.397	0.327	0.280	0.242	0.216	0.192	0.177
45	0.460	0.357	0.291	0.250	0.215	0.190	0.173	0.157
	0.496	0.387	0.319	0.272	0.236	0.209	0.288	0.172
50	0.455	0.350	0.288	0.246	0.210	0.186	0.170	0.152
	0.488	0.380	0.312	0.266	0.230	0.204	0.184	0.107
60	0.444	0.341	0.279	0.239	0.204	0.179	0.161	0.148
	0.474	0.368	0.300	0.256	0.220	0.198	0.177	0.160
80	0.429	0.329	0.268	0.227	0.195	0.170	0.154	0.140
	0.455	0.350	0.285	0.243	0.210	0.186	0.164	0.150
100	0.417	0.319	0.261	0.220	0.189	0.165	0.159	0.136
	0.441	0.338	0.277	0.235	0.202	0.180	0.160	0.143
150	0.401	0.305	0.250	0.211	0.180	0.160	0.145	0.130
	0.421	0.322	0.263	0.220	0.194	0.170	0.150	0.137
200	0.390	0.299	0.246	0.210	0.180	0.158	0.142	0.130
	0.410	0.310	0.255	0.215	0.190	1.115	0.148	0.135

Нульова гіпотеза приймається при $G \leq G_{05}$ і відхиляється при $G > G_{01}$.



$$F.OБР.ПХ(0.05/10;2;(10-1)*2)=7.05332$$

Рис. Ж.4.1. Розрахунок значення площі під кривою розподілу Фішера, яка знаходиться справа від z

Таблиця Ж.5 Розрахункові критичні значення критерію Кохрена для повторення дослідів k (числа порівнюваних дисперсій) і повторності дослідів n і довірчого рівня статистичної значущості α .

Верхній рядок за даними табл. Ж.4 і Ж.6.

Рівень значущості α	Повторність дослідів n	Матриця планування				
		B_2	B_3	На-Ко $_4$	B_4	B_5
		Повторення дослідів k				
		9	14	18	24	42
0.100	3	0.43020	0.31622	0.26322	0.21202	0.13699
	4	0.36508	0.26342	0.21726	0.17335	0.11024
	5	0.32669	0.23296	0.19101	0.15148	0.09535
0.050	3	<i>0.4775</i> 0.47749	0.35173	0.29266	<i>0.2354</i> 0.23542	0.15145
	4	<i>0.4027</i> 0.40274	0.29067	0.23950	<i>0.1907</i> 0.19077	0.12079
	5	<i>0.3584</i> 0.35838	0.25542	0.20918	<i>0.1656</i> 0.16559	0.10379
0.025	3	0.52086	0.38539	0.32092	0.25812	0.16568
	4	0.43791	0.31674	0.26098	0.20772	0.13116
	5	0.38821	0.27698	0.22676	0.17934	0.11208
0.010	3	<i>0.573</i> 0.57271	0.42722	0.35655	0.28709	0.18412
	4	<i>0.481</i> 0.4810	0.3495	0.2883	0.2295	0.1446
	5	<i>0.425</i> 0.42509	0.30424	0.24918	0.19699	0.12284

Таблиця Ж.6 Критичні значення критерію Кохрена для повторення дослідів k (числа порівнюваних дисперсій), ступеня вільності ν і довірчого рівня статистичної значущості $\alpha=0.05$ [196] ⁵³⁾

Повторення дослідів k	Число ступенів вільності ν													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	36	144	∞
2	9985	9750	9392	9057	8772	8534	8332	8159	8010	7880	7341	6602	5813	5000
3	9669	8709	7977	7157	7071	6771	6530	6333	6167	6025	5466	4748	4031	3333
4	9065	7679	6841	6287	5895	5598	5365	5175	5017	4884	4366	3720	3093	25000
5	8412	6838	5981	5441	5065	4783	4561	4387	4241	4118	3645	3066	2513	2000
6	7808	6161	5321	4803	4447	4181	3980	3817	3682	3568	3135	2612	2119	1667
7	7271	5612	4800	4307	3974	3726	3535	3384	3259	3154	2756	2278	1833	1429
8	6798	5157	4377	3910	3595	3362	3185	3043	2926	2829	2462	2022	1616	1250
9	6385	4775	4027	3584	3286	3067	2901	2768	2659	2568	2226	1820	1446	1111
10	6020	4450	3733	3311	3029	2823	2666	2541	2439	2353	2032	1655	1308	1000
12	5410	3924	3264	2880	2624	2439	2299	2187	2098	2020	1737	1403	1100	0833
15	4709	3346	2758	2419	2195	2034	1911	1815	1736	1671	1429	1144	0889	0667
20	3894	2705	2205	1921	1735	1602	1501	1422	1357	1303	1108	0879	0675	0500
24	3434	2354	1907	1656	1493	1374	1286	1216	1160	1113	0942	0743	0567	0417
30	2929	1980	1593	1377	1237	1137	1061	1002	0958	0921	0771	0604	0457	0333
40	2370	1576	1259	1082	0968	0887	0827	0780	0745	0713	0595	0462	0347	0250
60	1737	11.31	0895	0765	0682	0623	0583	0552	0520	0497	0411	0316	0234	0167
120	0998	0632	0495	0419	0371	0337	0312	0292	0279	0266	0218	0165	0120	0083
∞	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

⁵³⁾ В табл. Ж.4 та Ж.6 всі квантілі $G_{\alpha(n,\nu)_T}$ менше одиниці, тому і в таблицях наведені лише десяткові знаки, наступні після коми, перед якою при користуванні таблицею потрібно ставити нуль цілих. Наприклад при $n = 6$, $\nu = 3$ маємо $G_{\alpha(n,\nu)_T} = 0.5321$.

Додаток И

КРИТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ КОРЕЛЯЦІЇ

Таблиця И.1 Співвідношення між величиною r і z ⁵⁴⁾ [34]

Десяті частки r	Соті частки r									
	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
	Значення z									
0.0	0.000	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.070	0.080	0.090
0.1	0.100	0.110	0.121	0.131	0.141	0.151	0.161	0.172	0.182	0.192
0.2	0.203	0.213	0.224	0.234	0.245	0.255	0.266	0.277	0.288	0.299
0.3	0.309	0.321	0.332	0.343	0.354	0.365	0.377	0.388	0.400	0.412
0.4	0.424	0.436	0.448	0.460	0.472	0.485	0.498	0.510	0.523	0.536
0.5	0.549	0.563	0.576	0.590	0.604	0.618	0.633	0.648	0.663	0.678
0.6	0.693	0.709	0.725	0.741	0.758	0.776	0.793	0.811	0.829	0.848
0.7	0.867	0.887	0.908	0.929	0.951	0.973	0.996	1.020	1.045	1.071
0.8	1.099	1.127	1.157	1.188	1.221	1.256	1.293	1.333	1.376	1.422
0.9	1.472	1.527	1.589	1.658	1.738	1.832	1.946	2.092	2.298	2.647

Таблиця И.2 Критичні значення коефіцієнта кореляції на 5 %-му і 1 %-му рівні значущості [34]

Ступінь вільності, $\nu = n - 2$	α		Ступінь вільності, $\nu = n - 2$	α		Ступінь вільності, $\nu = n - 2$	α	
	0.05	0.01		0.05	0.01		0.05	0.01
1	0.997	1.000	16	0.468	0.590	35	0.325	0.418
2	0.950	0.990	17	0.456	0.575	40	0.304	0.393
3	0.878	0.959	18	0.444	0.561	45	0.288	0.372
4	0.811	0.917	19	0.433	0.549	50	0.273	0.354
5	0.754	0.874	20	0.423	0.537	60	0.250	0.325
6	0.707	0.834	21	0.413	0.526	70	0.232	0.302
7	0.666	0.798	22	0.404	0.515	80	0.217	0.283
8	0.632	0.765	23	0.396	0.505	90	0.205	0.267
9	0.602	0.735	24	0.388	0.496	100	0.195	0.254
10	0.576	0.708	25	0.381	0.487	150	0.159	0.208
11	0.553	0.684	26	0.374	0.478	200	0.138	0.181
12	0.532	0.661	27	0.367	0.470	300	0.113	0.148
13	0.514	0.641	28	0.361	0.463	400	0.098	0.128
14	0.497	0.623	29	0.355	0.456	500	0.088	0.115
15	0.482	0.606	30	0.349	0.449	1000	0.062	0.081

⁵⁴⁾ Дані в табл. И.1 визначається залежністю (9.14) на с. 496, чи статистичною функцією **Excel ФІШЕР(х)**, наприклад, для $r = 0.63$ маємо $z = \mathbf{0.741416}$. Зворотне значення залежністю (9.15) на с. 496, чи статистичною функцією **ФІШЕРОБР(у)**, наприклад, для $r = \mathbf{0.741416}$ маємо $z = 0.63$.

Таблиця И.3 Мінімальний обсяг n вибірки при оцінці коефіцієнта кореляції на 5, 1 і 0.1 %–му рівні значущості [54]

r	n			r	n			r	n		
	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.001$		$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.001$		$\alpha=0.05$	$\alpha=0.01$	$\alpha=0.001$
0.01	38407	66 503	108 903	0.31	40	68	109	0.61	11	16	25
0.02	9603	16 628	27 228	0.32	38	63	102	0.62	10	16	24
0.03	4 269	7 392	12 103	0.33	36	60	96	0.63	10	15	23
0.04	2403	4159	6 809	0.34	34	56	90	0.64	10	15	22
0.05	1539	2263	5 359	0.35	32	53	85	0.65	9	14	21
0.06	1069	1850	3028	0.36	30	50	80	0.66	9	14	20
0.07	787	1 360	2225	0.37	28	47	75	0.67	9	13	20
0.08	604	1042	1704	0.38	37	44	71	0.68	9	13	19
0.09	477	824	1 347	0.39	26	42	67	0.69	8	12	18
0.10	383	661	1081	0.40	24	40	64	0.70	8	12	18
0.11	317	548	896	0.41	23	38	60	0.71	8	11	17
0.12	267	462	754	0.42	22	36	57	0.72	8	11	16
0.13	228	392	640	0.43	21	34	55	0.73	7	11	16
0.14	196	337	550	0.44	20	33	52	0.74	7	10	15
0.15	171	295	481	0.45	19	31	49	0.75	7	10	15
0.16	151	259	422	0.46	19	30	47	0.76	7	10	14
0.17	133	228	373	0.47	18	29	45	0.77	7	9	14
0.18	119	204	332	0.48	17	27	43	0.78	7	9	13
0.19	107	183	297	0.49	16	26	41	0.79	6	9	13
0.20	97	165	270	0.50	16	25	39	0.80	6	9	12
0.21	87	149	242	0.51	15	24	37	0.81	6	8	12
0.22	80	136	211	0.52	15	23	36	0.82	6	8	11
0.23	73	124	202	0.53	14	22	34	0.83	6	8	11
0.24	68	114	185	0.54	14	21	33	0.84	6	7	10
0.25	62	105	170	0.55	13	20	32	0.85	5	7	10
0.26	57	97	157	0.56	13	20	30	0.86	5	7	10
0.27	53	90	145	0.57	12	19	29	0.87	5	7	9
0.28	49	83	135	0.58	12	18	28	0.88	5	7	9
0.29	46	78	125	0.59	11	18	27	0.89	5	6	8
0.30	43	73	117	0.60	11	17	26	0.90	5	6	8

Таблиця І.4 Критичне значення добутку $H_{\alpha(n)}$ [31]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α				Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.10	0.05	0.01	0.001		0.05	0.01	0.001
10	1.65	1.9	2.29	2.62	25	1.941	2.475	3.026
11	1.65	1.9	2.32	2.68	26	1.941	2.479	3.037
12	1.65	1.91	2.35	2.73	27	1.942	2.483	3.047
13	1.65	1.92	2.37	2.77	28	1.943	2.487	3.056
14	1.65	1.92	2.39	2.81	29	1.943	2.49	3.064
15	1.65	1.92	2.4	2.85	30	1.944	2.492	3.071
16	1.65	1.93	2.41	2.87	35	1.947	2.505	3.102
17	1.65	1.93	2.42	2.9	40	1.949	2.514	3.126
18	1.65	1.93	2.43	2.92	45	1.95	2.521	3.145
19	1.65	1.93	2.44	2.94	50	1.951	2.527	3.161
20	1.65	1.94	2.45	2.96	60	1.953	2.535	3.183
21	1.65	1.94	2.45	2.98	70	1.954	2.541	3.198
22	1.65	1.94	2.46	2.99	80	1.955	2.546	3.209
23	1.65	1.94	2.47	3.00	90	1.956	2.55	3.219
24	1.65	1.94	2.47	3.02	100	1.956	2.553	3.226
					∞	1.96	2.576	3.291

Таблиця І.5 Мінімально допустимі значення відношення $R_{\alpha(n)}$ [31]

Обсяг вибірки n	Рівень значущості α			Обсяг вибірки n	Рівень значущості α		
	0.10	0.05	0.01		0.10	0.05	0.01
10	0.268	0.220	0.139	30	0.655	0.623	0.553
11	0.309	0.260	0.174	35	0.693	0.664	0.600
12	0.345	0.296	0.207	40	0.723	0.697	0.639
13	0.378	0.329	0.238	45	0.748	0.723	0.670
14	0.407	0.359	0.268	50	0.768	0.745	0.696
15	0.434	0.386	0.296	55	0.785	0.764	0.718
16	0.458	0.412	0.321	60	0.799	0.780	0.737
17	0.480	0.435	0.346	65	0.811	0.794	0.753
18	0.500	0.456	0.368	70	0.822	0.806	0.768
19	0.519	0.476	0.389	75	0.832	0.816	0.780
20	0.536	0.494	0.409	80	0.841	0.826	0.792
22	0.567	0.527	0.445	90	0.855	0.842	0.811
24	0.593	0.555	0.477	100	0.867	0.855	0.827
26	0.617	0.581	0.505	200	0.926	0.919	0.904
28	0.637	0.603	0.530	300	0.948	0.943	0.933

Таблиця І.6 Критичні значення коефіцієнтів кореляції r –Пірсона
(ρ –Спірмена) для неспрямованих альтернатив [197]

n	p				n	p				n	p			
	0.10	0.05	0.01	0.001		0.10	0.05	0.01	0.001		0.10	0.05	0.01	0.001
5	0.805	0.878	0.959	0.991	33	0.291	0.344	0.442	0.547	61	0.213	0.252	0.327	0.411
6	0.729	0.811	0.917	0.974	34	0.287	0.339	0.436	0.539	62	0.211	0.250	0.325	0.408
7	0.669	0.754	0.875	0.951	35	0.283	0.334	0.430	0.532	63	0.209	0.248	0.322	0.405
8	0.621	0.707	0.834	0.925	36	0.279	0.329	0.424	0.525	64	0.207	0.246	0.320	0.402
9	0.582	0.666	0.798	0.898	37	0.275	0.325	0.418	0.519	65	0.206	0.244	0.317	0.399
10	0.549	0.632	0.765	0.872	38	0.271	0.320	0.413	0.513	66	0.204	0.242	0.315	0.396
11	0.521	0.602	0.735	0.847	39	0.267	0.316	0.408	0.507	67	0.203	0.240	0.313	0.393
12	0.497	0.576	0.708	0.823	40	0.264	0.312	0.403	0.501	68	0.201	0.239	0.310	0.390
13	0.476	0.553	0.684	0.801	41	0.260	0.308	0.398	0.495	69	0.200	0.237	0.308	0.388
14	0.458	0.532	0.661	0.780	42	0.257	0.304	0.393	0.490	70	0.198	0.235	0.306	0.385
15	0.441	0.514	0.641	0.760	43	0.254	0.301	0.389	0.484	80	0.185	0.220	0.286	0.361
16	0.426	0.497	0.623	0.742	44	0.251	0.297	0.384	0.479	90	0.174	0.207	0.270	0.341
17	0.412	0.482	0.606	0.725	45	0.248	0.294	0.380	0.474	100	0.165	0.197	0.256	0.324
18	0.400	0.468	0.590	0.708	46	0.246	0.291	0.376	0.469	110	0.158	0.187	0.245	0.310
19	0.389	0.456	0.575	0.693	47	0.243	0.288	0.372	0.465	120	0.151	0.179	0.234	0.297
20	0.378	0.444	0.561	0.679	48	0.240	0.285	0.368	0.460	130	0.145	0.172	0.225	0.285
21	0.369	0.433	0.549	0.665	49	0.238	0.282	0.365	0.456	140	0.140	0.166	0.217	0.275
22	0.360	0.423	0.537	0.652	50	0.235	0.279	0.361	0.451	150	0.135	0.160	0.210	0.266
23	0.352	0.413	0.526	0.640	51	0.233	0.276	0.358	0.447	200	0.117	0.139	0.182	0.231
24	0.344	0.404	0.515	0.629	52	0.231	0.273	0.354	0.443	250	0.104	0.124	0.163	0.207
25	0.337	0.396	0.505	0.618	53	0.228	0.271	0.351	0.439	300	0.095	0.113	0.149	0.189
26	0.330	0.388	0.496	0.607	54	0.226	0.268	0.348	0.435	350	0.088	0.105	0.138	0.175
27	0.323	0.381	0.487	0.597	55	0.224	0.266	0.345	0.432	400	0.082	0.098	0.129	0.164
28	0.317	0.374	0.479	0.588	56	0.222	0.263	0.341	0.428	450	0.078	0.092	0.121	0.155
29	0.311	0.367	0.471	0.579	57	0.220	0.261	0.339	0.424	500	0.074	0.088	0.115	0.147
30	0.306	0.361	0.463	0.570	58	0.218	0.259	0.336	0.421	600	0.067	0.080	0.105	0.134
31	0.301	0.355	0.456	0.562	59	0.216	0.256	0.333	0.418					
32	0.296	0.349	0.449	0.554	60	0.214	0.254	0.330	0.414					

Таблиця И.7 Критичні значення критерію Фрідмана для $k=3$ [25]

n	Рівень значущості α					n	Рівень значущості α				
	0.001	0.005	0.01	0.05	0.1		0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
5	50	50	42	32	26	18	234	186	162	114	86
6	72	62	54	42	32	19	254	194	182	122	96
7	86	72	62	50	38	20	266	216	186	126	98
8	98	78	72	50	42	21	278	222	194	128	104
9	114	96	86	56	50	22	296	224	200	134	104
10	126	104	96	62	50	23	302	242	216	146	114
11	146	114	104	72	56	24	314	254	222	150	122
12	152	126	114	78	62	25	338	266	224	152	122
13	162	128	122	86	62	26	278	222	194	128	104
14	186	146	128	86	72	27	296	224	200	134	104
15	194	158	134	96	74	28	302	242	216	146	114
16	216	162	150	104	78	29	314	254	222	150	122
17	222	182	158	104	86	30	338	266	224	152	122

Таблиця И.8 Критичні значення критерію Фрідмана для $k=4$ [25]

n	Рівень значущості α					n	Рівень значущості α				
	0.001	0.005	0.01	0.05	0.1		0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
4	74	68	64	52	42	8	184	154	140	102	84
5	105	91	83	65	53	9	211	177	161	115	93
6	128	114	102	76	64	10	242	198	178	128	106
7	157	133	123	91	75						

Таблиця И.9 Критичні значення критерію Фрідмана для $k=5$ [25]

n	Рівень значущості α					n	Рівень значущості α				
	0.001	0.005	0.01	0.05	0.1		0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
3	86	80	76	64	42	5	180	156	146	112	180
4	132	120	112	88	53	6	228	196	178	136	228

Таблиця И.10 Критичні значення критерію Фрідмана для $k=5$ [25]

n	Рівень значущості α					n	Рівень значущості α				
	0.001	0.005	0.01	0.05	0.1		0.001	0.005	0.01	0.05	0.1
2		70	68	64	58	3	139.5	131.5	123.5	103.5	91.5

Таблиця И.11 Критичні значення критерію Фрідмана [79]

<i>n</i>	Рівень значущості α			Рівень значущості α		
	<i>k</i>			<i>k</i>		
	3	4	5	3	4	5
3	5.82	7.00	8.30	5.42	6.20	7.47
4	6.31	7.20	8.80	5.10	6.00	7.58
5	6.10	7.32	8.96	5.21	6.12	7.61
6	6.33	7.40		4.83	6.20	
7	6.00	7.63		4.71	6.26	
8	6.25	7.50		5.00	6.30	
9	6.00			4.67		
10	6.10			4.90		
11	6.09			4.91		
12	6.08			4.67		
13	6.00			4.77		

Таблиця І.12 Верхні критичні значення $H(\alpha, k, n_i; \dots, n_k)$ H -статистики Краскала–Уолліса

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$
2	2	2	0	0	0	4.571			
3	2	1	0	0	0	4.286			
3	2	2	0	0	0	4.500	4.714		
3	3	1	0	0	0	4.571	5.143		
3	3	2	0	0	0	4.556	5.361	5.556	
3	3	3	0	0	0	4.022	5.600	5.956	7.200
4	2	1	0	0	0	4.500			
4	2	2	0	0	0	4.458	5.333	5.500	
4	3	1	0	0	0	4.056	5.208	5.833	
4	3	2	0	0	0	4.511	5.444	6.000	6.444
4	3	3	0	0	0	4.709	5.791	6.155	6.745
4	4	2	0	0	0	4.555	5.455	6.327	7.036
4	4	3	0	0	0	4.545	5.598	0.394	7.144
4	4	4	0	0	0	4.054	5.692	0.015	7.654
5	2	1	0	0	0	4.200	5.000		
5	2	2	0	0	0	4.373	5.160	6.000	6.533
5	3	1	0	0	0	4.018	4.960	6.044	
5	3	2	0	0	0	4.651	5.251	6.004	6.909
5	3	3	0	0	0	4.533	5.648	0.315	7.079
5	4	1	0	0	0	3.987	4.985	5.858	6.955
5	4	2	0	0	0	4.541	5.273	6.068	7.205
5	4	3	0	0	0	4.549	5.656	6.410	7.445
5	4	4	0	0	0	4.668	5.657	6.673	7.760
5	5	1	0	0	0	4.109	5.127	6.000	7.309
5	5	2	0	0	0	4.023	5.338	0.346	7.338
5	5	3	0	0	0	4.545	5.705	0.549	7.578
5	5	4	0	0	0	4.523	5.666	6.760	7.823
5	5	5	0	0	0	4.560	5.780	6.740	8.000
6	2	1	0	0	0	4.200	4.822	5.600	
6	2	2	0	0	0	4.545	5.345	5.745	6.655
6	3	2	0	0	0	3.909	4.855	5.945	6.873
6	3	2	0	0	0	4.682	5.348	6.136	6.970
6	3	3	0	0	0	4.590	5.615	6.436	7.410
6	4	1	0	0	0	4.038	4.947	5.856	7.106
6	4	2	0	0	0	4.419	5.340	6.186	7.340
6	4	3	0	0	0	4.604	5.610	6.538	7.500
6	4	4	0	0	0	4.595	5.681	6.667	7.795
6	5	1	0	0	0	4.128	4.990	5.951	7.182
6	5	2	0	0	0	4.596	5.338	6.196	7.376
6	5	3	0	0	0	4.535	5.602	6.667	7.590

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	$\alpha=0.10$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.025$	$\alpha=0.01$
6	5	4	0	0	0	4.522	5.661	6.750	7.936
6	5	5	0	0	0	4.547	5.729	6.788	8.028
6	6	1	0	0	0	4.000	4.945	5.923	7.121
6	6	2	0	0	0	4.438	5.410	6.210	7.467
6	6	3	0	0	0	4.558	5.625	6.725	7.725
6	6	4	0	0	0	4.548	5.724	6.812	8.000
6	6	5	0	0	0	4.542	5.765	6.848	8.124
6	6	6	0	0	0	4.643	5.801	6.889	8.222
7	1	1	0	0	0	4.267			
7	2	1	0	0	0	4.200	4.706	5.727	
7	2	2	0	0	0	4.526	5.143	5.818	7.000
7	3	1	0	0	0	4.173	4.952	5.758	7.030
7	3	2	0	0	0	4.502	5.357	6.201	6.839
7	3	3	0	0	0	4.603	5.620	6.449	7.228
7	4	1	0	0	0	4.121	4.986	5.791	6.986
7	4	2	0	0	0	4.549	5.376	6.184	7.321
7	4	3	0	0	0	4.527	5.623	6.578	7.550
7	4	4	0	0	0	4.562	5.650	6.707	7.814
7	5	1	0	0	0	4.035	5.064	5.953	7.061
7	5	2	0	0	0	4.419	5.393	6.221	7.450
7	5	3	0	0	0	4.535	5.607	6.627	7.697
7	5	4	0	0	0	4.542	5.733	6.738	7.931
7	5	5	0	0	0	4.571	5.708	6.835	8.108
7	6	1	0	0	0	4.033	5.067	6.067	7.254
7	6	2	0	0	0	4.500	5.357	6.223	7.490
7	6	3	0	0	0	4.550	5.689	6.694	7.756
7	6	4	0	0	0	4.562	5.706	6.787	8.039
7	6	5	0	0	0	4.560	5.770	6.857	8.157
7	6	6	0	0	0	4.530	5.730	6.897	8.257
7	7	1	0	0	0	3.986	4.986	6.057	7.157
7	7	2	0	0	0	4.419	5.398	6.328	7.491
7	7	3	0	0	0	4.613	5.688	6.708	7.810
7	7	4	0	0	0	4.563	5.766	6.788	8.142
7	7	5	0	0	0	4.546	5.746	6.886	8.257
7	7	6	0	0	0	4.568	5.793	6.927	8.345
7	7	7	0	0	0	4.594	5.818	6.954	8.378
8	1	1	0	0	0	4.418			
8	2	1	0	0	0	4.011	4.909	5.420	
8	2	2	0	0	0	4.587	5.356	5.817	6.663
8	3	1	0	0	0	4.010	4.881	6.064	6.804
8	3	2	0	0	0	4.451	5.316	6.195	7.022
8	3	3	0	0	0	4.543	5.617	6.588	7.350
8	4	1	0	0	0	4.038	5.044	5.885	6.973

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	$\alpha=0.10$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.025$	$\alpha=0.01$
8	4	2	0	0	0	4.500	5.393	6.193	7.350
8	4	3	0	0	0	4.529	5.623	6.562	7.585
8	4	4	0	0	0	4.561	5.779	6.750	7.853
8	5	1	0	0	0	3.967	4.869	5.864	7.110
8	5	2	0	0	0	4.466	5.415	6.260	7.440
8	5	3	0	0	0	4.514	5.614	6.614	7.706
8	5	4	0	0	0	4.549	5.718	6.782	7.992
8	5	5	0	0	0	4.555	5.769	6.843	8.116
8	6	1	0	0	0	4.015	5.015	5.933	7.256
8	6	2	0	0	0	4.463	5.404	6.294	7.522
8	6	3	0	0	0	4.575	5.678	6.658	7.796
8	6	4	0	0	0	4.563	5.743	6.795	8.045
8	6	5	0	0	0	4.550	5.750	6.867	8.226
8	6	6	0	0	0	4.599	5.770	6.932	8.313
8	7	1	0	0	0	4.045	5.041	6.047	7.308
8	7	2	0	0	0	4.451	5.403	6.339	7.571
8	7	3	0	0	0	4.556	5.698	6.671	7.872
8	7	4	0	0	0	4.548	5.759	6.837	8.118
8	7	5	0	0	0	4.551	5.782	6.884	8.242
8	7	6	0	0	0	4.553	5.781	6.917	8.333
8	7	7	0	0	0	4.585	5.802	6.980	8.363
8	8	1	0	0	0	4.044	5.039	6.005	7.314
8	8	2	0	0	0	4.509	5.408	6.351	7.654
8	8	3	0	0	0	4.555	5.734	6.682	7.889
8	8	4	0	0	0	4.579	5.743	6.886	8.168
8	8	5	0	0	0	4.573	5.761	6.920	8.297
8	8	6	0	0	0	4.572	5.779	6.953	8.367
8	8	7	0	0	0	4.571	5.791	6.980	8.419
8	8	8	0	0	0	4.595	5.805	6.995	8.465
99	99	99	0	0	0	4.605	5.991	7.378	9.210
2	2	2	1	0	0	5.357	5.679		
2	2	2	2	0	0	5.667	6.167	6.667	6.667
3	2	1	1	0	0	5.143			
3	2	2	1	0	0	5.556	5.833	6.250	
3	2	2	2	0	0	5.644	6.333	6.978	7.133
3	3	1	1	0	0	5.333	6.333	6.333	
3	3	2	1	0	0	5.689	6.244	6.689	7.200
3	3	2	2	0	0	5.745	6.527	7.055	7.636
3	3	3	1	0	0	5.655	6.600	7.036	7.400
3	3	3	2	0	0	5.879	6.727	7.515	8.015
3	3	3	3	0	0	6.026	7.000	7.667	8.538
4	2	1	1	0	0	5.250	5.833		
4	2	2	1	0	0	5.533	6.133	6.533	7.000

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	$\alpha=0.10$	$\alpha=0.05$	$\alpha=0.025$	$\alpha=0.01$
4	2	2	2	0	0	5.755	6.545	7.064	7.391
4	3	1	1	0	0	5.067	6.178	6.711	7.067
4	3	2	1	0	0	5.591	6.309	6.955	7.416
4	3	2	2	0	0	5.750	6.621	7.326	7.871
4	3	3	1	0	0	5.689	6.545	7.326	7.758
4	3	3	2	0	0	5.872	6.795	7.564	8.333
4	3	3	3	0	0	6.016	6.984	7.775	8.659
4	4	1	1	0	0	5.182	5.945	6.955	7.909
4	4	2	1	0	0	5.568	6.386	7.159	7.909
4	4	2	2	0	0	5.808	6.731	7.538	8.346
4	4	3	1	0	0	5.692	6.635	7.500	8.231
4	4	3	2	0	0	5.901	6.874	7.747	8.621
4	4	3	3	0	0	6.019	7.038	7.929	8.876
4	4	4	1	0	0	5.654	6.725	7.648	8.588
4	4	4	2	0	0	5.914	6.957	7.914	8.871
4	4	4	3	0	0	6.042	7.142	8.079	9.075
4	4	4	4	0	0	6.088	7.235	8.228	9.287
99	99	99	99	0	0	6.251	7.815	9.348	11.340
2	2	1	1	1	0	5.786			
2	2	2	1	1	0	6.250	6.750	6.750	
2	2	2	2	1	0	6.600	7.133	7.333	7.533
2	2	2	2		0	6.982	7.418	7.964	8.291
3	2	1	1	1	0	6.139	6.583		
3	2	2	1	1	0	6.511	6.800	7.200	7.600
3	2	2	2	1	0	6.709	7.309	7.745	8.127
3	2	2	2		0	6.955	7.682	8.182	8.682
3	3	1	1	1	0	6.311	7.111	7.467	
3	3	2	1	1	0	6.600	7.200	7.618	
3	3	2	2	1	0	6.788	7.591	8.121	8.576
3	3	2	2		0	7.026	7.910	8.538	9.115
3	3	3	1	1	0	6.788	7.576	8.061	8.424
3	3	3	2	1	0	6.910	7.769	8.449	9.051
3	3	3	2		0	7.121	8.044	8.813	9.505
3	3	3	3	1	0	7.077	8.000	8.703	9.451
3	3	3	3	2	0	7.210	8.200	9.038	9.876
3	3	3	3	3	0	7.333	8.333	9.233	10.200
99	99	99	99	99	0	7.779	9.488	11.140	13.280
2	2	1	1	1	1	0.833			
2	2	2	1	1	1	7.267	7.800		
2	2	2	2	1	1	7.527	8.018	8.345	8.618
2	2	2	2	2	1	7.909	8.455	8.864	9.227
2	2	2	2	2		8.154	8.846	9.385	9.846
3	2	1	1	1	1	7.133	7.467	7.667	

n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6	$\alpha = 0.10$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.025$	$\alpha = 0.01$
3	2	2	1	1	1	7.418	7.945	8.236	8.509
3	2	2	2	1	1	7.727	8.348	8.727	9.136
3	2	2	2	2	1	7.987	8.731	9.218	9.692
3	2	2	2	2		8.198	9.033	9.648	10.220
3	3	1	1	1	1	7.400	7.909	8.564	8.564
3	3	2	1	1	1	7.697	8.303	8.667	9.045
3	3	2	2	1	1	7.872	8.615	9.128	9.628
3	3	2	2	2	1	8.077	8.923	9.549	10.150
3	3	2	2	2	2	8.305	9.190	9.914	10.610

Додаток К
МАТРИЦІ ПЛАНУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНИХ
ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Таблиця К.1 Дворівнева матриця повнофакторного плану першого порядку для двох факторів [51] ⁵⁵⁾

№ досліду	Фактор		№ досліду	Фактор	
	X ₁	X ₂		X ₁	X ₂
1	-1	-1	3	-1	+1
2	+1	-1	4	+1	+1
			5	0	0

Таблиця К.2 Дворівнева матриця повнофакторного плану першого порядку для трьох факторів [51]

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X ₁	X ₂	X ₃		X ₁	X ₂	X ₃
1	-1	-1	-1	5	-1	-1	+1
2	+1	-1	-1	6	+1	-1	+1
3	-1	+1	-1	7	-1	+1	+1
4	+1	+1	-1	8	+1	+1	+1
				9	0	0	0

Таблиця К.3 Дворівнева матриця повнофакторного плану першого порядку для чотирьох факторів

№ досліду	Фактор				№ досліду	Фактор			
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	+1	-1	-1	-1	9	+1	-1	-1	+1
2	-1	-1	-1	-1	10	-1	-1	-1	+1
3	+1	+1	-1	-1	11	+1	+1	-1	+1
4	-1	+1	-1	-1	12	-1	+1	-1	+1
5	+1	-1	+1	-1	13	+1	-1	+1	+1
6	-1	-1	+1	-1	14	-1	-1	+1	+1
7	+1	+1	+1	-1	15	+1	+1	+1	+1
8	-1	+1	+1	-1	16	-1	+1	+1	+1
					17	0	0	0	0

⁵⁵⁾ Додання до матриць лінійних планів, за якими отримуються площину першого порядку (рис. 11.80, а) і б) на с. 795), рядка з нульовими значеннями дозволяє отримувати неповне квадратичне рівняння функції відгуку – гіперболічний параболоїд, рис. 11.77, а) і б) на с. 793.



Таблиця К.4 Дворівнева матриця повнофакторного плану першого порядку для п'яти факторів

№ досліджу	Фактор					№ досліджу	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	-1	-1	-1	-1	-1	17	-1	-1	-1	-1	+1
2	+1	-1	-1	-1	-1	18	+1	-1	-1	-1	+1
3	-1	+1	-1	-1	-1	19	-1	+1	-1	-1	+1
4	+1	+1	-1	-1	-1	20	+1	+1	-1	-1	+1
5	-1	-1	+1	-1	-1	21	-1	-1	+1	-1	+1
6	+1	+1	+1	-1	-1	22	+1	+1	+1	-1	+1
7	-1	+1	+1	-1	-1	23	-1	+1	+1	-1	+1
8	+1	+1	+1	-1	-1	24	+1	+1	+1	-1	+1
9	-1	-1	-1	+1	-1	25	-1	-1	-1	+1	+1
10	+1	-1	-1	+1	-1	26	+1	-1	-1	+1	+1
11	-1	+1	-1	+1	-1	27	-1	+1	-1	+1	+1
12	+1	+1	-1	+1	-1	28	+1	+1	-1	+1	+1
13	-1	-1	+1	+1	-1	29	-1	-1	+1	+1	+1
14	+1	-1	+1	+1	-1	30	+1	-1	+1	+1	+1
15	-1	+1	+1	+1	-1	31	-1	+1	+1	+1	+1
16	+1	+1	+1	+1	-1	32	+1	+1	+1	+1	+1
						33	0	0	0	0	0

Таблиця К.5 Трирівнева матриця повнофакторного ортогонального плану другого порядку для двох факторів [17, 68]^{56, 57)}

Фактор	№ досліджу								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X_1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1	+1	0

⁵⁶⁾ Матриці К.5, К.24, К.31 і К.34 використовуються ППП Statist (див. підрозділ 11.10 Використання ППП Statist для аналізу результатів багатфакторного активного експерименту).

⁵⁷⁾ План міститься к модулі   Планирование экспериментов ППП Statistica.

Таблиця К.6 Трирівнева матриця повнофакторного ротатбельного плану другого порядку для двох факторів [19]

Фактор	№ досліду								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X_1	-1	+1	-1	+1	-1.41 ^{*)}	+1.41	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1.41	+1.41	0
*) Зіркове плече $\alpha = \sqrt{2}$.									

Таблиця К.7 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку для двох факторів [68]⁵⁷⁾

Фактор	№ досліду										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X_1	-1	+1	-1	+1	-1.414	+1.414	0	0	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1.414	+1.414	0	0	0

Таблиця К.8 Трирівнева матриця центрального композиційного уніформ-ротатбельного плану другого порядку для двох факторів [17, 141]

Фактор	№ досліду												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X_1	-1	+1	-1	+1	-1.414	+1.414	0	0	0	0	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1.414	+1.414	0	0	0	0	0

Таблиця К.9 Трирівнева матриця другого порядку повнофакторного експерименту з доданими дослідями для двох факторів [96, 150]

Фактор	№ досліду															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X_1	-1	+1	-1	+1	-1.414	+1.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1.414	+1.414	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблиця К.10 Трирівнева матриця центрального композиційного ортогонального другого порядку для двох факторів [17]

Фактор	№ досліду										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X_1	-1	+1	-1	+1	-1.15	+1.15	0	0	0	0	0
X_2	-1	-1	+1	+1	0	0	-1.15	+1.15	0	0	0

Таблиця К.11 Трирівнева матриця центрального композиційного уніформ-ротатбельного плану другого порядку для двох факторів [17]

Фактор	№ досліду											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X_1	1	0.5	-0.5	-1	-0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
X_2	0	0.866	0.866	0	-0.866	-0.866	0	0	0	0	0	0

Таблиця К.12 Трирівнева матриця ротатбельного плану центрального другого порядку для двох факторів на основі шестикутника [96]

Фактор	№ досліду									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_1	-1	+1	-0.5	0.5	-0.5	0.5	0	0	0	0
X_2	0	0	-0.866	-0.866	+0.866	+0.866	0	0	0	0

Таблиця К.13 Трирівнева матриця повнофакторного плану другого порядку для трьох факторів ⁵⁷⁾

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	17	0	-1	-1
2	+1	-1	-1	18	0	+1	-1
3	-1	+1	-1	19	0	-1	+1
4	+1	+1	-1	20	0	+1	+1
5	-1	-1	+1	21	-1	0	0
6	+1	-1	+1	22	+1	0	0
7	-1	+1	+1	23	0	-1	0
8	+1	+1	+1	24	0	+1	0
9	-1	-1	0	25	0	0	-1
10	+1	-1	0	26	0	0	+1
11	-1	+1	0	27	0	0	0
12	+1	+1	0				
13	-1	0	-1				
14	+1	0	-1				
15	-1	0	+1				
16	+1	0	+1				

Таблиця К.14 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку для трьох факторів [19]

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1.215 ^{*)}	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1.215	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1.215	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1.215	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1.215
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1.215
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1				

^{*)} Зіркове плече $\alpha = \sqrt{0.5\sqrt{n \cdot n_0} - n_0} = \sqrt{0.5\sqrt{15 \cdot 8} - 8} = 1.215$.

Таблиця К.15 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку для трьох факторів [19]

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1.682 ^{*)}	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1.682	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1.682	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1.682	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1.682
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1.682
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1				

^{*)} Зіркове плече $\alpha = \sqrt[4]{2^3}$.

Таблиця К.16 Трирівнева матриця центрального композиційного уніформ-ротатбельного плану другого порядку для трьох факторів [68, 121, 125]

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	11	0	-1.682	0
2	+1	-1	-1	12	0	+1.682	0
3	-1	+1	-1	13	0	0	-1.682
4	+1	+1	-1	14	0	0	+1.682
5	-1	-1	+1	15	0	0	0
6	+1	-1	+1	16	0	0	0
7	-1	+1	+1	17	0	0	0
8	+1	+1	+1	18	0	0	0
9	-1.682	0	0	19	0	0	0
10	+1.682	0	0	20	0	0	0

Таблиця К.17 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку для трьох факторів [68] ⁵⁷⁾

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1.682	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1.682	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1.682	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1.682	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1.682
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1.682
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1	16	0	0	0

Таблиця К.18 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного повнофакторного плану другого порядку для трьох факторів [96]⁵⁷⁾

№ досліджу	Фактор			№ досліджу	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1.682	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1.682	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1.682	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1.682	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1.682
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1.682
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1				

Таблиця К.19 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатбельного плану другого порядку для трьох факторів⁵⁷⁾

№ досліджу	Блок	Фактор		
		X_1	X_2	X_3
1	1	-1	-1	-1
2	1	-1	1	1
3	1	1	-1	1
4	1	1	1	-1
5	1	0	0	0
6	2	-1	-1	1
7	2	-1	1	-1
8	2	1	-1	-1
9	2	1	1	1
10	2	0	0	0
11	3	-1.67332	0	0
12	3	1.67332	0	0
13	3	0	-1.67332	0
14	3	0	1.67332	0
15	3	0	0	-1.67332
16	3	0	0	1.67332
17	3	0	0	0

Таблиця К.20 Трирівнева матриця центрального композиційного
уніформ–ротатбельного плану другого порядку для
трьох факторів ⁵⁷⁾

№ досліду	Блок	Фактор			№ досліду	Блок	Фактор		
		X_1	X_2	X_3			X_1	X_2	X_3
1	1	-1	-1	-1	10	2	-1.76383	0	0
2	1	+1	-1	-1	11	2	1.76383	0	0
3	1	-1	+1	-1	12	2	0	-1.76383	0
4	1	+1	+1	-1	13	2	0	1.76383	0
5	1	-1	-1	+1	14	2	0	0	-1.76383
6	1	+1	-1	+1	15	2	0	0	1.76383
7	1	-1	+1	+1	16	2	0	0	0
8	1	+1	+1	+1					
9	1	0	0	0					

Таблиця К.21 Трирівнева матриця уточненого центрального
композиційного ортогонального плану другого порядку
для трьох факторів [68]

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1.215	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1.215	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1.215	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1.215	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1.215
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1.215
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1				

Таблиця К.22 Трирівнева матриця центрального композиційного ротативного плану другого порядку для трьох факторів [125] ⁵⁸⁾

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-2	0	0
2	+1	-1	-1	10	+2	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-2	0
4	+1	+1	-1	12	0	+2	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-2
6	+1	-1	+1	14	0	0	+2
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1	16	0	0	0

Таблиця К.23 Трирівнева матриця центрального композиційного ортогонального плану другого порядку для трьох факторів [17]

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1
7	-1	+1	+1	15	0	0	0
8	+1	+1	+1	16	0	0	0
				17	0	0	0

⁵⁸⁾ Точки 1–8 утворюють кубічну частину плану, еквівалентну факторному плану 2^3 . Точки 9 і 14 — це обробки в зіркових точках, а 15–16 — в центральних.

Таблиця К.24 Трирівнева матриця оптимального плану Бокса
другого порядку для трьох факторів (B_3)⁵⁹⁾

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1	0	0
2	+1	-1	-1	10	+1	0	0
3	-1	+1	-1	11	0	-1	0
4	+1	+1	-1	12	0	+1	0
5	-1	-1	+1	13	0	0	-1
6	+1	-1	+1	14	0	0	+1
7	-1	+1	+1				
8	+1	+1	+1				

Таблиця К.25 Трирівнева матриця ортогонального плану Бокса–Бенкіна
другого порядку для трьох факторів (BB_3) [68]⁵⁷⁾

№ досліду	Фактор			№ досліду	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	+1	+1	0	9	0	+1	+1
2	+1	-1	0	10	0	+1	-1
3	-1	+1	0	11	0	-1	+1
4	-1	-1	0	12	0	-1	-1
5	+1	0	+1	13	0	0	0
6	+1	0	-1	14	0	0	0
7	-1	0	+1	15	0	0	0
8	-1	0	-1				

⁵⁹⁾ У ПП Statist файл з матрицею К.24 названий **B.003**.

Таблиця К.26 Трирівнева матриця D –оптимального плану другого порядку на кубі для трьох факторів [58]

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	-1	-1	9	-1	+1	0
2	+1	+1	-1	10	+1	+1	0
3	-1	-1	-1	11	-1	-1	0
4	+1	+1	-1	12	+1	-1	0
5	-1	-1	+1	13	-1	0	+1
6	+1	+1	+1	14	+1	0	+1
7	-1	-1	+1	15	-1	0	-1
8	+1	+1	+1	16	+1	0	-1
				17	0	-1	+1
				18	0	+1	+1
				19	0	-1	-1
				20	0	+1	-1
				21	0	0	0

Таблиця К.27 Матриця D –оптимального плану другого порядку на кулі для трьох факторів [58]

№ дослід	Фактор			№ дослід	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	-1	0	0	7	0.577	0.577	0.577
2	+1	0	0	8	-1.732	0.577	0.577
3	0	-1	0	9	1.732	-1.732	1.732
4	0	+1	0	10	-1.732	-1.732	1.732
5	0	0	-1	11	0.577	0.577	-0.577
6	0	0	+1	12	-1.732	0.577	-0.577
				13	1.732	-0.577	-1.732
				14	-0.577	-0.577	-1.732
				15	0	0	0

Таблиця К.28 Трирівнева матриця симетричного квазі- D -оптимального плану другого порядку для трьох факторів

№ досліджу	Фактор			№ досліджу	Фактор		
	X_1	X_2	X_3		X_1	X_2	X_3
1	0	-1	-1	9	+1	-1	0
2	0	+1	-1	10	-1	-1	0
3	0	-1	+1	11	+1	+1	0
4	0	+1	+1	12	-1	+1	0
5	-1	0	-1	13	0	0	0
6	+1	0	-1				
7	-1	0	+1				
8	+1	0	+1				

Таблиця К.29 Трирівнева матриця центрального композиційного уніформ-ротатбельного плану другого порядку для чотирьох факторів [68]

№ досліджу	Фактор				№ досліджу	Фактор			
	X_1	X_2	X_3	X_4		X_1	X_2	X_3	X_4
1	-1	-1	-1	-1	17	-2	0	0	0
2	+1	-1	-1	-1	18	+2	0	0	0
3	-1	+1	-1	-1	19	0	-2	0	0
4	+1	+1	-1	-1	20	0	+2	0	0
5	-1	-1	+1	-1	21	0	0	-2	0
6	+1	-1	+1	-1	22	0	0	+2	0
7	-1	+1	+1	-1	23	0	0	0	-2
8	+1	+1	+1	-1	24	0	0	0	+2
9	-1	-1	-1	+1	25	0	0	0	0
10	+1	-1	-1	+1	26	0	0	0	0
11	-1	+1	-1	+1	27	0	0	0	0
12	+1	+1	-1	+1	28	0	0	0	0
13	-1	-1	+1	+1	29	0	0	0	0
14	+1	-1	+1	+1	30	0	0	0	0
15	-1	+1	+1	+1	31	0	0	0	0
16	+1	+1	+1	+1					

Таблиця К.30 Трирівнева матриця центрального композиційного ротатабельного плану другого порядку для чотирьох факторів [68]

№ досліду	Фактор				№ досліду	Фактор			
	X_1	X_2	X_3	X_4		X_1	X_2	X_3	X_4
1	+1	-1	-1	-1	17	-2	0	0	0
2	-1	-1	-1	-1	18	+2	0	0	0
3	+1	+1	-1	-1	19	0	-2	0	0
4	-1	+1	-1	-1	20	0	+2	0	0
5	+1	-1	+1	-1	21	0	2	-2	0
6	-1	-1	+1	-1	22	0	2	+2	0
7	+1	+1	+1	-1	23	0	2	0	-2
8	-1	+1	+1	-1	24	0	2	0	+2
9	+1	-1	-1	+1	25	0	0	0	0
10	-1	-1	-1	+1	26	0	0	0	0
11	+1	+1	-1	+1					
12	-1	+1	-1	+1					
13	+1	-1	+1	+1					
14	-1	-1	+1	+1					
15	+1	+1	+1	+1					
16	-1	+1	+1	+1					

Таблиця К.31 Трирівнева матриця оптимального плану Бокса
другого порядку для чотирьох факторів (B_4) [153] ⁶⁰⁾

№ дослід	Фактор				№ дослід	Фактор			
	X_1	X_2	X_3	X_4		X_1	X_2	X_3	X_4
1	+1	-1	-1	-1	17	-1	0	0	0
2	-1	-1	-1	-1	18	+1	0	0	0
3	+1	+1	-1	-1	19	0	-1	0	0
4	-1	+1	-1	-1	20	0	+1	0	0
5	+1	-1	+1	-1	21	0	0	-1	0
6	-1	-1	+1	-1	22	0	0	+1	0
7	+1	+1	+1	-1	23	0	0	0	-1
8	-1	+1	+1	-1	24	0	0	0	+1
9	+1	-1	-1	+1					
10	-1	-1	-1	+1					
11	+1	+1	-1	+1					
12	-1	+1	-1	+1					
13	+1	-1	+1	+1					
14	-1	-1	+1	+1					
15	+1	+1	+1	+1					
16	-1	+1	+1	+1					

⁶⁰⁾ Ці, дещо змінені за порядком рядків порівняно з [153], файли з матрицями К.31 і К.34 у ПП **Statist** мають назви відповідно **B.004** і **B.005**.

Таблиця К.32 Трирівнева матриця оптимального плану Бокса–Бенкіна другого порядку для чотирьох факторів (BB_4) [68]⁵⁷⁾

№ досліджу	Блок	Фактор			
		X_1	X_2	X_3	X_4
1	1	-1	-1	0	0
2	1	1	-1	0	0
3	1	-1	1	0	0
4	1	1	1	0	0
5	1	0	0	-1	-1
6	1	0	0	1	-1
7	1	0	0	-1	1
8	1	0	0	1	1
9	1	0	0	0	0
10	2	-1	0	0	-1
11	2	1	0	0	-1
12	2	-1	0	0	1
13	2	1	0	0	1
14	2	0	-1	-1	0
15	2	0	1	-1	0
16	2	0	-1	1	0
17	2	0	1	1	0
18	2	0	0	0	0
19	3	-1	0	-1	0
20	3	1	0	-1	0
21	3	-1	0	1	0
22	3	1	0	1	0
23	3	0	-1	0	-1
24	3	0	1	0	-1
25	3	0	-1	0	1
26	3	0	1	0	1
27	3	0	0	0	0

Таблиця К.33 Трирівнева матриця оптимального плану Хартлі – Коно
другого порядку для чотирьох факторів (**Ha-Ko₄**) [68, 153] ⁶¹⁾

№ досліду	Фактор				№ досліду	Фактор			
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	1	-1	-1	-1	10	0	1	-1	1
2	-1	1	-1	-1	11	-1	0	-1	-1
3	-1	-1	1	-1	12	1	0	1	1
4	-1	-1	-1	1	13	-1	1	-1	0
5	-1	1	-1	1	14	-1	0	1	1
6	1	-1	1	-1	15	0	1	1	-1
7	-1	-1	1	1	16	1	-1	1	0
8	1	1	1	1	17	1	-1	0	1
9	0	0	0	0	18	0	-1	1	-1

⁶¹⁾ У ПП **Statist** файл з матрицею табл. К.33 має назву **Нк.004**.

Таблиця К.34 Трирівнева матриця оптимального плану Бокса
другого порядку для п'яти факторів (B_5) [68, 153] ⁶⁰⁾

№ дослід	Фактор					№ дослід	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	-1	-1	-1	+1	-1	22	+1	+1	+1	+1	+1
2	+1	-1	-1	+1	-1	23	-1	+1	+1	+1	+1
3	-1	+1	-1	+1	-1	24	+1	+1	+1	+1	+1
4	+1	+1	-1	+1	-1	25	-1	-1	-1	-1	+1
5	-1	-1	+1	+1	-1	26	+1	-1	-1	-1	+1
6	+1	+1	+1	+1	-1	27	-1	+1	-1	-1	+1
7	-1	+1	+1	+1	-1	28	+1	+1	-1	-1	+1
8	+1	+1	+1	+1	-1	29	-1	-1	+1	-1	+1
9	-1	-1	-1	-1	-1	30	+1	-1	+1	-1	+1
10	+1	-1	-1	-1	-1	31	-1	+1	+1	-1	+1
11	-1	+1	-1	-1	-1	32	+1	+1	+1	-1	+1
12	+1	+1	-1	-1	-1	33	-1	0	0	0	0
13	-1	-1	+1	-1	-1	34	+1	0	0	0	0
14	+1	-1	+1	-1	-1	35	0	-1	0	0	0
15	-1	+1	+1	-1	-1	36	0	+1	0	0	0
16	+1	+1	+1	-1	-1	37	0	0	-1	0	0
17	-1	-1	-1	+1	+1	38	0	0	+1	0	0
18	+1	-1	-1	+1	+1	39	0	0	0	-1	0
19	-1	+1	-1	+1	+1	40	0	0	0	+1	0
20	+1	+1	-1	+1	+1	41	0	0	0	0	-1
21	-1	-1	+1	+1	+1	42	0	0	0	0	+1

Таблиця К.35 Трирівнева матриця ротатабельного плану Бокса
другого порядку для п'яти факторів [68]

№ дослід	Фактор					№ дослід	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	1	-1	-1	-1	-1	14	-1	1	-1	1	1
2	-1	1	-1	-1	-1	15	-1	-1	1	1	1
3	-1	-1	1	-1	-1	16	1	1	1	1	1
4	1	1	1	-1	-1	17	-2	0	0	0	0
5	-1	-1	-1	1	-1	18	2	0	0	0	0
6	1	1	-1	1	-1	19	0	-2	0	0	0
7	1	-1	1	1	-1	20	0	2	0	0	0
8	-1	1	1	1	-1	21	0	0	-2	0	0
9	-1	-1	-1	-1	1	22	0	0	2	0	0
10	1	1	-1	-1	1	23	0	0	2	-2	0
11	1	-1	1	-1	1	24	0	0	2	2	0
12	-1	1	1	-1	1	25	0	0	2	0	-2
13	1	-1	-1	1	1	26	0	0	2	0	2

Таблиця К.36 Трирівнева матриця ротатабельного плану Бокса–
Бенкіна другого порядку для п'яти факторів [68]⁵⁷⁾

№ дослідку	Блок	Фактор					№ дослідку	Блок	Фактор				
		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5			X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	1	-1	-1	0	0	0	24	2	0	-1	-1	0	0
2	1	1	-1	0	0	0	25	2	0	1	-1	0	0
3	1	-1	1	0	0	0	26	2	0	-1	1	0	0
4	1	1	1	0	0	0	27	2	0	1	1	0	0
5	1	0	0	-1	-1	0	28	2	-1	0	0	-1	0
6	1	0	0	1	-1	0	29	2	1	0	0	-1	0
7	1	0	0	-1	1	0	30	2	-1	0	0	1	0
8	1	0	0	1	1	0	31	2	1	0	0	1	0
9	1	0	-1	0	0	-1	32	2	0	0	-1	0	-1
10	1	0	1	0	0	-1	33	2	0	0	1	0	-1
11	1	0	-1	0	0	1	34	2	0	0	-1	0	1
12	1	0	1	0	0	1	35	2	0	0	1	0	1
13	1	-1	0	-1	0	0	36	2	-1	0	0	0	-1
14	1	1	0	-1	0	0	37	2	1	0	0	0	-1
15	1	-1	0	1	0	0	38	2	-1	0	0	0	1
16	1	1	0	1	0	0	39	2	1	0	0	0	1
17	1	0	0	0	-1	-1	40	2	0	-1	0	-1	0
18	1	0	0	0	1	-1	41	2	0	1	0	-1	0
19	1	0	0	0	-1	1	42	2	0	-1	0	1	0
20	1	0	0	0	1	1	43	2	0	1	0	1	0
21	1	0	0	0	0	0	44	2	0	0	0	0	0
22	1	0	0	0	0	0	45	2	0	0	0	0	0
23	1	0	0	0	0	0	46	2	0	0	0	0	0

Таблиця К.37 Трирівнева матриця оптимального плану Хартлі
другого порядку для п'яти факторів (H_5) [125]

№ досліду	Фактор					№ досліду	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	1	1	1	1	1	17	0	0	0	0	0
2	-1	-1	1	1	1	18	1	0	0	0	0
3	-1	1	-1	-1	-1	19	-1	0	0	0	0
4	1	-1	-1	-1	-1	20	0	1	0	0	0
5	-1	1	-1	1	1	21	0	-1	0	0	0
6	1	-1	-1	1	1	22	0	0	1	0	0
7	1	1	1	-1	-1	23	0	0	-1	0	0
8	-1	-1	1	-1	-1	24	0	0	0	1	0
9	-1	1	1	1	-1	25	0	0	0	-1	0
10	1	-1	1	1	-1	26	0	0	0	0	1
11	1	1	-1	-1	1	27	0	0	0	0	-1
12	-1	-1	-1	-1	1						
13	-1	1	1	-1	1						
14	1	-1	1	-1	1						
15	1	1	-1	1	-1						
16	-1	-1	-1	1	-1						

Таблиця К.38 Трирівнева матриця оптимального плану Вестлейра
другого порядку для п'яти факторів (W_5) [125]

№ досліду	Фактор					№ досліду	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	1	1	1	1	-1	13	1	0	0	0	0
2	1	1	-1	-1	-1	14	-1	0	0	0	0
3	-1	1	1	-1	-1	15	0	1	0	0	0
4	-1	1	-1	1	-1	16	0	-1	0	0	0
5	1	-1	1	1	1	17	0	0	1	0	0
6	1	-1	-1	-1	1	18	0	0	-1	0	0
7	-1	-1	1	-1	1	19	0	0	0	1	0
8	-1	-1	-1	1	1	20	0	0	0	-1	0
9	-1	1	-1	-1	1	21	0	0	0	0	1
10	-1	1	1	1	1	22	0	0	0	0	-1
11	1	1	-1	1	1	23	0	0	0	0	0
12	1	1	1	-1	1						

Таблиця К.39 Трирівнева матриця некомпозиційного D -оптимального плану другого порядку для п'яти факторів Кіфера (Ki_{75}) [68, 125]

№ дослід	Фактор					№ дослід	Фактор				
	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
1	-1	-1	-1	+1	-1	33	0	0	1	1	1
2	+1	-1	-1	+1	-1	34	1	0	0	1	1
3	-1	+1	-1	+1	-1	35	0	0	-1	-1	1
4	+1	+1	-1	+1	-1	36	-1	-1	1	0	0
5	-1	-1	+1	+1	-1	37	0	-1	0	1	1
6	+1	+1	+1	+1	-1	38	-1	0	0	1	1
7	-1	+1	+1	+1	-1	39	-1	0	1	1	0
8	+1	+1	+1	+1	-1	40	-1	1	0	1	0
9	-1	-1	-1	-1	-1	41	1	0	0	-1	-1
10	+1	-1	-1	-1	-1	42	1	0	-1	0	-1
11	-1	+1	-1	-1	-1	43	0	1	-1	1	0
12	+1	+1	-1	-1	-1	44	0	1	0	-1	1
13	-1	-1	+1	-1	-1	45	1	0	0	-1	1
14	+1	-1	+1	-1	-1	46	-1	0	1	0	-1
15	-1	+1	+1	-1	-1	47	0	1	1	-1	0
16	+1	+1	+1	-1	-1	48	1	1	-1	0	0
17	-1	-1	-1	+1	+1	49	1	1	0	-1	0
18	+1	-1	-1	+1	+1	50	0	-1	-1	0	-1
19	-1	+1	-1	+1	+1	51	-1	0	-1	0	-1
20	+1	+1	-1	+1	+1	52	-1	0	-1	-1	0
21	-1	-1	+1	+1	+1						
22	+1	+1	+1	+1	+1						
23	-1	+1	+1	+1	+1						
24	+1	+1	+1	+1	+1						
25	-1	-1	-1	-1	+1						
26	+1	-1	-1	-1	+1						
27	-1	+1	-1	-1	+1						
28	+1	+1	-1	-1	+1						
29	-1	-1	+1	-1	+1						
30	+1	-1	+1	-1	+1						
31	-1	+1	+1	-1	+1						
32	+1	+1	+1	-1	+1						

Таблиця К.40 Трирівнева матриця ротатбельного плану Бокса–Бенкіна
другого порядку для шести факторів [68]

№ дослід	Фактор						№ дослід	Фактор					
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆
1	+1	+1	0	+1	0	0	28	+1	0	0	-1	-1	0
2	1	1	0	-1	0	0	29	-1	0	0	1	1	0
3	1	-1	0	1	0	0	30	-1	0	0	1	-1	0
4	1	-1	0	-1	0	0	31	-1	0	0	-1	1	0
5	-1	1	0	1	0	0	32	-1	0	0	-1	-1	0
6	-1	1	0	-1	0	0	33	0	1	0	0	1	1
7	-1	-1	0	1	0	0	34	0	1	0	0	1	-1
8	-1	-1	0	-1	0	0	35	0	1	0	0	-1	1
9	0	1	1	0	1	0	36	0	1	0	0	-1	-1
10	0	1	1	0	-1	0	37	0	-1	0	0	+1	1
11	0	1	-1	0	1	0	38	0	-1	0	0	1	-1
12	0	1	-1	0	-1	0	39	0	-1	0	0	-1	1
13	0	-1	1	0	1	0	40	0	-1	0	0	-1	-1
14	0	-1	+1	0	-1	0	41	1	0	1	0	0	1
15	0	-1	-1	0	1	0	42	1	0	1	0	0	-1
16	0	-1	-1	0	-1	0	43	1	0	-1	0	0	1
17	0	0	1	1	0	1	44	1	0	-1	0	0	-1
18	0	0	1	1	0	-1	45	-1	0	1	0	0	1
19	0	0	1	-1	0	1	46	-1	0	1	0	0	-1
20	0	0	1	-1	0	-1	47	-1	0	-1	0	0	1
21	0	0	-1	1	0	1	48	-1	0	-1	0	0	-1
22	0	0	-1	1	0	-1	49	0	0	0	0	0	0
23	0	0	-1	-1	0	1	50	0	0	0	0	0	0
24	0	0	-1	-1	0	-1	51	0	0	0	0	0	0
25	1	0	0	1	1	0	52	0	0	0	0	0	0
26	1	0	0	1	-1	0	53	0	0	0	0	0	0
27	1	0	0	-1	1	0	54	0	0	0	0	0	0

Таблиця К.41 Трирівнева матриця ротатбельного плану Бокса–Бенкіна другого порядку для семи факторів [68]

№ дослід	Фактор							№ дослід	Фактор						
	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
1	0	0	0	1	1	1	0	32	-1	-1	0	-1	0	0	0
2	0	0	0	1	1	-1	0	33	0	0	1	1	0	0	1
3	0	0	0	1	-1	1	0	34	0	0	1	1	0	0	-1
4	0	0	0	1	-1	-1	0	35	0	0	1	-1	0	0	1
5	0	0	0	-1	1	1	0	36	0	0	1	-1	0	0	-1
6	0	0	0	-1	1	-1	0	37	0	0	-1	1	0	0	1
7	0	0	0	-1	-1	1	0	38	0	0	-1	1	0	0	-1
8	0	0	0	-1	-1	-1	0	39	0	0	-1	-1	0	0	1
9	1	0	0	0	0	1	1	40	0	0	-1	-1	0	0	-1
10	1	0	0	0	0	1	-1	41	1	0	1	0	1	0	0
11	1	0	0	0	0	-1	1	42	1	0	1	0	-1	0	0
12	1	0	0	0	0	-1	-1	43	1	0	-1	0	1	0	0
13	-1	0	0	0	0	1	1	44	1	0	-1	0	-1	0	0
14	-1	0	0	0	0	1	-1	45	-1	0	1	0	+1	0	0
15	-1	0	0	0	0	-1	1	46	-1	0	1	0	-1	0	0
16	-1	0	0	0	0	-1	-1	47	-1	0	-1	0	1	0	0
17	0	1	0	0	1	0	1	48	-1	0	-1	0	-1	0	0
18	0	1	0	0	1	0	-1	49	0	1	1	0	0	1	0
19	0	1	0	0	-1	0	1	50	0	1	1	0	0	-1	0
20	0	1	0	0	-1	0	-1	51	0	1	-1	0	0	1	0
21	0	-1	0	0	1	0	1	52	0	1	-1	0	0	-1	0
22	0	-1	0	0	1	0	-1	53	0	-1	1	0	0	1	0
23	0	-1	0	0	-1	0	1	54	0	-1	1	0	0	-1	0
24	0	-1	0	0	-1	0	-1	55	0	-1	-1	0	0	1	0
25	1	1	0	1	0	0	0	56	0	-1	-1	0	0	-1	0
26	1	1	0	-1	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
27	+1	-1	0	1	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
28	1	-1	0	-1	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0
29	-1	1	0	1	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0
30	-1	1	0	-1	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0
31	-1	-1	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0

Таблиця К.42 Лінійна тернарна матриця ⁶²⁾

№ дослід ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1

Таблиця К.43 Квадратична тернарна матриця

№ дослід ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.5	0	0.5
5	0.5	0.5	0
6	0	0.5	0.5

Таблиця К.44 Кубічна тернарна матриця трифакторного симплекс–
центроїдного неповного кубічного плану [84] ⁵⁷⁾

№ дослід ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.5	0.5	0
5	0.5	0	0.5
6	0	0.5	0.5
7	0.333333	0.333333	0.333333

⁶²⁾ В табл. К.42–К.47 точки чистих компонентів наведено жирним шрифтом, точки подвійних (бінарних) систем — нормальним, точки потрійних сумішей — похилим шрифтом.

⁶³⁾ Номер дослід в табл. К.42–К.47 відповідає точці симплексної решітки ділення трикутника на рис. 11.112, с. 855.

Таблиця К.45 Кубічна тернарна матриця трифакторного симплекс–
вершинного плану другого ступеня із внутрішніми
точками та загальним центроїдом ⁵⁷⁾

№ дослідів ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.5	0.5	0
5	0.5	0	0.5
6	0	0.5	0.5
7	0.666667	0.166667	0.166667
8	0.166667	0.666667	0.166667
9	0.166667	0.166667	0.666667
10	0.333333	0.333333	0.333333

Таблиця К.46 Кубічна тернарна матриця [84]

№ дослідів ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.33(3)	0	0.66(6)
5	0.66(6)	0	0.33(3)
6	0.33(3)	0.66(6)	0
7	0.66(6)	0.33(3)	0
8	0	0.33(3)	0.66(6)
9	0	0.66(6)	0.33(3)
10	0.33(3)	0.33(3)	0.33(3)

Таблиця К.47 Квартиктна (четвертого ступеня)
тернарна матриця [84]

№ дослід ⁶³⁾	Частки факторів		
	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.50	0	0.5
5	0.50	0.5	0.00
6	0	0.50	0.50
7	0.25	0	0.75
8	0.75	0	0.25
9	0.25	0.75	0
10	0.75	0.25	0
11	0	0.25	0.75
12	0	0.75	0.25
13	0.25	0.25	0.50
14	0.50	0.25	0.25
15	0.25	0.50	0.25

Додаток Л
РОЗРАХУНОК ПАРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ФУНКЦІЇ ВІДКЛИКУ
(див. табл. 11.103 с. 843)

Третій інваріант

$$\begin{aligned} F2 &= 2 * B9 & G2 &= B6 & H2 &= B7 \\ F3 &= G2 & G3 &= 2 * B10 & H3 &= B8 \\ F4 &= H2 & G4 &= H3 & H4 &= 2 * B11 \\ J3 &= \text{МОПРЕД}(F2:H4) \end{aligned}$$

Значення x

$$\begin{aligned} F6 &= B3 & G6 &= B6 & H6 &= B7 \\ F7 &= B4 & G7 &= 2 * B10 & H7 &= B8 \\ F8 &= B5 & G8 &= H3 & H8 &= 2 * B11 \\ J7 &= \text{МОПРЕД}(F6:H8) \end{aligned}$$

Значення y

$$\begin{aligned} N2 &= 2 * B9 & O2 &= B3 & P2 &= B7 \\ N3 &= G2 & O3 &= B4 & P3 &= B8 \\ N4 &= H2 & O4 &= B5 & P4 &= 2 * B11 \\ R3 &= \text{МОПРЕД}(N2:P4) \end{aligned}$$

Значення z

$$\begin{aligned} N6 &= 2 * B9 & O6 &= B6 & P6 &= B3 \\ N7 &= G2 & O7 &= 2 * B10 & P7 &= B4 \\ N8 &= H2 & O8 &= H3 & P8 &= B5 \\ R7 &= \text{МОПРЕД}(N6:P8) \end{aligned}$$

Нульові значення

$$\begin{aligned} x_{\phi} & \quad B14 = F22 \\ y_{\phi} & \quad B15 = G20 \\ z_{\phi} & \quad B16 = K20 \\ Y_{\phi} & \quad B17 = B14 * B3 + B15 * B4 + B16 * B5 + B15 * B14 * B6 + B14 * B16 * B7 + \\ & \quad + B15 * B16 * B8 + B14 * B14 * B9 + B15 * B15 * B10 + B16 * B16 * B11 + B2 \end{aligned}$$

Парні залежності при нульових рівнях

Y_{xy}

$$\begin{aligned} H12 &= \$B\$2 + \$B\$3 * F12 + \$B\$4 * G12 + \$B\$5 * \$B\$22 + \$B\$6 * F12 * G12 + \$B\$7 * F12 * \$B\$22 + \\ & \quad + \$B\$8 * \$B\$22 * G12 + \$B\$9 * F12 * F12 + \$B\$10 * G12 * G12 + \$B\$11 * \$B\$22 * \$B\$22 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H25 &= \$B\$2 + \$B\$3 * F25 + \$B\$4 * G25 + \$B\$5 * \$B\$22 + \$B\$6 * F25 * G25 + \$B\$7 * F25 * \$B\$22 + \\ & \quad + \$B\$8 * \$B\$22 * G25 + \$B\$9 * F25 * F25 + \$B\$10 * G25 * G25 + \$B\$11 * \$B\$22 * \$B\$22 \end{aligned}$$

Y_{xz}

$$\begin{aligned} L12 &= \$B\$2 + \$B\$3 * J12 + \$B\$4 * \$B\$21 + \$B\$5 * K12 + \$B\$6 * J12 * \$B\$21 + \$B\$7 * J12 * K12 + \\ & \quad + \$B\$8 * \$B\$21 * K12 + \$B\$9 * J12 * J12 + \$B\$10 * \$B\$21 * \$B\$21 + \$B\$11 * K12 * K12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L25 &= \$B\$2 + \$B\$3 * J25 + \$B\$4 * \$B\$21 + \$B\$5 * K25 + \$B\$6 * J25 * \$B\$21 + \$B\$7 * J25 * K25 + \\ & \quad + \$B\$8 * \$B\$21 * K25 + \$B\$9 * J25 * J25 + \$B\$10 * \$B\$21 * \$B\$21 + \$B\$11 * K25 * K25 \end{aligned}$$

$$Y_{yz}$$

$$P12 = \$B\$2 + \$B\$3 * \$B\$20 + \$B\$4 * N12 + \$B\$5 * O12 + \$B\$6 * \$B\$20 * N12 + \$B\$7 * \$B\$20 * O12 + \\ + \$B\$8 * N12 * O12 + \$B\$9 * \$B\$20 * \$B\$20 + \$B\$10 * N12 * N12 + \$B\$11 * O12 * O12$$

$$P25 = \$B\$2 + \$B\$3 * \$B\$20 + \$B\$4 * N25 + \$B\$5 * O25 + \$B\$6 * \$B\$20 * N25 + \$B\$7 * \$B\$20 * O25 + \\ + \$B\$8 * N25 * O25 + \$B\$9 * \$B\$20 * \$B\$20 + \$B\$10 * N25 * N25 + \$B\$11 * O25 * O25$$

Оптимальні значення

$$x_o \quad B20 = -J7/J3$$

$$y_o \quad B21 = -R3/J3$$

$$z_o \quad B22 = -R7/J3$$

$$Y_o \quad B23 = B20 * B3 + B21 * B4 + B22 * B5 + B21 * B20 * B6 + B20 * B22 * B7 + B21 * B22 * B8 + \\ + B20 * B20 * B9 + B21 * B21 * B10 + B22 * B22 * B11 + B2$$

Парні залежності при заданих рівнях⁶⁴⁾

$$Y_{oxy}$$

$$H31 = \$B\$2 + \$B\$3 * F31 + \$B\$4 * G31 + \$B\$5 * \$B\$22 + \$B\$6 * F31 * G31 + \$B\$7 * F31 * \$B\$22 + \\ + \$B\$8 * \$B\$22 * G31 + \$B\$9 * F31 * F31 + \$B\$10 * G31 * G31 + \$B\$11 * \$B\$22 * \$B\$22$$

$$H39 = \$B\$2 + \$B\$3 * F39 + \$B\$4 * G39 + \$B\$5 * \$B\$22 + \$B\$6 * F39 * G39 + \$B\$7 * F39 * \$B\$22 + \\ + \$B\$8 * \$B\$22 * G39 + \$B\$9 * F39 * F39 + \$B\$10 * G39 * G39 + \$B\$11 * \$B\$22 * \$B\$22$$

$$Y_{oxz}$$

$$L31 = \$B\$2 + \$B\$3 * J31 + \$B\$4 * \$B\$21 + \$B\$5 * K31 + \$B\$6 * J31 * \$B\$21 + \$B\$7 * J31 * K31 + \\ + \$B\$8 * \$B\$21 * K31 + \$B\$9 * J31 * J31 + \$B\$10 * \$B\$21 * \$B\$21 + \$B\$11 * K31 * K31$$

$$L39 = \$B\$2 + \$B\$3 * J39 + \$B\$4 * \$B\$21 + \$B\$5 * K39 + \$B\$6 * J39 * \$B\$21 + \$B\$7 * J39 * K39 + \\ + \$B\$8 * \$B\$21 * K39 + \$B\$9 * J39 * J39 + \$B\$10 * \$B\$21 * \$B\$21 + \$B\$11 * K39 * K39$$

$$Y_{oyz}$$

$$P31 = \$B\$2 + \$B\$3 * \$B\$20 + \$B\$4 * N31 + \$B\$5 * O31 + \$B\$6 * \$B\$20 * N31 + \$B\$7 * \$B\$20 * O31 + \\ + \$B\$8 * N31 * O31 + \$B\$9 * \$B\$20 * \$B\$20 + \$B\$10 * N31 * N31 + \$B\$11 * O31 * O31$$

$$P39 = \$B\$2 + \$B\$3 * \$B\$20 + \$B\$4 * N39 + \$B\$5 * O39 + \$B\$6 * \$B\$20 * N39 + \$B\$7 * \$B\$20 * O39 + \\ + \$B\$8 * N39 * O39 + \$B\$9 * \$B\$20 * \$B\$20 + \$B\$10 * N39 * N39 + \$B\$11 * O39 * O39$$

⁶⁴⁾ Дані наведені для фіксації незалежних факторів при оптимальному значенні регресора. У разі прийняття заданими рівнями мінімального значення регресора слід замінити **\$B\$20**, **\$B\$21** і **\$B\$22** відповідно на **\$B\$26**, **\$B\$27** і **\$B\$28**, а у разі прийняття заданими рівнями максимального значення регресора слід замінити **\$B\$20**, **\$B\$21** і **\$B\$22** відповідно на **\$B\$32**, **\$B\$33** і **\$B\$34**.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Прикладная статистика. Правила определения оценок и доверительных границ для параметров нормального распределения: ГОСТ 11.004–74 (СТ СЭВ 876–78). – [Введ. 01.07.1975]. – М.; Изд-во стандартов, 1981. – 20 с.
2. Красовский П. С. Исследование и оптимизация свойств строительных материалов с применением элементов математической статистики: Учеб. пособие / П. С. Красовский. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2004. – 128 с.
3. Сизова Т. М. Статистика: Учебное пособие / Т. М. Сизова – СПб.: Изд-во СПб ГУИТМО, 2005. – 189 с.
4. Мойсейченко В. В. Основы научных исследований в агрономии / В. Ф. Мойсейченко, М. Ф. Трифонов, А. Х. Заверюха, В. Е. Ещенко. – М.; Колос, 1996. – 336 с.
5. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica / О. Ю. Реброва. – М., МедиаСфера, 2002. – 312 с.
6. Комп'ютерні методи в сільському господарстві та біології: Навч. посібник / [О. М. Царенко, Ю. А. Злобін, В. Г. Скляр, С. М. Панченко]. – Суми: Університетська книга, 2000. – 203 с.
7. Василенко П. М. Элементы методики математической обработки результатов экспериментальных исследований / П. М. Василенко. – К.: Из-во Укр. акад. с.-х. наук, – 1959. – 64 с.
8. Кассандрова О. Н. Обработка результатов измерений / О. Н. Кассандрова, В. В. Лебедев. – М.: Наука, 1970. – 104 с.
9. Горбачева И. Краткий курс по методам математической статистики: www.statwork.net / Ирина Горбачева. – 43 с.
10. Cochran W. G. Some Methods of Strengthening the Common χ^2 Tests // *Biometrics*, 1954. V. 10. - P. 417.
11. Мельников Ю. И. Аппараты для смешивания сыпучих материалов / Ю. И. Мельников. М.: Машиностроение, 1973. – 216 с.
12. Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментальных исследований и обработки опытных данных / Г. В. Веденяпин. – М.: Колос, 1973. – 199 с.
13. Ченцов Н. Н. Статистические решающие правила и оптимальные выводы / Н. Н. Ченцов. – М.: Наука, 1972. – 520 с.
14. Куприенко Н. В. Статистика. Методы анализа распределений. Выборочное наблюдение. 3-е изд.: учеб, пособие / Куприенко Н. В., Пономарева О. А., Тихонов Д. В. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 138 с.
15. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учебное пособие для биол. спец. вузов / Лакин Г. Ф. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Высш. шк., 1990. – 352 с.

16. Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике и случайным процессам / Дмитрий Письменный. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. — 288 с.
17. Спирин Н. А. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента: Конспект лекций (отдельные главы из учебника для вузов) / Н. А. Спирин, В. В. Лавров. Под общ. ред. Н. А. Спирина. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2004. – 257 с.
18. Heinholt I., Gaede K. W. Ingenieur statistic / I. Heinholt, K. W. Gaede. – München; Wein: Springer Verlag, 1964. – 352 s.
19. Новицкий П. В. Оценка погрешности результатов измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Л.: Энергоатомиздат, Денингр. отд-ние, 1991. – 304 с.: ил.
20. Сергеев А. Г. Метрология: Учеб. пособие для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Крохин В. В. – М.: Логос, 2001. – 408 с.
21. ГОСТ Р 8.736-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. Издание официальное. Дата введения 2013-01-01. – М.: – Стандартинформ, 2013. – 24 с.
22. Бурдун Г.Д. Основы метрологии / Г. Д. Бурдун, Б. Н. Марков. – М.: Изд-во стандартов, 1985. - 120 с.
23. Mann H.B., Wald A. On the choice of the number of intervals in the application of the chi-square test // Ann. Math. Stat., 1942. V. 13. - P. 478-479.
24. Козлов А. Ю. Статистические функции MS Excel в экономико-статистических расчетах / Андрей Юрьевич Козлов, Владимир Сергеевич Мхитарян, Владимир Федорович Шишов. – М.: ООО «Издательство Юнити-Дана». – 233 с.
25. Лапач С. М. Статистические методы в медико–биологических исследованиях из использованием Excel / С. М. Лапач, А. В., Чубенко, П. Н. Бабич – 2-е изд., перероб. и доп. – К.: МОРИОН, 2001. – 408 с.
26. Таушанов З. Вычисление энтропийного коэффициента при малых выборках / З. Таушанов, Е. Тонева, Р. Пенова // Изобретательство, стандартизация и качество, – София. 1973. № 5..
27. Тонева Е. Аппроксимация распределений погрешности средств измерений / Тонева Е. // Измерительная техника, 1981. № 6. - С. 15-16.
28. Алексеева И. У. Теоретическое и экспериментальное исследование законов распределения погрешностей, их классификация и методы оценки их параметров : автореф. дис. ... канд. техн. наук / И.У. Алексеева. Л., 1975.
29. Аністратенко В. О. Математичне планування експериментів в АПК: Навчальний посібник / Володимир Олексійович Аністратенко, Володимир Гаврилович Федоров . – Київ: Вища школа, 1993. – 375 с.

30. Справочник по вероятностным расчетам / [Абезгауз Г. Г., Тронь А. П., Копенкин Ю. Н., Коровина И. А.]. – М.: Воениздат, 1970. – 536 с.
31. Румшицкий Л. З. Математическая обработка результатов эксперимента / Л. З. Румшицкий. – М.: Наука. Главная редакция физико-математическом литературы, 1971. – 192 с.
32. Пономарев В. Б. Математическое моделирование технологических процессов: курс лекций / В. Б. Пономарев, А. Б. Лошкарев. Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, 2006. 129 с.
33. Любченко Е. А. Планирование эксперимента: учебное пособие. Часть 1 / Е.А. Любченко, О. А. Чуднова. Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. -156 с.
34. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): учебное пособие. – 5-е изд., доп. и перераб. / Доспехов Б. А. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
35. Елисеева И. И. Общая теория статистики / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. Под редакц. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой. Пятое издание, переработанное и дополненное. – М.: “Финансы и статистика”, 2004. – 657 с.
36. Подання результатів математичної та статистичної обробки даних медичних та біологічних досліджень у дисертаційних роботах / [Сердюк А. М., Антомонов М. Ю., Бардов В. Г., Прилуцький О. С.] // Бюлет. Вищої атестац. комісії України. – 2010. – № 6. – С. 31–33.
37. Дубина И. Н. Математические основы эмпирических социально-экономических исследований: учебное пособие / Дубина И. Н. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. – 2006 г. – 363 с.
38. Литтл Т. М. Сельскохозяйственное опытное дело. Планирование и анализ / Т. М. Литтл, Ф. Дж. Хиллз: пер. с англ. Б. Д. Кирюшкина; под ред. и с предисловием Д. В. Васильевой. – М.: Колос, 1981. – 320 с.
39. Ушкаренко И. А. Планирование эксперимента и дисперсионный анализ данных полевого опыта / И. А. Ушкаренко, И. Я. Скрипников. – К. – Одесса: Вища шк., 1988. – 120 с.
40. Ушкаренко Е. О. Дисперсійний і кореляційний аналіз у землеробстві та рослинництві: Навчальний посібник / [Ушкаренко Е. О., Нікіщенко В. Л., Голобородько С. П., Коковіхін С. В.]. – Херсон: Айлант, 2008. – 272 с.
41. Финни В. Д. Введение в теорию планирования эксперимента / Финни В. Д.: пер. с англ. – М.: Наука, 1970. – 280 с.
42. Виньерон А. Обработка результатов физико-химических наблюдений / А. Виньерон. – М.–Л. ОНТИ Гос. Хим.-технич. изд-во, 1934. – 368 с.
43. Леонов В. П. Применение статистики в медицине и биологии: анализ публикаций 1990–1997 гг. / В. П. Леонов, П. В. Ижевский // Сибирский медицинский журнал. 1997. № 3–4. – С. 64–74.
44. Леонов В. П. Ошибки статистического анализа биомедицинских данных / В. П. Леонов. Международный журнал медицинской практики. 2007. – № 2. – С. 19–13.

45. Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. Пер. с англ. – М., Практика, 1998. — 459 с.
46. Использование Microsoft Excel 97: Пер. с англ./ Брюс Холберг, Шерри Кинкорф, Билл Рей и др. – К.; М.; СПб.: Издат. Дом “Вильямс”, 1998. – 736 с. : ил. – (Спец. Изд.). – Парал. тит. англ.
47. Статистический анализ средствами пакета MS Excel: Лабораторный практикум по дисциплине “Статистика” / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: В.Ю. Арьков, А.В. Жевак, А.И. Абдулнагимов. – Уфа, 2008. – 51 с.
48. Баврин, И. И. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / И. И. Баврин. – М.: Высш. шк., 2005, – 160 с.
49. Третьяк Л. Н. Обработка результатов наблюдений: Учебное пособие / Л. Н. Третьяк. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. – 171 с.
50. Вольф В. Г. Статистическая обработка опытных данных / В. Г. Вольф. – М.: Колос, 1966. – 254 с.
51. Налимов В. В. Теория эксперимента. Физико–математическая библиотека инженера / В. В. Налимов – М.: Наука. Главн. ред. физ.–мат лит., 1971. – 208 с.
52. Наукові дослідження в агрономії: Навчальний посібник / [В. О. Ушкаренко, В. О. Найдьонова, П. Н. Лазер, О. В. Свиридов, С. О. Лавренко, Н. М. Лавренко] . – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 316 с.
53. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов / В. Боровиков. – [2–е изд.]. (+CD). – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.: ил.
54. Плохинский Н. А. Алгоритмы биометрии. Под ред. академика АН УССР В. В. Гнеденко. – М., Изд–во Моск. ун–та, 1980. – 150 с.
55. Кравченко Н. С. Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей в учебном лабораторном практикуме: учебное пособие / Н. С. Кравченко, О. Г. Ревинская; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд–во Томского политехнического университета, 2011. – 88 с.
56. Князев Б. А. Начала обработки экспериментальных данных. Измерительный практикум / Б. А. Князев, В. С. Черкасский. Новосибирск: Новосибирский госуниверситет. – 1996. – 44 с.
57. Обработка экспериментальных данных в MS Excel : методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов дневной формы обучения / сост. Е. Г. Агапова, Е. А. Битехтина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. унта, 2012. – 32 с.
58. Конспект лекций по дисциплине “Планирование и организация эксперимента”. – Сибирская государственная геодезическая академия. – Новосибирск. – 48 с.
59. Заляжных В. В. Статистические расчеты при обработке результатов испытаний (измерений) / сайт <http://arhiuch.ru/index.html>.

60. Плохинский Н. А. Биометрия / Плохинский Н. А. – [3-е издание]. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 368 с.
61. Хан Г. Статистические модели в инженерных Прикладах / Г. Хан, С. Шапиро. – М.: Мир, 1969. – 395 с.
62. Типовая методика определения качества смешивания кормов. – М. 29.055-87. [дата введения 30.09.1987]. – Дослідницьке: ВНИИМОЖ. – 1987. – 35 с.
63. ОСТ 70.19.2–83 Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для приготовления кормов. Программа и методика испытаний. Отраслевой стандарт. [дата введения 01.08.1984] / Государственный комитет СССР по производственно–техническому обеспечению сельского хозяйства. – М.: 1984. – 114 с
64. Типовая методика ускоренных испытаний сушилок кормов типа АВМ на надежность М. 29.063-89. [дата введения 01.01.1990]. – Дослідницьке: ВНИИМОЖ. – 1989. – 38 с.
65. Статистический словарь. М., Статистика, 1965. – 708 с.
66. <http://samenkorn.ru/dosing-and-mixing-feed-components/85-mixing-processes-in-feed-factories.html>.
67. Веденеева Е. А. Функции и формулы Excel 2007. Библиотека пользователя. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с: ил.
68. Мельников С. В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / Мельников С.В., Алешкин В. Р., Рошин П. М. – Л.: Колос, 1980. – 168 с.
69. Кудряшова Ж. Ф. Методы обработки результатов наблюдений при косвенных измерениях / Ж. Ф. Кудряшова, С. Г. Рабинович // Методы обработки результатов наблюдений при измерениях. Л.: ВНИИМ, 1975. – Вып. 172 (234), С. 3–58.
70. Кудряшова Ж. Ф. Рекомендации к методам обработки результатов наблюдений при прямых измерениях / Ж. Ф. Кудряшова, С. Г. Рабинович // Методы обработки результатов наблюдений при измерениях. Л.: ВНИИМ. – 1972. – вып. 134 (194). – С. 105–113.
71. Рабинович С. Г. Погрешности измерений / Рабинович С.Г. – Л.: Энергия, 1978. – 261 с.
72. Ашмарин И. П. Быстрые методы статистической обработки и планирования экспериментов / И. П. Ашмарин, Н. Н. Васильев, В. А. Амбросов. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 76 с.
73. Горбунов Л. В. Определение минимального количества измерений, обеспечивающих достоверный научный результат / Л. В. Горбунов // Агроэкологічний журнал. – 2002. – № 1. – С. 69–71.

74. Статистические методы. Проверка отклонения распределения вероятностей от нормального распределения: ГОСТ Р ИСО 5479–2002. [Дата введения 2002.07.01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – (Государственный стандарт Российской Федерации).
75. Кисельов О. В. Дослідження неорганізованих масивів вибірок / О. В. Кисельов, І. Б. Комарова, Р. О. Бакарджієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: – ІМТ НААН, 2011. – Вип. 1(7). – С. 254–259.
76. Бахан Н. И. Планирование эксперимента при исследованиях по механизации и автоматизации сельского хозяйства (учебн. пособ. для сельхозвузов) / Н. И. Бахан, А. М. Дмитриев, И. С. Нагорский. – Горки. – 1986. – 80 с.
77. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. Учебн. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. М., Высш. школа, 1970. – 239 с., ил.
78. Гмурман В. Е. Теория вероятности и математическая статистика. Изд. 4-е, доп. Учебн. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. М., Высш. школа, 1972. – 368 с., ил.
79. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / А. И. Кобзарь – М.: Физматлит, 2006. – 816 с.
80. Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и математическими таблицами / Под. ред. М. Абрамовица, И. Стиган. Пер. с англ. В. А. Диткина, Л. Н. Кармазиной – М.: Наука, Глав. ред. физ–мат. лит.–ры, 1979. – 832 с.
81. Егоров С. А. Законы распределения времени между отказами / С. А. Егоров, Н. Е. Егорова – Иваново: РИО ИГТА, 2011. – 28 с.
82. Гришин В. К. Статистические методы анализа и планирования эксперимента / В. К. Гришин. – М.: Изд–во Моск. у–та, 1975. – 128 с.
83. Гросман С. Математика для биологов: Пер с англ.: / С. Гросман, Дж. Тернер. Предисл. и комент. Ю. М. Свирежева. – М.: Высш. школа, 1983. – 383 с., ил.
84. Ахназарова С. Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии: Учебн. пособие для хим.–технол. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. – М.: Высш. шк., 1985. – 327 с.
85. Денисов В. И. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Методические рекомендации. Часть I. Критерии типа χ^2 / В. И. Денисов, Б. Ю. Лемешко, С. Н. Постовалов – Новосибирск: Изд–во НГТУ, 1998. – 126 с.
86. Дёрффель К. Статистика в аналитической химии. Пер. с нем. / К. Дёрффель. – М.: Мир, 1994. 268 с.

87. Поддубная О. Н. Лекции по теории вероятности / О. Н. Поддубная. Ми.: БГЭУ. – 2006. – 125 с.
88. Волковец А. И. Теория вероятностей и математическая статистика: Конспект лекций для студ. всех спец. и форм обучения БГУИР / А. И. Волковец, А. Б. Гуринович. – Мн.: БГУИР, 2003. – 84 с.
89. Бобкова В. А. Системы случайных величин / В. А. Бобкова. – Иваново: Изд-во ИГХТУ, 2010.
90. http://matlab.ru/articles/Ver_7.pdf.
91. Курепин В. В., Баранов И. В. Обработка экспериментальных данных: Метод. указания к лабораторным работам для студентов 1, 2 и 3-го курсов всех спец. / Под ред. В. А. Самолетова. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2003. – 57 с.
92. РМГ 29–99. Рекомендации по межгосударственной стандартизации ГСИ. Метрология. Основные термины и определения (взамен ГОСТ 16263–70) – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 46 с.
93. ГОСТ Р ИСО 5725–1–2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002 – 23 с.
94. Фильчиков П. Ф. Численные и прикладные методы прикладной математики. Справочник / П. Ф. Фильчиков. – К.: – Наукова думка, 1970. – 800 с.
95. Крылов А. Н. Лекции о приближенных вычислениях. Изд. 5 / А. Н. Крылов – М.–Л.: Гостехиздат, 1950. – 400 с.
96. Губин С. В. Теория планирования экспериментов в энергетике. Курс лекций для высших технических учебных заведений / С. В. Губин, А. И. Яковлев / – Киев, "Миллениум", 2009 – 158 с.
97. Савчук В. П. Обработка результатов измерений. Физическая лаборатория. Ч. 1: Учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Савчук В. П. – Одесса: ОНПУ, 2002. – 54 с.
98. Метрология, стандартизация и сертификация. Часть I: метод, указания по выполнению практических работ для студентов строительных и механических специальностей очной и заочной форм обучения / сост. В. А. Норин, В. Е. Гордиенко, Н. В. Овчинников; СПбГАСУ. – СПб., 2009. – 56 с.
99. Селиванов М. Н. Качество измерений: Метрологическая справочная книга / Селиванов М. Н., Фридман А. Э., Кудряшова Ж. Ф. – Л.: Лениздат, 1987. – 295 с., ил.
100. Брянский Л. Н. Краткий справочник метролога: справочник. / Л. Н. Брянский, А. С. Дойников. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 79 с.
101. РМГ 29–99. Рекомендации по межгосударственной стандартизации ГСИ. Метрология. Основные термины и определения (взамен ГОСТ 16263–70) – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2000. – 46 с.
102. Усков В. И. Обработка результатов измерений / Усков Валерий Иванович. М.: МГУПБ, ООО “Франтера”, 2011. – 34 с.

103. Налимов В. В. Применение математической статистике при анализе вещества / В. В. Налимов. М.: Гос. изд. физ.–мат. литерат., 1960. – 431 с.
104. Адлер Ю. П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. М.: Наука, 1976. – 278 с.
105. ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений. Дата введения 2002-11-01.
106. Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. – М.: Наука. Главная редакция физико–математическом литературы, 1983. – 416 с.
107. Агекян Т.А. Основы теории ошибок для астрономов и физиков / Т.А. Агекян. М. : Наука, 1972.
108. Грешников В. А. Статистические методы обработки эмпирических данных / В. А. Грешников, В. Н. Волков, А. И. Кубарев. М.: – Стандарты, 1978.
109. ДСТУ 3651.2–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення. К.: Держстандарт України. – 1998. – 16 с.
110. Бакарджиев Р. А. Обоснование конструктивных параметров и режимов работы пресс–брикетировщика для утилизации растительных материалов: дисс...канд. техн. наук: спец. 05.20.01 / Бакарджиев Роман Александрович / Мелитополь, 1997. – 168 с.
111. ДСТУ 3651.0–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення. К.: Держстандарт України. – 1998. – 14 с.
112. ДСТУ 3651.1–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин. Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. К.: Держстандарт України. – 1998. – 62 с.
113. ДСТУ 2568–94 Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів. . К.: Держстандарт України. – 1994. – 38 с.
114. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. К.: ДП УкрНДНЦ. – 2016. – 31 с.
115. Надикто В. Т. Основы научных исследований: Підручник / В. Т. Надикто. – Херсон: ОЛДІ–ПЛЮС, 2017. – 268 с.

116. Грибовский С. В. О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа / С. В. Грибовский, Н. П. Баринков, И. Н. Анисимова // “Вопросы оценки” с. 2–10.
117. Mann H.B., Wald A. On the choice of the number of class intervals in the application of the chi-square test // Ann. Math. Stat., 1942. V. 13. – P. 306–317.
118. Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
119. Жеверзев В. Ф. Специальный курс высшей математики для вузов / В. Ф. Жеверзев, Л. А. Кальницкий, Н. А. Сапогов. – М.: Высш. шк., 1970. – 416 с.
120. Мастицкий С. Э. Методическое пособие по использованию программы Statistica при обработке данных биологических исследований. / С. Э. Мастицкий. – Мн.: РУП “Институт рыбного хозяйства”. – 76 с.
121. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В. А. Вознесенский. М., Статистика, 192 с., 1973.
122. Урбах В. Ю. Биометрические методы / В. Ю. Урбах. – М.; Наука, 1964. – 416 с.
123. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие / А. Д. Наследов. СПб.: Речь 2001. – 393 с.
124. Караєв О. Г. Реєстрація та обробка інформації при аналізі механізованих технологічних систем в садівництві / О. Г. Караєв О. Г. // Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти – Вип. 4. – Херсон: ОЛДЫ-ПЛЮС, 2016. – С. 202–211.
125. Мельников С. В. Планирование эксперимента в исследованиях сельскохозяйственных процессов / Мельников С.В., Алешкин В. Р., Рошин П. М. – Л.: Колос, 1972. – 200 с.
126. Зайдель А. Н. Погрешности измерений физических величин / А. Н. Зайдель. – М.: – Наука, 1985.
127. Шеффе Г. Дисперсійний аналіз / Г. Шеффе. – М.: Физматгиз, 1980. – с. 512.
128. Системний аналіз в селекції польових культур. Навчальний посібник / Літун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П., Х. – 2009 – 354 с.
129. Гайдадин А. Н. Применение корреляционного анализа в технологических расчетах: метод. указания / сост. А. Н. Гайдадин, С. А. Ефремова, Н. Н. Бакумова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 16 с.
130. Ивантер Э. В., Коросов А. В. И 228 Введение в количественную биологию : учеб. пособие / Э. В. Ивантер, А. В. Коросов. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2011. – 302 с.

131. Фаддеев М. А. Элементарная обработка результатов эксперимента: Учебное пособие. Нижний Новгород: Издво. Нижегородского госуниверситета, 2002. – 108 с.
132. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, П. В. Костогриз, В. П. Опришко. За ред. В. О. Єщенка. — Вінниця: ПП “ТД “Едельвейс і К”, 2014. – 332 с.
133. Мойсейченко В. Ф. Основи наукових досліджень в агрономії: Підручник / В. Ф. Мойсейченко, В. О. Єщенко. – К.: Вища шк., 1994. – 334 с.
134. Методика. Корреляционный анализ для магистров / <http://www.studfiles.ru/preview/4385804/> Уральский государственный лесотехнический университет.
135. Гусев А. Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии: Учебное пособие для студентов факультетов психологии высших учебных заведений по направлению “Психология” / А. Н. Гусев. – М.: Учебно–методический коллектор “Психология”, 2000. – 136 с.
136. Бакарджиєв Р. О. Особливості використання програм Excel і Statistica для дисперсійного аналізу однофакторних експериментів з повторенням / Бакарджиєв Р. О., Комарова І. Б., Кисельов О. В. // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: – ІМТ НААН, 2012. – Вип. 2(10). – С. 170–178.
137. Howell D. Statistical Methods for Psychology (4 th ed.). CA: Duxbury Press, 1998.
138. Использование статистических методов для обработки экспериментальных данных при проведении научных исследований по механизации и электрофикации сельскохозяйственного производства: Методические рекомендации. – Л. – Пушкин. НИПТИМЭСХ Нечерноз. зоны РСФСР, 1978. – 66 с.
139. Ушкаренко В. О. Статистичний аналіз результатів польових дослідів у землеробстві: Монографія. / [Ушкаренко Е. О., Вожегова Р. А, Голобородько С. П., Коковіхін С. В.] – Херсон: Айлант, 2013. - 378 с.
140. Саутин С. Н. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / С. Н. Саутин. – Л. Химия, Ленингр. отд., 1975. – 48 с.
141. Хамханов Е. М. Основы планирования эксперимента / Е. М. Хамханов. – Улан–Уде: Вост.–Сиб. гос. технолог. у-тет., 2001. – 48 с.
142. Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel / Практикум: Учебное пособие для вузов / И. В. Орлова. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 136 с.
143. Кангалов П. Многофакторно изследване на процеса за получаване на конвесрионно фосфатно покритие / П. Кангалов, Г. Станева. // Научни трудове на Русенския университет. – 2009. – Т. 48, серия 1.1. – С.142–146.

144. ГОСТ 24026–80 Исследовательские испытания. Планирование экспериментов. Термины и определения / Государственный комитет СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – М.: 1980.
145. Корольков В. И. Планирование эксперимента: учеб. пособие / В. И. Корольков, И. С. Попов. Воронеж: ФГБОУВПО “Воронежский государственный технический университет”, 2013. – 80 с.
146. Блехман И. И. Прикладная математика. Предмет, логика, особенности подходов / И. И. Блехман, А. Д. Мышкис, Я. Г. Пановко. – Киев, Наукова думка, 1976. – 267 с.
147. Погорелый Л. В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин / Л. В. Погорелый. – К.: Техніка, 1981. – 176 с.
148. Митков А. Я. Статистические методы в сельхозмашиностроении / А. Я. Митков, С. В. Кардашевский. – М.: Машиностроение, 1978. – 390 с.
149. Хартман К. Планирование экспериментов в исследовании технологических процессов / К. Хартман, Э. Лецкий и др. – М., Мир, 1977. – 552 с.
150. Астахова Л. Г. Математическая теория планирования эксперимента Методические указания. / Л. Г. Астахова Л. Г. – Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2014. – 77 с.
151. Налимов В. В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В. В. Налимов, Н. А. Чернов. – М., Наука, 1965. – 340 с.
152. Астурян В. И. Теория планирования эксперимента: учеб. пособие / В. И. Астурян – М.: Радио и связь, 1983. – 248 с.
153. Новые идеи в планировании эксперимента / [под ред. В. В. Налимова]. – М.: Наука, 1966. – 336 с.
154. Миркова Е. В. Планировании эксперимента в условиях неоднородностей / Е. В. Миркова, А. Н. Лисенков. – М.: Наука, 1973. – 220 с.
155. Зедгенидзе И. Г. Планировании эксперимента для исследования многокомпонентных систем / И. Г. Зедгенидзе. – М.: Наука, 1976. – 390 с.
156. Налимов В. В. Логические основания планирования эксперимента / В. В. Налимов, Т. Н. Голикова. – М., Металлургия, 1976. – 128 с.
157. Ефимов Н. В. Квадратичные формы и матрицы / Н. В. Ефимов. – М.: Наука, 1967. – 160 с.
158. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных сотрудников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн. – М., Наука, 1970. – 720 с.
159. Кисельов О. В. Використання пакету програм Statist для аналізу результатів багатфакторного активного експерименту / О. В. Кисельов, Є. Є. Антонов, Р. О. Бакарджієв // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: – ІМТ НААН, 2011. – Вип. 1(7). – С. 243–253.

160. Лемешко Б. Ю. О применении и мощности критериев проверки однородности дисперсий. Параметрические критерии / Лемешко Б. Ю., Лемешко С. Б., Горбунова А. А. // Измерительная техника. – 2010. – № 3. – С. 10–15.
161. Бакарджиєв Р. О., Комарова І. Б., Кисельов О. В. Розрахунок математичної моделі багатofакторного експерименту за допомогою ППП Statistica / Бакарджиєв Р. О., Комарова І. Б., Кисельов О. В. // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2012. – Вип. 2, т. 2. – С. 59–65.
162. Бакарджиєв Р. О. Попередня оцінка і обробка даних при регресійному аналізі / Р. О. Бакарджиєв, А. О. Комаров // Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в с.–г. виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Вип. 28, – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 255–260.
163. Бакарджиєв Р. О. Особливості оцінки результатів регресійного аналізу / Р. О. Бакарджиєв, А. О. Комаров // Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в с.–г. виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Вип. 28, – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 237–249.
164. Бондар Е. В. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона / VII Международная студенческая электронная научная конференция "Студенческий научный форум 2015" <https://www.scienceforum.ru/2015/928/7849>.
165. Елисеева И. И. Эконометрика: учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др.; под ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 576 с.: ил.
166. Алексеев Е. Р. Matcad 12 / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова. – М.: НТ Пресс, 2005. – 347, 7 с.: ил.
167. Кисельов О. В. Порівняння результатів рівняння регресії з незадіяним і задіяним рангом / Кисельов О. В., Комарова І. Б., Бакарджиєв Р. О. // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: – ІМТ НААН, 2012. – Вип. 1(9). – С. 97–102.
168. Бакарджиєв Р. О. Застосування тернарних графіків при аналізі теплоти згорання для трикомпонентних паливних брикетів / Бакарджиєв Р. О. // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві: Зб. наук. праць. – Запоріжжя: – ІМТ НААН, 2011. – Вип. 2(8). – С. 220–224.
169. Мілько Д. О. Тернарне представлення поверхні відклику трифакторного експерименту / О. Д. Мілько, Р. О. Бакарджиєв, І. Б. Комарова // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2015. – Вип. 15, т. 3. – С. 224–229.
170. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / П. С. Александров. – М.: Наука, Главн. ред-ия физ-мат лит-ры, 1979. – 512.

171. Уокенбах Д. Диаграммы в Excel / Джон Уокенбах : Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 448 с.
172. Боровиков В. П. Популярное введение в программу STATISTICA / В. П. Боровиков. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, 1998, – 269 с.
173. Деревицкий Н. Ф. Опытное дело в растениеводстве. Изд.-во АН Молдавской ССР, Кишинева, 1962.
174. Иванченко Э. Г. К методике изучения пластичности сортов / Э. Г. Иванченко, В. Г. Вольф, П. П. Литун // Селекция и семеноводство. Республиканский межведомственный тематический научный сборник. – К., Урожай, 1975. – Вып. 40. – С. 16–25.
175. Кильчевский А. В. Экологическая селекция растений / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева. – Мн.: Тэхнологія, 1997. – 372 с.
176. Кильчевский А. В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов [растений], дифференцирующей способности среды. Сообщение 1. Обоснование метода / А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева // Генетика. – 1985. – Т.21, № 9. – С.1481–1490.
177. Системний аналіз в селекції польових культур. Навчальний посібник / Літун П. П., Кириченко В. В., Петренкова В. П., Коломацька В. П., Х. – 2009 – 354 с.
178. Боголюбов А. С. Простейшие методы статистической обработки результатов экологических исследований / А.С.Боголюбов // Экосистема, 1998. <http://karpolya.ru/uploads/fajly/40statistika.pdf>.
179. Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення на вимоги до змісту нормативних документів. ДСТУ 1.5:2003. – [Чинний від 2003-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2003. – 46 с.
180. Методичні поради. 4-е видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, Видавництво “Толока”, 2010. – 80 с. – Бібліогр. 79 с.
181. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ Statistica / Реброва О. Ю. М., МедиаСфера, 2002, 312 с.
182. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008:2015. – [Чинний від 2017-07-01]. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2016. –31 с.
183. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлет. Вищої атестац. комісії України. – 2007. – № 6. – С. 9–16.
184. Подготовка публикаций по результатам научных исследований. Методические рекомендации / [отв. за выпуск И. С. Чекалин] – Л.: НИПТИМЭСХ НЗ РСФСР, 1978. – 35 с.

185. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008–95. – [Чинний від 1995-02-25]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.
186. Флеер М. Д. Составление текстовых производственных документов / М. Д. Флеер, Ю. Л. Полторак. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 144 с.
187. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления: ГОСТ 7.32–2001. – [введен 1 июля 2002 г.]. М. – 2001.
188. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам: ГОСТ 2.105.95. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – [введен 1 июля 1996 г.]. Минск. – 2005. – 29 с.
189. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила оформления: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [введен 1 июля 2007 г.]. М. – 2005 – 60 с.
190. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з впровадження / уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 с.
191. Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата. Методические рекомендации в помощь соискателю / [составитель В. И. Шевчук]. – М.: Гос. библиот. СССР им. В. И. Ленина, 1988. – 37 с.
192. Единая система конструкторской документации. Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм: Р 50–77–88. Государственный комитет СССР по стандартам. – [введен 1 января 1989 г.]. М.: Изд-во стандартов. – 1989.
193. Техника сельскохозяйственная. Методы энергетической оценки: ГОСТ Р 52777–2007. – [Введ. 13.11.2007]. – М.; Статинформ, 2008. – 6 с.
194. Дерффель К. Статистика в аналитической химии / Дерффель К. – М.: – Мир, 1994.
195. Pearson Ed. E. S. Abridged from Table 12 / Ed. E.S. Pearson, U.O.Hartley. // Biometrika Tables for Statisticians. Vol. 1 Hartley. – London: Cambridge University Press, 1962.
196. Пустыльник Е. И. Методы анализа и обработки наблюдений / Е. И. Пустыльник. М.: Наука, Главн. ред. ф.–м. лит.–ры, 1968. – 288 с.
197. http://statexpert.org/articles/таблицы_критических_значений_статистических_критериев#5.

**Інститут механізації тваринництва
Національної академії аграрних наук України**

**Олексій Васильович Кисельов
Ірина Борисівна Комарова
Дмитро Олександрович Мілько
Роман Олександрович Бакарджієв**

**СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА
І ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ**

(ІЗ ДОСВІДУ НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ)

Навчальний посібник

Електронний аналог друкованого видання (електронна книга)

Редагування і коректування І. Комарова
Комп'ютерна верстка і художнє оформлення О. Кисельов
Текст публікується в авторській редакції.

**Інститут механізації тваринництва
Національної академії аграрних наук України
остр. Хортиця,
м. Запоріжжя, Україна, 69017
тел./факс: (061) 289 81 44
e-mail: imtuaan@ukr.net**



Видавець:
ТОВ «Видавництво „СТАТУС“»
Адреса редакції: Україна, 69035, м. Запоріжжя,
Соборний просп., д. 158, оф. 249.
моб. +38 (068) 448-11-28, mail@status.zp.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції *серія ДК № 5316 від 03.04.2017 р.*

Здано в набір 01•VII•2017. Підписано до друку 16•VIII•2017. Формат PDF.
Гарнітура Times New Roman. Об'єм 66,7 Mb. Обл.-вид. арк. 71,66.
Тираж 100 прим. Замовлення № 8583/07.2017-А.

ISBN 978-617-7353-62-0